Se gli elementi osculanti a 1900 Ott. 31 si trasportano ad osculare a 1898 Agos. 2, introducendo opportunamente le perturbazioni da me in passato calcolate e pubblicate, l'accordo coi luoghi normali, osculanti ad Agos. 2, 1898, e pubblicati in A. N. 3678, è intorno a 1", e per avere un accordo più stretto converrebbe migliorare i luoghi normali anche col calcolo della parallasse con distanze geocentriche esatte, mentre nel 1898, coll'effemeride allora

preparata per i confronti (vedi A. N. 3609), le distanze erano ancora ben difettose, e l'effetto non è trascurabile come mi accertai; inoltre forse una revisione e un miglioramento dell'intero conteggio delle perturbazioni, fra Agosto 1898 e Ottobre 1900, non sarebbero del tutto inutili, poichè questa volta quel conteggio è rimasto del tutto indipendente dal presente lavoro; ciò non pertanto dette miglirie e revisioni non sembrano necessarie.

Roma, 1901 Giugno 12.

E. Millosevich.

Elemente des Planeten (454) Mathesis.

Epoche 1900 April 28.5 M. Z. Berlin.

$$\begin{array}{lcl} M = 353^{\circ} 6' 49''7 & & \varphi = 6^{\circ} 18' 51''5 \\ \omega = 174 20 14.5 & & \mu = 833''1458 \\ \Omega = 32 33 28.4 & \left. \vphantom{\begin{array}{l} M \\ \omega \\ \Omega \\ i \end{array}} \right\} 1900.0 & \log a = 0.419523 \\ i = 6 19 15.0 & & \end{array}$$

Die Elemente sind aus den nachstehenden Normalörtern der ersten Erscheinung im Anschluss an den ersten und sechsten Ort durch Variation der Distanzen abgeleitet und lassen die unter B — R gegebenen Abweichungen übrig.

Nr.	M. Z. Berlin	α 1900.0	δ 1900.0	Bb.	Gew.	B — R	
						$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
1	April 2.5	12 ^h 41 ^m 12.60	— 0° 0' 7.3	6	1	0.0	0.0
2	» 16.5	12 28 50.22	+ 0 27 19.7	9	1	— 0.4	— 0.2
3	» 24.5	12 23 5.35	+ 0 32 21.2	9	1	+ 0.1	— 1.0
4	Mai 2.5	12 18 50.09	+ 0 27 42.6	14	1	+ 1.0	— 0.5
5	» 18.5	12 15 36.71	— 0 12 8.6	5	1	— 2.0	— 1.0
6	» 25.5	12 16 26.69	— 0 41 37.1	5	1	— 0.2	0.0
7	Juni 22.5	12 31 41.10	— 3 39 28.7	1	1/4	— 0.6	— 1.8

Die Ephemeride für die bevorstehende Opposition wird in den Veröffentlichungen des Kgl. Astron. Recheninstituts zu Berlin mitgeteilt werden.

Die Rechnungen wurden anknüpfend an eine Vorlesung von Herrn Prof. Becker über Bahnbestimmung und mit dessen freundlichster Unterstützung ausgeführt.

Strassburg i. E., 1901 Juni.

W. I. Milham.

Elemente der Planeten 1901 FV, FX, FY.

Pl.	Epoche M. Z. Berlin	M	ω	Ω	i	φ	μ	$\log a$
FV	1901 Jan. 9.5	92° 54' 0.7	252° 34' 12.3	103° 44' 20.8	10° 51' 48.3	14° 39' 57.7	742.582	0.452841
FX	1901 Jan. 23.5	294 39 46.9	261 29 42.2	291 43 8.8	19 17 15.1	3 58 23.0	581.203	0.523786
FY	1901 Febr. 11.5	55 52 57.2	91 49 11.7	323 48 28.8	6 24 22.6	6 20 17.4	704.103	0.468247

Die Elemente beziehen sich auf das Aequinoctium 1901.0.

1901 FV. Bahn gerechnet aus Jan. 9 Heidelberg, Jan. 23 und Febr. 15 Wien. Darstellung der Beobachtung Jan. 18 Wien (B — R): $\Delta\alpha = +0.2$, $\Delta\delta = -4.0$.

1901 FX. Bahn gerechnet aus Jan. 23 Wien, Febr. 10 Kopenhagen, Febr. 25 Kopenhagen und Königsberg. Darstellung der Beobachtungen (B — R):

1901	Ort	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	1901	Ort	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
Jan. 17	Heidelberg	— 0.16:	+ 18.5:	Febr. 11	Kopenhagen	+ 0.06	+ 3.9
19	Pola	— 0.76	+ 3.9	15	Wien	+ 0.38	— 0.1
19	Rom	— 0.37	+ 1.2	20	Königsberg	+ 0.14	+ 1.6
22	»	— 0.14	— 0.6	24	Kopenhagen	— 0.18	— 0.3
22	Wien	+ 0.06	— 1.7	25	»	— 0.16	— 0.1
23	»	— 0.02	— 0.2	25	Königsberg	+ 0.14	+ 0.5
Febr. 10	Kopenhagen	— 0.07	+ 0.2				