hatte. Eine ziemlich scharfe Verdichtung von der Helligkeit 11^m schien zwei hellere Stellen zu besitzen, aber wegen der langsamen Bewegung des Kometen ließ sich nicht mehr entscheiden, ob der Komet nicht etwa ein Sternchen bedeckte. Der Ort war 1906 Nov. 20 um 12^h 14^m M. Z. Bamberg

$$\alpha \text{ app.} = 4^{\text{h}} 3^{\text{m}} 13^{\text{s}} \quad \delta \text{ app.} = -3^{\circ} 35' 5'' \quad \text{Red. ad l. app.} +3^{\circ} 06' +5''.$$

Der Komet stand etwa 6' nördlich von BD. $-3^{\circ} 686$, der ein weit getrennter Doppelstern mit nahe gleich hellen Komponenten ist.

Mittlere Örter der Vergleichsterne.

*	α 1906.0	δ 1906.0	Autorität
1	4 ^h 3 ^m 6 ^s .45	$-3^{\circ} 41' 5''$	BD. $-3^{\circ} 686$ rapp. à 2
2	4 3 52.67	$-3 48 22.7$	AG. Straßb. 1038
3	4 5 7.31	$-3 49 13.5$	$\frac{1}{2}$ (Rad ₃ 981 + AG. Straßb. 1047)
4	4 5 45.99	$-4 10 46.6$	AG. Straßb. 1049

Elemente und Ephemeride des Kometen 1906 g.

Aus den Beobachtungen Kopenhagen Nov. 10 (1. Beob.), Utrecht Nov. 17 und Rom Nov. 25 habe ich die folgenden Elemente abgeleitet:

$$\begin{aligned} T &= 1906 \text{ Nov. } 21.2585 \text{ M. Z. Berlin} \\ \omega &= 8^{\circ} 38' 13'' \\ \Omega &= 84 56.05 \\ i &= 56 32.41 \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} T \\ \omega \\ \Omega \\ i \end{aligned}} \right\} 1906.0 \quad \text{Mittlerer Ort (B - R):}$$

$$\text{Nov. 17} \quad d\lambda = +0.61 \quad d\beta = -0.02.$$

$$\log q = 0.08446$$

Ephemeride für 12^h M. Z. Berlin.

1906	α vera	δ vera	$\log r$	$\log A$	H.	1906	α vera	δ vera	$\log r$	$\log A$	H.
Nov. 28	10 ^h 52 ^m 28 ^s	+36° 13' 5"	0.0863	9.7998	1.32	Dez. 14	12 ^h 58 ^m 39 ^s	+53° 6' 4"	0.1029	9.8504	0.97
29	10 59 22	37 33.8				15	13 7 8	53 46.1			
30	11 6 25	38 52.7				16	13 35	54 23.1			
Dez. 1	11 13 38	40 10.0				17	23 59	54 57.4			
2	21 0	41 25.5	0.0889	9.8042	1.27	18	32 19	55 29.2	0.1093	9.8726	0.85
3	28 32	42 38.7				19	40 34	55 58.5			
4	36 13	43 49.5				20	48 43	56 25.4			
5	44 2	44 58.0				21	13 56 46	56 50.1			
6	11 51 58	46 3.8	0.0926	9.8149	1.19	22	14 4 41	57 12.7	0.1165	9.8962	0.73
7	12 0 2	47 6.7				23	12 28	57 33.3			
8	8 12	48 6.9				24	20 5	57 52.0			
9	16 28	49 4.2				25	27 33	58 9.1			
10	24 49	49 58.6	0.0973	9.8307	1.08	26	34 51	58 24.6	0.1244	9.9204	0.63
11	33 14	50 49.9				27	41 58	58 38.6			
12	41 41	51 38.3				28	48 55	58 51.3			
13	50 10	52 23.8				29	14 55 40	59 2.8			
14	12 58 39	+53 6.4	0.1029	9.8504	0.97	30	15 2 15	+59 13.3	0.1328	9.9446	0.54

Kiel, Bureau der Astr. Nachrichten, 1906 Nov. 28.

Elis Strömgren.

Elemente und Ephemeride des Kometen 1906 h.

Aus dem hier vorliegenden Material, Nov. 16–23, habe ich durch verschiedene Kombination der Beobachtungen vier Elementensysteme berechnet, von denen ich nur dasjenige mitteile, welches im mittleren Ort den relativ kleinsten Fehler übrig läßt. Denselben liegen die Beobachtungen Nov. 17 Mt. Hamilton, Nov. 20 Wien und Nov. 23 Rom zugrunde.

$$\begin{aligned} T &= 1906 \text{ Sept. } 15.371 \text{ M. Z. Berlin} \\ \omega &= 187^{\circ} 26' 8'' \\ \Omega &= 201 10.8 \\ i &= 21 20.0 \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} T \\ \omega \\ \Omega \\ i \end{aligned}} \right\} 1906.0 \quad \text{Mittlerer Ort (B - R):}$$

$$\Delta\lambda = +0.09 \quad \Delta\beta = -0.64$$

$$\log q = 0.29956$$

Mit Ausnahme von Knoten und Neigung bestimmen sich die Elemente, wie eine Vergleichung der verschiedenen Rechnungen ergibt, noch außerordentlich unsicher, so z. B. schwankt T zwischen Sept. 10 und Dez. 5, ω zwischen 179° und 225° , $\log q$ zwischen 0.26 und 0.39. Ein von Prof. H. Kreutz unternommener Versuch, aus Nov. 16 Washington,

Nov. 19 Northfield und Nov. 22 Utrecht einen Kegelschnitt ohne Voraussetzung der Exzentrizität abzuleiten, führte zu einer Ellipse mit 2.6 Jahren Umlaufzeit; doch stellt diese die zur Rechnung nicht benutzten Beobachtungen so schlecht dar, daß ihr kaum eine reelle Bedeutung zukommen kann.

Ephemeride für 12^h M. Z. Berlin.

1906	α vera	δ vera	$\log r$	$\log \Delta$	H.
Nov. 14	4 ^h 4 ^m 41 ^s	—2° 17' 2	0.3268	0.0714	1.00
16	4 14	2 44.3			
18	3 46	3 9.8	0.3302	0.0779	0.95
20	3 17	3 33.7			
22	2 47	3 56.0	0.3338	0.0857	0.91
24	2 17	4 16.6			
26	1 48	4 35.5	0.3376	0.0947	0.85
28	1 20	4 52.8			
30	0 53	5 8.3	0.3415	0.1046	0.80
Dez. 2	0 28	5 22.0			
4	4 0 4	—5 34.1	0.3455	0.1155	0.75

1906	α vera	δ vera	$\log r$	$\log \Delta$	H.
Dez. 4	4 ^h 0 ^m 4 ^s	—5° 34' 1	0.3455	0.1155	0.75
6	3 59 43	5 44.5			
8	59 25	5 53.3	0.3496	0.1272	0.70
10	59 10	6 0.5			
12	58 59	6 6.2	0.3538	0.1396	0.65
14	58 52	6 10.5			
16	58 48	6 13.3	0.3581	0.1527	0.60
18	58 49	6 14.7			
20	58 54	6 14.8	0.3625	0.1662	0.54
22	59 3	6 13.6			
24	3 59 16	—6 11.2	0.3670	0.1802	0.50

Kiel, Bureau der Astr. Nachr., 1906 Nov. 28.

M. Ebell.

Über zwei nebelartige Objekte nahe BD. —3°696.

Le 22 novembre en observant la comète 1906 h au grand équatorial de l'observatoire de Bordeaux j'ai aperçu au voisinage de l'étoile de comparaison que j'avais choisie, BD. —3°696, grandeur 6.5, deux nébulosités très visibles, de grandeurs 12.0 mais de formes très différentes. La nébulosité I était de forme très allongée, d'une longueur de 30"

environ. La nébulosité II de forme arrondie avait un diamètre de 20" environ. J'ai pu faire sur ces deux nébulosités une dizaine de pointés. En désignant par α et δ les coordonnées équatoriales de l'étoile —3°696, les coordonnées des centres des deux nébulosités seraient pour le 22 nov. à 11^h 30^m (t. m. Bordeaux)

Nébulosité I	α — 6 ^s 4	δ + 6"
Nébulosité II	α — 5 ^s 3	δ — 2' 20"

La nébulosité II se trouvait à côté d'une petite étoile de grandeur 12.5. Le 23 novembre je n'ai pu retrouver ces nébulosités. Les pointés sur la nébulosité II faits le 22 nov. sembleraient révéler une marche horaire de +0^s 7

et $\Delta\delta = -7"$. Certains observateurs observant le 22 nov. la comète 1906 h et ayant pris la même étoile de comparaison, auraient-ils remarqué les nébulosités en question.

Floirac, Bordeaux, le 24 novembre 1906.

E. Esclançon.

Zusatz des Herausgebers. Da die Möglichkeit vorliegt, daß es sich hier um Begleiter des Kometen 1906 h ($\approx$ minus —3°696 = —2^m 24^s 5 —8' 21") handelt, habe ich sofort nach Eintreffen vorstehender Notiz, Nov. 26, einige Sternwarten telegraphisch um Prüfung gebeten. Aus Rom kam Nov. 27 die Antwort »Nessuna appendice [alla —3°696], regione bassa ponente dopo luna. Millosevich«. Weitere Nachrichten sind, außer daß Prof. M. Wolf telegraphierte »Wetter hoffnungslos schlecht«, bis zum Schluß der Nummer nicht eingegangen. Kr.

Komet 1906 g. Prof. J. Franz in Breslau teilt d. d. 29. Nov. die folgende von Herrn stud. Georg Dybeck aus Nov. 10 (2. Beob.) Kopenhagen, Nov. 13 Breslau und Nov. 20 Jena gerechnete Bahn des Kometen 1906 g mit:

$$T = 1906 \text{ Nov. } 18.8896 \text{ M. Z. Berlin, } \omega = 6^\circ 17' 8''.5, \Omega = 84^\circ 33' 5''.2, i = 55^\circ 31' 40''.9, \\ \log q = 0.083744, \text{ Äqu. } 1906.0.$$

Inhalt zu Nr. 4138. A. Tass. Vorläufige Mitteilung der Resultate photometrischer Beobachtungen veränderlicher Sterne. 145. — J. Pidoux. Positions de petites planètes. 149. — E. Silbernegel. Beobachtungen von Kometen. 153. — Beobachtungen des Kometen 1906 h. 155. — E. Strömgren. Elemente und Ephemeride des Kometen 1906 g. 157. — M. Ebell. Elemente und Ephemeride des Kometen 1906 h. 157. — E. Esclançon. Über zwei nebelartige Objekte nahe BD. —3°696. 159. — Zusatz hierzu. 159. — Komet 1906 g. 159.