Kynurin.

	Berechnet		Gefunden	
			I.	II.
C ₁₈	216	74,48	74,77	74,91
H ₁₄	14	4,82	5,06	5,12
N ₂	28	—	—	—
O ₂	32	—	—	—

Für das Platinsalz

Pt	Berechnet	Gefunden	
		28,32	27,9
	28,19		

Für das chlorwasserstoffsaurer Salz

	Berechnet	Gefunden
HCl	20,11	20,13
H ₂ O	9,07	8,77.

Dafs die beiden vorstehend beschriebenen Körper der aromatischen Reihe angehören, geht aus ihrer Formel und ihren Reactionen mit Sicherheit hervor. Ihre Constitution wird sich bei weiteren Versuchen ergeben.

Dorpat, den 24. Juni 1872.

Berichtigung.

In diesen Annalen **150**, 15 habe ich eine von Herrn Prinzhorn ausgeführte Analyse der Trisalicylsalicylsäure angeführt, bei welcher es heifst :

1. 0,2702 Grm. aus v. Gilm's acetylrter Salicylsäure gaben 0,679 CO² und 0,0962 H²O.

Statt dessen mufs es nach Herrn Prinzhorn's, mir und der Redaction dieser Annalen vorliegendem Journal heifsen :

- 0,2702 Grm. aus von v. Gilm's acetylrter Salicylsäure gaben 0,674 CO² und 0,0692 H²O.

Die Resultate der Analysen vergleichen sich demnach mit der Formel der Trisalicylsäure, wie folgt :

			Prinzhorn		
			1.	2.	3.
28 C	336	67,47	68,03	67,96	67,11
18 H	18	3,61	3,95	4,07	4,07
9 O	144	28,92	—	—	—
C ²⁸ H ¹⁸ O ⁹	498	100,00.			

Dieser Fehler bedurfte der Berichtigung, da H. Schiff*) demselben Gründe gegen die Existenz der Trisalicyclosalicylsäure entnimmt.

Ich bin zu meinem Bedauern zur Zeit nicht in der Lage, durch eine wiederholte Untersuchung der condensirten Salicylsäuren diejenigen Punkte meiner Arbeit aufzuklären, welche durch Schiff's Untersuchung etwa zweifelhaft geworden sein könnten. Dafs die von mir gegebene Formel der Salicylosalicylsäure die Bildung dieses Körpers unter Austritt von Essiganhydrid schwierig erklärt, mufs allerdings zugegeben werden. Aber andererseits ist nicht einzusehen, wie eine Säure von der Formel $O \begin{cases} C^6H^4 \cdot CO \cdot O \cdot H \\ C^6H^4 \cdot CO \cdot O \cdot H \end{cases}$ durch Ammoniak in Salicylamid und salicylsaures Ammoniak übergeführt werden kann; überhaupt ist die leichte Zerlegbarkeit der Säuren, welche unter Austritt von Wasser aus der Salicylsäure entstehen, mit H. Schiff's Formel schwer vereinbar. Wäre die Untersuchung jetzt nochmals auszuführen, so würde ich der Frage, ob beim Erhitzen von Acetylosalicylsäure Essiganhydrid allein oder neben Essigsäure auftritt, eine gröfsere Aufmerksamkeit zuwenden, als es geschehen sein mag.

Hannover, 15. Juli 1872.

K. Kraut.

*) Diese Annalen **163**, 223.