Beobachtungen von Jupiterstrabanten

am Utrechter Refractor (Oeffnung 26 cm, Brennweite 319 cm, Vergrößerung 248).

1900	Phase	M. Z. Utrecht	B — R	L.	Bb.	1900	Phase	M. Z. Utrecht	B — R	L.	Bb.
März 9	I Sh E	H 16 ^h 13 ^m 42 ^s	— 1 ^m .3		V	Mai 18	I Tr J	EB 10 ^h 32 ^m 32 ^s		4	V
April 21	II Oc R	EB 15 33 14			V			H 33 26	0 ^m .0		
		H 33 58	— 2.6				I Sh J	LB 34 28		4	V
		LB 34 38						EB 11 4 36			
Mai 26	I Tr J	EB 10 54 32		3	V			H 5 27	+ 1.0		
		H 56 1	+ 2.4					LB 6 19			
		LB 57 13				Juli 3	II Tr E	H 9 21 7	+ 5.6	1	V
	I Tr E	EB 13 2 43		2	V	4	I Tr E	EB 10 41 32		2	V
		H 4 52	— 0.9					H 44 16	— 1.3		
		LB 6 17						LB 46 40			
Juni 3	I Ec R	Z 12 17 15.8	+ 71 ^s		V	19	I Oc D	EB 9 24 58		3	N
		VL 46						H 26 40	+ 1.1		
11	I Tr E	EB 10 59 59		2	V			LB 28 3			
		H 11 1 36	+ 1 ^m .1				II Ec R	Z 10 32 30.5	— 183 ^s .5	2	N
		LB 3 8						VL 36 3			

Bemerkungen.

Juni 18, I Tr J. Gut. Bilder sehr ruhig. — Juli 3, II Tr E. Unsicher. — Juli 19, I Oc D. Ziemlich gut. — Juli 19, II Ec R. Leidlich. Planet niedrig. Nebel.

EB = erste Berührung; H = Halbirung; LB = letzte Berührung; Z = Trabant zuerst gesehen; VL = Trabant hat das volle Licht.

Die Spalte B — R enthält den Unterschied Beobachtung minus Angabe des Nautical Almanac. Für die östliche Länge von Utrecht haben wir 20^m 31^s 0 angenommen. In der mit L. bezeichneten Spalte ist der Luftzustand angegeben; 1, 2, 3 und 4 bedeuten der Reihe nach schlecht, ziemlich gut, gut und ausgezeichnet.

Utrecht, 1901 März 8.

A. A. Nijland, S. L. Veenstra.

Observations of Comet 1901 I

made at the Royal Observatory Cape of Good Hope, by Mr. R. T. A. Innes.

(Communicated by Sir David Gill, H. M. Astronomer).

1901	Greenw. M. T.	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cp.	α app.	$\log p.\Delta$	δ app.	$\log p.\Delta$	Red. ad l. app.	*
May 3	5 ^h 4 ^m 43 ^s	+ 0 ^m 39 ^s 15	+ 4' 14".4	7.7	3 ^h 40 ^m 32 ^s 39	9.682	— 0° 32' 18".6	0.688 _n	+ 0 ^s 52 — 3".7	1
4	5 15 0	— 3 8.60	+ 13 51.6	6.6	3 54 24.23	9.682	— 0 18 27.9	0.688 _n	+ 0.55 — 4.6	2
5	4 57 46	+ 3 4.16	+ 3 33.7	4.4	4 7 8.97	9.671	— 0 1 32.4	0.689 _n	+ 0.56 — 5.0	3
5	5 29 24	— 3 31.76	— 13 28.3	4.4	4 7 25.23	9.683	— 0 1 8.5	0.689 _n	+ 0.58 — 5.3	4
6	4 49 45	+ 8 10.38	+ 5 57.5	1.1	4 19 7.37	9.661	+ 0 18 17.4	0.689 _n	+ 0.58 — 5.2	4
6	»	— 10 15.53	+ 6 16.1	1.1	4 19 7.04	»	+ 0 18 21.5	»	+ 0.61 — 6.2	5
6	5 5 48	+ 1 1.62	+ 1 57.7	5.4	4 19 14.91	9.671	+ 0 18 34.8	0.689 _n	+ 0.59 — 5.6	6
6	5 15 18	— 1 38.57	— 8 35.8	5.5	4 19 19.21	9.675	+ 0 18 35.8	0.689 _n	+ 0.60 — 5.7	7
7	5 1 15	— 1 43.89	— 7 30.8	8.8	4 30 24.24	9.663	+ 0 40 15.0	0.687 _n	+ 0.62 — 6.2	8
11	4 50 17	— 0 58.82	— 1 29.0	6.6	5 7 38.75	9.638	+ 2 13 45.0	0.699 _n	+ 0.71 — 7.6	9
11	5 7 28	— 0 50.01	+ 9 1.1	5.5	5 7 42	9.653	+ 2 14	0.698 _n	+ 0.71 — 7.6	10
12	4 49 56	— 0 19.49	— 12 42.3	2.2	5 15 22.71	9.633	+ 2 36 50.6	0.702 _n	+ 0.74 — 7.8	11
12	5 37 58	+ 1 35.92	+ 8 12.2	6.6	5 15 38.02	9.669	+ 2 37 39.3	0.697 _n	+ 0.73 — 7.7	12
13	4 59 28	+ 0 58.94	— 0 48.3	6.6	5 22 38.72	9.640	+ 2 59 39.6	0.703 _n	+ 0.75 — 8.0	13
15	4 45 49	— 0 37.84	— 0 52.1	10.10	5 35 36.67	9.621	+ 3 42 36.7	0.709 _n	+ 0.80 — 8.5	14
16	4 37 44	— 0 48.14	— 0 42.7	10.10	5 41 29.04	9.609	+ 4 2 57.4	0.712 _n	+ 0.81 — 8.7	15
17	4 51 25	+ 2 5.39	+ 0 39.9	10.10	5 47 4.81	9.623	+ 4 24 11.4	0.712 _n	+ 0.82 — 8.8	16
18	4 52 17	+ 1 53.88	— 1 50.8	6.6	5 52 18.46	9.623	+ 4 41 48.6	0.714 _n	+ 0.84 — 9.0	17
19	4 50 53	+ 0 57.99	+ 5 27.9	10.10	5 57 13.79	9.621	+ 4 59 55.5	0.716 _n	+ 0.85 — 9.2	18
20	5 7 53	+ 2 13.38	— 7 53.6	10.10	6 1 55.69	9.640	+ 5 17 28.7	0.714 _n	+ 0.86 — 9.2	19

1901	Greenw. M.T.	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cp.	α app.	$\log p.A$	δ app.	$\log p.A$	Red. ad l. app.	*
May 21	5 ^h 17 ^m 54 ^s	-0 ^m 38 ^s 93	+ 7' 14" 5	12.12	6 ^h 6 ^m 22 ^s	9.647	+5° 34'	0.713 _n	+0 ^s 87 — 9" 3	20
22	4 46 42	+0 48.87	+ 1 52.4	10.10	6 10 27.08	9.614	+5 49 48" 9	0.722 _n	+0.89 — 9.4	21
23	5 2 26	+0 41.31	- 2 44.1	15.15	6 14 28.23	9.632	+6 5 11.0	0.719 _n	+0.91 — 9.4	22
24	5 5 17	-2 2.81	- 0 27.9	10.10	6 18 16.08	9.636	+6 19 47.0	0.720 _n	+0.92 — 9.6	23
27	4 56 32	+0 24.03	+ 0 32.5	12.12	6 28 34	9.629	+6 59	0.724 _n	+0.94 — 9.6	24
28	5 0 18	-1 3.39	- 1 55.3	1.1	6 31 48.79	9.634	+7 11 56.0	0.723 _n	+0.96 — 9.7	25
29	4 58 26	+0 48.14	+ 2 33.6	4.4	6 34 51.05	9.633	+7 23 32.1	0.724 _n	+0.96 — 9.7	26
30	4 48 29	-0 51.38	- 0 11.7	15.15	6 37 45.70	9.623	+7 34 38.6	0.727 _n	+0.97 — 9.8	27
June 2	4 55 20	-1 6.19	+ 4 30.0	10.10	6 45 57.41	9.635	+8 5 20.2	0.727 _n	+0.99 — 10.0	28
4	5 7 30	+0 46.60	- 3 10.9	15.15	6 50 59.21	9.650	+8 23 39.8	0.723 _n	+1.01 — 9.9	29
8	4 49 30	+0 3±	+ 0 34.0	-11	7 0 8	—	+8 55 41.7	0.729 _n	+1 — 9.9	30
8	5 9 3	-1 11.45	+ 3 46.7	12.12	7 0 8.68	9.657	+8 55 50.0	0.721 _n	+1.04 — 10.0	31
9	4 53 34	-0 24.15	- 3 20.2	13.12	7 2 15.29	9.646	+9 2 53.7	0.727 _n	+1.04 — 9.9	32
10	5 0 41	+0 12.78	- 4 4.0	12.12	7 4 20.39	9.655	+9 9 50.1	0.724 _n	+1.05 — 9.9	33
12	5 2 3	+1 24.66	- 0 14.0	15.15	7 8 21.11	9.658	+9 22 44.2	0.723 _n	+1.06 — 9.9	34
13	4 53 29	-0 53.97	- 1 48.7	10.10	7 10 16.39	9.653	+9 28 41.2	0.726 _n	+1.07 — 10.0	35
14	4 57 8	+0 43.78	+ 2 26.8	16.16	7 12 9.68	9.658	+9 34 32.5	0.724 _n	+1.07 — 9.9	36

Mean places of the comparison stars.

*	α 1901.0	δ 1901.0	Authority	*	α 1901.0	δ 1901.0	Authority
1	3 ^h 39 ^m 52 ^s 72	-0° 36' 29" 3	Cape ₉₀	19	5 ^h 59 ^m 41 ^s 45	+5° 25' 31" 5	1/2 (AG. + 10 yr.)
2	3 57 32.28	-0 32 14.9	1/3 (10 yr. + Rad ₃ + Cape ₈₀) with p. m. from Rad ₃	20	6 7 0	+5 27	BD. +5° 11 30
3	4 4 4.25	-0 5 1.1	1/3 (Paris + 2 AG.)	21	6 9 37.32	+5 48 5.9	AG.
4	4 10 56.41	+0 12 25.1	AG.	22	6 13 46.01	+6 8 4.5	AG.
5	4 29 21.96	+0 12 11.6	AG. (p. m. 0 ^s 0, -0" 11)	23	6 20 17.97	+6 20 24.5	AG.
6	4 18 12.70	+0 16 42.7	AG.	24	6 28 9	+6 59	BD. +7° 13 41
7	4 20 57.18	+0 27 19.7	AG.	25	6 32 51.22	+7 14 1.0	AG.
8	4 32 7.51	+0 47 52.0	1/2 (AG. + 9 yr.)	26	6 34 1.95	+7 21 8.2	AG.
9	5 8 36.86	+2 15 21.6	1/2 (AG. + Yarn.)	27	6 38 36.11	+7 35 0.1	AG. (An. 11 ^m comes 5" nf.)
10	5 8 31	+2 5	BD. +2° 8 90	28	6 47 2.61	+8 1 0.2	AG.
11	5 15 41.46	+2 49 40.7	AG.	29	6 50 11.60	+8 27 0.6	AG.
12	5 14 1.37	+2 29 34.8	AG.	30	7 0 4.41	+8 55 17.6	AG.
13	5 21 39.03	+3 0 35.9	AG. (p. m. -0 ^s 00 09, -0" 00 4)	31	7 1 19.09	+8 52 13.3	AG. (p. m. 0 ^s 00, -0" 1)
14	5 36 13.71	+3 43 37.3	AG.	32	7 2 38.40	+9 6 23.8	AG.
15	5 42 16.37	+4 3 48.8	AG. (p. m. . . ., -0 ^s 03)	33	7 4 6.56	+9 14 4.0	AG.
16	5 44 58.60	+4 23 40.3	1/2 (AG. + 10 yr.)	34	7 6 55.39	+9 23 8.1	AG.
17	5 50 23.74	+4 43 48.4	AG.	35	7 11 9.29	+9 30 39.9	AG.
18	5 56 14.95	+4 54 36.8	AG.	36	7 11 24.83	+9 32 15.6	AG.

Notes.

The observation of 3^d May 1901 was made with the 18 inch McClean refractor, the others with the 7 inch refractor — all with the Repsold filar micrometer. Differential refraction has been applied to both elements.

The column »Red. ad l. app.» applies to the comparison stars and not to the comet.

May 5. The observations on this date were difficult as the comparison stars were very faint. — May 7. Diameter of nucleus = 16" by one double distance. — May 11. Nucleus much small and fairly stellar. — May 13. The fainter branch of the main tail passed exactly over the

central star of Orion's belt. — May 15. Comet is double, angle 10° 6, dist. 0" 8 or 1" 0, difference of magnitudes 1.0. There is an extension of coma in the direction 10° 6 as well. Tail extends from 5^h 36^m +3° 42' to 6^h 2^m +4° 27' in 7 in. and to 6^h 15^m +4° 30' in the 2 in. finder. — May 18. Nucleus quite stellar (in other words the elongation or separation of the 15th had disappeared). — May 21. Comet diffused and difficult to bisect. — May 23. Hazy. — May 24. Passing clouds. — May 27. Tail 50' long in 7 in. — May 28-29. Stopped by cloud. — May 30. Tail 6' long. June 2. Nucleus = 9^m 5 star, coma about 60" diameter, no tail noticed, passing clouds. — June 4. Nucleus = 10^m 5 star,

coma about 30" diameter, tail perhaps 2° long in finder. Comet near a 9.0 mag. star. — June 8. Long narrow tail still visible. — June 9. Illumination of wires bad and comet

faint. The tail can still be traced over several degrees in a low power field. Nucleus ill defined. — June 10. Nucleus not steadily held. Zenith distance 72°–82°.

Royal Observatory, Cape of Good Hope, 1901 June 27.

David Gill, H. M. Astronomer.

Elemente und Aufsuchungs-Ephemeride des Encke'schen Cometen.

Epoche und Osculation 1901 Juli 8.0 M. Z. Berlin.

$$\begin{array}{l} M = 339^{\circ} 20' 39''.38 \\ \pi = 158 \ 47 \ 57.37 \\ \Omega = 334 \ 48 \ 58.06 \\ i = 12 \ 53 \ 38.46 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{M. Aequ. 1901.0} \\ \\ \end{array} \quad \begin{array}{l} \varphi = 57^{\circ} 46' 44''.82 - 2''.394 \tau \\ n = 1073''.87571 + 0''.069299 \tau \\ \log a = 0.3460351 \end{array}$$

Die Elemente sind dieselben, die Iwanow für 1898 März 25.0 gefunden hat, nur dass die Jupiterstörungen erster Ordnung angebracht worden sind. Die Ephemeride wird hinreichend genau sein, um den Cometen aufzufinden, da die Correction derselben nicht 5/0 übersteigen wird. Eine weitere Ephemeride folgt.

0^h M. Z. Berlin.

1901	α app.	δ app.	$\log r$	$\log A$	Ab.-Z.	1901	α app.	δ app.	$\log r$	$\log A$	Ab.-Z.
Aug. 5	5 ^h 57 ^m 8 ^s	+31° 42' 3	9.9916	0.1534	11 ^m 50 ^s	Aug. 15	7 ^h 6 ^m 56 ^s	+30° 22' 2	9.9080	0.1181	10 ^m 54 ^s
6	6 3 36	31 41.1	9841	1494	43	16	14 29	30 4.7	8984	1153	50
7	10 12	31 38.4	9765	1454	37	17	22 7	29 45.1	8885	1127	46
8	16 55	31 34.4	9687	1416	31	18	29 49	29 23.5	8783	1103	42
9	23 44	31 29.0	9607	1379	25	19	37 36	28 59.6	8678	1081	39
10	30 40	31 22.2	9525	1343	19	20	45 26	28 33.7	8571	1061	36
11	37 42	31 13.7	9441	1307	14	21	7 53 20	28 5.5	8460	1043	34
12	44 52	31 3.5	9354	1273	9	22	8 1 17	27 35.1	8346	1027	32
13	52 7	30 51.5	9265	1241	11 4	23	9 16	27 2.4	8228	1014	30
14	6 59 29	30 37.8	9173	1210	10 ^h 59	24	17 18	26 27.4	8106	1003	28
15	7 6 56	+30 22.2	9.9080	0.1181	10 54	25	8 25 21	+26 49.9	9.9780	0.0994	10 27

Kronstadt, Marine-Observatorium, 1901 Juli 31.

Ch. Thonberg.

Wiederauffindung des Encke'schen Cometen 1901 b.

(Telegramm von Prof. Pickering in Cambridge, Mass.).

»Encke's comet was observed by Wilson, Northfield, August 5.8924 Greenw. M. T., RA. app. = 6^h 2^m 2^s 8 PD. app. = 58° 17' 30". Pickering.«

Die Correction der Thonberg'schen Ephemeride beträgt hiernach $-1^m 2^s$ in RA. und $+1' 2''$ in Decl. Kr.

Mittheilung betreffend die Herausgabe eines neuen Cataloges der veränderlichen Sterne.

Vom Vorstände der Astronomischen Gesellschaft ist die Herausgabe eines neuen Cataloges der veränderlichen Sterne beschlossen und die Ausführung dieser Arbeit der unterzeichneten Commission übertragen worden. Die Commission erlaubt sich an die Beobachter der veränderlichen Sterne die Bitte zu richten, grössere, noch nicht publicirte Beobachtungsreihen, die zur Verbesserung der Elemente von Nutzen sein können, bald zu veröffentlichen oder Mittheilungen darüber an das geschäftsführende Mitglied der Commission (Prof. G. Müller, Potsdam, Observatorium) gelangen zu lassen.

Zugleich macht die Commission bekannt, dass sie von jetzt an die definitive Benennung der neu entdeckten Veränderlichen, sobald die Lichtänderung sicher festgestellt ist, übernehmen wird. Eine Namensliste der in den letzten Jahren aufgefundenen, bisher noch unbenannt gebliebenen Veränderlichen wird in der nächsten Zeit veröffentlicht werden.

Die Commission für die Herausgabe eines Cataloges der veränderlichen Sterne.

Dunér, Hartwig, Müller, Oudemans.

Inhalt zu Nr. 3732-33. G. Müller. Die Lichtcurve Algois in den Jahren 1878-1881. 177. — J. Scheiner. Ueber die Sternspectra mit theils hellen, theils dunklen Wasserstofflinien. 195. — A. A. Nijland. Das Mira-Maximum von August 1900. 199. — A. A. Nijland, S. L. Veenstra. Beobachtungen von Jupiterstrabanten. 203. — D. Gill. Observations of Comet 1901 I. 203. — Ch. Thonberg. Elemente und Aufsuchungs-Ephemeride des Encke'schen Cometen. 207. — Wiederauffindung des Encke'schen Cometen 1901 b. 207. — Mittheilung betreffend die Herausgabe eines neuen Cataloges der veränderlichen Sterne. 207.