daß ich die voraufgehende Anse noch äußerst schwach sehe, ich komme aber schließlich zur Überzeugung, daß dies nur Täuschung ist. Schatten auf der Kugel sehr scharf, überhaupt sehr gute Luft, Enceladus ganz deutlich, auch Mimas sichtbar.

Nach Vergleichung der heutigen Beobachtung mit der gestrigen bin ich geneigt den Durchgang der Erde durch die Ringebene auf frühestens Okt. 4.0 anzunehmen.

Die Beobachtung des Wiedererscheinens des Ringes im Januar ist durch die Witterung vereitelt worden. Am 6. Januar vermochte ich (im 6-z. Refr.) außerhalb der Planeten-

Straßburg, 1908 Januar.

scheibe noch keine Spur des Ringes zu erkennen, am 10. Jan. waren die Ansen eine sofort auffällige Erscheinung; in der Zwischenzeit war der Himmel bedeckt.

Die weiteren den Ring betreffenden Beobachtungen, die von dem Observator der Sternwarte am 18-z. Refraktor gemacht sind, werden demnächst mitgeteilt; hier folgen noch die Bemerkungen, die Herr Dr. *Fost* aufgezeichnet hat, den ich wegen damaliger Abwesenheit des Observators von Straßburg gebeten hatte, an den Beobachtungen des Verschwindens des Ringes im Oktober teilzunehmen.

E. Becker.

Beobachtungen des Verschwindens des Saturnsrings 1907 Oktober

auf der Kaiserl. Universitätssternwarte in Straßburg von *E. Fost*.

1907 Oktober 2.

10^h 0^m M. Z. Straßb., gr. Refr. Der Ring ist noch gut sichtbar, die folgende Anse ist bedeutend auffälliger, auch nachdem ein Trabant, welcher anfangs auf der Anse eine helle Verdickung bildet, von derselben getrennt erscheint. Auf dem Planeten hebt sich der Ring, resp. sein Schatten, als scharfe dunkle Linie ab, auch sieht man wolkige Gebilde zeitweilig sehr scharf. Farbe der Ansen bläulich-bleigrau, die folgende Anse etwas violett. Angewandte Vergrößerungen 200, 400, 700, alles am besten bei Vergr. 200 sichtbar.

11^h 0^m, kl. Refraktor. Auch hier ist die folgende Anse das auffallendere Objekt; Farbe der Ansen mehr rötlich. Vergr. 150–200.

Straßburg, 1908 Januar.

Oktober 3.

10^h 30^m, kl. Refraktor. Ich glaube momentan die Ansen zu sehen.

12^h 0^m, gr. Refr. Beide Ansen deutlich sichtbar, besonders die folgende.

13^h 10^m. Nur noch die folgende Anse sichtbar, der Himmel ist aber nicht mehr ganz rein. Farbe der Ansen wie gestern.

Oktober 4.

9^h 0^m, gr. Refr. Von den Ansen ist keine Spur mehr zu sehen, der Schatten des Ringes auf Saturn ist als scharfe Linie von circa 0.75 Dicke sichtbar. Luft anscheinend sehr durchsichtig, man sieht neben vier helleren Satelliten auch Mimas (12^m8).

E. Fost.

Observation du passage de Mercure des 13 et 14 novembre 1907

à l'observatoire de Genève.

Par M. R. *Gautier*.

Contrairement aux prévisions que l'on pouvait faire le 13 novembre, le temps a été assez propice à Genève pour l'observation du passage de Mercure devant le soleil. La matinée du 14 a été claire, il y avait seulement un léger halo blanchâtre sur le ciel, et le beau temps s'est maintenu jusqu'à midi et demi (temps de l'Europe centrale). Puis le ciel s'est couvert et il n'y a eu que quelques éclaircies jusqu'à 2^h et quart. Le ciel s'est de nouveau découvert à ce moment et nous avions les meilleures espérances pour l'observation des deux derniers contacts, lorsqu'un nuage malencontreux est venu la menacer. C'est au travers de ce nuage, et en supprimant tout verre noir, qu'il a été possible à MM. *Pidoux* et *Schaer* de noter l'instant de l'un des contacts et même de tous deux.

Voici maintenant quelques indications sur les instruments employés et sur les diverses constatations, qui ont pu être faites.

Instruments. M. *Pidoux* observait à l'équatorial Plantamour de 271 mm d'ouverture. Il avait fixé le micromètre sur l'hélioscope d'Herschel afin de pouvoir faire des pointés

sans que les fils eussent à souffrir de la chaleur solaire; grossissement 150 fois.

M. *Schaer* observait avec son réflecto-réflexeur de 340 mm d'ouverture, diaphragmé à 20 cm pour l'observation des contacts avec un grossissement de 120 fois. Quelques observations ont été faites, durant le passage, à pleine ouverture avec un grossissement de 350 fois. Pour atténuer l'éclat du soleil, M. *Schaer* avait réduit le champ de l'oculaire en plaçant à son foyer un diaphragme de 5 mm de diamètre.

M. *Gautier* observait à l'ancien équatorial de Gambey de 102 mm d'ouverture, grossissement de 90 fois. M. *Duaine* observait avec le chercheur de comètes de 97 mm, grossissement 30 fois seulement. Quelques étudiants utilisaient les lunettes plus faibles appartenant à l'observatoire. Tous, nous employions, pour atténuer l'intensité de la lumière du soleil, les verres gradués que nous avions fait construire pour l'observation des deux éclipses de soleil du 28 mai 1900 et du 30 août 1905.

Observations d'ordre physique. Les nombreuses taches qui se trouvaient, le 14 novembre, sur le disque du

soleil ont permis de constater que Mercure, sans être absolument noir, était cependant d'une teinte plus foncée que le noyau des taches.

Aucun d'entre nous n'a, à aucun moment, aperçu d'anneau brillant autour de la planète, ni de point lumineux sur son disque. Au moment du second et du troisième contact, M. *Schaer*, le seul qui ait pu les constater, n'a aperçu aucun ligament ou goutte noire reliant le petit disque noir de Mercure au bord du soleil. Aucun des observateurs n'a vu Mercure en dehors du soleil.

M. *Pidoux* a pris, pendant le passage, un certain nombre de photographies du soleil où les taches et Mercure sont bien visibles et présentent la même différence dans l'intensité du noir que nous avons constatée à l'observation directe. Les photographies¹⁾ ont été obtenues au moyen de la lunette photographique de M. *Schaer*, fixée parallèlement à l'équatorial Plantamour, lunette de 28 cm d'ouverture, diaphragmée à 16 cm.

Contacts. Seul, M. *Schaer* a pu noter les instants de tous les contacts, que je donne ici en temps moyen de Genève, lequel retarde de 35^m23^s2 sur le temps moyen de l'Europe centrale:

	M. <i>Schaer</i>	M. <i>Pidoux</i>
1 ^{er} contact	22 ^h 48 ^m 13 ^s 9	—
2 ^e »	49 55.7	—
3 ^e »	2 12 46.4	—
4 ^e »	14 57.8	2 ^h 14 ^m 58 ^s

M. *Schaer* a noté que le premier contact a dû être observé un peu trop tard, ce qui est naturel, et le deuxième un peu trop tôt.

Passage au méridien. M. *Schaer* a observé le passage du soleil et de Mercure au moyen du cercle méridien. Il a observé le passage du premier bord du soleil aux 9 fils du micromètre, le passage de Mercure au même

nombre de fils et le passage du deuxième bord du soleil à 3 fils seulement, Mercure étant trop rapproché de ce bord là. La durée du passage du soleil a été de 2^m16^s73 (en temps sidéral). Le centre de Mercure a passé au méridien 0^m39^s12 après le centre du soleil. Il en résulte comme ascension droite de la planète au moment de son passage au méridien: $\alpha_{\gamma} = 15^{\text{h}}14^{\text{m}}40^{\text{s}}26$.

Observations micrométriques à l'Équatorial Plantamour. M. *Pidoux* a obtenu par la moyenne de cinq passages du soleil la valeur suivante pour la durée du passage du soleil: 2^m17^s14.

M. *Pidoux* a aussi déterminé la position de Mercure par rapport aux deux bords du soleil. Le détail de ces mesures se trouve indiqué dans le tableau ci-dessous:

T. m. Genève	Différences observées	Cp.
0 ^h 7 ^m 41 ^s	☿ — ☉ 1 ^{er} bord	+1 ^m 39 ^s 60
0 8 56	» 2 ^e »	—0 38.61
0 47 13	» 1 ^{er} »	+1 23.76
0 47 13	» 2 ^e »	—0 53.13
1 37 13	» 1 ^{er} »	+1 4.80
1 37 13	» 2 ^e »	—1 12.26
23 ^h 2 ^m 0 ^s	☿ — ☉ bord boréal	—7' 57".6
1 30 22	» »	—2 18.6

Les différences sont corrigées de la réfraction différentielle.

Diamètre de Mercure. M. *Pidoux* a trouvé, par une moyenne de 16 mesures micrométriques, pour le diamètre, la valeur 8".4, sensiblement inférieure au diamètre indiqué par les éphémérides. D'après les observations de M. *Schaer* des instants des deux derniers contacts, faites très exactement malgré l'interposition du nuage, on trouve, pour le diamètre, la valeur 8".2.

Observatoire de Genève, 10 janvier 1908.

R. Gautier.

¹⁾ Reproduites en partie dans »La revue polytechnique«, Genève, Vol. IX p. 353.

Beobachtung des Merkursdurchgangs 1907 Nov. 13-14.

Da das Äquatorial unserer Sternwarte noch nicht aufgestellt ist, so wurde ein Merzscher Refraktor von 10.7 cm Öffnung und 160 cm Fokaldistanz benutzt und das Sonnenbild auf einen weißen Schirm projiziert, mit einem Durchmesser von 10 cm. Die altazimutale Aufstellung des Instruments gestattete nicht, den ersten Kontakt genau zu fassen. Die anderen drei Kontakte aber konnten bei heiterem Himmel wie folgt beobachtet werden:

Rom, Specola Vaticana, 1908 Jan. 21.

Kontakt	M. E. Z.	Sonnenrand
II	23 ^h 25 ^m 52 ^s	ruhig
III	2 47 44	wallend
IV	2 50 24	»

Ich schätzte die Unsicherheit der zwei letzten Zeitangaben auf ± 2 Sekunden; die erste schien mir etwas weniger sicher. Die beabsichtigte Beobachtung des Meridiandurchgangs am Passageninstrument wurde durch Wolken verhindert.

Dr. F. Stein, S. J.

Notiz über den Veränderlichen RU Pegasi.

Seit dem 17. Juli 1906 habe ich diesen Stern, soviel die Umstände es mir gestatteten, andauernd verfolgt; es liegen Schätzungen von 136 Abenden vor, wobei zu bemerken ist, daß der Stern von Anfang Februar bis Mitte

Juni hier nicht oder schlecht beobachtet werden kann. Bis jetzt konnte ich nur drei gut ausgeprägte Maxima sichern.

Der Stern ist für mein Auge gewöhnlich etwas (1 oder 2 Stufen) heller als sein Begleiter γ (Graff A. N. 4062), den