Bei Anwendung von 1,4718 g Kakao wurden 30,12 % Fett gefunden,

"	"	"	1,5014	"	"	"	30,12	"	"	"
"	"	"	2,0000	"	"	"	29,83	"	"	"
"	"	"	2,0000	"	"	"	29,90	"	"	"
"	"	"	2,5000	"	"	"	29,66	"	"	"
"	"	"	3,0000	"	"	"	29,63	"	"	"
"	"	"	2,0000	"	"	und je 35 ccm beider Äther wurden 30,05 % Fett gefunden.				

Bei Anwendung größerer Mengen Kakao erhält man also niedrigere Ergebnisse und zwar fallen dieselben mit dem Steigen der angewendeten Menge. Es folgt daraus, daß das Gottlieb-Röse'sche Verfahren beim Kakao nur dann mit den nach dem Extraktionsverfahren erhaltenen Ergebnissen gute Übereinstimmung zeigt, wenn man nur in 1 g der Probe die Fettbestimmung vornimmt.

Woher das Fallen der Ergebnisse bei Anwendung größerer Mengen Kakao kommt, suchte ich nicht weiter zu erklären; vielleicht liegt dies an der ungenügenden Menge der beiden Äther zur Extraktion des vorhandenen Fettes.

Die Versuche, das Fett in der Schokolade nach dem geschilderten Verfahren zu bestimmen, mußten wegen der lästigen Emulsionsbildungen verlassen werden. Ebenso konnte diese Methode zur Fettbestimmung in den Kakaosamen oder überhaupt fetthaltenden Samen nicht angewendet werden, weil einerseits die Extraktion nicht quantitativ verlief und andererseits sich die Ätherschicht von der unteren Flüssigkeit nicht gut trennte.

Referate.

Eier.

J. Wohlgemuth: Über den Sitz der Fermente im Hühnerei. (Zeitschr. physiol. Chem. 1905, 44, 540—545.) — Verf. suchte durch Versuche festzustellen, in welchem Teile des Eies die Fermente ihren Sitz haben, ob im Eiweiß, Eigelb oder in beiden zugleich. Verf. verfuhr in folgender Weise: In 5—10 ganz frischen Hühnereiern wurde das Eigelb mechanisch vom Eiweiß getrennt, gut durchgeschüttelt und zu dem Brei 2—4 ccm Toluol hinzugefügt. Dann wurde die Masse in eine Flasche gebracht und in einem Brutschrank unter häufigem Durchschütteln 4—10 Wochen belassen. Nach Ablauf der Frist wurde der Brei in zwei Teile geteilt und diese gesondert untersucht. Der eine Teil diente zum Nachweis der Eiweißspaltungsprodukte, mit dem anderen sollte nachgewiesen werden, daß bei der Autolyse neben dem Eiweiß auch das Lecithin eine fermentative Spaltung erfahren habe. Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß in dem Hühnereiweiß Fermente nicht vorhanden sind, dagegen finden sie sich im Eigelb und sie besitzen die Fähigkeit, Eiweiß, Lecithin und Fett zu zerlegen.

Max Müller.

K. Farnsteiner, K. Lendrich, P. Buttenberg, A. Kiekton und M. Klassert: „Ei“-Präparate. (5. Bericht über die Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg 1903/04, 38—39.) — Clarks Eierpulver-Extrakt (Concentrated Egg Powder) bestand aus einem Gemisch von Natriumbikarbonat und Stärke, dem durch einen gelben Farbstoff das Aussehen von getrocknetem Eigelb verliehen war. — Herrmann's Eierkuchen- und Krapfenpulver war ein Gemisch von Weinstein, Natriumkarbonat, Stärke und gelbem Farbstoff. — Gluck-Gluck, das bei früheren Untersuchungen

lediglich aus gefärbtem Stärkemehl und Natriumbikarbonat bestand, enthält jetzt mäßige Mengen stickstoffhaltiger Substanzen.

C. Mai.

Bujard: Eierkonservierungsmittel „Garantol“. (Bericht des Untersuchungsamtes Stuttgart 1905, 2—3.) — Das Mittel bestand aus gebranntem Kalk.

C. Mai.

K. Farnsteiner, K. Lendrich, P. Bittenberg, A. Kickton und M. Klassert: Elb-Kaviar. (5. Bericht über die Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg 1903/04, 39.) — Die Untersuchung einer Probe Elbkaviar ergab folgenden Befund: Aussehen grünlichschwarze, etwas schmierige, etwa 2,5 mm große Körner, Geruch milde, Geschmack pikant; Wasser 49,26, Asche 7,66, Stickstoff-Substanz 23,25, Fett 12,53, Kochsalz 5,54, Phosphorsäure 1,07%, Borsäure nicht nachweisbar; in der kochsalzfreien Trockensubstanz: Fett 27,72, Stickstoff-Substanz 51,44, kochsalzfreie Asche 4,70, Phosphorsäure 2,37%.

C. Mai.

Patente.

Dr. Ludwig Mach und Dr. Wolfgang Pauli in Wien: Verfahren zur Konservierung von Eiern. D.R.P. 161819 vom 29. Mai 1903. (Patentbl. 1905, 26, 1289.) — Die in bekannter Weise mit Hilfe von Salzsäure oder dergl. gereinigten Eier werden in einem geeigneten Raum nach dessen Evakuierung mit einem in flüssigem Zustande befindlichen Dichtungsmaterial (Paraffin, Wachs u. s. w.), das geruch- und geschmacklos ist und keinen Nährboden für Bakterien bildet, bei 40—50° imprägniert. Hierauf wird das Vakuum aufgehoben, sodaß durch den Luftdruck das Dichtungsmaterial durch die Poren der Eier getrieben wird und auch auf der Innenseite der Schale eine Schutzschicht bildet. Die so behandelten Eier zeigen keinerlei Geschmacksveränderung, sind infolge des Porenverschlusses nicht brutfähig und nehmen selbst bei längerem Verweilen in jauchigen Flüssigkeiten im Gegensatz zu anderen Eiern keinen Geruch an.

A. Oelker.

Obst, Beerenfrüchte und Fruchtsäfte.

H. Rühle: Über Obst und Obstverwertung. (Zeitschr. angew. Chemie 1905, 18, 1852—1856, 1892—1900 u. 1941—1946.) — Verf. bespricht zunächst die mehrfach in Deutschland vorgeschlagenen Maßregeln für eine Erweiterung und Verbesserung der Obstzucht, die in Betracht kommenden Obstarten und die Chemie und Analyse des frischen Obstes; weitere Artikel über die Obstverwertung sollen folgen. Während in England und Nordamerika Obstbau, Obstverwertung und Obstindustrie sich zu bedeutender Höhe entwickelt haben, fehlt es bei uns, trotzdem die Verhältnisse von Klima und Bodenbeschaffenheit für den Obstbau durchaus günstig sind, an einer guten Organisation des Obsthandels und an einer größeren Obstindustrie. Wenn auch durch Belehrung der Obstzüchter durch private und staatliche Fürsorge viel geleistet wird, so ist doch für rationelle Obstverwertung nicht genügend gesorgt. Maßregeln zur Schaffung eines geregelten und lohnenden Absatzes können nur dann dauernde Abhilfe bringen, wenn sie durch Zusammenschluß einzelner Obstzüchter zu Genossenschaften und zu größeren Verbänden in großem Maßstabe getroffen werden. Die Frage, ob eine Hebung der Obstzucht und Steigerung des Verbrauchs von Obst und Obsterzeugnissen möglich sei, ist zu bejahen, da der gewaltigen Obsteinfuhr nur eine unbedeutende Ausfuhr gegenübersteht. Die Obstzucht ist, sobald sich nur Handel und Industrie in zweckmäßiger Weise mit ihr verbinden, imstande, ihre Erträge weit über das jetzt Erreichte zu steigern. — Verf. zählt weiterhin die Obstarten auf, die für menschliche Genußzwecke verwertbar sind und bringt eine ausführliche Zusammenstellung der in der Literatur enthaltenen Arbeiten über Zusammensetzung und Analyse der Obstsorten und führt die Verfahren zur Haltbarmachung des Obstes und Gewinnung der verschiedenen Obsterzeugnisse auf. Die Verarbeitungsarten sind im wesentlichen auf drei Verfahren zurückzuführen: Saftkonzentrierung durch Wasserentziehung (Trocknen, Einkochen, Zuckerzusatz), Erwärmen unter Luftabschluß (Dünsten,