Aus dem Laboratorium der L. und Th. Landauschen Frauenklinik, Berlin.

Über den wahren Hermaphroditismus des Menschen und der Säugetiere.

Von
Ludwig Pick.

Hierzu Tafel IX—XIII und 5 Textfiguren.

	Inhalt:	Seite
Teil I:	Einleitung: Begriffsbestimmung und Einteilung des wahren Hermaphroditismus	119
Teil II:	a) Das untersuchte eigene Material beim Säugetier: Fünf Fälle von Hermaphroditismus verus beim Schwein	140
	b) Zusammenstellung der sicheren Fälle von Hermaphroditismus verus beim Menschen nebst Bericht über die histologische Nachuntersuchung des Falles Ernst Salén	163
Teil III:	Tabellarische Übersicht der in Teil II berichteten Fälle von Hermaphroditismus verus	176
Teil IV:	Die morphologischen („phänomenologischen“) Gesetzmässigkeiten beim Hermaphroditismus verus des Menschen und der Säuger . . .	178
Teil V:	Das Adenoma tubulare testiculare ovarii beim menschlichen Weibe	207
Teil VI:	Epikritische Betrachtungen zur Ätiologie des Hermaphroditismus verus und seine Beziehungen zum Pseudohermaphroditismus. Die praktischen Prinzipien der Geschlechtsfestsetzung beim Hermaphroditismus und die Kategorien der „Neutren“ beim Menschen	216
Teil VII:	Allgemeine Zusammenfassung	231

Teil I.

Die Begriffsbestimmung und Einteilung des Hermaphroditismus verus.

Hermaphroditismus bedeutet die Mischung entgegengesetzter Geschlechtsmerkmale in einem Individuum. Jedes System des Hermaphroditismus muss also an die Umgrenzung und Einteilung der Geschlechtscharaktere anknüpfen.

John Hunter und nach ihm Darwin haben zuerst den primären Geschlechtscharakteren als sekundäre diejenigen somatischen Kennzeichen gegenübergestellt, die mit dem Fortpflanzungsakt in keiner direkten Beziehung stehen. Die primären Geschlechtsmerkmale umfassen danach das Genitale als Ganzes; alle anderen sind sekundäre.

Die alte Einteilung hat in der Folge mancherlei Kritik und Änderung erfahren — ich nenne Brandt (7)¹⁾, Laurent-Kurella (42), Ellis (13), neuerdings Poll (52a), Kammerer (30) und Steinach (63). Sie ist durch die Abgrenzung primärer, sekundärer und tertiärer Merkmale (Brandt, Laurent-Kurella) erweitert, andererseits auch durch die Umwertung des „Sekundären“ in kausalem und zeitlichem Sinne ihrer ursprünglichen rein morphologisch-deskriptiven Absicht verlustig gegangen.

Ich lege meinen Untersuchungen die von Poll (52a und b) gegebene Einteilung der Geschlechtsmerkmale zugrunde, die auch Tandler und Grosz (66) als die „derzeit beste“ benennen. Sie unterscheidet die essentialen oder germinalen, allein durch die gegensätzliche Verschiedenheit der Keimzellen (Gameten) gegebenen Sexualmerkmale von den akzidentalten, stellt also den gametischen Geschlechtsdifferenzen, die allein (Johannes Müller) das Geschlecht des Individuums, ob männlich oder weiblich, bestimmen, alle übrigen als somatische gegenüber.

Diese akzidentalten Merkmale gliedern sich wie folgt:

a) genitale subsidäre:

α) interne:

β) externe;

b) extragenitale:

α) interne;

β) externe.

Zu den genitalen subsidiären inneren Charakteren gehören die Leitungswege nebst ihren akzessorischen Drüsen; zu den äusseren die konjungalen Werkzeuge und die Brutapparate; zu den extragenitalen inneren Merkmalen z. B. die Stimmorgane, die psychischen Geschlechtsqualitäten; zu den extragenitalen äusseren die Körperbedeckung, Behaarung, Färbung etc.

¹⁾ Die Zahlen beziehen sich auf die Literaturübersicht am Schluss.

H. A. ¹⁾ als Mischung entgegengesetzter Geschlechtscharaktere kann danach entweder die essentialen (germinalen) oder die akzidentalen Charaktere einbeziehen oder natürlich auch gleichzeitig diese wie jene.

Die Mischung der akzidentalen Geschlechtscharaktere bedeutet den in der Weltliteratur viel erörterten, mit mehr als tausend Fällen kasuistisch belegten falschen oder unechten H. A. (H. A. spurius, Pseudohermaphroditismus oder Scheinzwittertum). Hier besteht bei dem an sich geschlechtssicheren, also entweder sicher männlichen oder sicher weiblichen Individuum ein grösserer oder kleinerer gegengeschlechtlicher Komplex von akzidentalen Merkmalen.

Demgegenüber ist nun allerdings eine reine, sozusagen umschriebene Mischung der essentialen Geschlechtsmerkmale, d. h. der beiderseitigen Gameten für die höheren Metazoen nicht möglich. Die Existenz der Gameten ist hier an die durch die Keimdrüsen (Gonaden)²⁾ gegebenen und als Hoden und Ovarium makroskopisch und mikroskopisch geschlechtsspezifisch gebauten Hilfsapparate gebunden, und die Mischung der Gameten in einem Individuum bedeutet zugleich das Vorhandensein der beiderseitigen Keimdrüsen. Da aber der gesamte Zellbestand der Keimdrüsen ausschliesslich der Gameten den inneren genitalen subsidiären Apparaten zurechnet, besteht in dem Vorhandensein von beiderlei Keimdrüsen zugleich eine Mischung essentialer (gametischer) und akzidentaler (somatischer) Charaktere.

Diese Tatsache ist von vornherein im Auge zu behalten, wenn wir die Mischung essentialer Geschlechtscharaktere in einem Individuum als echten, wahren Hermaphroditismus zu der Vereinigung gegengeschlechtlicher akzidentaler Charaktere bei einem Individuum als Pseudohermaphroditismus in Gegensatz bringen, und der wahre H. A. ist in diesem Sinne notwendig identisch mit dem glandulären (H. A. bisexualis = biglandularis: z. B. bei Kitt [35], S. 110).

Sofern der wahre H. A. gelegentlich bei den Vertretern einer physiologisch getrenntgeschlechtlichen Spezies beobachtet wird, ist

¹⁾ Ich setze H. A. = Hermaphroditismus; Ps. H. A. = Pseudohermaphroditismus.

²⁾ „Gonade“ gilt einerseits als Bezeichnung des Hilfsapparates der Gameten, findet aber andererseits auch für die Keimdrüse als Ganzes Anwendung; vergl. z. B. bei Tandler und Grosz (66), S. 2 bzw. S. 30, 78, 83.

er als sporadischer, pathologischer oder teratologischer, d. h. als Missbildung charakterisiert gegenüber dem physiologischen oder funktionellen, der für eine ganze Spezies die Norm darstellt.

Es ist bekannt und bei allen Erörterungen über den wahren H. A. der Säger und des Menschen in einer Art von Tradition immer wiederholt worden, dass dieser wahre funktionelle H. A. besonders verbreitet bei den Wirbellosen vorkommt — bei Gastropoden (Mollusken), Hirudineen, Plathelminthen etc. — und dass wahrer H. A. — sei es physiologisch oder pathologisch — auch bei den niederen Vertebraten, Cyklostomen, Fischen und Amphibien existiert, ohne dass freilich gerade auf den hier sehr wesentlichen Umstand der starken Unterschiede der Keimdrüsen bei diesem physiologischen und pathologischen H. A. niederer Tiere genügend hingewiesen wäre. Hier bestehen alle möglichen Varianten: räumlich vollkommen getrennte Keimdrüsen, oder Hoden und Ovarium als „Ovotestis“ oder „Zwitterdrüse“, oder beiderlei Keimzellen in einer Drüse vereinigt („Zwitterdrüse“ im eigentlichen Sinne¹⁾): kontemporäre Reifung mit der Möglichkeit der Selbstbefruchtung (Ascidien [Tunikaten]); alternierende — proterandrische oder protogyne — Funktion je einer Keimdrüse oder auch Funktion nur einer Keimdrüse bei dauernder Funktionslosigkeit der anderen oder fehlende Funktion bei sonst gut ausgebildeten Apparaten (Stephan's [64] H. A. potentialis [s. potis] foecundus und sterilis).

Ich betone diese verschiedenen Kombinationen, weil sie das Verfehlte der nicht selten erhobenen Forderung erweisen (vergl. Finkenbrink [17], v. Rosthorn [56], Bucura [8], Bayer [2], Menge [46]), für den wahren H. A. im allgemeinen und im besonderen gerade für den der höheren Wirbeltiere getrennte und funktionierende Keimdrüsen oder doch mindestens geschlechtsreife Keimzellen beiderlei Geschlechts — neben ausgebildeten männlichen und weiblichen Geschlechtsgängen — als unerlässlich zu betrachten. Der Schwerpunkt der Definition des wahren Hermaphroditismus liegt allein in der Mischung der germinalen Geschlechtscharaktere, d. h. der Gameten, aber weder in der besonderen Anordnung noch in der kontemporären Reifung oder Funktion der Keimzellen.

Ja, auch hier ist noch eine Einschränkung oder, wenn man will, eine Erweiterung der Definition notwendig, insofern nämlich

¹⁾ Vergl. Kopsch und Szymonowicz (36) in Teil IV.

„Mischung der Gameten“ beim H. A. verus nicht notwendig die Mischung der fertigen, befruchtungspotenten Keimzellen bedeutet, sondern die heterosexuale Mischung auch durch geschlechtsspezifische Vorstufen der fertigen Sexualzellen — durch Gametogonien oder Gametozyten — gegeben sein kann. Verschiedenheiten dieser Art sowohl wie auch der vorhergenannten Kombinationen zeigen sich gerade in den Fällen des wahren H. A. der Vertebraten.¹⁾

Bei den Myxinoiden (Schleimaalen), die zu den Cyklostomen zählen, funktioniert bei jungen Fischen der hintere Abschnitt der hier unpaaren Gonade als Hoden, während der vordere Teil der Keimdrüse sich als Ovarium erweist, als solches aber erst später in Funktion tritt. Mit dem Erreichen des Reifezustandes des Ovarialanteils hört der Hodenabschnitt der Genitaldrüse zu funktionieren auf. Hier besteht also H. A. verus in Form der Proterandrie. Der vordere Abschnitt der Keimdrüsen der Gonade ist eine weibliche Keimdrüse, auch in dem Stadium, in dem noch keine reifen Eizellen gebildet werden und lediglich Ovogonien vorhanden sind, ebenso wie der Eierstock eines jungen menschlichen Embryo durch die hier ausschliesslich vorhandenen Ovogonien als weibliche Keimdrüse unzweifelhaft charakterisiert ist.

Anders bei dem physiologischen H. A. der Teleostier-(Knochenfisch-)gattungen Serranus und Chrysophrys, die zu den Perciden (Barschen) bzw. Sargiden (Brassen) gehören. Hier ist in die Wand des Ovariums ein wohlbegrenzter Hoden eingelagert, und es ist ein Vas deferens vorhanden (Wiedersheim [73], S. 601), das den ganzen Ovarialkanal umschliesst. Für Serranus (S. scriba C., Schriftbarsch oder Sägebarsch) behauptet ein so zuverlässiger Autor wie Cori (9) noch ganz jüngst wieder die Selbstbefruchtung; bei Chrysophrys (Chr. aurata L., Goldbrasse) findet gegenseitige Befruchtung statt.²⁾

¹⁾ Tourneux (68), vor ihm (1880) schon Mac Leod (zitiert bei Tourneux), hatten neben dem funktionierenden Ovarium des weiblichen Maulwurfs ein physiologisch funktionierendes Testikelrudiment mit Zwischenzellen festgestellt, also bei einem Säuger (Insektivoren) eine physiologische Zwitterdrüse, deren weiblicher Anteil in Funktion war. Nach Tandler und Grosz (S. 96 und 139) handelt es sich dabei lediglich um die im Maulwurfs-ovarium mächtig entwickelte Glandula interstitialis, wie sie in ähnlicher Massivität im Ovarium des Pferdes oder Esels zu finden ist.

²⁾ Vergl. ferner bei Haempel (27) weitere Teleostierspezies mit physiologischem wahren H. A.: *Box salpa* L., Goldstriemen; *Sargus annularis* L., Geissbrasse; *Pagellus erythrinus* C., Rotbrasse; *Pagellus mormyrus* C.,

Ein wahrer H. A. existiert unter den anuren Amphibien¹⁾ so stark gehäuft, dass er bei den Raniden fast physiologisch erscheint (Tandler und Grosz [66], S. 79/80). Hier existieren beim Frosch ausser männlichen und weiblichen Tieren noch sogenannte intermediäre Formen oder Pflügersche Hermaphroditen mit Zwitterdrüsen (Hoden und Ovarium vereinigt), die der Mehrzahl nach später zu männlichen, in geringer Zahl auch zu weiblichen Tieren werden. Für die Bufonen wiederum ist als ein physiologischer Befund das Biddersche Organ²⁾ bekannt, das entweder am oberen Ende eines normal funktionierenden Hodens Eier in verschiedenen Entwicklungsstadien führt oder das umgekehrt (W. Waldeyer [70], S. 418 o.) neben einem funktionierenden Ovarium zuweilen auch Spermien ausbildet. Im ganzen also bei Cyklostomen, Fischen und gewissen Amphibien ein wahrer Hermaphroditismus von gewiss wechselnder Morphologie und Funktion!³⁾

Bei den Vögeln und den Säugetieren ist der wahre H. A. lediglich als unbestreitbar pathologischer oder teratologischer beobachtet und zwar als eine sicherlich sehr seltene Missbildung, obschon er, wie unsere eigenen Befunde zeigen, wenigstens für eine bestimmte Säugetierspezies in einem immerhin übersehbaren Verhältnis zu finden ist.

Für den wahren H. A. der Vögel hat z. B. Poll (52a) in einem auch aus anderem Grunde (vergl. unten) bemerkenswerten Fall — Ovarium links, Hoden rechts bei *Pyrrhula pyrrhula* — die gleichzeitige Existenz der männlichen und weiblichen Geschlechtszellen erwiesen. Dagegen ist dieser Nachweis bisher noch für keinen Fall eines wahren H. A. der Säugetiere und des Menschen

Marmorbrasse. Andere Fischarten zeigen inkonstanten oder gelegentlichen wahren H. A.: *Gadus morrhua* L., Dorsch; *Scomber scomber* L., Makrele; *Clupea harengus* L., Hering; *Lota vulgaris* C., Rutte; *Trutta fario* L., Forelle; *Cyprinus carpio* L., Karpfen u. a.

¹⁾ Betreffs der Urodelen vergl. H. A. verus bei Triton (La Valette St. George, zitiert bei Kermauner [33a], S. 335).

²⁾ Dass (Kermauner [33b], S. 455 o.) der Ovotestis der Kröte „dem indifferenten Zustand der Keimdrüse entspricht“, ist ebenso unrichtig, wie dass (33a, S. 335) er hier eine „entschieden pathologische Form“ darstellt.

³⁾ H. A. effectivus successivus bei den Myxinoiden, effectivus autogamus bei *Serranus*, reciprocus bei *Chrysophrys*, potentialis foecundus bei den Raniden und Bufonen nach dem Stephanschen Schema.

erbracht¹⁾, und darum wird es verständlich, wenn eine Reihe von Autoren sich gegen die Anerkennung dieser Form mehr oder weniger energisch sträubt.

Das Material des H. A. verus bei Mensch und Säugetier ist zuletzt 1909 durch Ernst Sauerbeck (58) einer sehr kritischen und eingehenden Sichtung unterzogen worden.

Sauerbeck, dem das besondere Verdienst zukommt, zuerst systematisch auch den H. A. und insbesondere den wahren H. A. der Säugetiere in einer für das Problem höchst förderlichen Art verwertet und die Vorteile der vergleichenden Methode diesen Fragen nutzbar gemacht zu haben, lässt schliesslich als sichere Fälle, die allen Anforderungen genügen, für das Säugetier sieben Beobachtungen einschliesslich einer eigenen gelten²⁾, sämtlich beim Schwein, und für den Menschen zwei, die Beobachtungen von Ernst Salén (57) und Simon (60). Dazu als „sehr wahrscheinliche“ für die Säuger drei³⁾ (zwei Fälle beim Reh und einen bei der Ziege) und für den Menschen fünf.⁴⁾ In den ersteren ist die mikroskopische Untersuchung eine unzulängliche, in den letzteren ist trotz mikroskopischer Untersuchung die Qualität der Geschlechtsdrüsen (einer oder beider) wegen atypischer, immer wohl stark hypoplastischer Ausbildung nicht unbedingt sicher (l. c., S. 667).

Für den Menschen ist inzwischen noch ein sicherer, auch mikroskopisch genau untersuchter Fall von Uffreduzzi (69 a, b, c) und schliesslich ein Fall von Gudernatsch (23) beigebracht worden, der freilich im Sinne von Sauerbeck eher zu den „sehr wahrscheinlichen“ zählt.

Wenn ich von dieser letzteren Kategorie hier ganz absehe und mich, zunächst unter Ausschluss des später genau zu beschreibenden Falles von Ernst Salén, lediglich an die sicheren Fälle halte, so sind hier in der Tat in keinem Falle in Hoden und Eierstock beiderlei Geschlechtszellen erwiesen.

¹⁾ Betreffs des Falles Pütz (53) siehe unten.

²⁾ Beobachtungen von Garth (20), Fall 1 und 2, Kopsch und Szymonowicz (66), Becker (3), Pütz (53), Reuter (55).

³⁾ Boas, Fall 1 und 2; Mayer; siehe Tabelle III, S. 672, Fall VIII bis X bei Sauerbeck (58).

⁴⁾ Blacker-Lawrence, Gast, Oboïonski, Schmorl, Zimmermann; siehe Tabelle III, S. 674, Fall III—VII, l. c. Gelegentlich (l. c. S. 697, 698, 703 und 704) werden freilich auch die sehr wahrscheinlichen Fälle zu den sicheren gezählt.

Während der Eierstock in allen diesen Beobachtungen¹⁾ Eizellen enthält, entweder Primordialfollikel oder auch weitere Entwicklungsstadien der Primordialfollikel bis zu Corpora lutea, sind (vergl. bei Sauerbeck, l. c., Tabelle VI) in den Kanälchen des Hodens niemals Archispermiozyten oder Spermatogonien, geschweige denn höhere Stadien der Spermiogenese zu finden.

Dabei sind (vergl. unten) unter diesen zehn Fällen Hoden und Eierstock neunmal doppel- oder einseitig zu einer Zwitterdrüse (Ovotestis) vereinigt; im Falle Reuter's (55) fand sich der Hoden rechts, das Ovarium links.

Der Hoden in allen diesen Fällen entspricht in seinen histologischen Qualitäten ganz dem gewöhnlichen Zustande des Hodens beim *H. A. spurius masculinus*, und weiter gleichen diese Hoden der wahren und falschen Hermaphroditen histologisch wieder vollkommen den Hoden des Kryptorchens, deren feineren Aufbau die Untersuchungen von Langhans (41), Finotti (18), Félicet et Branca (15), Spangaro (61) u. a. kennen gelehrt haben. Dass diese Übereinstimmung, die sich auf alle histologischen Details erstreckt, tatsächlich besteht, ist nach dem vorliegenden Material für den Menschen wie für das Säugetier²⁾ ganz ausser Zweifel. Es bedarf dazu, wie ich gegenüber Kermanner (33b) ausdrücklich bemerke, keiner neuen vergleichenden Untersuchungen.

Jedenfalls ist so die Bedeutung der Frage, ob die männliche Keimdrüse auch beim Fehlen der germinalen Charaktere allein durch ihre somatischen Bestandteile als männliche charakterisiert ist, eine das Gebiet des *H. A.* überschreitende, weit allgemeinere, entsprechend dem relativ häufigen Vorkommen des Kryptorchismus bei Mensch und Säugern.

Was zunächst die Forderung der Geschlechtsreife bzw. Funktion der Keimdrüsen für die Anerkennung des Sexus und im besonderen für die Anerkennung des doppelten Geschlechts der Keimdrüsen beim *H. A. verus* anlangt, so halte ich diese im Prinzip für verfehlt. Das betont auch Sauerbeck (l. c., S. 340

¹⁾ Betreffs der genauen morphologischen Einzelheiten vergl. Teil IV.

²⁾ Vergl. bei Sauerbeck (58), S. 865, Abs. 3, betr. des *H. A. verus* und *spurius* beim Schwein; ferner S. 694, allgemein betr. der histologischen Übereinstimmung der Hoden bei *H. A. verus*, *spurius* und Kryptorchismus. Ich kann diese histologische Identität nach eigenem Material bestätigen; für die Übereinstimmung bei Kryptorchern und Scheinzwittern vergl. neuerdings Hofstaetter (28), ferner Verfasser (51a).

und 690) in aller Schärfe. Ebenso entfällt mit der Ablehnung dieser Forderung der weitere Schluss (Finkenbrink [17], v. Rosthorn [56], Menge [46]), dass für den Menschen und die Säugetiere, da getrennte und funktionierende Keimdrüsen beiderlei Geschlechts nicht erwiesen seien, überhaupt nur von Pseudohermaphroditismus gesprochen werden müsse.¹⁾

Wenn Menge bei der Diskussion des H. A. *verus* alle Individuen, deren Keimdrüsen nicht funktionieren, wenn sie sich auch morphologisch sonst irgendwie bezeichnen lassen, als „geschlechtslos“ charakterisiert, so wäre dies, wie es Sauerbeck in ähnlichem Zusammenhang (l. c., S. 690) sehr richtig ausdrückt, „logisch gleichwertig mit der Forderung, keinen Menschen vor Nachweis der Vater- oder Mutterschaft zu dem einen oder anderen Geschlecht zu zählen“. Und es würde aus gleichem Grund das kryptorchische, nicht hermaphroditische oder pseudohermaphroditische, Individuum, dessen sonstige sekundäre, accidentale Geschlechtscharaktere im Sinne des Männlichen stets in aller Vollkommenheit vorhanden sind, zu einem Neutrum, ein Schluss, der kaum ernstlich diskutiert zu werden braucht.

Auch Kermauner (33 b) hält die Forderung der Funktion als Kriterium der bestimmten Sexualität der Keimdrüsen für zu weitgehend, aber er verlangt doch immerhin für die Diagnose des echten H. A. den Nachweis von Keimzellen beiderlei Geschlechts, und es läuft schliesslich auch auf das Nämliche hinaus, wenn Sauerbeck das einschichtige Epithel in den Samenkanälchen des Hodens in seinem Fall von H. A. *verus* beim Schwein im Sinne der französischen Autoren (Prenant, Félicet et Branca) analog den häufigen Befunden im ektopischen Hoden als „sekundär einheitlich“ auffasst, und ihn danach, „wenn auch nur *implicite*“, alle wesentlichen Elemente der Keimdrüse, also auch die Samenzellen enthalten lässt, deren Produktion für eine spätere Lebenszeit des Tieres nicht auszuschliessen wäre.

Abgesehen davon, dass nach den neuen Ergebnissen der Entwicklungsgeschichte diese besonders von den französischen Forschern vertretene „*unicistische*“ Auffassung der Spermiogenese endgültig erledigt ist, hält aber Sauerbeck an anderer Stelle

¹⁾ So auch Kitt (35), S. 110, der aber bei Anwesenheit der Genitaldrüsen zweierlei Geschlechts „im rein anatomischen Sinne“ die Bezeichnung als Hermaphroditismus *verus* anerkennt.

mit Entschiedenheit den Standpunkt inne, dass man bei H.A. nicht minder als bei normalen Individuen oder überhaupt nicht hermaphroditischen Individuen auf eine männliche oder weibliche Drüse zu erkennen hat, sobald ein histologisches Bild vorliegt, das nur in der Entwicklung des einen Geschlechts existiert. Mit anderen Worten: auch ohne die spezifischen Keimzellen wird das Geschlecht durch den organspezifischen Bau der Gonade sicher bestimmt, also, worauf es für die Frage des wahren und falschen H. A. hauptsächlich ankommt, auch ohne männliche Keimzellen durch eine sonst charakteristische Keimdrüse das männliche Geschlecht des Individuums oder bei gleichzeitig vorhandenem Ovarium der H. A. verus.

Für diese eigentlich selbstverständliche Anschauung, die ich in allen ihren Folgerungen vertrete, lässt sich, insbesondere auch gegenüber den neuerlichen Ausführungen Kermanners, mehr als ein Argument anführen.

Sicherlich treten die somatischen Zellkomplexe, die innerhalb der Gonaden in den besonderen Dienst der Reifung und Generation der Geschlechtszellen gestellt sind, schon dadurch in einen Gegensatz zu allen anderen somatischen akzidentalen Geschlechtscharakteren. Diesem Umstand trägt der allgemeine Sprachgebrauch insofern Rechnung, als vielfach, so auch an anderer Stelle (52a) bei Poll, nicht die Gameten, sondern die Gonaden als primäre (essentielle) Geschlechtsmerkmale in Gegensatz zu allen übrigen als sekundären gebracht werden, und diese Auffassung ist so verbreitet, dass Tandler und Grosz, ohne die Bedeutung der Keimzellen als Träger der eigentlich primären Merkmale zu verkennen, sie für ihre den biologischen Grundlagen der sekundären Geschlechtscharaktere gewidmeten Untersuchungen ausdrücklich akzeptieren (vergl. l. c., S. 12 oben und S. 3, 130 und 133).

Die gegensätzliche Stellung des somatischen Keimdrüsenanteils gegenüber allen anderen akzidentalen Geschlechtsmerkmalen findet sich aber noch in einer anderen äusserst wichtigen Beziehung, und es sind gerade die eben genannten Untersuchungen von Tandler und Grosz, die sich mit diesen Verhältnissen sehr wesentlich beschäftigen.

Die Keimdrüse besteht neben dem generativen Anteil, der die Produktion bzw. Reifung der Gameten besorgt, aus einem innersekretorischen Anteil, der interstitiellen Drüse, die im Hoden

durch die Leydig'schen Zwischenzellen, im Ovarium durch den gelben Körper und die den Leydig'schen Zellen korrespondierenden, bei den verschiedenen Tierspezies nicht gleichmässig entwickelten Zwischenzellen repräsentiert ist. Alle sekundären Geschlechtscharaktere¹⁾ entstehen (vergl. Tandler und Grosz; auch Steinach) phylogenetisch wie ontogenetisch unter dem schon intrauterin tätigen Einfluss der von der interstitiellen Drüse gelieferten geschlechtsspezifischen Keimdrüsen- oder Sexualhormone, vielfach nicht ohne gleichzeitige Hormonwirkung seitens anderer „komplementärer“ innersekretorischer Drüsen (Schilddrüse, Thymus, Hypophyse, Glandula pinealis, Nebenniere). Sie sind, um es so auszudrücken, physiologische Produkte der Harmonie der Hormone.²⁾

Wie für den generativen somatischen Keimdrüsenteil durch seine engen Beziehungen zur Produktion und Reifung der Keimzellen, so besteht auch für den innersekretorischen Gonadenteil eine unbestreitbare Sonderstellung gegenüber allen anderen sekundären somatischen Charakteren. Er ist im Verhältnis zu diesen von überragender sexual-spezifischer Bedeutung, und da wenigstens im allgemeinen gerade in den Hoden der Kryptorchen sowie der Pseudohermaphroditen und wahren Hermaphroditen im Gegensatz zu der Mangelhaftigkeit der generativen Bestandteile der innersekretorische Abschnitt, d. h. der Zwischenzellenbestand mit dem des normalen Hodens in der allgemeinen und speziellen Struktur übereinstimmt, so besteht hier ein für die Entscheidung der Geschlechtszugehörigkeit (Männlichkeit) durchaus wesentliches Merkmal. Sind es nach Tandler und Grosz (l. c., S. 133) die Gonaden, die „als primäre (essentiale) Merkmale die Geschlechtszugehörigkeit eines Individuums eindeutig bestimmen“,

¹⁾ Nach Poll zum mindesten eine Anzahl der akzidentalen Charaktere, nämlich die „versiblen“.

Nach Tandler und Grosz ist in der Ontogenese die Abhängigkeit von den Keimdrüsenhormonen für die phylogenetisch jüngsten Sexualcharaktere am ausgeprägtesten.

²⁾ Die von Plato und späteren Autoren vertretene Auffassung der Zwischenzellen als Hilfsorgane der Spermiogenese wird von Tandler und Grosz mit Rücksicht auf gewisse neue Befunde Goldmanns (Einwanderung von Zwischenzellen in Samenkanälchen) als Nebenfunktion der Zwischenzellen nicht unbedingt abgelehnt; wohl aber die Theorie Kyrles, nach der die Leydig'schen Zellen der Regeneration des Hodenparenchyms dienen sollen (vergl. 66, S. 86, 90, 115, 116, 120, 121 und 122).

so ist damit neben die geschlechtsbestimmende Valenz der Gameten die geschlechtsspezifische Bedeutung der Zwischenzellen — wenn auch nur in biologischem Sinne — gesetzt. Es würden nach alledem Hoden aus typisch geordneten Samenkanälchen und Zwischenzellen auch ohne männliche Geschlechtszellen meines Erachtens als Hoden nicht zu bezweifeln sein.

Nun ist aber weiter der völlige Mangel von Geschlechtszellen in den Hoden der Kryptorchen und der Pseudohermaphroditen keineswegs eine undurchbrochene Regel. Einmal gibt es hier, wenn auch selten, Fälle einer regelrechten Spermiogenese. Sie ist von Garth¹⁾ z. B. in den retinierten Hoden eines Schweinekryptorchen gesehen (vergl. Sauerbeck [58], S. 693 o.), und von Merkel (47) in dem Falle eines männlichen 52jährigen Pseudohermaphroditen, wo bei der gleichzeitigen Anwesenheit von Scheide, Uterus und Tuben die Hoden an der Stelle der Eierstöcke, also innerhalb der Bauchhöhle, gelegen waren.²⁾

Und weiter ist insbesondere für den Hoden der menschlichen Kryptorchen, bei denen die Möglichkeit einer Untersuchung in Altersserien gegeben ist, häufig genug entweder vollständige Spermiogenese (von Uffreduzzi [69d] neuerdings in 10% der Kanälchen im retinierten Hoden; vergl. auch einen Fall bei Basso [1]) oder mangelhafte Spermiogenese oder doch wenigstens, wie in der jüngst von Tandler und Grosz untersuchten Serie, in den Hoden kindlicher Kryptorchen ein Bestand an pathologisch veränderten Urgeschlechtszellen oder Spermatogonien festgestellt worden.³⁾ Also unvollkommene Spermatogenese oder zerfallende, zugrunde gehende Ureier, aber doch immerhin männliche Geschlechtszellen.

Erwägt man, dass z. B. in den Tandler und Groszschen Präparaten zur Zeit der Pubertät in den kryptorchischen Hoden diese Elemente spurlos verschwunden waren, so liegt darin ein

¹⁾ Garth (l. c.) betont mit Recht die Notwendigkeit, in jedem einzelnen dieser Fälle auch bei den wahren Hermaphroditen möglichst umfassende Untersuchungen der ganzen Hodensubstanz vorzunehmen; vergl. auch Simon (60), S. 24, unter Bezugnahme auf die Feststellungen Finottis.

²⁾ Vergl. auch Sauerbeck (S. 353 o.), der für die Ektopie der Hoden, auch die der echten Zwitter, alle Übergänge vom Zustand der „sekundären unification cellulaire“ bis zum normalen, geschlechtsreifen Hoden feststellt.

³⁾ Auch ich selbst habe bei gelegentlichen Untersuchungen in Leistenhoden Jugendlicher zweifelloso Elemente der Geschlechtszellreihe gefunden.

höchst bedeutsamer Hinweis darauf, dass auch in den „geschlechtszellosten“, sonst geschlechtsspezifisch gebauten Hoden der H. A. und Ps. H. A. in früherer Zeit Geschlechtszellen vorhanden waren. Es ist möglich, dass sich die geschlechtsspezifischen männlichen Strukturen der Hodenkanälchen überhaupt nur bilden, wenn wenigstens für eine kurze Phase der Ontogenese männliche Keimzellen gegenwärtig sind. Jedenfalls ist der Gedanke eines passagären Bestehens von Keimzellen (oder beim Ps. H. A. andersgeschlechtlichen Keimdrüsengewebes), eines Unterschiedes dessen, was gefunden wird, von dem, was tatsächlich dagewesen ist, gelegentlich der Erörterung dieser Fragen wiederholt zu finden. So bei Sauerbeck (58, S. 350, 352, 831, 872 und 873), bei Kermauner (33 b, S. 457; auch 33 c, S. 494) und neuerdings bei Gudernatsch (23, S. 269).

Aber selbst wenn wir alles Hypothetische ausschalten, machen sicherlich die tatsächlichen Befunde zugrundegehender Geschlechtszellen in jugendlichen kryptorchischen Hoden für diese ganze Gruppe histologisch sonst vollkommen übereinstimmender Keimdrüsen der Kryptorchen und der männlichen Pseudohermaphroditen die nämlichen Vorgänge nicht unwahrscheinlich, und die Abtrennung „mancher“, d. h. geschlechtszelloser Formen des Kryptorchismus (Kermauner, 33 b, S. 459) zu einer durchaus künstlichen. Alle Individuen dieser Art sind danach auch von diesem Gesichtspunkt aus durch Hoden ohne Keimzellen in ihrer Männlichkeit genügend charakterisiert, und der „Kryptorch“ trägt seinen Namen mit ebenso gutem Recht, als im System des Pseudohermaphroditismus vom weiblichen Scheinzwitter der männliche geschieden wird, auch wenn sein Hoden keine männlichen Geschlechtszellen auffinden lässt. Und mit nicht minderem Berechtigung endlich ist der im kleinsten entsprechend gebaute Anteil des Ovotestis wirklicher Hoden.

Eine besonders radikale Stellung nimmt gegenüber der Auffassung dieser keimzellosten Hoden als wirkliche Hoden neuerdings Kermauner (33 b)¹⁾ ein. Das Einzige, was in dem histo-

¹⁾ Kermauner, der an anderer Stelle (33 a) die Zwitterdrüsen (Ovotestis) der Säugetiere und des Menschen in der Zusammenstellung Sauerbecks anerkennt, sie dort „vorläufig noch auf eine bisexuale Anlage der Keimdrüsen zurückführt“ und „die Möglichkeit der Existenz hermaphroditischer Eier für diese Fälle zugibt“, hat diese Anschauung, wie er übrigens selbst andeutet (S. 446), neuerdings seiner radikaleren Überzeugung geopfert.

logischen Bilde des Hodens der bisher bekannten Zwitterdrüsen ¹⁾ bei Mensch und Säugern an den Hoden erinnert, sind die Kanälchen, und „Kanälchen allein beweisen noch keinen Hoden“. Der nämliche Zweifel bezüglich der „Hoden“-Natur gilt für die analog gebauten, als männliche angesprochenen Keimdrüsen der männlichen Pseudohermaphroditen und „mancher“ Kryptorchen. Kermanner stützt sich hierbei auf folgende embryologische Erwägung:

Ein Rete (= Markschläuche) wird in völlig homologer Form im Hoden sowohl wie im Ovarium angelegt. Da „ein Teil zum mindesten des ganzen Kanalsystems der Tubuli contorti vom Rete abstammt“ und als „das natürlichste wohl anzunehmen ist, dass nur Teile, welche deutliche Spermatogenese aufweisen, auf die Keimstränge zurückgeführt werden dürfen“, die „anderen aber auf das — vielleicht übermässig gewucherte — Rete“, so sind alle diese hodenähnlichen Gebilde der Ovotestes, nicht minder logischerweise die histologisch analogen der Pseudohermaphroditen und gewisser Kryptorchen, lediglich adenomatöse Fehlbildungen seitens des ovariellen Rete (Adenoma retis [33 b] S. 459); sie sind Hodenimitationen, Scheinhoden (Pseudotestes), die eine Scheinmännlichkeit der Keimdrüsen, eine Pseudoandrie, vortäuschen.

Diesen Beweis halte ich in allen Punkten für misslungen. Unhaltbar ist die Behauptung Kermanners, dass die Hoden der Hermaphroditen (und Kryptorchen) allein durch die Kanälchen an den Hoden erinnern. Die im histologischen Bilde oft so stark vortretenden Zwischenzellen werden dabei vollkommen übersehen. Unhaltbar ist der angenommene Unterschied der Embryogenese der Geschlechtszellen führenden Tubuli contorti von der Entstehung der häufig ganz analog gebauten geschlechtszellosen Kanälchen. Völlig unhaltbar ist auch die Annahme der Genese der Tubuli contorti aus dem Rete. Über ihre Abstammung aus den Keimsträngen bzw. dem Keimepithel besteht nach den neuen Untersuchungen (vergl. W. Felix, 14) keinerlei Zweifel. Selbst die Tubuli recti entstammen nicht dem Reteblastem, sondern den inneren Enden der Hodenstränge (vergl. ferner das Keibelsche Schema, 32, S. 23, Fig. 8).

¹⁾ Auch der Fall Reuters würde dabei inbegriffen sein, da der Bau des Hodens sich von dem des männlichen Teils der Zwitterdrüsen nicht unterscheidet.

In dem nämlichen Sinne ist auch v. Rosthorns (56) Auffassung der Zwitterdrüsen (Ovotestis) als glandulärer Pseudohermaphroditismus strikt abzulehnen. Die „Zwitterdrüsen“ der Säuger und des Menschen enthalten neben dem Eierstocksteil wirklichen Hoden, sie sind Beweisstücke eines wahren sexualen Dimorphismus der Keimdrüsen und damit des wahren Hermaphroditismus.

Ganz gewiss ist der H. A. verus dieser Form nicht nur von der oft postulierten bisexuell-funktionellen, sondern auch von derjenigen, zuerst charakterisierten Form verschieden, für die in den zum Ovotestis vereinigten Gonaden zugleich eine Mischung der Gameten überhaupt (resp. der Gametogonien oder Gametozyten) besteht.

Ebenso wie nach den bisherigen tatsächlichen Feststellungen bei der Kombination eines Ovariums mit einem geschlechtszelllosen Hoden die Ovula zur vollen Reife (eventuell Funktion?)¹⁾ gelangen können, wäre auch bei der Kombination geschlechtszellenführender Keimdrüsen die volle Ausreifung entweder im Ovarium oder im Hoden möglich.

Es würden sich danach für den wahren pathologischen oder teratologischen H. A. der Säuger und des Menschen (unbeschadet der Anordnung und Verteilung der Keimdrüsen im einzelnen) a priori folgende Möglichkeiten ergeben.

I. Hoden und Eierstock mit beiderlei Gameten in voller Geschlechtsreife²⁾ (Funktion).

II. Hoden und Eierstock mit beiderlei Gameten

1. mit Geschlechtsreife (Funktion) der Gameten einer Keimdrüse

a) des Ovariums;

b) des Hodens;

2. Reifung der Gameten in keiner der beiden Drüsen.

III. Hoden ohne Keimzellen, Eierstock mit Keimzellen

1. reifend (funktionierend);

2. nicht reifend.

¹⁾ Die Funktion eines Abschnittes der Zwitterdrüse (des Ovariums) ist in den Fällen von H. A. verus an sich prinzipiell nicht in Abrede zu stellen; so führte in dem Falle von Boas von H. A. lateralis beim Reh das Tier ein Junges bei sich.

²⁾ Hierher würde, falls die durch die sehr spärlichen Spermien des Samens bewiesene Spermatogenese in den Hodenkanälchen mikroskopisch hätte demonstriert werden können, der Fall Pütz zählen.

(Betreffs „Ovarium ohne Keimzellen“, Hoden mit Keimzellen vergl. unten: Anmerkung.)

Ich möchte entsprechend der speziellen Differenzierung des generativen Keimdrüsenanteils in germinale und vegetative Geschlechtszellen (Benda) die Gruppen I und II als wahren rein germinalen (oder essentialen) Hermaphroditismus, die Gruppe III als wahren vegetativ-germinalen¹⁾ Hermaphroditismus bezeichnen. Gruppe I würde in reinsten Form dem funktionellen wahren H. A. von Tandler und Grosz, Gruppe II, 2 und III, 2 dem morphologischen wahren H. A. dieser Autoren entsprechen, Gruppe II, 1 und III, 1 mit einseitiger Reifung der Keimzellen im Eierstock bzw. im Hoden und bloss morphologisch charakterisiertem Hoden bzw. Ovarium würden eine Intermediärstellung zwischen dem funktionellen und dem morphologischen innehalten. Jedenfalls bezeichnen bemerkenswerterweise auch Tandler und Grosz die Differenzen zwischen der funktionellen und morphologischen Gruppe lediglich als graduelle.²⁾

Sowohl für den germinalen wie für den vegetativ-germinalen H. A. wären die beiderlei Gonaden als getrennte Drüsen oder vereinigte Ovotestis möglich, nach dem bekannten Schema von Klebs als bilateraler H. A. oder als unilateraler H. A. bei vorhandener, sei es männlicher oder weiblicher oder fehlender Keimdrüse der anderen Seite oder aber als H. A. lateralis bei männlicher der einen, weiblicher Keimdrüse der anderen Seite. Sauerbeck hat alle diese Möglichkeiten der Anordnung und

¹⁾ Würde man (vergl. Fall Gudernatsch [23], auch Kitt [35], S. 113 u.) ein Ovarium ohne völlig sichere Keimzellen nur nach seinem charakteristischen Bau — Mark und Rinde mit Keimepithel und typischem Rindenstroma oder mit Follikeln ohne Eizellen (Sauerbeck [58], S. 691) — in gleichem Sinne wie einen lediglich aus gewundenen Kanälchen ohne Samenzellen bestehenden Hoden akzeptieren, so würde einmal sub III auch die Kombination von Hoden mit männlichen Keimzellen und Ovarium ohne Keimzellen möglich sein und ferner (Fall Gudernatsch) als eine dritte Form der wahre rein vegetative Hermaphroditismus bestehen.

Der Fall Gudernatsch, dessen Präparate dem VIII. Internationalen Zoologenkongress in Graz vorlagen, wird in der Tat durch A. Kohn-Prag, Tandler und Grosz und, nach der Angabe von Gudernatsch, auch von den Kongress-Mitgliedern als H. A. verus mit Ovotestis begutachtet.

²⁾ Diese Formen des H. A. verus der Säuger und des Menschen würden in Stephans allgemeinem Schema des H. A. unter die Kategorien des H. A. potentialis foecundus und sterilis bzw. rudimentarius glandularis entfallen.

Verteilung der Gonaden in sein erweitertes Klebssches Schema einbezogen (vergl. l. c. S. 666, 670 und 691 nebst Tab. II) und in seiner tabellarischen Analyse der einschlägigen Fälle von Mensch und Tier zur Anwendung gebracht.¹⁾

Wir erhalten danach im Sinne von Klebs-Sauerbeck den H. A. verus als:

I. bilateralis

- a) mit getrennten,
- b) mit vereinigten Keimdrüsen.

II. unilateralis (dexter oder sinister)

- a) mit getrennten,
- b) mit vereinigten Keimdrüsen, dabei
 - α) mit vorhandener Keimdrüse der anderen Seite (completus) als
 - αα) Hoden (masculus),
 - ββ) Eierstock (femininus);
 - β) mit fehlender Keimdrüse der anderen Seite (incompletus).

III. lateralis (alternans bei Kitt)

- a) männliche Keimdrüse rechts (masculus dexter),
- b) männliche Keimdrüse links (masculus sinister).

Jede einzelne Form dieses Zwittertums könnte in unserem Sinne als ein rein germinaler oder als ein vegetativ-germinaler,

¹⁾ Eine kritische Besprechung der verschiedenen Schemata des H. A. und Ps. H. A. liegt nicht in meiner Absicht. Sauerbeck vergleicht und kritisiert die Modifikationsversuche, die Kaplan (1895), Benda (1895) und Siegenbeck van Heukelom (1898) an dem von Sauerbeck selbst beibehaltenen und erweiterten Klebsschen Schema des H. A. vornehmen. Halban hat es durch die Berücksichtigung der sekundären und psychischen Geschlechtsmerkmale erweitert; die „sekundären“ sind hier im Sinne Hunter-Darwins die extragenitalen Charaktere unter Ausschluss der besonders gestellten psychischen Eigenschaften; Kermauner hat die anatomische Reduktion im Sinne Bendas noch verstärkt. Tandler und Grosz schlagen vor, die von Poll angegebene Einteilung der Geschlechtsmerkmale auf die Einteilung des H. A. zu übertragen.

Das bei diesen Reduktionen vortretende, auch von Sauerbeck (l. c. S. 663, 831—832, 875—876) bekämpfte Prinzip, bestimmte Formen des H. A., namentlich den H. A. externus als „zufällige“ Missbildungen von besonderer, sozusagen unspezifischer, eventuell grobmechanischer Ätiologie (als „Pseudo-Pseudohermaphroditismus“, 58, S. 832) vom Gebiet des H. A. abzutrennen, ja, den Ps. H. A. vom wahren H. A. im gleichen Sinne ätiologisch abzulösen, halte ich für falsch (vergl. darüber unten).

eventuell auch als ein rein vegetativer H. A. vorkommen, beim H. A. verus unilateralis die eventuell vorhandene Keimdrüse der Gegenseite dabei übrigens gleichfalls entweder Keimzellen führen oder nicht und sie im ersteren Falle entweder ausreifen oder nicht ausreifen lassen, — eine nicht geringe Fülle von Möglichkeiten, die allerdings, wie alsbald zu zeigen ist, durch die Tatsachen eine sehr wesentliche Einschränkung erfährt.

Und doch sind damit — wenigstens vom theoretischen Standpunkt aus — die für den wahren H. A. offenen Möglichkeiten noch nicht einmal erschöpft.

Ich habe oben auf die sexualspezifische Bedeutung des innersekretorischen Anteils der Keimdrüse, die spezifisch funktionierende (Steinach) interstitielle Drüse des Hodens und des Eierstocks verwiesen und auf den als solchen sichergestellten formativen Einfluss der Keimdrüsenhormone zum mindesten auf einen Teil der sekundären Geschlechtscharaktere. Wenn wirklich, wie Steinach und mit ihm Tandler und Grosz annehmen, im differenzierten Hoden weibliche und im differenzierten Ovarium männliche Zwischenzellen („Pubertätszellen“ nach Steinach) eingesprengt sein könnten, so würde dem bisher allein bekannten und erörterten Keimdrüsen-Hermaphroditismus der generativen Anteile ein solcher der innersekretorischen Anteile an die Seite gestellt werden müssen. Er würde, den im übrigen geschlechtsspezifischen Bau von Hoden und Ovarium vorausgesetzt, vielleicht noch am ehesten als eine eigentümliche Form des wahren H. A. — als ein Hermaphroditismus verus glandulo-interstitialis — zu gruppieren sein. Und er würde sich von den Formen des rein generativen H. A. verus nicht nur dadurch unterscheiden, dass hier die hermaphroditische Mischung in einer an sich einfachen, äusserlich nicht veränderten und anscheinend typischen Keimdrüse vollzogen ist, sondern vor allem dadurch, dass mit der Sicherstellung dieser Form sich das physiologisch-kausale Moment in das bisher gezwungenermassen rein deskriptiv gehaltene Schema des H. A., einführt. Zugleich würde nach den obengenannten Korrelationen der interstitiellen Drüse des Hodens und Eierstocks zu den „komplementären“ inneren Drüsen des Organismus die kausale Störung über das Gebiet des glandulo-interstitiellen Hermaphroditismus der Keimdrüse mehr oder minder weit in das übrige polyglanduläre System hinausgreifen. Es ist möglich, dass das,

was wir heute in rein morphologischer Fassung als Pseudohermaphroditismus bezeichnen, in dieser Form des glandulo-interstitiellen Hermaphroditismus mehr oder weniger aufginge, und es ist natürlich weiter auch möglich, dass dieser als eine weitere Komplikation zu den Mischungen der rein generativen Keimdrüsenanteile mehr oder weniger regelmässig hinzutrate.

Allerdings steht, was nicht zu vergessen ist, diese Form des H. A. vor der Hand überhaupt nur auf dem Papier.¹⁾ Das erkennen auch Tandler und Grosz ausdrücklich an. Unsere Kenntnisse über die morphologische Identifizierung der männlichen und weiblichen interstitiellen Drüse und ihre physiologische Wirkung im einzelnen sind bisher so mangelhafte, dass mit einer ernsthaften Prüfung der Hypothese zurzeit noch nicht der Anfang gemacht werden kann. So bleibt also als sichere Form des wahren H. A. zunächst allein der H. A. der generativen Anteile der Gonaden.

Prüfen wir die Klebs-Sauerbecksche schematische Aufstellung, die gemäss unserer eigenen obigen Einteilung (germinaler, vegetativ-germinaler und rein vegetativer wahrer H. A.) vervollständigt ist, an der Hand der tatsächlichen Befunde, so ergibt sich nach dem bisherigen Material²⁾ zunächst der Aus-

¹⁾ Vergl. unseren Befund im äusserlich unveränderten Ovarium des Falles V. Er betrifft in den äusserlich nicht veränderten Eierstock versprengte Zwischenzellen und Samenkanälchen, stellt also doch eigentlich nur eine Abart des Ovotestis dar.

²⁾ Vergl. die eingangs (den Fall Salén schliesse ich [vergl. S 125] vorläufig aus) gegebene Aufzählung der Fälle von H. A. verus bei Mensch und Säugern. Dabei möchte ich auf die von Kitt (35) neuerdings erwähnten Fälle von Hermaphroditismus biglandularis s. bisexualis (= verus) hinweisen. Kitt zitiert: H. A. alternans biglandularis („früher lateralis genannt“) beim Schwein (Gurlt, Pütz, Münchener Sammlung) und beim Kalb (Schlumpf, Soulié, Münchener Sammlung); H. A. unilateralis (biglandularis) beim Stier (Mascagni) und H. A. bilateralis (glandularis) beim Schaf (Scriba, Gurlt), bei der Ziege (Gurlt, Guinard), beim Eselsfüllen (Hunter) und bei einer hörnertragenden scheinbaren Rehgeiss (Kitt). Fig. 51 stellt das innere Genitale bei einem H. A. biglandularis alternans des Kalbes dar; Fig. 52 das Nämliche bei einem Schwein.

Kitt erwähnt ausdrücklich, dass Johne, Bonnet, Sticker und er selbst auch histologische Feststellungen von bisexuellen Zwittern bei Haustieren vorgenommen haben.

Weiter finden sich in der französischen Literatur Beobachtungen von glandulärem H. A. bei Säugern, z. B. berichten Bouin und Ancel (6a, b)

fall der Gruppen Ia und IIa. Alle bisher bekannten sicheren Fälle wahren Zwittertums mit doppelten Keimdrüsen zeigen diese nicht getrennt, sondern, wie schon oben bemerkt, zur doppel- oder einseitigen Zwitterdrüse vereinigt.

Weiter ergibt sich der vollkommene Ausfall der rein germinalen Formen in unserem Sinne. In sämtlichen bisher bekannten Fällen der Zwitterdrüsen, ebenso in den beiden sicheren Fällen von H. A. verus lateralis (Reuter, Kingsburg) mit linksseitigem Ovarium und rechtsseitigem Hoden, ist der H. A. verus ein vegetativ-germinaler in dem Sinne, dass der Hoden keine Geschlechtszellen, das Ovarium dagegen zweifellose Eizellen enthält.¹⁾

Es ist dies ein Punkt von prinzipieller Bedeutung, nicht nur in rein morphologischem Betracht. Denn es ist, wie schon vorher angedeutet, gar kein Zweifel: die immer von neuem auftauchende Opposition gegen den H. A. verus beim Säuger und

wiederholt über solche. In der englischen bzw. amerikanischen Literatur gibt neuerdings Kingsburg (34) eine Mitteilung vom H. A. verus lateralis beim Schwein mit histologischer Untersuchung. Neunmonatliches Tier mit äusserem männlichen Genitale. Normaler Penis. Am Perinaeum ein vulvaähnlicher Wulst („ridge“). Vagina und Uterus vorhanden. Keine Vaginalanwendung. Linkes Uterushorn mit Tube, Fimbrie und kleinbohnengrossem Eierstock; keine Spur von Hoden. Epididymis und Vas deferens auf dieser Seite. Rechts typischer Hoden, 2,5 cm lang, mit typischem Nebenhoden und Vas deferens. Kein Ovarium. Rechte Tube blind am Nebenhodenkopf endigend. Vom Ovarium wird das mittlere Drittel oder etwas mehr auf Serienschnitten mikroskopisch untersucht. Normales Ovarialstroma. Follikel (1 Graafischer) zum Teil mit Ovula; kein Hodengewebe links. Im rechtsseitigen Hoden typische kryptorchische Struktur. Epithel einschichtig, vakuolisiert; zahlreiche typische Zwischenzellen.

Ein sicherer Fall von Ovotestis beim Schwein ist ferner im Göttinger Pathologischen Institut seinerzeit unter Orth (laut gefl. persönlicher Mitteilung von Orth an mich) untersucht worden.

Ich habe es absichtlich unterlassen, die Sauerbeck'sche Zusammenstellung des wahren H. A. bei Säugern auf ihre Vollständigkeit zu prüfen oder sie insbesondere noch durch den einen oder anderen der genannten Fälle zu ergänzen. Ich sehe für die Frage darin keinen besonderen Nutzen mehr.

¹⁾ Pütz sah in seinem schon wiederholt zitierten Fall bei einem H. A. verus unilateralis dexter incompletus, d. h. bei rechtsseitiger Zwitterdrüse und links überhaupt fehlender Drüse, neben reifen Eifollikeln im Ovarium Spermatozoen im Sperma. Doch gelang der Nachweis irgendwelcher Zellen der samenbildenden Reihe bei der mikroskopischen Untersuchung des Hodens nicht.

Der Fall Gudernatsch entspricht unserer rein vegetativen Form (vergl. oben S. 134).

beim Menschen begründet sich letzten Endes darin, dass die gleichzeitige Existenz von Hoden und Eierstock mit ihren „unumgänglichen charakteristischen Bestandteilen, den Keimzellen beiderlei Geschlechts“, bisher von niemandem gezeigt worden ist. Daher die wiederholten Versuche — ich nenne hier Siegenbeck van Heukelom und W. Nagel (48 b) — alle Fälle von „Hermaphroditismus verus beim Menschen“ in rücksichtsloser, zum Teil übrigens gewiss berechtigter Kritik zu beseitigen. Daher das Bestreben, die keimzellenlosen Hoden der Zwitterdrüsen zu Fehlbildungen eines Eierstocksrete zu degradieren. Daher die Bemühungen Kermanners, für die Genese des Hermaphroditismus eine besondere doppeltgeschlechtliche Bildungstendenz überhaupt zurückzuweisen und den gesamten Pseudohermaphroditismus als eine rein lokale Genitalmissbildung im mechanistischen Sinne — aus einer zeitlichen Inkongruenz in der Entwicklung der Wolffschen und Müllerschen Gänge — zu begründen und ihn in Annäherung an andere Genitalmissbildungen, wie die Cloakenmissbildungen, seiner Eigenheit und Sonderstellung zu entkleiden.

Gibt es, so folgert Kermann (33 b, S. 446), keine echten Hermaphroditen, bei denen Hoden und Ovarium durch männliche und weibliche Keimzellen charakterisiert werden, so muss auch der Begriff des Pseudohermaphroditismus fallen.

Diese Folgerung ist falsch, weil die Prämisse nicht stimmt. Es gibt in der Tat auch für den Menschen einen wahren germinalen Hermaphroditismus, einen Hermaphroditismus, bei dem beide Geschlechtsdrüsen die spezifischen Geschlechtszellen enthalten. Ich werde den tatsächlichen Beweis dafür erbringen, und ich gebe im folgenden eine eingehende, soviel als tunlich durch Abbildungen erläuterte Beschreibung einer derartigen Beobachtung.

Ich lasse ihr aber zunächst eine Reihe von fünf eigenen Fällen des wahren H. A. beim Säuger vorangehen, die ich selbst untersucht habe. Sauerbeck hat die bis in das Kleinste gehende Übereinstimmung des H. A. der Säuger, des Ps. H. A. wie des wahren H. A., mit den Verhältnissen beim Menschen durch seine schon oben genannten Unternehmungen in vergleichender Analyse erwiesen und damit die ganze Lehre mit einem Schlage auf eine weit breitere, gesichertere Grundlage gestellt. Insofern möchte ich gerade die Darstellung meiner Befunde beim Säugetier mit den von

mir beim Menschen gemachten Feststellungen verbinden. Meine Beobachtungen betreffen, wie alle bisherigen sicheren Fälle von H. A. verus beim Tier, das Schwein. Die relativ bedeutende Anzahl — fünf Fälle gegenüber den sieben sicheren Sauerbecks aus der Gesamtliteratur der letzten 27—28 Jahre — habe ich aus dem Material des Berliner städtischen Schlachthofes in den Jahren 1910—1913 mit der tatkräftigen und interessvollen Unterstützung des städtischen Schlachthofarztes Herrn Dr. Max Schmey zusammengebracht.

Meine Beobachtungen schliessen sich an die von Sauerbeck zusammengestellten von sicherem H. A. verus beim Schwein unmittelbar an. Ich will an der Hand der einzelnen Befunde prüfen, wie weit durch meine Ergebnisse die von Sauerbeck aus seinen Untersuchungen für den H. A. verus abgeleiteten „phänomenologischen Gesetze“ sich bestätigen bzw. erweitern lassen. Zu dem nämlichen Zweck gebe ich auch eine kurze Wiedergabe des älteren Simonischen Falles von H. A. verus beim Menschen und der beiden neuen Fälle von Uffreduzzi (69 a, b, c) und Gudernatsch (23).

Freilich kommen bei allen diesen Untersuchungen und Befunden des H. A. verus nicht allein die rein morphologischen Detailfeststellungen in Frage. Die Bedeutung der positiven und jetzt nicht mehr angreifbaren Begründung des wahren H. A. ist eine weit umfassendere, ja, grundsätzliche für die Auffassung des H. A. verus überhaupt.

Durch den sicheren Nachweis des H. A. verus, durch seine gesetzmässige Kombination mit dem Ps. H. A. in seinen verschiedenen Abarten ist die Einheitlichkeit des H. A. gewährleistet, zunächst natürlich im rein anatomischen Sinne. Aber darin liegt zugleich gewiss auch ein starker Hinweis auf eine gemeinsame Ätiologie aller Formen des H. A., des wahren wie des falschen.

Wir werden auf diese Fragen nach der Darstellung der tatsächlichen Befunde, die ich nun folgen lasse, einzugehen haben.

Teil II.

a) Fünf eigene Fälle von Hermaphroditismus verus beim Schwein.

Sämtliche von mir untersuchten Tiere waren etwa 8 Monate alt. Die Kontrollorgane wurden von gleich alten männlichen und weiblichen normalen und kastrierten Schweinen, von sogenannten „Borgs“ bzw. „Nonnenschweinen“, untersucht.

Fall I.

Das Tier hat nach dem mir gegebenen Bericht Auffälliges an seinem äusseren Genitale, der Scheide und seiner Körperform nicht gezeigt. Der Gesamteindruck des Tieres war ein weiblicher und ebenso wie der Befund der inneren Organe ohne eine Abweichung.

Ich nehme diese Angabe einfach ad notam, da ich sie nicht habe nachprüfen können.

Ich erhielt den obersten Abschnitt der Scheide mitsamt dem Uterus, den breiten Mutterbändern und den Anhängen in einem Stück (Taf. XIII, Fall 1). Die oberste Scheide plus Uterusteil (ut) (Cervix und Corpus) war 9 cm lang.

Die Schnittfläche zeigt den Muskelschlauch der Scheide sehr kräftig entwickelt; er ist etwas von vorn nach hinten abgeplattet, bei einem Querdurchmesser von 24 mm. Das Lumen ist mit normaler Schleimhaut ausgekleidet, stellt sich als ein querer Spalt dar. Zu beiden Seiten des Lumens von Muskulatur umgeben, aber doch schon am Rand des Durchschnittes erscheinen zwei deutliche Lumina (Gg) (Vasa deferentia).

Die Uterushörner (nh), die aus der Trennung des unpaaren Teiles an normaler Stelle hervorgehen, sind kräftig entwickelt, je etwa 33 cm lang und 2,5 cm dick. Die Dicke sinkt da, wo sie nach abwärts umbiegen, auf 2 cm. Schliesslich folgt unter besonderer Krümmung abgesetzt an jedem Horn ein 1 cm langer, 7--8 mm dicker, schnell verjüngter Endabschnitt.

Diesem Ende liegt jederseits ein Pol eines Körpers an, der seinem ganzen Äusseren nach sofort als Hoden (h) imponiert. Er besitzt die Maße links 4,5:4,5:3 cm, rechts 4,5:4:4 cm, ist, abgesehen von seiner Verkleinerung gegen die Norm, von normaler Form; seine bläulich-graue Oberfläche ist von nicht verdickter normaler Albuginea überzogen.

Jederseits liegt aber der dem Ende des Uterushorns genäherte Hodenpol nicht frei, sondern wird von einer relativ flachen, kappenartigen Auflagerung (o) umfasst, die überall ganz scharf abgesetzt ist. Sie besitzt links wie rechts eine kleingebuckelte Oberfläche, die mit der glatten Aussenfläche der Hoden stark kontrastiert, eine derbe Konsistenz und eine durchscheinende, opakgelbe Farbe an manchen der kleinen Höcker. Die Maße dieser Auflagerung betragen links: 1,9:1,0:0,8 cm; rechts: 3:2,3:0,5 cm.

Der Durchschnitt ergibt beiderseits eine exquisite „Zwitterdrüse“: die kappenartigen Organe sind typische Ovarien. Das linke (vergl. auf Taf. IX: Fall 1 [links] o und h) zeigt neben einem Corpus luteum einige erbsengrosse zystische Follikel bzw. Follikelzysten mit klarem Inhalt; das rechte typische kleinere und grössere Corpora lutea und einige kleinere zystische Follikel bzw. Follikelzysten oder mehr grauliche solide Abschnitte.

Etwa dem mittleren Teil der Grenze gegen den Hoden entsprechend besteht jederseits eine bedeutende Ansammlung kleiner weiter Blutgefässe, die sogar etwas in die Hodensubstanz hinein einschneidet; sie entspricht dem Eierstocksmark (vergl. Taf. IX m). Im übrigen zieht zwischen Hoden und Eierstock als Fortsetzung der Albuginea testis eine feine weissliche Membran die scharfe Grenze; sie ist auch unterhalb des Eierstocksmarks in aller Schärfe vorhanden (vergl. Taf. IX).

Die Durchschnittsfläche des Hodens (in seiner grössten Dicke) entspricht in ihrer bräunlichen Farbe der Norm. Auffällig ist nur der Mangel einer irgendwie nennenswerten Septierung und vor allem das Fehlen eines eigentlichen Hilus bezw. eines Corpus Highmori, obschon der Schnitt genau gegen den Kopf des beiderseits sehr kräftigen Nebenhodens (Taf. XIII, lnh) geführt ist. Dieser setzt etwa gegenüber dem aufgelagerten Eierstock an, bei einem beiderseits sehr lockeren, frei beweglichen Verhältnis des Nebenhodenkopfes zum Hoden. Auf dem Durchschnitt des Nebenhodenkopfes besteht sehr exquisite Läppchenzeichnung. Die Hydatiden fehlen.

Die Länge des in seiner Form durchaus typischen, normal abgeplatteten, ca. 1 cm breiten Nebenhodens beträgt links etwa 14 cm, rechts 16 cm. Er zieht mit gegen den Hoden gerichtetem scharfen Rand längs des Hodens und dann im freien Rand des Ligamentum latum so herum, dass die Übergangsstelle in das Vas deferens jederseits etwa da liegt, wo die Uterushörner in ihr kurzes, verjüngtes Endstück auslaufen (vergl. Taf. XIII). Das Vas deferens (Gd) zieht dann in typischen Schlingelungen zwischen den Blättern der zarten Ligamenta lata parallel zum Uterushorn jederseits gegen den oberen Teil des unpaaren Gebärmutterabschnittes.

Dass es beiderseits auf der Schnittfläche der Scheide zutage tritt, ist schon erwähnt.

Auf die Konvexität des rechten Nebenhodens tritt vom verjüngten Ende des Uterushorns ein 6 cm langer, fast stricknadeldicker Strang mit feinem Lumen über, der als Tube (rt) imponiert (vergl. auch unten die mikroskopische Untersuchung). Er läuft blind ohne Ostium auf der Nebenhodenoberfläche aus und ist der Furche zwischen Hoden und Ovarium unmittelbar benachbart. Links fehlt jede Andeutung eines solchen Stranges.

Mikroskopische Untersuchung.

Härtung in 10prozentigem Formalin; Paraffineinbettung; Färbungen: Hämalaun-Eosin; van Gieson; Orcein nach Unna-Tänzer; Elastinfärbung nach Weigert (mit Karmin- und Parakarmin-Vorfärbung).

1. Es ergeben sich vollkommen normale Verhältnisse, die einer besonderen Beschreibung nicht bedürfen: a) für das Vas deferens im (linken) Ligamentum latum; b) für den Kopf des (linken) Nebenhodens. Die Flimmern der hohen Zylinderzellen sind vielfach erhalten.

2. Ferner zeigt normale Verhältnisse ein querer Schnitt kurz vor dem blinden Endstück des Uterushorns und durch den Anfangsteil des unmittelbar daneben gelegenen Samenleiters; der Schnitt trifft beide Organe.

3. Schnitte einer Scheibe, die quer vom distalen Ende des Genitalschlauches (der Scheide) abgetragen wird, erweisen das makroskopisch jederseits sichtbare Lumen als Querschnitt des Vas deferens. Letzteres ist hier leicht geschlängelt, so dass es auf einzelnen Schnitten zweimal in verschiedener Richtung getroffen erscheint, aber frei von besonderen traubenförmigen Ausstülpungen.

4. Querschnitte durch den rechten Nebenhoden und den feinen, seiner Konvexität aufgelagerten Strang (Taf. XIII, rt) zeigen diesen als Tube.

Die Muskulatur ist gut entwickelt, die Mucosa ganz glatt, von Epithel entblösst. Im Lumen abgestossene Epithelien, Kerne und Zerfallsprodukte.

5. Schnitte durch den Körper des linken Nebenhodens bestätigen auf dieser Seite das vollkommene Fehlen der Tube.

6. Schnitte der rechten Zwitterdrüse. Eine grosse Scheibe, die Eierstock und Hoden enthält, wird nach Formalinhärtung in Paraffin eingebettet. Ausser den genannten Methoden Untersuchung von Gefrierschnitten des Hodens mit Hämalan-Sudanfärbung.

Hoden und Eierstock sind auch im mikroskopischen Präparat scharf getrennt. Die trennende Bindegewebslage ist ziemlich derb und kernarm (siehe Taf. IX, Fig. 1, ao und at).

Das Eierstocksstroma ist nur an wenigen Stellen das typische, derbe, an kleinen Spindelzellen reiche. Meist ist es viel weniger kernreich, stellenweise lockerer, stellenweise straffer, vielfach mit reichen Beimengungen wirrer Geflechte feiner elastischer Fasern versehen. Primärfollikel sind nur sehr vereinzelt aufzufinden. Dagegen sind Wachstums- (Fig. 1, wfei) und Reifestadien der Primordialfollikel in geschlossener Reihe vorhanden, bis zur Bildung grösserer und kleinerer, wiederum ganz typischer Corpora lutea (cl). Eine Beschreibung dieser Formen erübrigt sich, da gegen die Norm auch nicht die leiseste Abweichung besteht. Daneben findet sich zystische Degeneration einzelner eiloser Follikel, einige Male mit kleinen papillären, von den Granulosaellen überzogenen Erhebungen der Theca folliculi.

Besonders bemerkenswert ist, dass eine Anzahl von Entwicklungsstadien der Follikel, auch grosse und grösste Formen, durch die mächtigen Corpora lutea beiseite geschoben, erdrückt, abgeplattet und zum Schwund gebracht werden.

An der schon makroskopisch gekennzeichneten Stelle des Markteils (m auf Taf. IX) besteht eine starke Häufung weiter gewundener Arterien und Venen. Das kernarme Bindegewebsstroma umschliesst hier auch einige atrophische Kanälchen, von einschichtigem niedrigen Zylinderepithel umsäumt (atrophische Markstränge?).

Der Hoden bietet an allen Stellen das nämliche Bild ohne irgendeine Abweichung. Er ist durch überall nur schmale, einfach fibröse, lockere Septen in unregelmässig konturierte, verschieden grosse Läppchen geteilt, wie schon die Lupenvergrösserung deutlich demonstriert, aber ohne eine besonders erkennbare Regelmässigkeit. Ein Corpus Highmori ist auch mikroskopisch nicht ersichtlich. Die einzelnen Lobuli bestehen lediglich aus Zwischenzellen und Hodenkanälchen (zw und hk auf Fig. 1). Bindegewebe ist innerhalb der Läppchen nur in zartester konzentrischer Lage mit platten Kernen als Tunica der Samenkanälchen vorhanden; diese führt allerfeinste elastische Fasern.

Die Zwischenzellen sind gross, von 16,5 „ mittlerem Durchmesser, prononciert polyedrisch, stark mit Eosin gefärbt, frei von Pigment, Kristallen und, wie die Sudanbehandlung der Formalin-Gefrierschnitte beweist, auch von Fett. Sie sind in die Maschen eines Netzes zarter Blutkapillaren eingelagert.

Die Samenkanälchen sind bei 105 „ mittlerem Durchmesser durchweg lumenlos, solide oder doch nur mit Andeutungen eines Lumens versehen, in den verschiedensten Richtungen getroffen, auch dichotomisch verbunden, von polyedrischen Epithelien, die zur Tunica hin öfters mehr längliche pallisadenartige Form aufweisen, als einziger Zellart gefüllt. Die Kerne sind im allgemeinen länglich, oft unregelmässig konturiert, diffus gefärbt.

Diese Epithelien sind bis auf die äussersten Lagen in ausserordentlich reichem Maße scheinbar vakuolisiert, d. h. sie enthalten am Sudanpräparat grosse, oft zellfüllende Fettropfen, die den Kern unter entsprechender Formänderung an die Wand drängen. So können eventuell Siegelringformen entstehen. An den Hämalaun-Eosinpräparaten sieht das Lumen der Samenkanälchen allermeist geradezu siebförmig aus.

Das quantitative Verhältnis von Zwischenzellen und Samenkanälchen innerhalb der Lappchen steht schätzungsweise wie 3:2, eher noch mehr zugunsten der Zwischenzellen; jedenfalls sind diese in kolossalen Mengen vorhanden. Die typische Albuginea (ca. 0,5 mm) an der Oberfläche des Hodens ist ebenso wie die äusserste Stromalage des Ovariums von Keimepithel entblösst.

Fall II.

Für den zweiten Fall steht das ganze äussere und innere Genitale vollständig zur Verfügung. Nur ist die Urethra mit der Harnblase durch den üblichen „Schlächterschnitt“ abgetrennt, und dabei der Genitalschlauch mit durchschnitten, so dass das Präparat in zwei getrennten Teilen vorliegt.

Ausser einer abnormen Bildung der äusseren Scham bestanden nach Bericht irgendwie äusserlich bemerkbare Missbildungen nicht. Der Gesamteindruck war ohne Auffälligkeiten der eines weiblichen Tieres. Auch die inneren Organe waren abgesehen vom Urogenitalapparat ohne Missbildung.

Das äussere Genitale (vergl. Textfigur 1) macht einen verbildeten, aber im ganzen doch weiblichen Eindruck. Die 7 cm langen Labien, schwärzlich grau pigmentiert und mit einigen starren Borsten besetzt, bilden unter Verwachsung in ihrem unteren und mittleren Teil ein relativ bedeutendes, dick vorspringendes Hautpolster (Scrotumrudiment?). Zwischen den nicht verwachsenen Teilen führt oben eine rundliche Öffnung von 7 mm Durchmesser in die Tiefe, und darüber liegt frei ein über 4 cm langer, also im Vergleich

Fig. 1.

zur Norm stark hypertrophischer, klitorisähnlicher Körper, der nach unten und links hakenförmig gekrümmt ist. In seinem oberen Umfang besteht ein 1 cm tiefer Präputialsack.

Der normale kleine kegel- oder zungenförmige Hautanhang am ventralen Winkel der Vulva fehlt.

Von unten her ziehen zwei kaum zentimeterlange Hautfalten jederseits mit freiem Rand von den Labien zur Unterfläche der Klitoris und bilden hier ein ganz kurzes breites Frenulum.

Die genannte Öffnung entspricht dem Eingang in den Sinus urogenitalis, der als ein über 18 cm langer und fast 2 cm dicker zylindrischer Schlauch, von gelblich grauer Schleimhaut ausgekleidet, dorsalwärts zieht. Der lichte Durchmesser beträgt dem Eingang entsprechend 7 mm.

Auf dem Durchschnitt ist er unterhalb der glatten Mucosa von seinem hintersten Abschnitt an rings von einer gelbrötlichen, stark vaskularisierten, weichen, nach aussen durch eine dünne weissliche Kapsel scharf begrenzten Masse — der Pars disseminata prostatae (siehe Taf. XI, Fig. 2) — mantelförmig umgeben, die unmittelbar bis an die Schleimhaut reicht, mit ihr in ganzer Breite zusammenhängt. Sie ist ventral und an den Seiten mächtiger, während sie dorsalwärts an Masse abnimmt. Die grösste Ausbildung erreicht sie ventralwärts mit fast 5 mm Dicke, etwa 10 cm vor der Sinusmündung, dann nimmt sie mündungswärts schnell an Dicke ab, und zwar zuerst ventralwärts, so dass hier 8 cm vor dem Orificium ihre Kontinuität bereits ca. 1 cm unterbrochen ist. 6 cm vor der Sinusmündung ist sie nur noch dorsalwärts als schmaler Saum erhalten und 3 cm vor der Sinusmündung ganz verschwunden. In den mittleren Abschnitten des Sinus legen sich ventralwärts rechts und links seitlich von der Mantelmasse die Muskelzüge des Musculus urethralis an.

Über das Corpus prostatae ist nichts Sicheres auszusagen. Die grossen Vestibulardrüsen fehlen.

Auf den Schlauch des Sinus urogenitalis unmittelbar aufgelagert, von dichten Fettmassen umgeben, ist die Fortsetzung der Klitoris als solider, anscheinend 11 cm langer, drehrunder Strang von 6 mm Durchmesser. In Wirklichkeit ist er noch einige Zentimeter länger, da er auf der Dorsalfäche des Sinusrohres S-förmig verläuft und ausserdem kurz hinter dem äusseren Eingang in den Urogenitalsinus in scharf S-förmiger Windung als knopfförmiger Vorsprung sich von rechts her in den Sinus vorwölbt.

Der hinterste Abschnitt des Klitorisstranges ist oben und seitlich von Muskeln eingefasst. Beiderseits dicht neben ihm laufen etwas vor seiner Mitte die in Form und Aussehen typischen bleistiftdicken runden Mutterbänder in das Fettgewebe der Labien aus.

Die Verbindung des Sinus urogenitalis mit der Scheide und Harnröhre ist, wie schon erwähnt, durchtrennt. Durch die Schnitte des Schlächters ist zugleich vom hintersten Sinusabschnitt ein Stück mit entfernt. Das Lageverhältnis der Scheide zum Sinus urogenitalis (ob unmittelbare Fortsetzung des letzteren oder Eintritt in ihn „von hinten her“ [vergl. Sauerbeck, S. 356 und 343]) und die Beschaffenheit ihrer Einmündung (ob verengt?), ebenso wie die Einmündungsart der Vasa deferentia und der Prostatakörper ist wegen dieser Kontinuitätstrennungen nicht sicher zu bestimmen.

Das Scheidenlumen, von vorn nach hinten abgeplattet, ist weit, misst von rechts nach links 45 mm. Die Vaginalwand ist verdünnt, nur etwa

3 mm dick (gegen 4—5 mm der Norm). An jeder Seite ist auf dem Durchschnitt in den verschiedenen Höhen der Scheidenwand und in symmetrischer Anordnung je ein körniges Körperchen von etwa 2 mm Durchmesser zu sehen („Pseudosamenblasen“) (Taf. XIII, Fall 2, pssa). Die Scheidenschleimhaut ist graurot, rauh. —

Der Uterus mit seinen Hörnern (vergl. Taf. XIII) ist hier in eine Pyometra kolossalsten Umfanges umgewandelt; sie enthielt etwa 15 Liter graugelben, geruchlosen Eiters. Das rechte Horn ist weit über mannskopfgross, das linke kindskopfgross.

Das Endometrium stellt sich als eine typische pyogene Membran dar. Das Perimetrium ist von fädigen und breiteren lamellosen Adhäsionen besetzt, die Ligamenta lata sind grauweisslich verdickt und haben ihre natürliche Transparenz zum grössten Teile eingebüsst. An ihrem unteren Rand sitzen an der Abtrennungsfläche einige haselnussgrosse weiche Lymphdrüsen mit gleichmässig graugelblicher trüber Schnittfläche. Der Sack des linken Uterushornes hat nach Entleerung und faltigem Collaps einen Aussenkontur von 43 cm, der des rechten grösseren (uh) von 82 cm.

Scheide plus unpaarer (ut) Uterusteil messen bis zur Teilungsstelle 20 cm. Die weite Scheide geht in das mächtig erweiterte, etwa doppelt-mannsfautgrosse Cavum uteri allmählich über.

Eine Stenose oder ein Verschluss des erweiterten Genitalschlauches ist am Präparat nicht ersichtlich. Er muss also an der vom Schlichter durchtrennten Stelle, d. h. am untersten Ende der erweiterten und in ihrer Wand verdünnten Scheide gesessen haben. Beide Uterushörner endigen unter mächtiger keulenförmiger Auftreibung blind. Hier schliesst sich unmittelbar die Keimdrüse an.

Sie besteht hier jederseits aus zwei scharf abgesetzten und in Konsistenz und Aussehen verschiedenen Anteilen. Der eine derselben — links 4,5 : 4 : 3 cm; rechts 4 : 3,5 : 2,8 cm — erscheint ohne weiteres als typischer Hoden (h) mit blaugrauer glatter Oberfläche; der andere — links 4 : 2,5 : 1,2 cm, rechts etwas grösser wie der Hoden — als Ovarium (o). Die Hoden sind, abgesehen von ihrer Verkleinerung gegen die Norm, von gewöhnlicher Form, aber gegen die aufliegenden Ovarien abgeplattet; die Oberfläche ist von normaler Albuginea überzogen. Die Ovarien, besonders das rechte, sind reich gebuckelt, teils durch opakgelbe Körper, teils durch vorspringende transparente kleinere und grössere Zysten.

Auf dem gegen den Kopf des kräftigen Nebenhodens geführten Durchschnitt (vergl. Taf. IX, Fall 2 [rechts]) fällt an den Hoden (h) der Mangel der regelmässigen Septierung des bräunlichen Parenchyms und das Fehlen des Corpus Highmori auf. Der linke Eierstock (o) enthält auf dem Schnitt neben einer Reihe bis erbsengrosser Corpora lutea einige über erbsengrosse glattwandige zystische Follikel; der rechte (Taf. IX) ein halbes Dutzend bis bohnengrosser gelber Körper (cl) und an der Peripherie an zwei diametralen Stellen je eine walnussgrosse und eine klein-walnussgrosse Zyste mit glatter, weisslich-grauer Innenfläche und klarem serösen Inhalt (fc).

Das Zwischengewebe an beiden Ovarien ist trüb grauweisslich. Eine besonders reichliche Ansammlung, zumal am rechten Ovarium über der Mitte

der Grenzlinie gegen den Hoden hin, bildet eine ausgesprochene Markschicht (m).

Als scharfe Grenze zwischen Hoden und Eierstock ist zwischen beiden Organen die Albuginea des Hodens fortgesetzt. Auf dem Durchschnitt (Taf. IX) wird die breite kappenartige Umfassung des Hodens durch den Eierstock besonders deutlich.

Der Kopf des Nebenhodens (vergl. Taf. XIII, rnh) liegt wiederum im Verhältnis zum Eierstock am Gegenpol des Hodens, mit diesem äusserst locker verbunden. Der Nebenhoden selbst ist kräftig entwickelt, von normaler, nur etwas platter Form und 1 cm Breite, mit scharfem Rand gegen den Hoden hin. Er zieht beiderseits im freien Rand des Ligamentum latum gegen das verschlossene Ende der Uterushörner, ist rechts 10 cm lang, links auf nur 7 cm deutlich verfolgbar, da er dann hier zwischen derbe grauweissliche bindegewebige Adhäsionsmembranen eingelagert ist. Hydatiden fehlen beiderseits.

Vom Ende des rechten Uterushornes bzw. des grossen Sackes aus ist auf den rechten Nebenhoden, dann im scharfen freien Rand der Epididymis unmittelbar neben dem Ovarium verlaufend, ein 7 cm langer lichtbräunlicher, reichlich stricknaddeldicker Strang fortgesetzt (rt [hys]). Er ist etwas transparent, hat eine sehr dünne Wand und ein relativ weites Lumen. Links ist dieser Strang (lt) weniger deutlich ausgesprochen. Irgendwie an das Fimbrienende erinnernde Bildungen fehlen.

In der Nähe des Endes der Uterushörner liegt auch der Übergang der Nebenhoden in die Samenleiter (Gd), die im Ligamentum latum gegen den unpaaren Uteruskörper verlaufen, auf ihrem Wege dorthin aber sich hier wegen der Verdickung und Trübung der Ligamente schwerer verfolgen lassen.

Mikroskopische Untersuchung.

(Technik wie im vorigen Falle.)

1. Der Querschnitt eines der runden Mutterbänder und
2. der Klitoris ist ohne Abweichung.
3. Eine Scheibe quer zur Längsrichtung des Sinus urogenitalis (nach hinten von seiner Mitte entnommen [vergl. Fig. 2 auf Taf. XI]).

Das Epithel ist mehrschichtig, etwa nach Art des menschlichen Übergangsepithels angeordnet. Unter der Epitheldecke im mässig kernreichen fibrösen Stroma eine verschieden mächtige kleinzellige Infiltration; streckenweise fehlt über dieser auch die Epitheldecke mehr oder weniger, eventuell ganz. Die den Sinusschlauch umlagernde (für das blosse Auge gelbrötliche) Prostatamasse (pdpr), die in diesem Bereich des Sinus (vergl. oben) ihre grösste Entfaltung besitzt, besteht aus ziemlich locker aufgebauten, aber dicht aneinander geschlossenen, verzweigten tubulösen Einzeldrüsen. Die Tubuli führen ein einschichtiges niedrig-kubisches Epithel, das von den Kernen fast ausgefüllt ist; die grösseren Ausführungsgänge haben eine mehrschichtige Epithelauskleidung. Das Drüsenstroma, das mit dem Schleimhautstroma zusammenhängt, ist teils einfaches, ziemlich kernarmes Bindegewebe, teils mehr locker, flüssigkeitsreicher, mit Hämalun leicht bläulich tingiert. Da und dort liegen kleinzellige Infiltrate zwischen den Tubulis.

Überall zwischen den grossen tubulösen Einzeldrüsen, namentlich aber zwischen ihnen und der Schleimhautoberfläche, finden sich weite kavernöse dünnwandige venöse Blutgefässe, oft in starker Häufung (cc).

Auch die hintersten Abschnitte des Sinus wurden untersucht, mit den geschilderten gleichenden Befunden.

Die äussere Umkapselung des Schlauches des Sinus urogenitalis wird durch einen kräftigen Musculus urethralis (mur) gebildet. Nur fehlt an diesem die physiologische dorsale Unterbrechung.

4. Querschnitt der Scheidenwand vor der Einmündung in den Sinus urogenitalis.

Das geschichtete Plattenepithel ist bis auf geringe Reste verloren gegangen. Die Oberfläche der freiliegenden Tunica propria der Schleimhaut ist auf das dichteste von kleinen Rundzellen durchsetzt. An wenigen Stellen senkt sich die Oberfläche in Form einer kurzen, aber weiten bauchigen Tasche ein, die mit einschichtigem Epithel ausgekleidet ist. Dieses Epithel besteht aus niedrig-zylindrischen Elementen, deren dunkel gefärbter Kern die basalen zwei Drittel des Zelleibes einnimmt, während das innere gegen das Lumen gerichtete Drittel gleichmässig trübes, stark mit Eosin gefärbtes Plasma enthält.

Die beiden Körperchen, die auf dem Durchschnitt symmetrisch zu beiden Seiten des Scheidenschlauches gelegen sind (Taf. XIII, pss), haben eine drüsig-traubige Zusammensetzung, links ausgesprochener als rechts. Jedes der makroskopischen Granula besteht aus einer kleinen Anhäufung drüsiger, besonders rechts stärker dilatierter Räume. Jedes Aggregat ist von einem dicken Mantel einigermassen konzentrischen Bindegewebes umgeben, das, zugleich in das Innere dringend, die einzelnen Kavitäten trennt. Sie besitzen eine einschichtige Epithelauskleidung, die aber in ihrer besonderen Natur deswegen an vielen Stellen sich schwer feststellen lässt, weil das Epithel sich hier von der Unterlage losgelöst und im Inneren der Räume zu lockerer Masse zusammengeballt hat. Dabei durchsetzen verschieden grosse unregelmässige Ansammlungen kleiner Rundzellen und Eiterkörperchen das Stroma und mischen sich im Innern der Räume mit den abgeschilferten Epithelien.

5. Linkes Vas deferens.

Das Vas deferens ist durch eine reichliche Ansammlung von Eiterkörperchen und Rundzellen in einer schaumig-vakuolären Grundmasse (Schleim?), die durch Eosin stark gefärbt ist, ausgedehnt. Das Epithel ist erhalten, aber reduziert und abgeflacht, das subepitheliale Stroma der Mucosa verdünnt, von gelapptkernigen eosinophilen Leukozyten durchsetzt. Die übrige Wand ist frei.

6. Wand der Pyometra (Stück von der Konvexität des rechten Hornes).

Das Oberflächenepithel und der Drüsenapparat des Endometriums ist vollständig verloren gegangen. Das Stroma der Schleimhaut ist sehr locker, ödematös, an der Oberfläche von einer granulierenden Lage eingenommen, neben deren strotzenden Kapillaren kleine Extravasationen sichtbar werden. Die Muskelwand ist frei.

7. Querschnitte aus der Kontinuität des rechten Nebenhodens.

Die Struktur des Nebenhodens ist ohne Abweichung von der Norm, der Flimmerbesatz des Epithels sehr gut konserviert.

Der Strang im freien Rand des Nebenhodens stellt sich als muskulöser, von einem einschichtigen Epithel ausgekleideter Schlauch dar. Die niedrig-zylindrischen Zellen sind von den länglichen kräftig gefärbten Kernen fast gefüllt, an der Oberfläche mit einem Cilienbesatz versehen. Es folgt nach aussen eine dünne fibröse Tunica propria von mittlerem Kernreichtum, dann nach aussen zu nicht ganz regelmässig eine Ring- und schliesslich eine Längsmuskellage mit dünner epithelloser Serosa. In der Lichtung hyaline, vakuolär-schaumige Masse mit spärlich verstreuten freien kleinen runden Kernen. Im ganzen also das Bild einer blasig aufgeweiteten Tube (Hydrosalpinx).

8. Querschnitt aus der Kontinuität des linken Nebenhodens.

Linker Nebenhoden wie rechts. Der hier makroskopisch wenig ausgesprochene Strang erweist sich als rein muskulös, ohne Lumen, also als lumenlose Tube“.

9. Rechtsseitige Zwitterdrüse.

Die für die Untersuchung abgetragene Scheibe umfasst das ganze Ovarium und die ganze Breite des angrenzenden Hodens; anderes Hodengewebe wird von der Nähe des linken Nebenhodenkopfes entnommen.

Die Oberfläche des Eierstocks und Hodens ist frei von Keimepithel. Die Albuginea des Hodens ist etwa 350 „ dick und schiebt sich in direkter Fortsetzung als Septum zwischen beide Organe.

Entsprechend dem makroskopischen Verhalten (Taf. IX, Fall 2) wird die Hauptmasse des Eierstocks von den gelben Körpern und von den Zysten eingenommen. Erstere sind vollkommen typisch gebaut; eines der auf den Schnitten zur Untersuchung gelangenden ist zystisch, der homogen geronnene Inhalt hier von verschiedenen zahlreichen Lagen der Luteinzellen umgeben. Die grossen Zysten sind epithellos. Ihre Begrenzung wird von etwas dichterem und stärker gefärbten Bindegewebslagen gebildet.

Das Stroma des Eierstocks ist allerwärts derb-fibrös, kern- und gefässarm, nirgends dem normalen Typus des klein-, dicht- und spindelzelligen Gewebes entsprechend. Primordialfollikel sind nur ganz vereinzelt und wenig deutlich zu finden, des öfteren weitere Entwicklungsstadien, aber meist durch Kompression seitens der benachbarten gelben Körper oder der grossen Zysten deformiert, atrophisch. Durch die noch erhaltene Eizelle sind sie indessen auch bei starker Abplattung und Verzerrung stets leicht festzustellen.

Der makroskopisch charakterisierte Markteil (Taf. IX, m) ist frei von Parenchym, enthält nur grosse weite Blutgefässe. —

Der Hoden ist mikroskopisch durch schmale bindegewebige Septen in Läppchen abgeteilt, allerdings in wenig regelmässiger Art und ohne ersichtliche Bildung eines Corpus Highmori. Das Bindegewebe der Septen ist bald straffer, bald lockerer und enthält oft schmale, kürzere oder längere Züge von Zwischenzellen. Diese sind hier zum Teil kleiner als im ersten Falle, von 11 „ mittlerem Durchmesser, die grösseren Formen gleichfalls polyedrisch, sämtlich frei von Pigment und Kristallen, an den Sudanpräparaten auch von Fett.

Auch hier bestehen die Lobuli wieder lediglich aus Zwischenzellen und Tubulis. Bindegewebe ist nur unmittelbar um die Tubuli in Form einer ausserordentlich dünnen Tunica vorhanden, die mit zartesten elastischen Fasern durchmischt ist. Ihrer Quantität nach halten sich innerhalb der Lappchen Tubuli und Zwischenzellen etwa die Wage. Letztere gleichen denen der Interlobulärsepten. Sie sind von einem zarten Netz von Blutkapillaren durchzogen.

Die bei einem mittleren Durchmesser von 230 μ gleichmässig kalibrierten Tubuli, in den verschiedensten Richtungen getroffen, zeigen mannigfache Windungen, zuweilen auf längerer Strecke in der Ebene des Schnittes. Sie liegen nur selten unter vollkommener Reduktion des Stromas aneinander, fast stets schieben sich zwischen sie mehr oder minder reichliche Lagen von Zwischenzellen. Ganz gleichmässig und in allen Teilen des Hodens sind sie von einer einfachen Epithelzellenlage mittlerer Höhe als einziger Zellart ausgekleidet, und ganz gleichmässig sind diese Epithelzellen an den Balsampräparaten so stark und unregelmässig vakuolisiert, dass die ganze Epithel-lage ohne deutliche gegenseitige Begrenzung der Zellindividuen vollkommen durchsichtig schaumig erscheint. Die Sudanfärbung zeigt in den den Vakuolen entsprechenden Zellabschnitten zwar auch ziemlich reichlich kleinere und grössere Fetttropfen, aber zugleich auch eine feinkörnige Masse, die nicht die Sudanreaktion gibt. Die Kerne von mittlerem Chromatinreichtum, rundlich oder länglich, finden sich an die Zellperipherie, überwiegend an die Zellbasis, gedrängt und so allermeist unmittelbar der Tunica der Kanälchen aufgelagert, dabei dann vielfach ganz abgeplattet.

Im Lumen der Kanälchen liegt nicht selten feinfädige, vakuoläre, mit Hämalaun blaufarbte Masse, die auch mit dem Epithel direkt verbunden sein kann.

Fall 3.

Der äussere Eindruck des Tieres war vom weiblichen nicht irgendwie auffällig abweichend.

Das Genitale ist in zwei Stücken entfernt. Das eine Stück umfasst den Uterus nebst den Tuben und die Keimdrüsen (Taf. XIII, Fall 3); das zweite Stück umfasst das äussere Genitale nebst dem daran ansetzenden Stück des Urogenitalsinus. Wiederum sind beide durch den Schlächterschnitt, der Urethra und Blase entfernt hat, an der Stelle der Urethraleinmündung voneinander getrennt. Ausserdem ist auch die Scheide nebst dem distalsten Stück des Sinus vom Uterus abgeschnitten und entfernt. So lässt sich über das Einmündungsverhältnis der Scheide in den Urogenitalsinus (ob von hinten her?) und die Art der Mündungsstelle (verengt?) auch in diesem Falle, wie in Fall 2, nichts Sicheres aussagen; desgleichen nicht über die Mündung der Vasa deferentia und über das Corpus prostatae.

Uterushals und -körper bis zur Trennung des Körpers in die Hörner (ut) sind 16 cm lang. Das von vorn nach hinten abgeplattete Organ misst von rechts nach links fast 5 cm, besitzt ein deutlich aufgeweitetes Cavum. Die Hörner (uh) sind beiderseits vollkommen symmetrisch, bis zum Übergang in die Tuben je 45 cm lang, sehr stark entwickelt, mächtig gewulstet, nur

wenig abgeplattet, von 3 bis über 4 cm Dicke. Ihr Lumen ist etwas aufgeweitet, führt schleimigen Inhalt; die Schleimhaut ist graurötlich, 7—8 mm dick, sehr weich.

Jedes der Uterushörner geht über in eine links (lt [hys]) 12 und rechts (rt) 11 cm weit verfolgbare Tube, die ohne Tubentrichter jederseits blind an der Keimdrüse endigt.

Letztere ist nun jederseits von auffälligster Beschaffenheit. Rechts findet sich ein 6 : 4,5 : 4,25 cm messender ziemlich derber Hoden (h), von glatter Albuginea überzogen, und diesem aufsitzend, unter furchenartiger Absetzung, ein 5,6 : 3,3 : 3 cm messender, dem Eierstock gleichender Körper (o). Dabei sind Hoden und Eierstock so verbunden, dass sie in der Richtung ihrer grössten Durchmesser aneinander gelagert sind. Die Oberfläche des Eierstocks ist glatt, nur ein wenig flach gebuckelt.

Auf dem Durchschnitt im grössten Durchmesser ergibt sich (vergl. Fall 3 [rechts] auf Taf. IX): das hellbräunliche Hodengewebe (h) ist durch unregelmässig sich verzweigende Bindegewebsstränge in verschieden grosse Läppchen geteilt, die sich ohne besondere Regelmässigkeit um ein eben angedeutetes Corpus Highmori (cH) gruppieren. Der Eierstock (o) enthält auf der nämlichen Schnittfläche etwa ein halbes Dutzend gelber Körper (cl) und dabei einige überbohngrosse, zum Teil aneinander gerückte zystische Follikel (fl) mit blasser, glatter Innenfläche und zum Teil gallertig geronnenem Inhalt. Auch an den gelben Körpern ist gelegentlich das Zentrum zystisch, mit gallertiger, klar geronnener Masse gefüllt. Mit einem zentralzystischen Corpus luteum wölbt sich der Eierstock etwas in die Hodensubstanz hinein. Eine besondere Markzone ist nicht abgesetzt.

Die Grenzlinie zwischen Eierstock und Hoden ist im übrigen eine vollkommen scharfe, so zwar, dass stellenweise in der grauweisslichen Grenzlinie noch die Albuginea des Hodens einerseits, die feste grauweissliche Oberflächenschicht des Eierstocks andererseits sichtbar ist (vergl. Taf. IX).

Die vorher erwähnte rechte Tube (Taf. XIII, rt) zieht als stopfnadeldicker Strang zum Ovarium. Sie liegt im freien Rand des Ligamentum latum, aber neben ihr, ihr aufs dichteste angeschlossen, zieht mit ihr parallel der kräftige Nebenhoden (rnH), und zwar grenzt sie unmittelbar an seinen scharfen Rand.

Der rechte Nebenhoden (rnH) entspringt vom Hoden etwa dem Ovarium gegenüber mit freibeweglichem Kopf und zieht in 14 cm Länge und 18 mm Körperbreite (mit der Tube) im freien Rand des Ligamentum latum mit seinem Schwanz bis vor die Stelle, wo das Uterushorn in die Tube übergeht, dann weiter als Vas deferens (Gd) durch die Substanz des Ligamentum latum bis zur Einsenkung in das Corpus uteri.

Beide Ligamenta lata sind ebenso wie der seröse Oberflächenbezug der Uterushörner und des unpaaren Uterusteiles diffus verdickt, nicht sehr durchsichtig, jedoch genügend transparent, um das Vas deferens verfolgen zu lassen.

Die Verhältnisse der anderen Seite liegen im ganzen analog. Auch hier ist Hoden und Eierstock zu einer Drüse vereinigt in gleicher Situation vorhanden. Hodenmaße: 5,5 : 3,7 : 4 cm; Eierstocksmaße: 4,2 : 3,2 : 4 cm. Auch hier sind die beiden Organe durch eine Einschnürung gegeneinander

abgesetzt und in der Richtung der grössten Durchmesser aneinander gelagert. Nur ist der Eierstocksteil hier nicht solide, sondern zystisch transparent, mit einem kleineren, von aussen betrachtet, anscheinend ebenfalls zystischen Anteil.

Auf dem Durchschnitt ist der Hoden mehr unregelmässig, ohne Andeutung eines Mediastinum testis, in Lüppchen geteilt.

Der grössere zystische Teil des Eierstocks erweist sich als ein einfacher, mit klarer Flüssigkeit gefüllter Hohlraum, in den von der dem Hoden zugekehrten Basis her ein gelber Körper hineinragt. Die Zystenwand ist derb fibrös, an der dem Hoden zugekehrten Seite bis 1 mm dick, die Innenfläche glatt. Der Kontur der Zyste baucht sich ein wenig in die Masse des Hodens ein. Die scharfe Trennungsschicht zwischen Hoden und Eierstock wird durch die Albuginea testis einerseits, andererseits durch die derbfibröse Zystenwand selbst gebildet.

Der übrige, kleinere Teil des Eierstocks besteht aus einer flachen, etwa haselnussgrossen Zyste mit klarem Inhalt und einigen unbedeutenderen bis erbsengrossen Hohlräumen, so dass auf dieser Seite keine eigentliche solide Eierstocksmasse vorhanden ist. Kein Markteil.

Nebenhoden und Tube sind links in gleicher Anordnung wie auf der anderen Seite vorhanden. Nur ist der Nebenhoden hier noch länger als rechts, im ganzen fast 19 cm lang, wobei er alsbald hinter dem Ansatz seines Kopfes V-förmig abgelenkt ist (vergl. Taf. XIII).

Die Tube (lt [hys]), im freien Rand des breiten Mutterbandes, ist hier leicht aufgetrieben, transparent, an ihrem Anfang fast federkiel dick, dann alsbald nur mehr stricknadeldick, aber an dem keulenförmig geschlossenen Ende wieder etwas stärker anschwellend. Sie läuft auch hier wieder mit dem Nebenhoden eng verbunden, liegt auch hier an seinem scharfen Rand und zieht zum Eierstock, ihm eine kurze Strecke anliegend und in der Furche zwischen Hoden und Ovarium blind endigend.

Das Vas deferens verhält sich links wie das rechtsseitige.

Auf beiden Uterushörnern sind ziemlich zahlreiche feine Adhäsionsreste zu sehen.

Hydatiden sind beiderseits nicht vorhanden.

Dem unteren Teil der rechten seitlichen Cervixwand aufgelagert erscheint in 3,5 cm Länge, fast 2 cm Breite und wenigen Millimetern Dicke ein platter Körper (Taf. XIII, rpssa), auf dem Durchschnitt von etwas körniger Beschaffenheit (vergl. unten mikroskopische Untersuchung). Links fehlt eine ähnliche Bildung. Der rechtsseitige Körper liegt genau in der Längsrichtung des Vas deferens. —

An dem zweiten Teil des Genitale ist zunächst ein 10 cm langes Stück des Sinus urogenitalis erhalten, als ein im ganzen zylindrisches Rohr, das unter der glatten Mucosa von einer graugelblichen, ventral 5 mm dicken, dorsal und seitlich etwas dünneren weichen Schicht umkleidet ist und als Mantel um diese eine zirkuläre Schicht Muskulatur besitzt. Der Durchmesser des Rohres ist hinten an der Schnittfläche 18 mm, verjüngt sich aber distalwärts; das Lumen hat im Mittel etwa 5 mm Durchmesser. Drüsenkörner, die den grossen Vorhofsdrüsen entsprechen könnten, sind makroskopisch nicht vorhanden. Dem distalen Ende des Sinus urogenitalis dorsal aufgelagert

findet sich die ausserordentlich mächtig entwickelte und kräftig geschlängelte Klitoris mit starken Schwellkörpern. Sie hat bis zu ihrem Ende eine Länge, soweit die Windungen eine exakte Massbestimmung zulassen, von etwa 17 cm!

Die den Schamlippen entsprechenden Hautfalten fehlen vollkommen. Dagegen ist der Vulvateil der Klitoris in einen über 5 cm langen, zeigefingerdicken drehrunden penisähnlichen Körper verwandelt, der frei vorragt und an der unteren Fläche seines abgerundeten Endes die Mündung des Sinus urogenitalis trägt.

Man kann sich nach den Durchschnitten durch den Körper (Textfig. 2) seine Entstehung etwa so vorstellen, dass unter Verlängerung und Verdickung der Klitoris selbst das mächtig hypertrophierende Präputium (pr) und die relativ atrophischen Labien (zl) sich rings um die Klitoris (cl) zusammenschlossen, wobei Präputium und Klitoris wenigstens zum Teil verwachsen (a), d. h. der Präputialsack partiell obliterierte. So wurde eine mit „kutaner Schleimhaut“ ausgekleidete Fortsetzung oder Verlängerung des Sinus urogenitalis (sug) entlang der Unterfläche der Klitoris gebildet, und die äussere Mündung dieses fortgesetzten Sinus urogenitalis entspricht gleichsam dem Introitus einer verkümmerten Schamspalte.

Fig. 2.

Die Schleimhaut des Sinus urogenitalis dieses ganzen Teiles ist im Vergleich zu der erstgenannten Abschnitte dünn, kaum millimeterdick, von rötlicher Beschaffenheit.

Im ganzen also eine starke Hypertrophie der Klitoris und ihres Präputiums mit einer an die Bildung des Penis anklingenden ventralen Abschlussbildung, die eine entsprechende Verlängerung des Sinus urogenitalis bewirkt. Allerdings fehlt dabei jede Spur des für die Gestaltung des normalen Penis wesentlichen Corpus cavernosum urethrae.

Mikroskopische Untersuchung.

(Technik wie vorher.)

1. Rechtes und linkes Uterushorn. Das Endometrium ist ausserordentlich ödematös, nur in den dem Myometrium benachbarten Lagen etwas weniger von Flüssigkeit durchtränkt. Dabei sind die kleinen Blutgefässe, Arterien, Kapillaren und Venen vielfach erweitert und zum Teil strotzend gefüllt.

2. Der im Verfolg des rechten Samenleiters der seitlichen rechten Cervixwand aufgelagerte Körper ist drüsigen Baues. Die einzelnen Körner entsprechen lobulären Aggregaten reich verzweigter Tubuli, die von einem mässig hohen Epithel in einfacher Schicht mit basal stehenden rundlichen Kernen ausgekleidet sind. Im Lumen der Tubuli feinkörnige Gerinnungen und mehr oder minder zahlreiche Lymphocyten. Das Stroma zwischen den Läppchen wird von einem lockeren Bindegewebe mittleren Kernreichtums geliefert, das sich innerhalb der Läppchen um die Drüsenbildungen mehr konzentrisch und von dichter Beschaffenheit anordnet.

In dem korrespondierenden Abschnitt der linken Cervixwand ist auch mikroskopisch keine Andeutung dieser Formationen enthalten.

3. Schnitt in der Querrichtung der Pars pelvina urethrae. Die Innenanskleidung liefert ein Übergangsepithel. Die Drüsen der Prostata-mantelmasse besitzen hier im Vergleich zu Fall II eine noch dichtere und reichlichere Verzweigung. Wiederum ist die Prostata ventral stärker entwickelt als dorsal und auf beiden Seiten. In den grösseren Ausführungsgängen mehrschichtiges Epithel. Das wenig kernreiche Stroma zwischen den Drüsen, besonders aber die Schicht zwischen Drüsen und Schleimhautoberfläche führt zum Teil dicht gehäufte, weite und strotzend gefüllte, venöse Bluträume. Der Urethramuskel schliesst auch hier dorsal ohne Unterbrechung ab.

4. Rechter Nebenhodenkopf normal, Flimmern deutlich.

5. Rechter Nebenhodenkörper plus Tube. Ersterer ist normal, die Epithelien haben deutliche Flimmern.

Die Tube hat eine gut ausgesprochene wesentlich zirkuläre Muskulatur. Ihre Schleimhautoberfläche ist ganz glatt, faltenlos. Das einschichtige Epithel ist in continuo erhalten, ziemlich niedrig, der Zelleib vom Kern gefüllt.

6. Linker Nebenhodenkopf wie rechts.

7. Linker Nebenhodenkörper plus Tube. Corpus epididymidis normal. Tube aufgeweitet mit stark abgeplattetem Epithel, sonst wie rechts.

8. Rechtes und linkes Vas deferens ohne Abweichung.

9. Rechtsseitige Zwitterdrüse. Aus dem Ovarium und dem Hoden wird je eine Scheibe entnommen, und zwar wird vom Ovarium ein möglichst solider Abschnitt gewählt.

a) Ovarium. Das Keimepithel der Oberfläche fehlt. Das Stroma ist nirgends typisch dicht- und spindelzellig, sondern locker, faserreich, von höchstens mittlerem Kerngehalt. Primordialfollikel zu finden gelingt auf keinem der untersuchten Schnitte. Dagegen sind Wachstums- und Reifungsstadien der Eifollikel, wenn auch nur in relativ geringer Zahl, vorhanden. Die Corpora lutea sind auch mikroskopisch typisch.

b) Die Albuginea des Hodens (ca. 300 μ dick) entbehrt gleichfalls des Keimepithels. Die fibrösen Septen zwischen den Hodenläppchen sind relativ dünn, meist von Zwischenzellen erfüllt, die auch in grosser Masse innerhalb der Lobuli zu finden sind. Ihr Verhältnis zu den Hodenkanälchen ist etwa 1:1; sie messen im Mittel 19 μ , sind polyedrisch geformt, frei von Fett (Sudanpräparate!), von Pigment oder Kristallen in ihrem Zytoplasma. Ihre Kerne sind oft exzentrisch gelagert, rundlich, ziemlich hell, ohne deutliches Kernkörperchen, ihre Anhäufungen von einem Netz zarter Blutkapillaren durchzogen.

Die Samenkanälchen, bei einem mittleren Durchmesser von 150 μ in allen möglichen Richtungen getroffen, sind in typischer Form gewunden. Die äusserst zarte Tunica propria wird von dünnen spindligen Zellen in ein- oder zweifacher Lage, mit mehr oder weniger deutlich sichtbarer feinsten fibrös-elastischer Beimengung gebildet.

Ihr Epithel ist allerwärts einschichtig, aber dabei so stark von grossblasigen durchsichtigen Vakuolen durchsetzt, dass schaumige Masse das ganze Samenkanälchen vollkommen erfüllt und zentrale Lumina überhaupt

nicht vorhanden sind. Die Vakuolen sind, wie die Sudanfärbung zeigt, durch grosse Fettropfen erfüllt. Die ziemlich hellen, einen Nukleolus führenden rundlichen Epithelkerne liegen bei nur gelegentlicher und unerheblicher Abplattung in einfacher dichter Reihe unmittelbar auf der Tunica propria. Hier beginnt zugleich sofort die schaumige Auflösung des Zelleibes, so dass getrennte Epithelindividuen nicht existieren. Gelegentlich, aber nicht häufig, sind auch Kerne oder Kernreste in das Lumen hinein vorgeschoben und in den Vakuolen oder den Vakuolensepten zu finden.

Andersartige Zellelemente als die beschriebenen sind in den Samenkanälchen nicht vorhanden.

10. Linksseitige Zwitterdrüse.

a) Ovarium. Hier wird die grosse Zyste untersucht. Das Keimepithel fehlt. Die Zystenwand besteht aus parallel-faserigem, ziemlich kernarmen Bindegewebe ohne Innenauskleidung; sie enthält keine sonstigen eingeschlossenen epithelialen Elemente.

b) Hoden. Der Befund stimmt mit dem des anderseitigen vollkommen überein.

Fall IV.

Der äussere Eindruck des Tieres war ein weiblicher, der der äusseren Genitalien ein entschieden männlicher. Ob ein Scrotum vorhanden gewesen ist, ist nicht angegeben bezw. aus dem Präparat nicht mehr ersichtlich. Anscheinend ist früher die rechtsseitige Kastration ausgeführt worden.

Harnröhre und -blase sind hier mit dem Genitale des Tieres im Zusammenhang belassen; das ganze Genitale wird mir in einem Stück zur Untersuchung eingeliefert (vergl. Taf. XIII, Fall 4); nur das rechte Uterushorn liegt gesondert bei.

Der Harnblasenkörper (hb) ist entleert, 12 cm lang; es folgt ein einer weiblichen Harnröhre gleichender über 5 cm langer Teil (wur), an den sich dann erst in 13 cm Länge die typische Pars pelvina einer männlichen Harnröhre anschliesst (ppl = bst mit ur in Textfig. 3).

Ein deutlicher Prostatakörper ist auf dem Dorsum des (männlichen) Harnröhrenanfanges mit blossen Auge nicht sicher festzustellen (wird mikroskopisch nicht verfolgt). Dagegen ist die Pars disseminata der Prostata gut ausgebildet, ventral (5 mm) stärker als dorsal und seitlich entwickelt, sonst von gewöhnlichem Verhalten, vom Musculus urethralis umgeben. Der Durchmesser der kräftigen Pars pelvina urethrae beträgt 2 cm.

Der Bulbus urethrae (bl) ist ausgesprochen. Von den bulbourethralen Drüsen ist die linke vorhanden (lCdr), von etwa 3 cm Länge und 12 mm Breite; die rechte ist — wohl bei der Herausnahme der Organe durch den Schlächter — abgeschnitten.

Fig. 3.

Das Penisstück der Harnröhre (pst) ist 30 cm lang, vergleichsweise ebenso kräftig wie das eines kastrierten Ebers. Eine starke Abweichung gegenüber dem letzteren zeigt aber der Präputialteil. Die Vorhaut (pr) ist ausserordentlich hypertrophisch, fast elephantiasisch und zwar besonders dorsal und seitlich, anscheinend zum grossen Teil mit dem Penis (a und psp) verwachsen. Der Präputialbeutel (Nabelbeutel) fehlt.

An diese sicherlich männlichen Genitalwege schliesst sich nun proximalwärts vom Beginn der Pars pelvina urethrae (vergl. Taf. XIII) Scheide, Uterushals und Uteruskörper (ut) an, und zwar in sehr ausgesprochener Art so, dass die Scheide von der als gestrecktes Rohr mit der Harnblase eine natürliche Einheit bildenden Urethra (wur + ppl) nach hinten abzweigt. Die Vaginalmündung ist sehr eng.

Im distalen Teil der Scheide, beiderseits der seitlichen Vorderwand eng aufliegend, „Pseudosamenblasen“ (pssa), etwas über 5 cm lang, 1 cm breit und 3—4 mm dick, also etwa von der Grösse der Samenblasen kastrierter Eber. Sie reichen mit ihrem unteren Pol bis an die Einmündung der Vagina in die Pars pelvina urethrae. (Auf eine mikroskopische Darstellung ihrer Mündungsverhältnisse wird im Interesse der Erhaltung des Präparates verzichtet.)

Scheide plus Uterushals und -körper sind im ganzen 25 cm lang. Das Lumen scheint normal. Die grösste Breite der abgeplatteten Teile beträgt 2,5 cm. Das rechte Uterushorn (ruh) ist abgeschnitten, das linke (luh) in 36 cm Länge vorhanden, kräftig, abgeplattet, von 25 mm grösster Breite. Das sich verjüngende Ende dieses Uterushornes läuft blind aus. Es fehlt für das blosse Auge jede Andeutung einer Tube (vergl. aber mikroskopische Untersuchung).

Im breiten Mutterband an der physiologischen Stelle des Eierstocks liegt wiederum eine exquisite Zwitterdrüse.

Sie besteht aus zwei annähernd gleich grossen, durch eine Schnürfurche voneinander abgegrenzten Segmenten, bei im ganzen 8 cm grösster Breite, 5 cm grösster Länge und über 3 cm Dicke. Dabei überwiegt der Längendurchmesser des Ovariums (o) mit 50 mm den des Hodens (h) mit 42 mm. Der zum Uterushorn gekehrte Teil entspricht dem Eierstock, der andere dem Hoden.

Der Hoden ist von glatter Albuginea überzogen, der Eierstock aus kleinerbsen- bis doppeltbohngrossen, blasig-transparenten Zystchen traubig zusammengesetzt. Die meist sehr schmalen Septen zwischen den Zystchen stellen die einzigen soliden Anteile der Drüse dar.

Auf dem Durchschnitt (vergl. Fall IV [links] auf Taf. IX) besteht das Hodenparenchym (h) aus einer grossen Zahl unregelmässiger Läppchen. Ein Corpus Highmori fehlt vollkommen. Die einzelnen Zystchen des Eierstocks (o) sind mit klarer (nach der Härtung in 10 proz. Formalin gallertig geronnener) Masse gefüllt und mit glatter Innenfläche versehen.

Ein Markteil (m) ist angedeutet in Form eines ca. 2 mm langen und ca. 1 cm breiten derben, soliden Streifens.

Die Grenze der beiden Organe ist eine absolut scharfe. Die Albuginea testis überzieht auch die zum Eierstock gewendete Hodenoberfläche. Dabei

sitzt der (vergl. oben) in der Länge etwas überwiegende Eierstock dem Hoden kappenartig auf. Nur gegen den Ansatz am Mesovarium hin schiebt sich zwischen beide ein dichtes, auf dem Durchschnitt über 1 cm breites Konvolut von Blutgefäßen.

Der Nebenhoden (Taf. XIII, lnh), der mit frei beweglichem Kopf am Hoden etwa gegenüber dem Ovarium (keine Hydatide!) ansitzt, ist 6—7 cm lang, aber ganz ausserordentlich (über 4 cm!) breit, dabei entsprechend platt. Das Vas deferens (Gd) läuft geschlängelt in über 6 cm Länge im freien Rand des Ligamentum latum und biegt an dem Ende des Uterushorns zwischen die ziemlich transparenten Blätter des Ligamentum latum um. Hier ist es leicht bis zum Eintritt in das Corpus uteri verfolgbar.

Das rechte, abgetrennt vorliegende Uterushorn ist 10 cm lang, in breite Verwachsungsmembranen eingehüllt.

Tube und Keimdrüse der rechten Seite fehlen. Der Befund entspricht der früher auf der rechten Seite ausgeführten Kastration.

Mikroskopische Untersuchung.

(Technik wie vorher.)

1. Endometrium. Kleine Blutgefäße des Endometrium vielfach strotzend gefüllt. Im Stroma häufig ödematöse Auflockerung, Auseinanderdrängung von Zellen und Fibrillen durch homogen geronnene Flüssigkeit. Nur unmittelbar unter der Oberfläche ist meist an der physiologischen Dichtzelligkeit des Stromas nichts geändert.

2. Linker Nebenhoden ohne Abweichung.

3. Linkes Vas deferens im freien Rand des Ligamentum latum. Neben den an sich der Norm entsprechenden Windungen des Samenleiters findet sich an den senkrecht zum freien Rand des Ligamentum latum geführten Schnitten unmittelbar unter der Serosa ein quer getroffenes Tubenrohr. Es war (vergl. oben) mit dem blossen Auge nicht festzustellen. Das Lumen erscheint sternförmig, die Epithelauskleidung wie in der Norm; das Schleimhautstroma und die Muskelhaut sind sehr kräftig ausgesprochen.

An einer zweiten nahe dem Übergang in den Nebenhoden entnommenen Stelle fehlt es. Die Stelle der genauen Endigung des Tubenrohres kann, da sonst das ganze Vas deferens im Mesometriumrand in Serie hätte geschnitten werden müssen, nicht genauer angegeben werden. Sicher ist es, wie die entnommenen Stücke beweisen, kürzer als 5 cm.

4. Linkes Vas deferens im Ligamentum latum ohne Abweichung.

5. Scheide und aufgelagerte linke Pseudosamenblase. Die Scheidenschleimhaut und Muskelhaut ist ohne besonderen Befund.

Die drüsigen, reich verzweigten Räume der Pseudosamenblase sind von einem einschichtigen, ziemlich hohen, pallisadenförmigen Zylinderepithel ausgekleidet. Die Kerne stehen basal, der nach dem Lumen gekehrte Abschnitt des Zytoplasmas ist (durch Hämalaun) bläulich gefärbt. Im Zentrum der Räume dichte Anhäufungen von zelligem Detritus. An manchen Stellen sind auch die auskleidenden Epithelien in den Zerfall einbezogen.

Das Stroma liefert fibröses Bindegewebe von mittlerem Zell- und Blutgefässreichtum.

6. Pars pelvina urethrae. Das mikroskopische Bild des Querschnittes gleicht vollkommen dem oben beschriebenen Querschnitt des Sinus urogenitalis in Fall III. Im besonderen fehlen auch die weiten, strotzend gefüllten venösen Bluträume — namentlich in der Schicht zwischen der Pars disseminata prostatae und der Oberfläche — nicht.

Der Musculus urethralis ist auch hier dorsalwärts nicht unterbrochen und sogar dorsal von besonderer Mächtigkeit.

7. Zwitterdrüse. Es wird aus ihrer Kontinuität ein Hoden und Eierstock umfassendes Stück ausgeschnitten.

a) Ovarium. Das Keimepithel fehlt. Das Eierstocksstroma ist teilweise, namentlich an der Oberfläche, ziemlich reich an kleinen Spindelzellen und so einigermaßen dem physiologischen entsprechend. Im übrigen ist es weit mehr fibrös, von mittlerem Kernreichtum.

Neben den makroskopischen Zysten, die bei einer vielschichtigen Epithelauskleidung sich sämtlich als zystisch gewordene Graaf'sche Follikel erweisen, finden sich wachsende und Graaf'sche Follikel mit typischen Ovula in grosser Zahl, oft Dutzende auf einem Schnitt. Dagegen werden Primordialfollikel und Corpora lutea in dem untersuchten Stück vermisst.

b) Hoden. Das Keimepithel ist verloren gegangen, die Albuginea ist zart, 150 μ dick.

Die Bindegewebssepten zwischen den unregelmässigen Läppchen des Hodenparenchyms sind einfach fibrös, stellenweise sogar auffallend kernarm. Einlagerungen kleinerer Stränge und Inseln von Zwischenzellen in ihnen sind spärlich. Innerhalb der Läppchen sind letztere ziemlich reich entwickelt. In ihrer Masse erreichen sie schätzungsweise nicht ganz die Masse der Hodenkanälchen. Sie sind von polyedrischer Form, der rundliche, ziemlich dunkle Kern liegt meist exzentrisch. Ihr mittlerer Durchmesser ist 15 μ ; der Zelleib zeigt weder Pigment noch Kristalle oder (Sudanpräparate!) Fett. Ihre Anhäufungen sind von zarten Blutkapillaren durchzogen.

Die Samenkanälchen sind von typischer geknäuelter Form und besitzen einen mittleren Durchmesser von 180 μ .

Die Tunica propria besteht aus einer einfachen oder doppelten Lage dunkler spindliger Kerne mit zuweilen sichtbarer Beigabe feiner fibröser und elastischer Fasern. Die zellige Auskleidung ist nur insofern deutlich, als sich unmittelbar auf der Tunica propria eine einfache Lage oft platter und dann in ihrer Verlaufsrichtung der Tunica paralleler Kerne ausbreitet. Sie sind hell, mehr bläschenförmig, die Nukleolen wenig deutlich. Ihre Lage ist aber nicht immer kontinuierlich, und jedenfalls ist nirgends ein deutlicher Plasmaleib oder gar eine Schicht abgegrenzter Zellindividuen vorhanden. Vielmehr ist das ganze Lumen der Kanälchen von einem grossblasigen Schaum erfüllt. Ferner lagern in den Septen der runden Vakuolen zahlreiche rundliche bläschenförmige Kerne, oder Kerne liegen innerhalb der Vakuolen und sind unter entsprechender Abplattung entweder gegen ihre Peripherie geschoben oder in die Peripherie eingefügt, so dass der Eindruck der Siegelringzellen entsteht. So wird es auch schwer, mit Sicherheit festzustellen, ob hier eine ursprüngliche Ein- oder Mehrschichtigkeit des Epithels im Hoden-

kanälchen vorliegt. Wie die Sudanfärbung lehrt, entsprechen den Vakuolen grosse eingelagerte Fetttropfen.

Keine Geschlechtszellen in irgendwelchen Stadien.

Fall V.

Das Präparat stammt von einem ca. 8 Monate alten, in seinem Äusseren vom weiblichen Typus nicht abweichenden Schwein. Das innere und äussere Genitale ist hier zusammenhängend entfernt (Taf. XIII, Fall 5 zeigt den inneren Teil des Genitale). Die Blase nebst Harnröhre ist abgeschnitten. Die Ansatzstelle der Harnröhre (um) klafft als weites Loch. Der Gesamteindruck des inneren Genitale ist zunächst ein zweifellos weiblicher: es besteht ein kräftig ausgebildeter zweihörniger Uterus (ut) mit gut entwickeltem Körper und Hals nebst stark entwickelter Scheide (va). Nur mündet diese mit einer auffallend engen Öffnung in einen langen und dicken Sinus urogenitalis (sug). Ob dieser, wie beim Schwein die Regel, die unmittelbare Fortsetzung der Scheide bildet oder die der Harnröhre, ist, da letztere abgetrennt ist, nicht sicher zu sagen.

Corpus plus Cervix uteri plus Scheide sind 32 cm lang, der Sinus urogenitalis bis zu seiner Ausmündung 14 cm. Das Corpus uteri und die Scheide, beide von vorn nach hinten abgeplattet, messen fast 35 mm von rechts nach links.

Zu beiden Seiten der Scheide, auf ihrer Vorderwand, liegen zwei etwa 12 cm lange, bis (rechts) 2 cm breite und über 1 cm dicke körniggelappte ziemlich derbe Körper (pssa), die sich nach unten hin verjüngen und sich in die Wand des Anfanges des Sinus urogenitalis hinein einsenken ihre bezw. die Mündungsverhältnisse der Vasa deferentia werden nicht mikroskopisch untersucht). Ihr Durchschnitt zeigt dicht gestellte, mit zähem Schleim gefüllte bis über linsengrosse, etwas eckige Höhlen.

Der Durchschnitt von Scheide und unpaarem Uterusteil zeigt keine Abweichung.

Ein makroskopisches Corpus prostatae fehlt (keine mikroskopische Untersuchung). Der Sinus urogenitalis misst auf dem Durchschnitt 2,5 cm von rechts nach links, 2 cm von vorn nach hinten, ist also wie Vagina und Uterus von vorn nach hinten abgeplattet. Er besitzt ein enges Lumen, das von einer graugelblichen, über 1 cm dicken und sehr reich vaskularisierten weichen Schicht unter der glatten Schleimhaut gleichmässig umkleidet ist. Die Aussenschicht bildet eine gleichmässige Muskellage.

Die beiden Hörner des Uterus sind kräftig ausgebildet, aber von ungleicher Entwicklung. Das linke (lh) ist bei weitem stärker, länger sowohl wie dicker, als das rechte (rh). Es ist bis zu seinem verjüngten Ende, an seinem äusseren Umfange gemessen, fast 40 cm lang und, bei gleicher Abplattung von vorn nach hinten wie der unpaare Uterusteil, bis 22 mm dick.

Das rechte Horn ist 23 cm lang und bis 14 mm dick. Seine Windungen sind weniger ergiebig als die linksseitigen.

Dieselben quantitativen Verschiedenheiten zeigen Schleimhaut und Muskelhaut auf dem Durchschnitt der Hörner. Der Oberflächenbezug ist beiderseits diffus verdickt und durch zahlreiche feine Adhäsionsreste rauh

Das linke kräftigere Horn des Uterus läuft in einen nur kurzen, 6 cm langen und etwas dünnen Eileiter (t) aus, dessen an sich ziemlich weites Infundibulum verschlossen erscheint. Die daneben gelegene linke Keimdrüse ist ein an sich typisch aussehendes Ovarium (o). Die Bursa ovarii ist ziemlich gut ausgesprochen.

Der Eierstock ist klein, 2,5 : 2,5 : 1 cm lang. An der Oberfläche ist er flach und ziemlich grob gebuckelt. Der Durchschnitt wird zum grössten Teil von vollkommen typischen gelben Körpern besetzt. Daneben finden sich einige erbsengrosse, glattwandige, mit klarer oder blutiger Flüssigkeit gefüllte Follikel. Auf der medialen Seite erscheint die Kapsel (Albuginea) auf dem Durchschnitt zu einem 1—2 mm breiten Streifen verdickt, in dem dunkle Quer- und Längsschnitte feinsten Blutgefässe sichtbar werden.

Das Ligamentum latum ist diffus verdickt, namentlich gegen das Uterushorn hin, und lässt vom Parovarium oder Gartnerischen Gang nichts durchscheinen. Medialwärts vom Ovarium steht ein kurzer Rest des linken Ligamentum teres (lr).

Auf der rechten Seite ist von einer Tube oder einem Tubenostium nichts vorhanden. Das verjüngte Uterushorn endet hier ziemlich spitz.

Hier wird die Keimdrüse repräsentiert durch einen mit Nebenhoden und Vas deferens ausgestatteten Hoden (h). Er liegt im Ligamentum latum genau da, wo auf der anderen Seite das Ovarium sich befindet. Der Hoden misst 5,6 : 4,7 : 4,5 cm, ist von glatter Albuginea überzogen und fällt auf dem Durchschnitt durch den Mangel eines Corpus Highmori und einer regelmässigen Septierung auf. Unregelmässig ziehende Bindegewebsstränge dünnen Kalibers grenzen grössere und kleinere ganz unregelmässige Lappchen ab. Der Nebenhoden (nh) ist nicht auffällig hypertrophisch, sitzt locker, frei beweglich am distalen Hodenpol, liegt in 8 cm Länge mit scharfem Rand dem Hoden an, zieht auf weitere 8 cm im freien Rand des Mesometrium und geht dann unter mächtiger Aufknäuelung zu einem über walnussgrossen Konvolut (w) in das Vas deferens über. Dieser Wulst liegt genau kaudalwärts von dem zugespitzten blinden Ende des Uterushorns. Lateral neben dem Wulst setzt das in 3,5 cm Länge erhaltene Gubernaculum testis (gH) an, und von ersterem aus zieht das Vas deferens (Gd) in etwa 13—15 mm Abstand von der mesometrischen Kante des Uterushorns, in dem auch hier verdickten Mesometrium leicht verfolgbar, bis zu seiner Einsenkung in den Uterus.

Hydatiden sind weder links noch rechts nachweisbar. —

Das äussere Genitale (betrifft des Sinus urogenitalis vergl. oben) zeigt am Präparat Teile der Labien und am ventralen Winkel der Vulva einen stark ausgebildeten kegelförmigen Hautanhang. Die Klitoris ist, wie die Präparation nach hinten ergibt, über 8 cm lang, geschlängelt und tritt mit einer fast zentimeterlangen Spitze aus einem kleinen, in ihrem dorsalen Umfang ausgebildeten Präputialsack heraus. Sie krümmt sich dabei mit dem freien Ende nach rechts und ist hier durch eine kleine Hautbrücke mit der Aussenfläche des Präputialsackes verbunden.

Ventralwärts von der Klitoris liegt der sehr enge Eingang in den Sinus urogenitalis. Die präparatorische Darstellung grosser Vorhofsdrüsen gelingt nicht.

Mikroskopische Untersuchung.

(Technik wie vorher.)

1. Ein Unterschied in der mikroskopischen Ausbildung des rechten männlichen und des linken weiblichen Uterushorns, insbesondere des Endometriums, ist nicht erweislich. Das Endometrium ist hier wie dort mässig injiziert, das Stroma ödematös.

2. Der rechtsseitige Hoden (vergl. Taf. IX, Fig. 3). Das Keimepithel fehlt. Die Tunica albuginea ist $80\ \mu$ dick. Die fibrösen Septen der unregelmässigen Lobuli sind fast total von Zwischenzellen erfüllt, so dass die Scheidewände nahezu völlig verdeckt sind. Auch innerhalb der Läppchen ist die Masse der Zwischenzellen (zw) eine ausserordentliche, die der Hodenkanälchen (hk) (etwa im Verhältnis 3:2) überwiegende.

Sie sind im Mittel $19\ \mu$ gross, polyedrisch, reichlich von zarten Blutkapillaren (ble) durchzogen, im übrigen von der nämlichen Beschaffenheit wie in den vorbeschriebenen Fällen.

Die Hodenkanälchen, in den verschiedensten Richtungen getroffen, besitzen einen mittleren Durchmesser von $145\ \mu$ und eine Tunica propria (mpr) aus einer einfachen Lage zarter Spindelzellen, mit ganz unerheblichem faserigen elastisch-fibrösen Anteil.

Es folgt unmittelbar dieser Tunica aufgelagert eine einfache Schicht rundlicher oder etwas eckiger, mehr bläschenförmiger Kerne, von mittlerem Chromatinreichtum und ohne deutliche Kernkörperchen. Das (durch Hämalaun) granuliche, etwas trübe Protoplasma erfährt alsbald eine gross-vakuoläre Auflösung, so dass grossblasiger Schaum das ganze Lumen der Kanälchen (vergl. Taf. IX, Fig. 3) vollkommen erfüllt. Eine gegenseitige Abgrenzung von Einzelzellen ist nicht möglich.

Die Kerne auf der Tunica propria werden bei der Vakuolenbildung zuweilen abgeplattet. Sie liegen dann innerhalb der Vakuole an die Peripherie gepresst oder in die Peripherie unter Bildung einer Siegelringzellform eingeschaltet.

Eine andere Zellart ist in den Kanälchen nicht vorhanden. Überhaupt sind auch mehr zentral in der Schaummasse gelegene Kerne selten. Wie die Sudanfärbung zeigt, entsprechen die Vakuolen grossen Fetttropfen. In einem der schaumgefüllten Kanälchen zentral ein grosses, konzentrisch geschichtetes Kalkkörperchen.

Auf keinem der zahlreichen untersuchten Schnitte dieser Seite ist etwas von ovariellern Gewebe zu finden.

3. Der linksseitige Eierstock. Die untersuchte Scheibe stammt aus der ganzen Dicke des Organs.

Das Keimepithel der Oberfläche ist teilweise erhalten. Das Stroma ist einfach fibrös, ziemlich zellarm, aber relativ gut vaskularisiert. In sämtlichen Schnitten des untersuchten Stückes (das übrige Ovarium ist am makroskopischen Präparat konserviert) finden sich wesentlich typische Corpora lutea, keine sicheren Primordialfollikel oder Reifungsstadien. Nur gelegentlich erscheint ein Graafscher blutgefüllter Follikel.

Dagegen bietet sich (Taf. XI, Fig. 4 und Taf. X, Fig. 5) in der leicht fibrös verdickten medialen Oberflächenzone des Organs — in dem parallel zur äusseren Oberfläche streichenden fibrösen Bindegewebe (str) zwischen Keim-epithel (ke) einerseits und Peripherie der vorgeschobenen gelben Körper (cl) andererseits — ein höchst auffallender und überraschender Befund.

Hier sind kleine Gruppen von Kanälchen oder auch isolierte Kanälchen (vhk und vhk') eingesprengt, die in ihrem Aufbau vollkommen identisch sind mit den Hodenkanälchen der rechtsseitigen Keimdrüse. Sie besitzen die nämliche zarte spindelzellige Tunica propria (fibroelastica), die nämliche Auskleidung mit einschichtigem Epithel, die an der Tunica lagernden bläschenförmigen, gelegentlich abgeplatteten Kerne, die schaumige Auflösung des durch Hämalaun graulich getönten Zytoplasmas und die (meist vollkommene) vakuoläre Füllung des Lumens. Das grösste der gefundenen Kanälchen (Taf. X, Fig. 5, vhk) liegt, wie auch andere, in der Längsrichtung der Bindegewebszüge (str), ist deutlich gewunden und auf weiter Strecke verfolgbar. Es misst auf dem Durchschnitt im Mittel 140 μ .

Daneben sind auch kleinere und kleinste Kanälchen dieser Art zu treffen, gelegentlich ganz isoliert, und des öfteren kleine, noch solide Epithelstränge mit durchsichtigen Epithelien. Indem diese mit wachsendem Durchmesser des Stranges sich alsbald vakuolisieren und wandständig ordnen, führen die Bildungen zu den als Hodenkanälchen eindeutig charakterisierten erstgenannten Formen über.

Die typischen Hodenkanälchenformen sind stets von ebenso typischen Zwischenzellen (zw) in kleineren und grösseren Zügen begleitet. Wo letztere in der Nachbarschaft von Corpus luteum-Gewebe liegen, ist leicht ersichtlich, dass hier die männlichen Zwischenzellen die volle Grösse der Luteinzellen nicht ganz erreichen und sich zumeist bei weitem stärker mit Eosin färben.

Bemerkenswerterweise erstrecken sich diese verschiedenen Formationen (Kanälchen und Zwischenzellen) auch in die fibrösen Septen der gelben Körper zentripetal weit in das Ovarium hinein, so dass hier eine wirkliche Durchmischung der in sich wohlbegrenzten gelben Körper einerseits und der testikulären Gewebe andererseits erfolgt.

4. Die linke Tube zeigt, abgesehen von ihrem geringeren Durchmesser gegen die Norm, normalen Bau, kein begleitendes Rudiment eines Nebenhodens oder Vas deferens.

5. Nebenhoden und

6. Vas deferens der rechten Seite sind ohne Abweichung. Eine Tube ist auch mikroskopisch rechterseits nicht erweislich.

7. Querschnitt durch den Sinus urogenitalis. Die Ausbreitung der Pars disseminata prostatae um den Kanal ist hier ventral, seitlich und dorsal ohne quantitativen Unterschied, die Prostatamasse sehr bedeutend. Der Bau entspricht im übrigen, auch betreffs der weiten venösen Bluträume, den vorigen Fällen.

Der Musculus urethralis umfasst auch hier das Dorsum des Sinus ohne Unterbrechung.

8. Die Pseudosamenblasen (rechts und links) zeigen, entsprechend dem makroskopischen Befund, eine reichliche Schleimproduktion und Schleimanhäufung. Das Epithel ist zylindrisch mit basal gestellten Kernen und klarem Zelleib, bei stärkerer Aufweitung der Drüsenräume entsprechend niedriger.

b) Die anatomisch untersuchten sicheren Fälle des Hermaphroditismus verus beim Menschen.

I. Fall W. Simon (60).

20-jähriges Individuum mit ausgesprochenem Mannesbewusstsein. Schon frühzeitig starke Entwicklung der Brüste, links stärker als rechts, die seit 3 Jahren bisweilen vorübergehend anschwellen; zugleich — später nicht mehr in zeitlicher Gebundenheit — mehrtägige unbedeutende Blutungen aus dem Genitale. Auch in der Klinik wurde eine eintägige geringe Blutung aus dem Genitale, bei leichten Kreuzschmerzen, beobachtet. Seit einigen Jahren dann und wann, meist unter geschlechtlicher Erregung, deren Mittelpunkt stets ein weibliches Wesen ist, und unter Erektion des Geschlechtsgliedes Abgang von weisslich-schleimiger Flüssigkeit. Spermien wurden in dem gelegentlich untersuchten Schleim, der vor dem Genitale lag, nicht nachgewiesen.

Das Individuum sucht die Klinik auf in dem sehnlichen Wunsche, auch seinen Körper so umgestaltet zu sehen, dass jeder ihn als männlichen anerkennen müsse.

Körpergrösse 158 cm. Die Formen sind gut gerundet. Ganz geringer Bartanflug auf der Oberlippe. Kehlkopf wenig prominent. Basaler Umfang des Brustkorbes überragt den Beckenumfang nicht. Becken breit und flach. Schamhaargrenze etwas oberhalb des Schambeinrandes horizontal abscheidend. Sehr deutliche Michaelissche Raute.

An der Symphyse ist ein penisartiger Körper (4 cm lang, 6,5 cm Umfang) angeheftet, mit Präputium und mit etwa haselnussgrosser Glans (vergl. l. c. Taf. II). Nach unten setzen sich zwei wulstige, stark behaarte Hautfalten an, die hinten durch eine breite Kommissur vereinigt sind; zwischen ihnen ein Orificium, entweder die äussere Mündung der weiblichen Urethra oder eines Canalis urogenitalis. Eine Entscheidung kann nicht getroffen werden. (Andeutung kleiner Labien?)

Vor der Öffnung des rechten Leistenkanals ein über kirschgrosser, etwas länglicher reponierbarer Körper mit glatter Oberfläche und von solider mittelfester Konsistenz. Uterus (per rectum in Narkose) nicht fühlbar. Links im Becken über einem walzenförmigen bleistifticken ein etwa kastaniengrosser, leicht höckeriger Körper, dessen Konsistenz etwa der eines Ovariums bzw. Hodens entspricht.

Im ganzen sind im Bau des Körpers männliche und weibliche Typen miteinander innig gemischt, wenn auch das weibliche Element bis zu einem gewissen Grade vorherrscht. Am Genitale selbst scheint der männliche Typus zu überwiegen.

Das Individuum willigt in die zwecks Geschlechtsbestimmung vorgeschlagene Probeexzision aus dem vor dem rechten Leistenkanal gelegenen

als Keimdrüse angesprochenen Körper ein. Bei der Operation (l. c. Taf. II) erweist sich der gefühlte Körper als etwas über kirschgross, eiförmig, von der Konsistenz etwa eines normalen Hodens, bei glatter spiegelnder Oberfläche und hellgelbbraunlicher Farbe. An dem einen Pol setzt sich ohne eine erkennbare Organgrenze ein etwa erbsengrosser, mehr weisser und derberer Knoten an. Ausserdem findet sich eine 7 cm lange Tube mit Ostium, von etwa Zweistreichholz-Dicke, befestigt an einer dünnen, fledermausflügelartigen Peritoneallamelle (*Ligamentum latum*). In dieser fast unmittelbar unter dem distalen Tubenende ein Parovarium, etwa ein Drittel so lang als die Tube. Die Keimdrüse ist an der Peritoneallamelle fixiert. Ausserdem in letzterer ein Vas deferens und 1 cm von der Keimdrüse entfernt und ganz getrennt von ihr eine etwa halberbsengrosse, höckerige, gelblichweisse Epididymis.

Von der Keimdrüse werden aus beiden Teilen zwei kleine Keile exzidiert. Auf dem Schnitt Hodenteil gelblich, zart gekörnt, der nebengelegene Knoten (Eierstockteil) derb, grauweiss, streifig.

Tube und Parovarium wird abgetragen; auch aus dem neben dem Vas deferens gelegenen Körper (Epididymis) wird ein kleines Stück ausgeschnitten. Parovarium (l. c. Taf. I, Fig. 5) und Epididymis (Fig. 6) werden durch mikroskopische Untersuchung identifiziert. Für die Keimdrüse ergibt sich:

1. Eierstocksteil: stark ausgebildete Albuginea mit zum Teil erhaltenem Keimepithel. Ovarialrindenstroma mit Primordialfollikeln ohne weitere Entwicklungsstadien (Fig. 1 und 2).

2. Hodenteil (Fig. 3 und 4): lockeres, sehr zartes Bindegewebsstroma mit Zwischenzellen, meist in kleinen Häufchen und Zügen (*Reinkesche Kristalle im Zwischenzellplasma*).

Die Bilder der Hodenkanälchen gleichen vollkommen den von *Félicet* und *Branca* für den Leistenhoden Erwachsener aufgestellten Typen a und b, den „*cellules de Sertoli à protoplasma commun*“ und den „*formations colonnaires ou coniques implantées perpendiculairement ou obliquement sur la paroi propre*“.

Die Wand der Hodenkanälchen ist teils die typische fibrös-elastische Membran, meist aber zeigt diese hyaline Degeneration, so dass das Lumen stellenweise fast völlig erdrückt ist. Dem Epithel fehlen „alle Zeichen der Spermatogenese“.

Das ganze Bild „entspricht einer Hodenpartie im Ruhestadium, zugleich mit schweren degenerativen Veränderungen“.

Doch stammt das exzidierte Stück aus der dem Hilus entgegengesetzt gelegenen Konvexität der Drüse. Da die von dem Rete testis entfernten Partien im Leistenhoden der Regel nach in ihrer Entwicklung am meisten zurückgeblieben sind und am frühesten regressive Veränderungen erleiden (*Finotti*), so möchte *Simon* in seinem Befunde einen sicheren Beweis für die Funktionslosigkeit des Hodens nicht sehen.

II. Fall O. Uffreduzzi (69 a, b und c).

Uffreduzzi machte seine Beobachtung, die von ihm erschöpfend in mehreren Publikationen behandelt ist, an einem 7jährigen, als Mädchen er-

zogenen Kind, bei dem im Spiel mit seinen Altersgenossen mehr knabenhafte Neigungen aufgefallen waren. Bei dem Kind bestanden doppelseitige äussere (schräge) Leistenhernien, die auf einer Seite zweimal zu Inkarzerationserscheinungen geführt hatten. Die Eltern wünschten eine Radikaloperation dieser Seite und gleichzeitig eine Feststellung des ihnen fraglichen Geschlechts. So kam das Kind in die Hände des Arztes.

Der allgemeine äussere Eindruck, besonders auch der des Gesichts des Kindes, war ein weiblicher. Das Haupthaar ist lang, der Fettansatz reichlich, und die Formen sind so gerundet, dass die Muskelkonturen allerwärts verdeckt sind. Brüste nicht entwickelt, Becken ohne Besonderheit.

Das äussere Genitale zeigt ein 3—4 cm langes penisartiges undurchbohrtes Gebilde, etwas darunter die auffallend weite Mündung der Urethra — also im ganzen einen Zustand von Hypospadie; ferner zwei nicht verwachsene Scrotalhälften, in denen jederseits ein kleines hartes, bewegliches und empfindliches Körperchen gefühlt wurde; letztere werden als Leistenhoden angesprochen. Die Untersuchung (auch per rectum) ergab Fehlen von Vagina, Uterus, Prostata. So würde ein Pseudohermaphroditismus masculinus, eine Hypospadie mit Kryptorchismus angenommen. Bei der Herniotomie (auf welcher Seite ist nicht angegeben) fand sich im Bruchsack Hoden, Nebenhoden und Vas deferens, in einen Samenstrang übergehend, der durch den Leistenkanal zieht. Am oberen Pol des Hodens ein weisslicher Körper, ähnlich einer Verdickung der Albuginea, mit einer an den Nebenhoden getöteten Zyste von 1,5 mm Durchmesser. Alle diese Gebilde wurden exstirpiert.

Der Hoden besitzt eine typische Albuginea und ein Stroma aus kernarmem Bindegewebe; er ist in typischer Weise lobuliert (Läppchen von 0,2—0,8 mm Durchmesser). Die Auskleidung der mit fibrös-elastischer Membran versehenen Hodenkanälchen (bei einem Durchmesser von 35—50 μ) bilden plasmatisch verschmolzene Sertolizellen (ein „follikuläres Synzytium“) bei radiärer Stellung der länglichovalen, gut gefärbten, in einfacher Lage vorhandenen Kerne. Archispermiozyten fehlen. Die Kerne mit je einem Nukleolus lagern nahe der Membrana propria. Die plasmatische Substanz ist gekörnt. Ein Lumen in den Kanälchen fehlt.

Gut ausgebildetes, obschon etwas rudimentäres Rete testis in dem an die Epididymis grenzenden Teil. Das relativ reichliche kernarme Bindegewebsstroma ist frei von Zwischenzellen. Die Drüse ist „vollkommen identisch mit einem kindlichen Hoden von leicht zurückgebliebener Entwicklung in der Periode der zellulären Unifikation (follikuläres Synzytium)“ bzw. „mit einem kindlichen retinierten Hoden“.

Gegen den oberen Hodenpol wird das Bindegewebe allmählich dichter („poco a poco più duro“), kernreicher und enthält typische Primordialfollikel (von 35—40 μ Durchmesser) mit Primordialeiern und Follikelepithel, das an einigen Stellen unter kubischer Umformung Stadien einer Weiterentwicklung bietet.

Die nach dem Nebenhoden gelegene Zyste ist ein typischer Graafscher Follikel mit Eizelle (vergl. 69 c, Fig. 3 und 4).

Neben der Epididymis, durch lockeres Bindegewebe dieser angeschlossen, liegt eine Tube mit typischem Infundibulum und einer Fimbria ovarica, die

zum Eierstock zieht. Das distale Tubenende endet blind, etwas unterhalb des Schwanzes der Epididymis, und zwar nicht mehr mit dem Nebenhoden verbunden, sondern frei flottierend im Leistenkanal. Ein Parovarium fehlt.

III. Fall J. F. Gudernatsch (23).

Eine 40jährige Köchin sucht das Krankenhaus auf, um einen Tumor der rechten Leistengegend operieren zu lassen. Im linken Leistenkanal ein ähnlicher, etwas kleinerer Tumor, der nicht entfernt wurde.

Äusseres Genitale weiblich, aber ausserordentlich starke Klitoris-hypertrophie. Uterus nicht fühlbar. Um die Urethra ein prostataähnlicher Körper, doch will Verfasser sich mangels mikroskopischer Untersuchung nicht bestimmt entscheiden. Behaarung des Körpers von weiblichem Typus. Becken geräumig. Unentwickelte Brüste. Kehlkopf äusserlich von männlichem Typus. Die Patientin fühlte sich als Weib und hatte stets als solches gegolten. Menstruation war nie vorhanden gewesen. Geschlechtsverkehr hatte niemals stattgefunden; die Libido fehlte.

Die exstirpierte Geschwulst präsentierte sich als Testikel mit Epididymis, von den Maßen 6:5:5 cm.

(Die Präparate wurden in New-York von James Ewing, in Prag von Prof. A. Kohn und von den Mitgliedern des VIII. Internationalen Zoologenkongresses in Graz begutachtet und als Ovotestis anerkannt; vergl. oben S. 134.)

1. Hodenteil. Sehr starke Tunica albuginea. Das Hodengewebe zeigt an den meisten Stellen (nicht überall) die „typische hyaline“ Degeneration der Samenkanälchenmembranen des Säugetierhodens bei Retentio inguinalis. Der mittlere Durchmesser der Tubuli contorti ist weit geringer als normal. Das auskleidende Epithel besteht aus einer einfachen Schicht von Sertolizellen. Keine Spermatogenese bzw. Zelltypen dieser Reihe (there are no indications of spermatogonia, spermatids or spermatozoa). Die Sertolizellen zeigen verschiedene Stadien der Degeneration, entsprechend den Befunden Finottis.

Durch zentralwärts vordrängende hyaline Degeneration der inneren Schichten der Tunica propria der Samenkanälchen erfolgt oft unter völligem Zugrundegehen der Epithelien vollkommene Obliteration. Die noch erhaltenen bindegewebigen Teile der Membrana propria führen gleichzeitig elastische Fasern.

Es besteht eine ausserordentlich starke Vermehrung der Zwischenzellen, so dass die Samenkanälchen stellenweise auseinandergedrängt werden. Dabei erscheinen die Zwischenzellen, zwischen denen Bindegewebsfasern nur sehr spärlich zu sehen sind, von „normaler Beschaffenheit“. Reinkesche Kristalle enthalten sie nicht. Die Zwischenzellen liegen entweder in kleinen unregelmässigen Gruppen oder schmalen Strängen, oft aber in bedeutenden dichten Haufen. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um die in kryptorchischen Hoden gewöhnliche Vermehrung.

Rete testis, Vasa efferentia, Nebenhoden und Vas deferens sind vorhanden. Im Lumen der Nebenhodenkanälchen zelliger Detritus, feingranulierte Massen und zahlreiche Konkreme. Das Epithel des Nebenhodenkopfes ist stellenweise stark degeneriert. Es ist zum Teil gleichmässig, niedrig kubisch,

zum Teil von gewöhnlicher Anordnung, d. h. von normalem Wechsel der kubischen und zylindrischen Zellen. Für die Kanälchen mit flacher Zellanskleidung betont der Verfasser die Ähnlichkeit mit der Parovarialstruktur. Die Zusammensetzung des Ductus epididymidis ist normal. Das Vas deferens besitzt eine sehr dicke Muskulatur.

2. Eierstocksteil. Der weibliche Anteil der Keimdrüse ist repräsentiert durch ein rudimentäres Ovarium in der Form eines kleinen 3:2:2 mm messenden Knotens. Es liegt (vergl. Taf. I, Fig. 1) in einer kleinen zystischen Kavität der Tunica, zwischen dem Hoden und Nebenhodenkopf. Das Stroma des Körperchens ist das typische spindelzellige des Eierstocks, eine Rinden- und Markschicht lassen sich unterscheiden. In der Rindenschicht ist das Bindegewebe dicht und zellreich und führt nur unbedeutende Blutgefässe. Die Zellen liegen in Strängen oder Wirbeln. In der Marksubstanz ist das Bindegewebe weniger zellreich und führt grosse geschlingelte Blutgefässe. An der Oberfläche eine einfache Schicht kubischen bis zylindrischen Epithels (vergl. l. c. Fig. 5, 6 und 7 auf Taf. III). In dieser Zellschicht sind einzelne Elemente grösser, die Kerne bedeutender und rundlich, chromatinärmer als die der Nachbarzellen. Sehr wahrscheinlich sind diese Elemente Primordialeier, obschon eine bestimmte histologische Diagnose sich nicht stellen lässt (a definit diagnosis cannot be made. However the decision that the body is ovarian in structure is sufficiently warranted by the typical stroma with its surface epithelium). Ebenso fehlt vollständig die Bildung von Primordialfollikeln oder weiteren Entwicklungsstadien. Verfasser verweist auf die Analogie dieses Befundes mit der Tatsache (l. c., S. 272 u.), dass bei allen Fällen von Hermaphroditismus (wahrem oder falschem) der epitheliale Teil des Eierstocks eine Unterentwicklung zeigt.

IV. Fall Ernst Salén (57).

Über den Fall von Ernst Salén (Stockholm) ist zum erstenmal auf der zweiten Tagung der Deutschen Pathologischen Gesellschaft in München 1899 (durch Ernst Ziegler) berichtet worden. Ich gebe diesen Bericht hier zunächst wörtlich wieder:

Augusta Persdotter, 43 Jahre, unverheiratet. Monatliche Regel seit dem 17. Jahre. Passive Coitusversuche schmerzhaft; keine aktiven.

Weiblicher Habitus. Klitoris penisähnlich, beinahe 5 cm lang, mit haselnussgrosser Glans. Labia majora und minora normal entwickelt. In das Vestibulum münden die Urethra und die Vagina aus, die letztere aus einem feinen Gange, in welchen eine Sonde 8 cm weit hineingeführt werden kann, bestehend. Im November 1898 Laparotomie: Exstirpation eines zystischen mannskopfgrossen kurzgestielten Myoms plus Kastration.

Der Uterus war etwas vergrössert, mit mehreren kleinen Myomen besetzt. Beiderseits fand man die Tube und die Ligamente normal und an dem gewöhnlichen Platze des Ovariums eine Geschlechtsdrüse. Von der Klinik den 5. Januar 1899 gesund entlassen.

Die Untersuchung der Geschlechtsdrüsen ergab linkerseits ein ziemlich kleines höckeriges Ovarium mit Graafschen Follikeln und Eiern; rechterseits eine Zwitterdrüse, deren eine Hälfte Eierstocks-

gewebe, deren andere Hodengewebe zeigte. Der Ovarialteil ist grobhöckerig, von gelber Farbe und derber Konsistenz und zeigt bei der mikroskopischen Untersuchung Graafsche Follikel und ganz typische Eizellen in einem spindelzellreichen Stroma eingebettet.

Der Hodenteil ist eben, von ziemlich weicher Konsistenz, mit weissglänzender *Tunica albuginea*. Das Parenchym ist locker, von braungrauer Farbe und von weissen Bindegewebssepta durchzogen; mikroskopisch zeigt es *Tubuli seminiferi*, die in einem lockeren, von grösseren und kleineren Anhäufungen fett- und pigmentreicher Zwischenzellen durchsetzten Bindegewebsstroma liegen. Die *Tubuli* sind stark geschlängelt, von beinahe gleicher Weite. Ihre *Membranae propriae* sind grösstenteils verdickt, sehr reich an konzentrisch angeordneten elastischen Fasern. Das Epithel besteht aus Follikelzellen und Sertolischen Zellen. Nirgends Spermatogonien oder andere Samenzellen.

Die Struktur zeigt im ganzen eine auffallende Ähnlichkeit mit derjenigen des ektopischen Hodens nach der Pubertät.“

Diese Mitteilung — die erste eines sicheren Falles von *H. A. verus* beim Menschen — ist sehr kurz gehalten und durch Abbildungen nicht unterstützt, Mängel, die, wenn auch dem Fall die Beweiskraft allerwärts zugestanden wird, doch gelegentlich nicht ohne Berechtigung hervorgehoben werden (vergl. z. B. Sauerbeck, S. 340). Saléns auch mir gegenüber vor etwa 11 Jahren geäusserte Absicht, eine genaue Darstellung des Falles zu geben, wurde durch seinen allzu frühen Tod zunichte. Seine Präparate, Photographien und seine mit grosser Kunst und Sorgfalt angefertigten Zeichnungen übernahm aus der Hand von Dr. Saléns Gattin, Frau Dr. Signe Salén, jetzt Frauenärztin in Stockholm, Saléns Freund, Herr Prof. Ulrich Quensel, Direktor des Pathologischen Instituts der Universität Upsala.

Ich hatte noch bei Lebzeiten Saléns von ihm selbst eine Anzahl von Schnitten, mit denen das Wesentliche seiner Mitteilung zu belegen war, erhalten und diese der Sammlung der Landauschen Klinik einverleibt. Diese Schnitte sind gelegentlich auch bereits von mir selbst und später von Herrn Theodor Landau (40) in der Berliner Medizinischen Gesellschaft vorgelegt worden.

Mit der Zeit hatte dieses kostbare Material nun allerdings von seinem Demonstrationswert so gut wie alles verloren, weil die mit Thionin oder nach van Gieson gefärbten Schnitte vollständig ausgeblasst waren. Ich musste daher an eine Umfärbung bzw. Nachfärbung der Schnitte (mit Hämalan, Hämalan-Eosin, van Gieson, Karmin und Weigerts Elasticafärbung) gehen, die erfreulicherweise vollkommen gelang.

Zugleich stiess ich aber bei der Nachuntersuchung dieser neugefärbten Schnitte auf Befunde, von denen Salén nach dem eben zitierten Text seiner damaligen Mitteilung ausdrücklich bemerkt, dass er sie nicht getroffen habe. Sie bedeuteten für den Fall eine gewichtige Ergänzung, für die ganze Frage des *H. A. verus* eine grundsätzliche Erweiterung.

Es musste unter diesen Umständen von ganz besonderem Werte sein, auch das übrige Material des Falles nach diesen weiteren Gesichtspunkten

zu untersuchen, und so begrüßte ich mit grosser Freude das rückhaltlose und liebenswürdige Entgegenkommen von Frau Dr. Salén und Herrn Kollegen Quensel, die mir das gesamte anatomische Material des Falles, alle Schnitte sowohl wie die noch vorhandenen Zelloidinblöcke, nebst sämtlichen Salén'schen Zeichnungen und (zum Teil stereoskopischen) Photographien, auch den Negativen, in die Hände legten. Beiden zolle ich für ihre ganz besondere Freundlichkeit auch an dieser Stelle herzlichen Dank.

Die von Ernst Salén angefertigten Zeichnungen sind auf Taf. X (Fig. 8 und 9), Taf. XI (Fig. 11) und Taf. XII (Fig. 6, 7 und 10) reproduziert. Die Textfig. 4 und 5 sind Zeichnungen, die nach den damaligen photographischen Aufnahmen Saléns jetzt hergestellt sind; Fig. 12 auf Taf. XI ist unter Anlehnung an eine Originalzeichnung Saléns angefertigt.

Die Schnitte, die bis auf wenige gleichfalls mehr oder minder ausgefärbt waren, habe ich wiederum nach- bzw. umgefärbt. Die Härtung des Materials war in Formalin geschehen, die Einbettung in Zelloidin bzw. Paraffin erfolgt. Kleine Stückchen der Hodensubstanz waren auch in Flemmingscher Flüssigkeit fixiert. Von Färbungen wurden von mir angewendet: Hämalun, Hämalun-Eosin, Hämalun-van Gieson, Eisenhämatoxylin nach Heidenhain und Hansen, Eisenhämatoxylin-van Gieson nach Weigert, Weigerts Elastikafärbung mit Karmingegenfärbung, Orcein nach Unna-Tänzer.

Salén nennt den Habitus der Augusta P. weiblich. Die Brüste sind in der Tat gut entwickelt. Doch spielt (Fig. 4) der grobe Schnitt des Gesichts und der gegenüber der weiblichen sanften Rundung mehr eckige Kontur der Schultern und oberen Extremitäten sowie die grobe Form der Hände entschieden in das Männliche hinüber.

Vom Genitale liegen mir drei photographische Original-Aufnahmen vor. Ich habe zur Reproduktion Fig. 5 gewählt, weil die Hypertrophie der Clitoris und ihrer Glans, andererseits die Norm der grossen und kleinen Labien, darauf ausgezeichnet zum Ausdruck kommt. Weiblich ist auch die gut sichtbare horizontale Begrenzung der Behaarung des Mons veneris nach oben hin. Am After treten Hämorrhoidalknoten hervor.

Fig. 6 auf Taf. XII zeigt die durch die Kastration gewonnenen Geschlechtsdrüsen im frischen Zustand gemäss der Salén'schen Originalzeichnung.

Die grösste Länge der rechtsseitigen Zwitterdrüse (rot) ist mit 4, die grösste Breite mit 2,5, die geringste Breite mit 2, die grösste Dicke mit 1, die kleinste mit 0,5 cm angegeben. Die beiden auf Fig. 6, Taf. XII, oben gelegenen Figuren stellen die Zwitterdrüse mit gleichgrossen Eierstocks- und Hodenteil, von

den beiden Seiten betrachtet, dar. An der rechts gelegenen ist auch die Abtragungsstelle vom Ligamentum latum deutlich.

Die groben Höcker des gelbgefärbten (in der Konsistenz derben) Eierstocksteils treten (Fig. 6, oben rechts) deutlich hervor. Auch die weissglänzende Albuginea des (ziemlich weichen) glatten Hodenteils ist auf dieser Figur deutlich.

Auf der Gegenfläche des Ovotestis (Fig. 6, oben links) besitzt der Ovarialteil kleinere Höcker, die Albuginea ungleichmässige

Fig. 4.

Dicke, so dass grauweissliche Streifungen auf der grösstenteils mehr braungrauen Oberfläche entstanden sind.

Auf dem etwas über die Mittellinie hinausgeführten Durchschnitt (Taf. XI, Fig. 6, drot) ist der Ovarialteil gegen den Hodenteil scharf abgesetzt. Ersterer erscheint wiederum ausgesprochen gelb, letzterer braungrau (locker).

Im Eierstocksteil liegen drei zystische Follikel und ein Corpus candicans. Eine besondere Markzone ist nicht vorhanden.

Der Hodenteil besitzt für das blosse Auge, wie eben erwähnt, eine scharfe grauweissliche Abgrenzungslinie gegen den Eierstocksteil hin (Fortsetzung der Albuginea?), und namentlich in der Nähe dieser Linie, aber auch in den anderen Abschnitten des Parenchyms grauweissliche, gegen den (in der Fig. 6, drot, unteren) freien Pol hin etwas regelmässiger radiär angeordnete Bindegewebsseptula.

Fig. 5.

Gleichzeitig lehrt aber auch der Durchschnitt, dass unterhalb der Albuginea des Hodens die Eierstockssubstanz, zum mindesten auf einer Seite, noch über die Mitte des Organs hinaus auf den Hodenteil hinüberzieht. Denn es erscheint auf dem abgebildeten Durchschnitt (drot) — ebenso auch (Fig. 7) auf den durch die ganze Dicke des Organs geführten mikroskopischen Schnitten — unten links eine kleine, die Hodensubstanz einbuchtende, um-

schriebene gelblich-weissliche Gewebsmasse, die von Salén in den den Figuren beigegebenen Notizen ausdrücklich als Ovarialsubstanz bezeichnet ist.

Das linke ziemlich kleine Ovarium ist (auf der Originalzeichnung; vergl. Taf. XII, Fig. 6) 27 mm lang und 13—14 mm breit. Saléns Angaben bedürfen zu diesem Punkte weder in makroskopischer noch in mikroskopischer Richtung — es ergaben sich für die Eierstocksstruktur typische Befunde (Primordialfollikel bis zu Graafschen Follikeln reifend) — einer Ergänzung.

Die mikroskopischen Übersichtsschnitte (Taf. XII, Fig. 7) entsprechen dem auf Taf. XII, Fig. 6 unten links (drot) dargestellten Durchschnitt. Im Hodenteil (h) wird die in dem genannten Bezirk angedeutete septierte Anordnung der Hodenkanälchen (hk) noch deutlicher; andererseits wird der makroskopische Befund insofern etwas korrigiert, als die (bis 215 μ dicke) Albuginea (at) sich als solche keineswegs zwischen Hoden und Eierstocksteil als Grenzmembran einschiebt.

Letzterer (o) liefert in allen seinen Abschnitten, auch in dem sich über den Hodenteil schiebenden Ausläufer (o'), ein dem Alter der Trägerin vollkommen entsprechendes normales Bild, nur fehlt ein Markteil auch bei mikroskopischer Betrachtung ganz. Das Keimepithel ist nicht selten erhalten, besonders in den flacheren Nischen und tieferen Buchten zwischen den Höckern der Oberfläche. Stellenweise ist eine schmale, ziemlich hyaline Albuginea deutlich. Das Stroma ist durchweg das typische klein- und spindelförmige der normalen Eierstocksrinde (Taf. X, Fig. 8 und 9 ostr bzw. str). Primordialfollikel sind nur noch spärlich vorhanden, daneben alle Stadien des Wachstums bis zum Graafschen Follikel (Fig. 8, Grf und Fig. 9). Das auf der Schnittfläche (Fig. 6, drot) getroffene Corpus luteum (Fig. 7, cl) ist von gewöhnlicher Zusammensetzung, noch ziemlich frisch; das geronnene Blut im Zentrum ist in einer schmalen peripherischen Zone organisiert. Typische Corpora candicantia und fibrosa (narbige Stellen im Stroma) fehlen nicht. Daneben sind in grösster Häufung grössere und kleinere Komplexe wellig-hyaliner Bänder (Fig. 8, atrf) als Produkte der physiologischen Follikelatresie in das Stroma eingesprenkt. Dicht unter der Oberfläche finden sich vereinzelt (wohl vom Keimepithel herzuleitende), mit einschichtigem Epithel ausgekleidete kleine Zystchen.

Die grossen, auf dem Durchschnitt getroffenen Follikelzysten (vergl. auch Fig. 7, fc und fc') haben, wie gewöhnlich, eine Auskleidung mehrschichtigen Granulosaepithels. Die Blutgefässe im Eierstocksgewebe, besonders die kleinen Arterien, zeigen nicht selten, auch bei Elastikafärbung, mehr oder weniger hyaline Wandungen.

Der Übergang des Eierstocksteils in den Hodenteil ist entsprechend dem makroskopischen Eindruck ein unvermittelter (Taf. XII, Fig. 7, Taf. X, Fig. 8).

Das spindelzellreiche Stroma des Ovariums (Fig. 8, ostr) wird unmittelbar abgelöst durch das bedeutend zell- bzw. kernärmere Stroma des Hodens. Dieses (Fig. 8, hstr; auch Taf. XII, Fig. 10 str' nebst Taf. XI, Fig. 11 und Fig. 12, str) wird dargestellt durch ein lockeres fibrilläres, zu einem grossen Teil leicht hyalin erscheinendes (mit Eosin stark getöntes) Bindegewebe von höchstens mittlerem Kernreichtum; es führt kleine normal strukturierte Arterien und Venen (Fig. 12, blg). Allerdings ist die Grenzlinie zwischen Hoden und Eierstocksstroma nicht allerwärts eine linienscharfe, vielmehr greifen beide auf manchen Strecken zahnartig ineinander.

In einem grossen Teil der unmittelbar an den Eierstock grenzenden Hodenzone breitet sich flach ein relativ reich entwickeltes, gegenüber der Norm freilich etwas rudimentäres Rete testis aus (Fig. 7 und Fig. 10, rt).

Hierbei sind einzelne Kanälchen des Rete bis an das spindelzellige Ovarialstroma unmittelbar herangeschoben oder sogar schon von ihm umschlossen. Ebenso einzelne der gleich zu beschreibenden Hodenkanälchen, die sich unmittelbar an das Rete schliessen. Ausserdem ist in dem Bereich des Rete das Bindegewebsstroma an sich weniger locker, faser- (nicht zell-) reicher, so dass ein gewisser Gegensatz zu dem mehr lockeren Stroma zwischen den Hodenkanälchen besteht (Fig. 10, str und str').

Eine Steigerung der in gewissen Hodenabschnitten vorhandenen makroskopischen Septierung (vergl. auch das Übersichtsbild Taf. XII, Fig. 7) in Form einer irgendwie mikroskopisch deutlicheren, sei es regelmässigen oder unregelmässigen Lappchenform, ist nicht vorhanden, auch nicht in dem vom Rete testis ganz entfernten Hodenabschnitt.

Die einzelnen Hodenkanälchen (Fig. 8, 10 und 11, hk) sind bald durch geringere, bald durch reichlichere Stromamasse von-

einander getrennt, die in ihrer Gesamtquantität die Gesamtmasse der Hodenkanälchen sicherlich übertrifft (vergl. Fig. 7). An der Oberfläche ist das Stroma zu einer typischen kräftigen Albuginea (Fig. 11, at) verdickt. Das Kaliber der stark gewundenen Kanälchen schwankt in nicht sehr erheblichen Grenzen. Es beträgt im Mittel $125\ \mu$, die kleinsten Formen messen $90\ \mu$, die grössten $165\ \mu$ im Durchmesser.

Die zellige Auskleidung bietet ziemliche Variationen, doch lassen sich leicht dabei drei Typen (Fig. 12) unterscheiden:¹⁾

1. Kanälchen mit völliger Füllung des Lumens (t^1) durch grösstenteils plasmodial verschmolzene Elemente. Nur da und dort werden äusserst zarte Zellgrenzen sichtbar. Das, was von Zytoplasma erkennbar ist, ist durchsichtig, nur leicht feinkörnig trübe. Die Kerne sind kugelig oder doch rundlich, ziemlich hell, mit deutlichen Kernkörperchen versehen. Solide Formationen dieser Art sind durchaus in der Minderzahl. Zuweilen ist die plasmodiale Masse auch von grösseren oder kleineren Vakuolen durchbrochen.

2. Ganz überwiegend sind die Kanälchen von mehreren bis vielen epithelialen zelligen Lagen ausgekleidet (Fig. 12, t^2 , auch hk in Fig. 8 oder Fig. 11). Die Kerne sind die nämlichen wie bei dem sub 1 geschilderten Typus. Ebenso sind die Zelleiber, wie das Zytoplasma dort, durchsichtig. Ihr Kontur ist sehr unregelmässig; die Zellindividuen sind nicht gerade selten wenig deutlich getrennt. Von diesen zuweilen kegelförmig vorspringenden Elementen aus führen feine netzförmige Fortsätze in das Lumen hinein, und durch den Zusammenfluss dieser Fortsätze entsteht ein das Lumen kreuz und quer oft (aber keineswegs immer) vollkommen durchsetzendes grossblasiges oder schaumiges Netzwerk, wobei sich auch einzelne Kerne zentralwärts verschieben.

Es kann diese die Lichtung füllende Vakuolenmasse so überwiegen, dass nur mehr eine einzige Zell- bzw. Kernreihe in der Peripherie des Kanälchens übrig ist.

3. Wiederum der Zahl nach zurücktretend sind Formen (t^3), deren Auskleidung durch lange hohe schmale Zylinderzellen mit stärker gefärbtem Protoplasma und basalen Kernen in einfacher Lage gebildet wird. Sie sind um ein zentrales Lumen radiär

¹⁾ Für die Beschreibung werden zweckmässig reine Querschnitte der Kanälchen gewählt, um alle Trugbilder, die betreffs der zelligen Füllung der Lumina bei Oberflächenschnitten entstehen könnten, auszuschliessen.

gruppiert. Auch diese Elemente erscheinen mehr oder minder verschmolzen — eventuell wiederum auch vakuolisiert —, und das Lumen kann durch ihren zentripetalen Zusammenschluss aufgehoben sein.

Die *Membrana propria* der Hodenkanälchen ist durchweg gut ausgesprochen. Zu einem kleinen Teil besteht sie aus feinen konzentrischen collagenen Faserlagen mit ziemlich kräftig gefärbten spindeligen Kernen und leicht darstellbaren sehr reichlichen elastischen konzentrisch geordneten Beimengungen. Aber meist zeigt sie insofern Veränderungen, als ihre innerste Schicht zu einem zunächst zarten, dann breiteren, ganz fein gefaserten hyalinen Band aufquillt. Das Band ist meist frei von Zellen bzw. Kernen, auch von elastischen Fasern, und mit Eosin sehr lebhaft gefärbt (Fig. 10, mpr).

Die zentripetal vordrängende hyaline Umwandlung der *Membrana propria* führt zur spaltförmigen Einengung des Lumens, dann zum Schwund der Epithelauskleidung und schliesslich zur völligen Obliteration des Hodenkanälchens, dessen Kontur peripherisch meist noch durch erhaltene spindelige Kerne und zarte elastisch-konzentrische Fasern um das auf dem Querschnitt wellig gewulstete breite hyaline Band angedeutet ist.

Sowohl die genannten epithelialen Typen in der Auskleidung der Kanälchen wie die verschiedenen Degenerationsstadien der *Membrana propria* sind in der regellosesten Art kombiniert und dabei durch vielerlei morphologische Zwischenformen verbunden.

Ebenso regellos ist das im ganzen ziemlich häufige, wenn auch keineswegs vorstechende Auftreten von Zwischenzellen (Fig. 11, zw). Sie sind entweder frei im Stroma oder öfter an einzelne oder gruppierte Hodenkanälchen gebunden in stark wechselnder Anordnung, bald in grösseren, bald in kleineren Komplexen, bald zu kleinsten Inselchen vereinigt, zu finden. Die einzelnen Elemente sind polyedrisch und führen den runden, mässig hellen, mit Kernkörperchen versehenen Kern meist zentral. Das Plasma ist entweder sehr reichlich und hat äusserst zahlreiche feinste bräunliche Pigmentgranula, an den Flemming-Präparaten auch durch Osmiumsäure geschwärzte kleinere und grössere Fettröpfchen, eingelagert. Oder — diese Bilder überwiegen — der Zelleib ist unbedeutend, und die Kerne sind dicht aneinandergerückt. Zuweilen sind innerhalb der Zwischenzellmassen feine verzweigte Blutkapillaren deutlich.

In den zellig gefüllten Hodenkanälchen sowohl wie in den mit Lichtungen versehenen, in den Kanälchen des obigen Typus 1 und 2, findet sich nun aber noch eine weitere Zellform, die ganz besondere Hervorhebung verdient (Taf. IX, Fig. 13 a, b).¹⁾

Es erscheinen ganz distinkte grosse, kugelige, auffallend helle Zellen (gz), die durch die besondere Transparenz ihres Protoplasmas sich gegen ihre Nachbarelemente stark abheben. Ihr rundlicher Kern ist gleichfalls heller als die meist dunklen Nachbarkerne. Er liegt zentral und führt ein rundes Kernkörperchen.

Ganz besonders auffällig aber ist das syntopische Verhältnis der Nachbarzellen bzw. ihrer Kerne zu diesen hellen kugeligen Zellen: die Nachbarelemente schmiegen sich um ihre Peripherie (kfz) und umgeben sie nicht selten mehr oder minder kontinuierlich. So kommen förmlich follikelähnliche Anordnungen zustande, in denen eine grosse helle zentrale kugelige Zelle — ganz ähnlich dem Primordialfollikel im Eierstock — von einer Hüllzellanlage abgeplatteter Epithelien umgeben ist. Bilder dieser Art sind nicht gerade häufig, aber doch fast auf allen Schnitten zu finden. Nicht selten ferner sind die grossen kugeligen Elemente in ein und demselben Querschnitt in grösserer Zahl, gelegentlich sogar gehäuft (Fig. 13 a, b), zu treffen.

Teil III.

Tabellarische Übersicht der von mir untersuchten bzw. wiedergegebenen Fälle.

Ich gebe im folgenden eine tabellarische Übersicht der von mir neu untersuchten Fälle (fünf Tierfälle; Fall Salén) und sämtlicher übrigen Fälle von sicherem Hermaphroditismus verus beim Menschen, also des älteren Falles von Simon sowohl, wie auch der neuen von Uffreduzzi und Gudernatsch, nach dem Muster der von Sauerbeck erdachten tabellarischen Synopsis.

Ich habe versucht, in den Kolumnen der Tabelle möglichst das zusammenzufassen, was Sauerbeck in seiner Tabelle III („sichere und sehr wahrscheinliche Fälle von H. A. verus bei Tier und Mensch“), Tabelle VI („Beschaffenheit der Geschlechtsdrüse bei H. A. verus“) und Tabelle VII („Zustand der tubulären und konjugalen Geschlechtsteile beiderlei Geschlechts bei H. A. verus“)

¹⁾ Auch hier werden, um Trugbilder auszuschalten, lediglich Querschnitte beschrieben.

anatomisch analysiert, und ich habe mich darum in der Aufstellung der Rubriken auch möglichst genau an die von Sauerbeck aufgestellten Reihen gehalten. So mag meine Tabelle als eine unmittelbare Fortsetzung der mühevollen Sauerbeckschen Zusammenstellung vielleicht von einigem Nutzen sein.

Die Fälle Simon und Salén finden sich auch bei Sauerbeck. Ich habe sie, zumal meine Nachuntersuchung im Falle Salén die obigen prinzipiell bedeutungsvollen Ergänzungen aufdeckte, der gerade für den Menschen von mir erstrebten Vollständigkeit wegen hier nochmals eingestellt. Sauerbeck (S. 833) rechnet gegenüber anderen Autoren¹⁾ allgemein Vagina und Prostata zu den inneren Sexualorganen, den Sinus urogenitalis des weiblichen Schweines — mit Recht — zu den äusseren (S. 865). Er zählt auch den stark männlichen (vergl. unten) Sinus urogenitalis des hermaphroditischen Schweins, bei Pseudohermaphroditismus wie bei echtem Hermaphroditismus, zu den äusseren Geschlechtsorganen, und hier entspricht der Sinus urogenitalis durchaus der Pars pelvina der männlichen Urethra. Nun besitzt aber dieser wie jener unterhalb seiner Schleimhaut eine vollkommene Umkleidung durch die Pars disseminata prostatae, und so entsteht für die Sauerbecksche Auffassung der Widerspruch, dass ein äusseres Sexualorgan — der Sinus urogenitalis bezw. die Pars pelvina urethrae — in einer bestimmten Schicht seiner Wand zugleich ein inneres ist, oder aber man müsste die Konzession machen, den kleinen Prostatakörper des Schweins, der dorsal und seitlich vom Anfang der Pars pelvina urethrae liegt, zu den inneren, die innerhalb der Harnröhren-(bezw. Sinus urogenitalis-)wand liegende Pars disseminata prostatae zu den äusseren Geschlechtsorganen zu zählen.

Ich selbst rechne mit den genannten Autoren die Prostata zu den äusseren Organen, habe sie aber, um mit den Unterabteilungen der Sauerbeckschen Tabelle die Übereinstimmung zu erhalten, auch in meiner Tabelle unter der Rubrik der inneren Organe belassen.

Lediglich aus praktischen Gründen sind in diese Kolumne auch die bulbourethralen Drüsen (Cowperschen bezw. grossen vestibularen) eingestellt.

¹⁾ Feldmaier, Schönfeld, Brühl; vergl. auch Orth (50) und Fibiger (16) bei E. Kaufmann (31a), S. 906.

Teil IV.

**Die „phänomenologischen Gesetze“
beim Hermaphroditismus verus der Säugetiere und
des Menschen.**

I. Die Geschlechtsdrüsen beim Hermaphroditismus verus.

Die erste nicht anzuzweifelnde Beobachtung eines H. A. verus (H. A. verus lateralis masculinus dexter beim Säugetier [Schwein]) stammt aus dem Jahre 1885 (Reuter). Der erste unbedingt sichere Fall beim Menschen ist der von Ernst Salén (57) im Jahre 1899 berichtete.

Die sonstigen sicheren Fälle beim Säugetier sind bei Sauerbeck (58) eingehend verwertet und tabellarisch zusammengestellt (vergl. Tabelle II, III, VI, VII), die beim Menschen von mir sämtlich wiedergegeben (vergl. oben Teil I und die Tabelle, Teil III).

Mit meinen neuen fünf Beobachtungen verfügen wir nunmehr über mindestens zwölf unbedingt gesicherte Fälle beim Säugetier, und falls der Fall Gudernatsch (23) mitgezählt wird, über vier sichere Fälle beim Menschen.

Die zwölf sicheren Fälle beim Säugetier sind ausnahmslos beim Schwein beobachtet.¹⁾

Ich möchte diese auffallende Tatsache sowohl gegenüber der geringen Zahl der Fälle beim Menschen wie gegenüber dem Fehlen sicherer Fälle bei anderen Säugern wesentlich durch äussere Gründe erklären. Gegenüber den Millionen-Schlachtungen und der Millionen-Fleischschau an Schweinen, wie sie in den Schlachthäusern der Großstädte tagaus tagein geübt wird, verschwindet die Gesamtzahl der menschlichen Obduktionen, und auch die Schlachtzahl anderer Säuger kann damit keinen Vergleich aushalten.²⁾

¹⁾ Die „sehr wahrscheinlichen Fälle“ betreffen zweimal das Reh (Boas) und einmal die Ziege (Mayer), die sicheren und sehr wahrscheinlichen Fälle zusammengekommen also insgesamt Haustiere der Huftiergruppe (Sauerbeck, S. 692 und 868).

Auch die am besten und allein genügend beschriebenen Fälle von Ps. H. A. der Säuger sind bemerkenswerterweise beim Schwein beobachtet (vergl. Sauerbeck, Tabelle XIV und S. 864).

²⁾ Auf dem Berliner städtischen Schlachthofe wurden 1912 geschlachtet: 1 826 000 Schweine gegenüber 998 403 Schafen, 248 883 Rindern (Bullen, Ochsen, Kühen, Jungrindern und Kälbern).

Fall 1
(limbo)

Fall 2
(trechus)

Fall 3
(trechus)

Fall 4
(limbo)

3

8

9 (aus Fig. 7)