Les heures sont données en temps sidéral de Bruxelles. La 1^{re} impression du disque lunaire sur le soleil s'est faite par les sommets de deux montagnes, tandis que pendant un instant la partie du bord du soleil comprise entre elles ne paraissait pas déprimée.

A l'immersion les nombres relatifs à la tache *n* sont peu sûres; il y avait beaucoup de nuages.

A l'émergence M. *Hooreman* a noté l'observation de la tache *m* comme faite un peu tard.

Au dernier contact, le soleil était voilé par des nuages légers.

A 2^h49^m temps moyen on a remarqué autour du soleil, l'apparition de 2 arcs irisés; le plus brillant à gauche et un peu au dessus du centre du soleil présentait les 7 couleurs principales; l'autre, où l'orange et le vert dominaient, était à droite. Ce phénomène s'est présenté, au moment où une couche de cirrus passait devant le soleil. Le rayon de ces arcs a été estimé de 4 à 5 degrés environ.

Elemente des Cometen III. 1860, von Herrn Stud. *Tuttle*.

I enclose the latest of four sets of parabolic elements of the orbit of Comet III. 1860, which was discovered at Utrecht by M. *Gronemann*; at Florence by Dr. *Donati*; by myself at the Observatory of Harvard College on the 21.

They are derived from observations made at Cambridge on the 21., 28. of June and July 6. The observed places are corrected for parallax and referred to the mean equinox of 1860 Jan. 1. The elements are as follows:

There is good reason to believe that astronomers will have no difficulty in representing well all the observations of this Comet by means of a parabolic orbit.

Harvard College Observatory 1860 July 23.

$$T = 1860 \text{ June } 16,064360 \text{ Greew. m. t.}$$

$$\pi = 161^{\circ}33'9''5$$

$$\Omega = 84 \ 39 \ 45.4$$

$$i = 79 \ 20 \ 9.5$$

$$\log q = 9,466870$$

Movement direct.

The difference between the observed and the computed middle place is as follows: $\Delta\alpha = +0^{\circ}4$ $\Delta\beta = +1''5$.

Horace Parnell Tuttle.

Elemente der Cometen II. u. III. 1860, von Herrn Dr. *Seeling*, Observator an der Sternwarte in Glasgow.

Die neuesten Nummern der Astr. Nachr. haben für die beiden letzten Cometen dieses Jahres Beobachtungen gebracht, welche weit ausserhalb der bis jetzt zu Bahnbestimmungen benutzten liegen. Ich habe darauf neue Rechnungen ge-

gründet, deren Resultate ich mir erlaube. Ihnen hier mit-zutheilen.

Was zunächst den Cometen 1860 II. betrifft, so wurden folgende 3 Beobachtungen zu Grunde gelegt:

	Mittl. Zt. Greenw.	Geoc. Länge	Breite	Parallaxe	
				in α	in δ
1860 Hamburg	April 17,42332	50° 44' 52''6	+30° 46' 44''5	+1''78	+3''8
Kremsmünster	Mai 6,35057	74 30 22,2	+32 49 33,1	+3,84	+2,8
"	23,39302	91 26 19,9	+32 50 2,8	+3,37	+2,8

schon reducirt auf das mittlere Äquinox 1860,0 und frei von Aberration und Parallaxe. Die letztere ist in Bogen-Secund. für Rectascension und Declination beigefügt. Die Beobachtungen von Kremsmünster reichen höchst wahrscheinlich so weit, als der Comet wegen Mondlichts und zunehmender Entfernung überhaupt verfolgt werden konnte. Die später

bekannt gewordenen Beobachtungen von Florenz gehen nicht weiter.

Die Bestimmung der Elemente geschah durch Variation der curtirten Distanzen in der ersten und letzten Beobachtung. Nach zweimaligem Anwenden der Bedingungs-gleichungen werden die Elemente diese: