als bei der typischen Form; die Blumenblätter haben aber am Grund den orangegelben Fleck. — Diese an lichten Stellen der Föhrenwälder in Bernstein sehr verbreitete Varietät ist unter den Variationen der *P. serpentine* Borb. die auffälligste, denn sowohl die typische Form, als auch die *var. parvifrons* Borb. bildet mit ihren zahlreichen 10—25 cm langen Stengeln dichte Rasen und trägt grössere Blüten. — Zugleich will ich hier bemerken, dass die Blumenblätter der *P. Serpentine* Borb. in allen ihren Formen am Grunde einen mehr minder ausgeprägten orangegelben Fleck aufweisen, welches charakteristische Merkmal nebst anderen Kennzeichen auf ihre nahe Verwandtschaft mit *P. salisburgensis* Haenke, als welche ich diese Pflanze seinerzeit (1883) einlegte, hinweist.

P. pseudo-serpentine m. *P. serpentine* Borb. $\times$ *glandulifera* Kraš (vergl. Oest. botan. Zeitschr. 1893, pag. 357). Auf Serpentin in Bernstein. — Die in Bernstein gesammelten Exemplare stehen zum Theil der *P. serpentine* näher, manche sind blos durch die Drüsenhaare an dem oberen Theile der Stengel und an den Blütenstielen, ferner durch kleinere Blüten von dieser zu unterscheiden. Die der *P. glandulifera* näher stehenden Formen weichen von dieser ab ausser durch zahlreichere Blattzähne und subsessile Drüsenköpfchen an Stengel und Blättern, noch durch den orangegelben Fleck der Petalen und die mehr abstehenden Haare der Blattstiele.

Lotus tenuifolius L. *var. major* Scop. — Gräben in Güns.

Zopf W., Uebersicht der auf Flechten schmarotzenden Pilze.

Besprochen von Prof. E. Kernstock (Klagenfurt).

In der „Hedwigia“, Band XXXV (1896), Seite 312—366, hat Prof. Dr. Wilh. Zopf in Halle eine „Uebersicht der auf Flechten schmarotzenden Pilze“ gegeben. Mit den letzten Worten präcisirt der Verfasser seinen Standpunkt in der Flechtenparasitenfrage und stellt sich hiermit an die Seite Rehm's und in Gegensatz zu Minks.

Es wäre sehr erfreulich, wenn der Herr Verfasser in seiner von ihm angezeigten Monographie dieser Schmarotzer (in den „Nova Acta. Acad. Leopold.“) sich des Näheren über seine diesbezüglichen Ansichten aussprechen möchte. Was die Uebersicht anbelangt, so wird sie wegen ihrer Reichhaltigkeit und Uebersichtlichkeit von den Lichenologen freudigst begrüsst werden. Bei jeder der alphabetisch geordneten Flechtenarten verzeichnet der Verfasser die auf ihr beobachteten pyrenocarpen und discocarpen Schmarotzer und Conidienfructificationen.

Jeder weniger allgemein bekannten oder neuen Parasiten-species ist eine kurze Diagnose beigefügt, welche in den meisten Fällen der Absicht des Verfassers vortrefflich dienen wird. Zweifels- ohne hat derselbe bei der Bearbeitung der seit vielen Jahren

angesammelten Angaben über Flechtenparasiten eine kritische Sichtung, soweit sie möglich war, vorgenommen, und diese lief in manchen Fällen auf eine Reduction gewisser winziger Arten hinaus; nur wäre es dann vielleicht wünschenswerth gewesen, wenn dies an Ort und Stelle in der Uebersicht durch Anführung des oder der Synonyme kenntlich gemacht worden wäre. Wirkliche Vollständigkeit wird der Verfasser wohl nicht angestrebt haben; ich könnte aus meinem Handverzeichnisse eine ziemlich lange Reihe von Vorkommnissen anführen, welche in der Uebersicht nicht enthalten sind.

Meine eigenen kleinen Arbeiten über die Flechtenflora Steiermarks und Tirols enthalten ebenfalls einige in der Uebersicht fehlende Beobachtungen, welche ich hiermit — der Herr Verfasser wird es mir nicht übel nehmen — zu seiner Verfügung stelle.

Es wurde beobachtet auf dem:

Thallus von *Amphoridium Veronense*: *Tichothecium pygmaeum* (Beitr. VII).

Thallus von *Aspicilia calcarea*: dasselbe (Beitr. VII).

Thallus von *Aspicilia gibbosa*: *Xenosphaeria oligospora* (Brixen).

Thallus von *Biatora ochracea*: *Tichoth. pygmaeum* (III).

Apoth.: *Blastenien ferruginea*: *Cercidospora caudata* n. sp. (VII).

Thallus von *Cladonia amaurocraea*: *Nesolechia punctum* (Steiermark).

Thallus von *Dermatocarpon pussillum*: *Leciogr. centrifuga* var. *conglobata*, n. var. (VII).

Thallus von *Diplotomma epipolium*: *Tichoth. gemmiferum* (II).

Thallus von *Gyalolechia lactea*: *Tichoth. pygmaeum* (VII).

Apoth.: *Gyalolechia lactea*: *Cercidospora caudata* n. sp. (VI).

Thallus von *Lecanora intricata*: *Tichoth. pygmaeum* (St.).

Thallus von *Lecanora polytropa*: *Nesolechia vitellinaria* (VI).

Thallus von *Lecanora polytropa*: *Nesolechia aggregantula* (VI).

Thallus von *Lecanora polytropa*: *Tichoth. pygmaeum* v. *grandiusculum* (VI).

Apoth.: *Lecanora polytropa*: *Conida subvarians* (I), (VI).

Apoth.: *Lecanora subfusca*: dieselbe (III).

Thallus von *Lecidea albocoerulescens*: *Tichoth. gemmiferum* et *pygmaeum* (VI).

Thallus von *Lecidea crustulata*: *Tichoth. pygmaeum* (VI).

Thallus von *Lecidea declinans*: *Tichoth. pygmaeum* *grandiusculum* (St.) et *calcaricolum* (Brixen).

Thallus von *Lecidea infidula*: *Tichoth. pygmaeum* (IV).

Thallus von *Lecidea latypea*: dasselbe (VI).

- Thallus von *Lecidea leucitica*: dasselbe (Brixen, Steiermark).
 Thallus von *Lecidea lithyrga*: dasselbe, var. *grandiusculum* (Brixen).
 Thallus von *Lecidea meiospora*: Tichoth. *gemmiferum* (Brixen) et *pygmaeum* (VI).
 Thallus von *Lecidea petrosa*: Tichoth. *pygmaeum* (IV).
 Thallus von *Lecidea vorticosa*: Tichoth. *pygmaeum grandiusculum* (VI), *Müllerella Zhallophila* (VI).
 Thallus von *Parmelia exasperatula*: *Nesolechia oxyspora* (III).
 Thallus von *Parmelia proluxa*: dieselbe (VII).
 Thallus von *Parmelia caesia*: Tichoth. *gemmiferum* (VII).
 Thallus von *Parmelia saxatilis*: *Nesolechia punctum* (VII).
 Thallus von *Peltidea aphthosa*: *Bilimbia sabulet. Kiliasii* (IV).
 Thallus von *Placodium saxicilum*: *Cercidospora epipolytropa* (VI).
 Thallus von *Rinodina discolor v. candida*: Tichoth. *gemmiferum* (VII).
 Apoth. von *Rinodina corticola*: Tichoth. *pygmaeum* (III).
 Apoth. von *Rinodina metabolica*: dasselbe (III).
 Apoth. von *Rinodina pyrina*: dasselbe (III).
 Apoth. von *Scoliciosporum corticolum*: *Arthopyrenia conspurcans* (VII).
 Thallus von *Verrucaria aquatilis*: *Arthopyrenia rivulorum* (VII).

Klagenfurt, November 1896.

Ein Beitrag zur Pilz-Flora der Umgegend von Hohenstadt in Mähren.

Von Franz Bubák,
 Gymnasialprofessor in Hohenstadt.

Seit 15. September l. J. weile ich in Hohenstadt und diesen Aufenthalt habe ich zur Erforschung der mykologischen Verhältnisse hiesiger Umgegend benützt. Obzwar es nur eine sehr kurze Zeit ist, die ich heuer meinem Zwecke widmen konnte, so gelang es mir doch, viele interessante Arten zu entdecken. Da mir die betreffende Literatur hier unzugänglich ist, kann ich nicht unterscheiden, welche Species für Mähren neu sind.

Die grösste Aufmerksamkeit widmete ich den Uredineen und von diesen ist es mir gelungen, 52 Arten zu constatiren. Das Verzeichniss der Arten aus anderen Familien werde ich erst später zusammenstellen, jetzt veröffentliche ich nur die Ustilagineen und Uredineen.