		$d\alpha \cos \delta$	$d\delta$
Nov. 21	Florenz	— 1 ^u 9	— 12 ^u 3
	Berlin	— 12,7	— 15,6
Dec. 4	Bonn	+ 3,4	— 2,1
	4	+ 3,3	+ 13,0
	6	— 10,7	+ 13,3
	Göttingen	— 12,4	+ 8,1
	7 Bonn	— 2,1	+ 12,6
	8 Göttingen	— 3,2	+ 6,0
	9 Bonn	— 9,6	+ 17,4
	12 Berlin	+ 10,2	— 4,9
	19 Berlin	0,0	0,0

Die nicht corrigirten Beobachtungen geben $B-R$:

Nov. 14	Albany	$d\alpha \cos \delta = + 94^u4$	$d\delta = - 18^u4$
15		+ 29,5	— 8,6
18	Hamburg	— 5,9	+ 15,8
		— 20,3	+ 14,6
19	Kremsmünster	— 7,1	— 1,2
	Kopenhagen	— 39,3	— 47,2
20	Kremsmünster	+ 40,6	— 10,5
	Kopenhagen	— 111,9	— 113,6

Der mittlere zufällige Fehler einer Beobachtung vom Gewicht 1 wird nach der ersten Zusammenstellung:

$$s(\alpha) \cos \delta = \pm 5''27 \quad s(\delta) = \pm 7''01.$$

Göttingen 1859 Febr. 24.

A. Aumers.

Schreiben des Herrn Prof. *Santini*, Directors der Sternwarte in Padua, an den Herausgeber.

Mi è sommamente grato di potere annunziare, che dalla Munificenza sovrana l'Osservatorio di Padova è stato ultimamente arricchito di una eccellente Machina Equatoriale munita di un roteggio, che né guida il Cannocchiale nella direzione del moto diurno; essa è stata costruita all' I. R. Istituto Politecnico di Vienna con ogni diligenza. ed essatezza dall' abilissimo Meccanico *Starcke*, montata sopra un solidissimo tripode di furo fuso, egregiamente equilibrata in tutte le sue parti. Essa ha le seguenti dimensioni.

1. Distanza focale dell' Obiettivo, metri 1,64, sua opertura metri 0,116.

Il cannocchiale è opera egregia del Sig. *Merz* di Monaco, con 6 diversi oculari dal più debole per le cometa fino al più forte, il cui ingrandimento è circa 290 con un cercatore per facilmente dirigerlo ad un oggetto determinato senza ricorrere alle divisioni.

2. Allo stesso obiettivo si possono applicare due diversi sistemi di oculari costruiti in Vienna. Il primo è un micrometro di posizione per le osservazioni relative alle stelle doppie; le distanze vengono misurate mediante due sottilissimi fili mobili guidati da viti delicatissime; gli angoli di posizione si osservano in un circolo diviso in gradi e minuti, sul cui asse è girevole il sistema delle lenti oculari, e dei fili ad esse congiunti. Il campo può essere illuminato al modo solito; ma per gli Astri molto deboli si possono rendere luminosi soltanto i fili col mezzo di tre piccole lanterne lateralmente congiunte al sistema degli oculari, costruite con diligenza.
3. Un altro micrometro oculare diverso dal precedente serve a misurare mediante fili mobili le differenze di declinazione, mentre le differenze di AR si osservano dietro gli appolsi ai fili paralleli al circolo di declinazione.

4. Per le osservazioni degli Asteroïdi, e dei debolissimi astri, che non permettono la illuminazione del campo, vi fu applicata la disposizione atta a produrre nel campo oscuro del Cannocchiale 4 punti luminosi fissi immaginata del Chiarissimo Prof. *Stampfer*, descritta negli annunzii della I. R. Accademia di Vienna per l'anno 1856, della quale ho dato egualmente notizia negli atti dell' Istituto Veneto.

5. I circoli di AR, e di declinazione hanno il diametro di 0^m275 con divisioni nitidissime in Argento. L'uno, e l'altro con due opposti Nonii, dei quali il primo porre ½ secondo di tempo; il secondo 4^u di arco.

6. Il movimento AR si opera mediante un roteggio animato al moto da pesi variabili secondo il bisogno, l'azione dei quali rinascente ad ogni istante è moderata da un ventilatore a quattro palmette regolarmente distribuite in una ruota; questo, mediante un sistema di comunicazione, imprime un moto rotatorio, ed uniforme ad una vite, che ingrana in una gola dentata intagliata lungo la circonferenza del circolo equatoriale, il quale in conseguenza prende un moto uniforme di rotazione nel senso del moto diurno degli astri. Aumentando, o diminuendo il peso animatore dell' orologio mediante piccoli pesi noti, varia pure la celerità impressa al circolo equatoriale, ed è palese come si possa così ridurre uguale a quello del moto diurno delle stelle, del Sole, dei pianeti, ed anche della Luna.

Con facile artificio si può prontamente istituire, e tagliare la comunicazione fra la machina equatoriale, ed il roteggio, secondo che vuolsi mantenere fissa nel campo una data regione del cielo, o usarne come machina paralattica ordinaria. Essa è in tutte le sue parti bene equilibrata,

fornita di ottimi livelli per rettificarla, e ridurla alla conveniente situazione.

Questa bella *Machina*, che attendevosi da circa 4 Anni, è pervenuta da pochi mesi all' Osservatorio, nè altro manca per metterla in attività, che la costruzione di un' apposito locale confetto girevole, già implorata dalla Munificenza dell' I. R. Governo, di cui si spera di presto ottenere l'approvazione.

Avvicinandosi il tempo, in cui la cometa Periodica di Biela deve ritornare al suo perielio, nè avendo ricevuto alcuna notizia sull' esito del Programma pubblicato dalla I. R. Accademia di Pietroburgo intorno alla Teorica di questa interessante cometa, fui desideroso se si potesse sperare di osservarlo nel prossimo Maggio, e perciò presi ad indagarne prossimamente gli elementi, avendo riguardo alle perturbazioni prodotte da Giove, a cui sul principio del 1854 doretta avvicinarsi alla distanza di circa 1,6; presa per unità di misura la distanza medio della terra dal Sole.

Avendo già riconosciuto, che la mala riuscita della effemeride del 1852 derivò dall' avere abbandonato l'asse maggiore da me determinato dietro le osservazioni delle rivoluzioni precedenti per sostituirvi quello dedotto dal Sig. *Plantamour* dietro le sole osservazioni del 1846, in cui (come è noto) avvenne quella sua enigmatica separazione in due nuclei, ho stimato opportuno questa volta di ritenere l'antico asse maggiore, ed adottando le perturbazioni calcolate fra il 1846, del 1852, potai con una leggera correzione al tempo del passaggio al perielio formare il seguente sistema di elementi, facendo uso di tavole a 5 cifre, il quale rappresenta lodevolmente le osservazioni del nucleo più risplendente del 1852, siccome risulta da una nota presentata all' Istituto Veneto nell' ultima sua seduta, che spero poterle in breve inviare.

Passaggio al perielio $T = 1852$ Sett. 23, 1138 T. m. di Berlino
 longitudine del perielio $\pi = 109^\circ 8' 3''$ } dall' Eq. medio
 del Nodo $\omega = 245^\circ 52,5$ } Settem. 23
 Inclinazione $i = 12^\circ 33,3$
 Angolo di eccentricità $\phi = 49^\circ 8,1$
 logar. semiasse $\log a = 0,5470130$
 Moto diurno siderale $n = 536''2312$, $J = 2416''8683$.

Partendo da questi elementi, e calcolando di $6''$ in $6''$ di anomalia media le attrazioni prodotte dall' attrazioni di Giove, trascurando per ora quelle dipendenti dagli altri pianeti, che sono molto più piccole, ottenni i seguenti risultati:

$$\begin{aligned} \delta\pi &= +1190''11 & \delta\omega &= -811''15 & \delta i &= -574''62 \\ \delta\phi &= -851''64 & \delta n &= -4''3608 & \delta z &= -8811''34 \\ \text{Quindi } \delta J &= +16''4320. \end{aligned}$$

Applicando queste variazioni ai superiori elementi, qual' ora si abbia opportunamente riguardo alla precessione degli equinozii, si formano i seguenti elementi:

$$\begin{aligned} T &= 1859 \text{ Maggio } 23,4141 \text{ T. m. di Berlino} \\ \pi &= 109^\circ 33' 71'' \} \text{ dall' Eq. medio} \\ \omega &= 245^\circ 44,55 \} \text{ Maggio } 23 \\ i &= 12^\circ 23,71 \\ \phi &= 48^\circ 53,91 \\ n &= 531''8704 \\ \log a &= 0,5494672. \end{aligned}$$

Dietro questi elementi ho calcolato la seguente piccola effemeride, dalla ispezione della quale si ha poca speranza di potere osservare la cometa in questo suo ritorno verso la terra; rimanendo sempre da essa molto lontana, debolissima, ed immerza nella luce crepuscolare.

Le colonne $\Delta\alpha$, $\Delta\delta$ rappresentano le variazioni dell' AR, e della declinazione per l'aumento di un giorno nel tempo del passaggio al perielio, il quale deve riguardarsi un poco incerto si per le trascurate perturbazioni degli altri pianeti; si per la incertesse tutt' ora rimanenti nei veri elementi dell' orbita di questa cometa; il grado di illuminazione suppone $= 1$ l'illuminazione del suo nucleo più splendenté ai 1852,25 Sett. che era d'attronde molto debole, e difficile ad osservarsi nella luce crepuscolare matutina, nella quale trovavasi allora immerso.

Effemeride della Cometa Biela per 12^h T. m. di Berlino.

1859	AR di ☿	$\Delta\alpha$	Decl. di ☿	$\Delta\delta$	Log. dist. da Terra	Grado di illum.
Aprile 2	26° 32' 0	—22' 6	+13° 47' 0	—3' 4	0,3201	0,31
6	30 7,3		14 34,8		0,3133	
10	33 48,6		15 21,4		0,3062	
14	37 39,4	—28,5	16 6,0	—1,9	0,2991	
18	31 40,1		16 47,9		0,2918	
22	45 51,1		17 26,2		0,2847	
26	50 11,8	—33,7	18 0,4	—0,2	0,2776	
30	54 42,7		18 29,8		0,2707	0,60
Maggio 4	59 23,1		18 52,6		0,2640	
8	64 12,2	—41,2	19 9,0	+2,3	0,2575	
12	69 9,5		19 18,0		0,2515	
16	74 13,8		19 18,8		0,2499	
20	79 23,3	—44,9	19 11,3	+5,8	0,2409	
24	84 37,3		+18 54,7		0,2366	0,83

Padova 1859 febbrajo 24.

Giovanni Santini