N^o 35. Kleine Flecke.

1867	<i>p</i>	<i>ρ</i>	<i>L</i>	<i>b</i>	
Sept. 27, 535	244° 26'	32° 26'	144° 0	—18° 6	(H)
"	241 35	32 11	142,6	—19,3	(H)
28,453	258 22	41 56	145°	—18,6	
Oct. 1, 582	273 22	72 48	138,7	—19,4	

N^o 36. Kleine Flecke.

Sept. 28, 454	333 19	19 26	127,2	+18,0
"	341 12	17 9	123,7	+18,5

N^o 38. Kleine Flecke.

1867	<i>p</i>	Helio. <i>ρ</i>	<i>L</i>	<i>b</i>
Oct. 4, 429	185° 23'	33° 53'	16° 6	—25° 3
"	187 15	32 54	20,5	—24,8
5,643	217 55	32 3	22,4	—25,2
6,405	224 55	33 22	16,7	—25,4
"	231 57	34 48	21,4	—25,0
8,415	258 46	51 41	21,8	—24,2
9,457	264 31	63 2	22,2	—24,7

N^o 37.

Ein grösserer ringsum behofter Fleck wurde Oct. 1 nahe dem SO-Rande gesehen, wobei der Hof dem Rande zu merklich breiter erschien. Letzteres ist dem Umstande zu-

zuschreiben, dass der Fleck an der Ostgrenze eines Bezirkes lag, in welchem sich erhebliche Störungen vorbereiteten. Während kleinere südliche Flecke verschwanden, fanden neue Bildungen westlich statt, und so, dass die westliche Grenze der Gruppe täglich weiter vorrückte. Diese Gebilde erlangten sämmtlich keine beträchtliche Grösse und wechselten schnell.

Um das Fortrücken der Fleckenentwicklung näher zu bezeichnen, lasse ich die Oerter für den westlichen Theil der Gruppe folgen:

1867 Oct. 1.	<i>L</i> = 4° 0;	<i>b</i> = —15° 4.	Kleiner Fleck.
2	5,4	—16,2	Kl. behofter Fleck.
3	6,0	—16,6	Kleiner Fleck.
4	7,0	—15,8	Kleiner Doppelfleck.
5	9,3	—16,4	Kleiner Fleck.
6	8,9	—15,7	Kleine Gruppe.
8	10,2	—16,7	Behofter Fleck.
9	9,7	—15,5	desgl.

Indessen wird durch diese Oerter noch nicht vollständig die Westgrenze bezeichnet, denn es waren zeitweise noch Flecke vorhanden, welche sogar eine Verbindung mit den westlicheren unter N^o 38 aufgeführten Flecken herstellten.

Die folgenden Oerter des grossen und beständigen Flecks N^o 37 zeigen eine geringe Ortsveränderung.

1867	<i>p</i>	Geoc. <i>ρ</i>	Helio. <i>ρ</i>	<i>L</i>	<i>b</i>	<i>l</i>	Red. <i>l</i>	Δl	
Oct. 1, 583	136° 8'	916"	72° 14'	360° 31	—16° 95	314° 22	14° 27	+0° 11	
2,613	140 44	831	59 39	0,47	—17,57	329,08	14,56	—0,18	
3,433	145 5	741	50 13	0,13	—17,44	340,43	14,31	+0,07	
4,429	152 43	606	38 57	359,90	—16,63	354,41	14,20	+0,18	
5,625	172 46	454	28 3	360,12	—17,16	11,69	14,56	—0,18	
6,393	192 27	388	23 43	359,90	—16,89	22,43	14,44	—0,06	
8,428	248 23	496	30 52	359,69	—16,76	51,25	14,48	—0,10	
9,457	261 54	632	40 52	359,59	—17,20	65,83	14,50	—0,12	
10,494	270 12	764	52 21	359,07	—16,47	80,11	14,11	+0,27	
Oct. 5, 8283				359° 91	—17° 01	14° 38	14° 38		$\approx 14,178.$

$$\text{Normallänge } L = l + 14^{\circ} 2665. (\text{Oct. 4, 814} - t)$$

$$\text{Reducirte Länge} = l + 14,178. (\text{Oct. 5, 8283} - t).$$

Anclam, 1868 März 11.

G. Spörer.

Ueber die früheste Sichtbarkeit der Mondsichel am Abendhimmel. Von Herrn Dir. J. F. Julius Schmidt.

Vor Alters haben die Völker des Orientes ihre Aufmerksamkeit auf die erste Erscheinung des neuen Mondes gerichtet, und noch gegenwärtig finden wir bei Türken und Persern den Gebrauch, die erste Mondsichel aufzusuchen, und ihr Erscheinen zu verkünden. Bis zu welchem Grade solche Wahrnehmung im Sinne der alten Sternkunde nützlich erschien,

und wie weit sie jetzt noch beachtet wird, ungewisse Epochen zu bestimmen oder zu verbessern, werde ich diesmal unerörtert lassen, und nur mittheilen, was ich nach eigener Erfahrung darüber aufzustellen vermag. Die folgende kurze Darstellung mag als Beantwortung in genauerer Weise dienen auf jene Anfragen, die deshalb mehrfach an mich gerichtet worden sind.

1859 Juli	1 zu Athen; Mond	27,7 Stunden alt;	$\delta = +25^\circ$,	leicht und sicher aufgefunden (ohne Fernrohr.)
1859 Oct.	27	40,9	$= -24^\circ$,	leicht kenntlich.
1860 Febr.	23	40,9	$= -1^\circ$,	gut sichtbar.
1860 Juni	20	36,7	$= +23^\circ$,	schwierig erkennbar.
1861 März	12	27,3	$= +6^\circ$,	leicht sichtbar.
1861 Aug.	8	54,0	$= +3^\circ$,	sehr tief, nur kurze Zeit sichtbar.
1861 Sept.	7	67,0	$= -13^\circ$,	sehr tief, schwer kenntlich.
1861 Nov.	4	48,4	$= -24^\circ$,	sehr tief, deutlich sichtbar.
1861 Dec.	3	37,8	$= -23^\circ$,	sehr tief, deutlich sichtbar.
1862 Jan.	1 zu Korinth	25,7	$= -20^\circ$,	sehr auffallend und hell.
1862 März	31 zu Athen	33,9	$= +14^\circ$,	gut sichtbar.
1864 Jan.	10	32,4	$= -13^\circ$,	gut sichtbar.
1864 März	9	26,5	$= +7^\circ$,	leicht kenntlich.
1864 Juni	6	55,3	$= +18^\circ$,	leicht aufzufinden.
1864 Sept.	3	59,0	$= -5^\circ$,	tief am Horizonte.
1864 Nov.	1	49,0	$= -5^\circ$,	tief; leicht sichtbar.
1865 Jan.	28	30,4	$= -19^\circ$,	sehr augenfällig.
1865 März	28	35,7	$= +11^\circ$,	sehr leicht aufgefunden.
1865 April	26	27,7	$= +16^\circ$,	gut sichtbar.
1865 Juli	24	48,7	$= +9^\circ$,	erst spät aufgefunden.
1865 Oct.	21	48,0	$= -15^\circ$,	gut sichtbar.
1866 April	16	35,4	$= +14^\circ$,	gut sichtbar.
1867 Nov.	27	30,8	$= -18^\circ$,	sehr tief am Horizonte.

Bildet man aus dieser Reihe einige Mittelwerthe, so erhält man für die früheste Sichtbarkeit:

im Januar.	Alter des Mondes	$= 29,5$ Stunden.	$\delta = -17^\circ$	3 Beobachtungen.
„ Februar.	„	$= 40,9$	$= -1$	1
„ März.	„	$= 30,8$	$= +13$	4
„ April.	„	$= 31,5$	$= +16$	2
„ Juni.	„	$= 46,0$	$= +20$	2
„ Juli.	„	$= 38,2$	$= +17$	2
„ August.	„	$= 54,0$	$= +3$	1
„ September.	„	$= 63,0$	$= -9$	2
„ October.	„	$= 44,5$	$= -19$	2
„ November.	„	$= 48,7$	$= -21$	2
„ December.	„	$= 38,7$	$= -23$	1

Die Abhängigkeit der Sichtbarkeit von der Declination und zugleich von der Dämmerung ist also klar ausgesprochen. Es erübrigt aber noch, daran zu erinnern, dass hiermit keineswegs, ungeachtet der Sicherheit der Beobachtungen, schon die untersten Grenzen angegeben seien. Obgleich diese Wahrnehmungen nicht als zufällige zu betrachten sind, so war es doch in den meisten Fällen unzweifelhaft, dass unter den jedesmal gegebenen Umständen, der Mond mehr oder weniger früher hätte gesehen werden können. Am 1. Januar 1862 Abends 5^h 7 an einem höchst klaren Frosttage sah ich zu Korinth (Seehöhe 44 Toisen) die sehr feine Mondsichel in auffallender Helligkeit. Ich konnte bemerken, dass ich sie selbst dann leicht erkannt haben würde, wenn ihre Höhe 3° geringer gewesen wäre. Ein 3° geringerer Abstand von der

Sonne entspricht aber einem ungefähr 6 Stunden jüngerem Alter, so dass also unter den damaligen Umständen auch ein Alter von 20 bis 21 Stunden genügt hätte, um die Sichel bestimmt und klar zu erkennen. Im Juni, Juli, August und September verhält es sich anders, weil alsdann der Mond bei seiner frühesten Sichtbarkeit dem Horizonte schon so nahe ist, dass nur ausnahmsweise eine engere Grenze angenommen werden kann. Die obigen Mittelwerthe würde man aber verkleinern, und durch eine Curve reguliren dürfen; doch wird es besser sein, für diesen Zweck zahlreichere Beobachtungen abzuwarten.

Wenn aber für die Breite Athens ein Alter des Mondes von 21 Stunden genügt, um die Sichel erkennen zu lassen, so wird man zugeben, dass, da für Palästina und Nord-Aegypten,