Untersuchungen über Anomalien der Placentar- structur hypoplastischer Uteri und deren Folgen¹⁾.

Von

O. Schaeffer, Heidelberg.

(Hierzu Tafel I—III.)

Ueber den Verlauf von Schwangerschaften und Geburten bei Hypoplasia uteri weiss man Einiges, über die Placentarbildung wenig. Es fehlen planmässige Untersuchungen. Letztere sind aber heutzutage durchaus nöthig. Denn die Hypoplasie der Genitalien bildet in den Grossstädten und in den dem städtischen Leben näher gerückten Landtheilen keine seltene Entwicklungshemmung mehr und scheint streckenweise in deutlicher Häufigkeitszunahme begriffen zu sein. Ich habe mir deshalb die genauere Untersuchung einiger prägnanter Fälle angelegen sein lassen und erlaube mir, dieselben hier zu einem einheitlichen Bilde zusammen zu stellen.

Bei einer recht zarten anämischen, als Kind schon scrophulösen, jungen Frau hatte ich im Laufe weniger Jahre eine Reihe von beschwerdereichen Schwangerschaften, die stets mit einer Fehlgeburt endigten, zu beobachten und behandeln Gelegenheit gehabt. Die zuletzt eingetretene Gravidität wurde unter der consequenten Darreichung von Ferruginosis und vor Allem Hypophosphiten zu Ende geführt. Die Frau hatte sich hierbei sogar ausgezeichnet erholt. Die Wehenthätigkeit liess viel zu wünschen übrig, so dass zum Schlusse, als die kindlichen Herztöne in Folge einer Nabelschnurumschlingung nachliessen, die Extraction mittelst Forceps ausgeführt wurde. Die Placenta trat nach $\frac{1}{2}$ Stunde unter Credé leicht zu Tage und repräsentirte mehr einen Sack aus morschem Gewebe (wie aus Zunder) denn einen festen Kuchen. Auch war die materne Fläche keineswegs spiegelnd und die Kotyledonen waren nicht deutlich ausgeprägt. Immerhin fehlte Nichts, und man gewann auch keineswegs den Eindruck oder den Verdacht, dass etwas fehlen könnte.

1) Nach einem Demonstrationsvortrage in der mittelhhein. Gesellschaft für Gynäk. in Frankfurt a. M. März 1905.

Da ich den Fall von Anfang an beobachtet hatte, so war es mir klar, dass alle Schwangerschafts- und Geburtsanomalien auf die eine Ursache der hypoplastischen (infantilen) Entwicklung der Genitalien und der Gebärmutter im Besonderen zurückzuführen waren.

Das Wochenbett verlief fieberlos; nur fiel es auf, dass bei der stillenden Frau die Lochien lange und stark blutig blieben, wie es aber bei schwächlichen selbst nährenden Frauen nicht so selten vorkommt. Eine etwas andere Deutung erfuhren diese, als auch leichte Temperaturerhöhungen und gelegentlich stärkere Blutungen vorkamen. Secale war, weil der Uterus dauernd auffallend gross, subinvolvirt blieb, von Anfang an ununterbrochen (3—4 mal tägl. 0,7 g) weiter gegeben worden. Insbesondere lag keine ältere und auch keine frische Entzündung vor.

Etwa 2 Wochen, nachdem ich die Puerpera hatte aufstehen lassen und aus meiner Behandlung entlassen hatte — fast 5 Wochen post partum — wurde ich zu der ihrem ersten Menstruationstermine sich Nähernden Abends hinalarmirt und fand sie, von dem Collegen Huber wegen profuser Genitalblutung tamponirt und mit Kochsalzinfusion versehen, eben aus einem Collaps erwacht, vor.

Ich dachte an retinirte Nebenplacenta, an Thrombosenblutung, an Polypen und entfernte die Tampons, um sofort die Ursache der abundanten Metrorrhagie festzustellen und zu beseitigen.

Der Cervicalcanal klaffte; aus ihm hing ein fingerdickes Gerinnsel heraus, welches, nachdem das Scheidengewölbe von seinen grossen Coagula entleert war, den Finger an die hintere Uteruswand leitete, deren Fläche sich bröckelig, uneben anfühlte. Das übrige Gebärmutterinnere bot nichts Besonderes, vor Allem waren die anderen Wandungen und Kantenflächen glatt.

Die Curette förderte in ziemlicher Ausdehnung von der Hinterwandfläche bröckelige unzusammenhängende Massen zu Tage, welche makroskopisch den Eindruck nekrotischer Eireste machten und mit frischen Gerinnselchen gemischt waren. Einer sogenannten „Nebenplacenta“ gehörten sie also nicht an und noch weniger stellten sie den Beginn eines „Placentarpolyps“ dar. Die Blutung stand von da ab.

Die sofort eingebetteten Schabpartikel bestätigten unter dem Mikroskope, wie Tafel I, Fig. 3 zeigt, deren Eirest-Charakter, und zwar mit folgenden den Fall aufklärenden interessanten Befunden.

Neben meist nekrotischen decidualen Partien finden wir, diesen aufsitzend in verschiedenen reichlicher Masse, ebenfalls zum Theil nekrotisirte Zotten. Gewebe von lebhafter sich regenerirender Vitalität sind wenig mit abgeschabt worden; gleichwohl sassen diese theils frischen, theils abgestorbenen Eireste noch innig mit dem neu sich bildenden Endometrium verschmolzen, von dem sich merkwürdigerweise wenige Spuren im abgeschabten vorfanden. So sehen wir an einer Stelle der nekrotischen Decidua, in verschiedenen Tiefen getroffen, die Querschnitte einer Drüse mit schönem functionirenden Cylinderepithel ausgekleidet

und unmittelbar neben ihr, aus der Tiefe des Schleimhautstromas, sich eine frische Blutung gegen die Oberfläche der Schleimhaut hin fortsetzen, während die andere Seite dieses kleinen Blutstromes von einer älteren fibrinisierten Blutung, die gleichfalls dem tiefer gelegenen Bindegewebe entstammt und sich in dem nunmehr absterbenden Stroma verbreitet hat, begrenzt wird; neben der Drüse liegt eine leere kleine Arterie mit hyaliner Wandung. In grosser Ausdehnung werden das ältere und das frische Blutextravasat nebst jenen intacten Drüsenquerschnitten von zum Theil nekrotischem compactem Deciduagewebe durchzogen und überdeckt: die oberflächlichen Schichten desselben sind offenbar durch die Blutung von den tieferen Schleimhautlagen abgehoben.

Einzelne Inseln bzw. Säulen decidualer Zellen sind bis in die oberflächliche subchoriale Schicht hinauf noch ganz gut färbbar. Reichlich finden sich neben den nekrotisierten decidualen Zellen auffallend breite Züge von mehr oder weniger straffem Bindegewebe, welches vielmehr nach Lage und schlechter Färbbarkeit noch ein Schwangerschaftsprodukt ist und demgemäss zu den zu Grunde gehenden Gewebstheilen gehört. Diese fibrösen Züge erstrecken sich bis an und zwischen die Chorionzotten, sie umklammernd oder mit ihnen verschmelzend und je verschiedenen Stadien der Nekrobiose anheimfallend.

Das Schleimhautstroma ist stellenweise in der Tiefe von dem ausgetretenen zum Theil frischen, zum Theil älteren Blute durchsetzt, so dass die natürlichen Bindegewebslücken von rothen Blutkörperchen und hier und da mit Fibrinfasern erfüllt sind. In der Umgebung dieser Herde hat auch dieses Bindegewebe, Zellen sowohl wie Fasern, in seiner Ernährung Noth gelitten und ist hyalin degenerirt. Gegen diese Partien grenzt sich das anliegende gesunde Stroma durch eine Rundzelleninfiltration ab; Deciduazellen gelangen hier nirgends mehr zur Beobachtung. Die Bindegewebsfasern sind streckenweise so stark durch den Bluterguss auseinandergedrängt, dass z. B. an der beschriebenen Stelle eine Arterie isolirt in dem Extravasate und in nur noch spärlichen Stromafasermaschen lag, welche hyalin entartet waren und noch einige Rundzellen enthielten.

Die Choriongewebe liegen meist als freie, zum grossen Theile nekrotisierte Zotten auf den zum grössten Theil schon degenerierten Deciduagewebsresten, seltener innerhalb der Letzteren, welche als theils durchblutetes, theils nekrotisches, theils regenerirtes, oft aber auch als altes ziemlich straffes Bindegewebe der Deciduazellen selbst schon wieder entbehren und die Zotten mit ihren fibrösen Zügen vielfach umklammern.

Hier und da finden wir noch einen unversehrten einschichtigen Protoplasmasaum die freien wie die eingelagerten Zotten umgeben, obwohl deren centrales Bindegewebe völlig in kernloses Schleimgewebe oder wenigstens in ein spindelzellarmes fibröses Gewebe umgewandelt ist. Die nekrotischen wie die noch gut färbbaren Zotten sind gefässlos, — einige enthalten obturirte Gefässe; sie sind also seither trotz der subchorial fortschreitenden Coagulationsnekrose von den mütterlichen Geweben weiter ernährt worden. Während der Protoplasmasaum auch schon hier und da coagulirt ist, hat derselbe an anderen Stellen noch vielkernige syncytiale Sprossen als Ausläufer der spitzeren Enden einiger Zotten. Die intervillösen Räume sind theilweise im Anschlusse an die unmittelbare Nekrose der decidualen Gewebe mit hämorrhagischem Fibrin gefüllt, mehr distal sind sie aber leer.

Die Blutextravasate befinden sich also im gesunden Schleimhaut-

gewebe unter dem grösstentheils nekrotischen subchorialen; sie heben diese ganzen Decidua-Chorion-Massen von dem gesunden, bereits regenerirten Schleimhautstroma ab. Wo das Blut dieselben abgehoben hat, stürzt es in das freie Uteruslumen hinein, und zwar liegen die Prädi-
 lectionsstellen hierfür meist unmittelbar neben der Tunica propria der Drüseneinsenkungen.

Das Ergebniss des Falles ist also: Der hypoplastische Uterus, der seine Frucht wiederholt in den ersten Monaten ausgestossen hatte, löst bei rechtzeitiger Geburt die dünne und mürbe Placenta von seiner Hinterwand (nicht etwa aus einer Tubenecke) und zwar nicht wie gewöhnlich in der spongiösen Deciduaschicht, sondern weiter ausserhalb derart, dass noch flächenhaft eine schmale Platte von Chorionzotten an der Ersteren zurückbleibt, welcher Befund sowohl makroskopisch sofort wie mikroskopisch noch nach über 4 Wochen per abrasionem festzustellen war. Eine Entzündung hat nie vorgelegen.

Unter den zum grössten Theile hyalin degenerirten Decidua- und direct anhaftenden Chorionschichten waren reichlichere ältere und frische Blutungen zu Stande gekommen, die stellenweise jene abgehoben hatten und dadurch zu wiederholten geringeren Genitalblutungen und zuletzt zu einer profusen Metrorrhagie geführt hatten, und zwar wie sich später herausstellte, an dem ersten Periodentermine post partum. Unter dem Drucke der noch eingeschlossenen Stromablutungen waren die Fasern in den tiefergelegenen Schleimhautschichten weit auseinandergedrängt oder durch Coagulationsnekrose zu Grunde gegangen, sodass die Drüse und Gefässe stellenweise sogar isolirt wurden. Im Uebrigen lassen sich die Hämorrhagien zum Theile eben so gut als durch die deciduale Coagulationsnekrose entstanden ansehen, sodass bei den Erscheinungen eine gemeinsame Ursache zu Grunde liegt.

Besonders auffallend war es, dass noch nach über 4 Wochen post partum nicht nur Deciduainseln, sondern vor Allen auch Zotten sehr gut färbbar erhalten waren und dass alle Zotten gefässlos waren oder (seltener) obturirte Gefässe enthielten.

Zu bemerken ist noch, dass in den Schabpartikeln nur compacte Partien ehemaliger Decidua zu finden sind, und dass die Placenta auffallend dünn und mürbe war und einen Defect insofern aufwies, als die glänzende Deciduaschicht auf der maternen Fläche fehlte. Diese ganz compacte subchoriale Decidua bot als weiteren hervorzuhebenden Befund neben den hyalinen Fasermassen reichliche breite fibröse Bindegewebszüge, die unzweifelhaft schon

in der Schwangerschaft vorhanden waren, kein eigentliches Entzündungsproduct darstellten und sich reichlich verzweigt, zwischen die Zotten erstreckten und mit diesen, besonders mit den „Haftzotten“, in innigste Verbindung traten.

Der hypoplastische Uterus war also offenbar nicht im Stande, eine völlig normale Decidua serotina zu schaffen, wodurch Anfangs das Absterben der Früchte, später die ungewöhnliche Lösung der Placenta ausserhalb der zu dünn und fibrös angelegten und zu früh und ausgedehnt der Coagulationsnekrose verfallenden Serotina, endlich die Blutergüsse unter die zurückgebliebenen, massiven, zum Theil fibrösen, zum Theil ausgedehnt nekrotisirten Deciduaschichten zu Stande gekommen waren.

Der Lösungsmodus der Placenta erinnert dadurch an denjenigen embryonalen oder frühfötaler Eier!

Drei auf den ersten Blick von dem Geschilderten anscheinend verschiedene Fälle lassen sich auf die gleiche Ursache zurückführen. Bei diesen dreien und den ihnen gleichen weiteren Beobachtungen handelte es sich stets um dieselbe anatomische Basis: um primär hypoplastische Uteri und die gleichen Schwangerschaftserscheinungen: wiederholte Aborte, Anomalien in der Placentarstructur, postpuerperale Störungen, d. h. bald profuse Metrorrhagien (nach Aborten wie auch besonders auffallenderweise nach rechtzeitigen Niederkünften), bald langdauernde Amenorrhoe (ohne Hyperinvolutio uteri und ohne Laktation). — Beides zu Folge des beschriebenen abnormen Lösungsmodus der ausgedehnt fibrinös-nekrotischen Serotina.

Der zweite Fall betraf gleichfalls eine sehr zarte junge Frau, bei der die erste Schwangerschaft unter schwachen langdauernden Blutungen mit Fehlgeburt endigte, die zweite mit den gleichen Begleiterscheinungen schliesslich unter so profusen Blutungen zur Frühgeburt führte, dass ich, den vorliegenden Eihautpol mit dicken Zottenmassen bedeckt findend, dieselben mit der Hand durchbohrte und das Köpfchen packte und durch den Muttermund hinab in die Scheide leitete. Das frühgeborene, aber gleichwohl auffallend atrophische Kind lebte und ging erst älter als ein Jahr zu Grunde.

Die manuell extrahirten Eitheile — von Placenta konnte man nicht reden — trugen den Form- und Structur-Charakter eines Eies vor dem IV. Monate: sie waren nirgends zu einem typischen „Kuchen“ entwickelt, vielmehr rings umgeben von einem überall gleichmässig dicken, aber nirgends mehr oder weniger massiven Zottengewebe, welches noch mürber war, als bei dem vorigen Falle, und in noch höherem Grade die einheitliche Loslösung von der Decidua serotina vermissen liess (Placenta membranacea). Gestalt und Loslösung des Eies trugen unverkennbar die Eigenthümlichkeit eines embryonalen oder frühfötales Eies! (Vergl. Taf. III.)

Bei einer späteren Untersuchung erwies sich der Uterus retroponirt, ziemlich stark anteflectirt und von recht mässigen Dimensionen, sodass er noch immer nicht ganz über sein ursprünglich hypoplastisches Niveau hinaufgewachsen angesehen werden musste.

Nachdem die Pat. sich unter energischen Hochgebirgscuren und weiterer zweckdienlicher Lebensweise vorzüglich erholt hatte, begann ca. 1½ Jahre später eine neue Schwangerschaft im 3. Monate mit denselben Blutungen. Nun wurde eine consequente Liegecur bis zur rechtzeitigen Niederkunft durchgeführt; da die Wehen schliesslich wirkungslos und die Pat. erschöpft war, wurde das Kind durch Zange entwickelt. Die Nachgeburtsperiode und die Nachgeburt brachten nichts Besonderes. Im Puerperium bildeten sich Phlebothrombosen — offenbar eine Folge der schwachen Constitution und der heroischen 6 monatigen Liegecur, während der die Blutungen sistirten, aber beim Aufstehen wieder begannen, — welche nach 3 Wochen zu einer kleinen Embolie mit glücklichem Ausgange führten.

Der im vorigen Falle bereits angenommene embryonale Charakter des Eiaufbaues mit einem entsprechenden Lösungsmodus bei der fast oder völlig rechtzeitigen Niederkunft aus einem hypoplastischen Uterus wird hier durch ein in dem Ernährungssubstrat seiner Häute bis nahezu zur Reifeentwicklung des Fötus völlig gehemmt Ei in vollkommener Weise illustriert (Placenta membranacea). Dass der Ernährungsboden thatsächlich mangelhaft beschaffen war, beweist der atrophische Zustand des frühgeborenen Kindes. Die primäre Ursache liegt natürlich auch nicht in der Eibildung als solcher, — diese ist selbst Folge — sondern in dem hypoplastischen Zustande des Fruchthalters und seiner Gefässversorgung. A priori ist die Annahme, dass es sich nicht etwa um ein Persistiren der allseitigen embryonalen Zotten, sondern um ein späteres Hinaufwachsen desselben auf die Circumflexa von der Serotina aus handelt, die wahrscheinlichere, und zwar als Folge der mangelhaften Entwicklung der Serotina.

Im ersten Falle sahen wir die ersten Menses nach Sprengung der retinirten nekrotischen Decidua- und Chorionschichten fast 5 Wochen post partum in starker Weise auftreten; die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass der Fremdkörperreiz der zurückgehaltenen Eischicht, welcher neben Contractionen auch Hyperämie auslöst, eine Ueberfüllung der mucösen und submucösen Capillaren zu Wege gebracht hatte, welche nicht nur ein weit ausgedehntes menstruelles Hämatom mit hohem Druck unter den hyalinen Schichten gesprengt hatte und bei der Plötzlichkeit des Vorganges mit dem hohen vorhandenen Druck das Hämatom nach aussen ergossen, sondern auch den nachrückenden vollen Blutstrom mitgeleitet hatte.

Analoge Vorgänge beobachten wir bei jeder Retention von Abortresten auch. Die Innehaltung des Periodentermines, — verschiedener sogar, die einander in regelmässigen 4 wöchigen Intervallen folgen — lässt sich bei der Retention von ganzen Abortiv-eiern, bei der sogenannten missed abortion, feststellen. Ich beschrieb einen solchen Fall: Ein im 3. Monate abgestorbenes Ei wird ein Jahr später unter heftiger Blutung ausgestossen, nachdem seit 3 Monaten in 4 wöchigen Zwischenräumen 3 mal heftige „Periodenblutungen“ mit Schmerzen bzw. Wehen aufgetreten waren.

Wie in dem letzterwähnten Falle, so lässt sich gerade bei hypoplastischen Uteri, die ja auch häufig an Wehenatonie und Inertia uteri bei der Geburtsarbeit laboriren, a priori ganz gut vorstellen, dass der erwähnte Reiz der retinirten nekrotischen Deciduaschicht ungenügend beantwortet wurde und dass die Letztere, wie jenes retinirte ganze Ei, unter Ausbleiben einer Demarcationslinie erst nach einem langen Zwischenraume zur Ausstossung gelangte.

Einen solchen Fall habe ich vor Kurzem ebenfalls beobachtet.

Eine Pluripara ist, wie nach der vorletzten Entbindung, so auch nach der letzten, vor 9 Monaten stattgehabten Niederkunft lange, sogar stationär, in Behandlung eines Nervenarztes gewesen, weil sie beide Male an epileptiformen Anfällen gelitten hat, die sich in nahezu regelmässig vierwöchigen Intervallen spontan wiederholten. Beide Male blieb die Periode ohne ersichtlichen Grund (die Pat. stillte nie) monatelang aus: beim 1. Male 11 Monate und dieses Mal 9 Monate lang bis zu dem Momente der Vorstellung bei mir. Da sie früher und sonst nie an solchen Anfällen gelitten hat, vermuthet sie selbst einen Zusammenhang zwischen dem Ausbleiben der Regel und jenen Anfällen, zumal die neurologische Behandlung keine Aenderung gebracht hat.

Die Untersuchung brachte vor Allem den wichtigen Befund, dass keine Hyperinvolution der Genitalien, insbesondere nicht des Uterus und der Ovarien bestand. Da wiederholtes Sondiren keine Blutung brachte, legte ich wiederholt hintereinander Laminariastifte ein und curetirtirte zuletzt, worauf erst eine mehrtägige mässige Blutung erschien! Während dieser Behandlung traten trotz gleichzeitiger Darreichung von Alkal. bromat. mehrere Anfälle auf, die dann Wochen lang fortblieben und erst wiederkamen, als die nächsten Menses nur spärlich erschienen, aber wieder verschwanden, als jetzt eine einfache Sondirung in der Sprechstunde genügte, die Blutung zu provoziren. Die späteren Menstrualblutungen traten spontan und regelmässig auf. Die Pat. blieb gesund.

Da ich aus der ganzen Behandlung den Eindruck gewann, dass die ausgeschabten Massen die — wenn auch nicht alleinige, so doch wesentlich mit betheiligte — Veranlassung für das wiederholte postpuerperale Ausbleiben der Menstrualblutungen bis zu fast

einem Jahre, sogar gegenüber der Sonde, abgegeben hatten, so schien mir die mikroskopische Untersuchung besonders wichtig.

Die Massen bestanden aus einem dicken und dichten Fibringefaser, welchem vorwiegend Rundzellen in grossen Mengen, mit verschiedener Dichtigkeit eingelagert waren. Erythrocyten wurden nur an ganz vereinzelt Stellen und auch da sehr spärlich gefunden. Von Oberflächenepithel war nichts zu finden. Wohl aber muss sich unter diesen Fibrinmassen eine blutungsfähige Schleimhautschicht befunden haben; denn es blutete ein paar Tage, wenn auch nur mässig, nachdem jene Fibrinmassen abgeräumt waren. (Taf. II, Fig. 4b.)

Die Fibrinstructur war auch keineswegs wirr und formlos, sie gewährte vollkommen durch bald circuläre, bald röhren- (gefäss-) förmige Längsrichtung den Eindruck, als ob sie sich in ihrem Aufbau eng an ein organisches functionirendes Gewebe anlehnte; sie gab in der That die Form und den Bau eines subepithelialen Schleimhautgewebes wieder und enthielt streckenweise sogar Spindel- und Muskelfaserzellen, so dass man auch aus diesem Grunde das Fehlen einer Epithelschicht anzunehmen veranlasst wird. Vereinzelt sind Drüsenlumina mit kuboidem Epithel zu sehen.

Ich vermuthe im Anschlusse an die oben beschriebenen Bilder nekrotischer Gewebsschichten, welche von fibrinisirten Hämorrhagien durchsetzt sind, dass es sich hier gleichfalls um solche handelt, dass also in diesen Membranen hyalines Gewebe steckt, welches von Coagulationsfibrin, wie wir es nicht nur durch Hämorrhagien, sondern auch aus dem degenerirenden Stroma und Protoplasma deciduärer Zellen entstehen gesehen haben — auf das Innigste durchsetzt ist!

Vergleicht man, um zu einer Erklärung zu kommen, diesen Fall mit dem ersten und vergleicht man die vielmonatige Differenz der postpuerperalen Zeiträume beider, so lässt sich folgende Annahme wohl vertheidigen: gelingt es bei geringer Hyperämie und geringem Blutdrucke den Schleimhauthämatomen nicht, die nekrotischen Deciduaschichten abzuheben und das Blut nach aussen zu ergiessen, so wandeln sich die kleinen Hämatome, wie das an unserem ersten Präparate hinsichtlich der älteren Blutmassen auch zu sehen war, mehr und mehr in Fibrin um, während die Erythrocyten und deren Detritus resorbirt wird. Sind dann endlich die Eirestnekrosen abgestossen, wozu einzelne subchoriale Blutungen und vor allem die Bildung einer demarkirenden Rundzellenzone beitragen, so liegt eine Zeitlang jene nicht unerheblich dicke Fibrinschicht als eine Alles obturirende Decke auf der Schleimhaut! Voraussetzung ist natürlich immer eine geringe Menstrualhyperämie bei Genitalhypoplasie.

Allmählig hat sich aber seitens der tieferen Schleimhautpartien eine Reactionsschicht gegen den deckenden Fremdkörper gebildet und die Leukocyten wandern, da eine scharfe Demarcation fehlt, massenhaft in die Fibrinlagen ein. In diesem Stadium, d. h. noch vor der spontanen Lockerung und Losstossung, wurde diese Deckschicht von mir entfernt. Nach dem vorhergehenden Wochenbette hatte sie sich endlich einige Monate später spontan abgestossen.

Dieses Bild ist uns aus der Pathologie der Dysmenorrhoea membranacea bereits bekannt, aber ohne, soweit mir bekannt, seither eine Deutung erfahren zu haben, — ich meine jene eine Form, welche Schönheimer als „Endometritis menstrualis fibrinosa“ gesondert benennen zu müssen glaubte, wenngleich darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass bei bestimmten Individuen die verschiedenen seither bekannten Bilder dysmenorrhoeischer Membranen bei den verschiedenen Perioden auftreten können, und darunter auch diese fibrinöse Form zur Beobachtung gelangt ist. Die jeweilige Frische der Rundzellen deutet darauf hin, dass der ganze Process ein mit der betreffenden Menstruation selbst verlaufener ist. Jedenfalls ist in den einschlägigen Fällen seither keine Beobachtung durch Schleimhautgewinnung gemacht worden, wie die Oberfläche des Endometrium unter der Fibrinauflagerung beschaffen ist und wie das Epithel und die Drüsenmündungen sowie das Stratum subepitheliale sich verhalten. In meinem Falle brachte die Ausschabung trotz der Dicke der abgeschabten Stücke kein Cylinder-epithel zu Tage. Die von Löhlein während der Intermenstrualzeit curettirten Fälle von Endometritis exfoliativa ergaben zwar eine völlig normale Schleimhaut, aber es handelte sich hier nie um Fibrinmembranen!

Es wäre in analoger Beobachtung zu meinem postpuerperalen Amenorrhoeefalle von vornherein ganz gut denkbar, dass auch bei Dysmenorrhoea fibrinosa das Fibrinexsudat nach Loslösung des Epithels von der vorigen Menstruation, die Leukocytenwanderung hingegen von der jetzigen Periode herrührte; es ist auch sonst schwer erklärlich, warum dem Fibrin keine rothen Blutkörperchen beigemischt sind, wenn der Process ein eben vor sich gegangener ist.

Wenn ich angesichts der geschilderten beiden postpuerperalen Fälle den Schlusssatz dahin formulirt habe, dass bei den hypoplastischen Uteri seltener die ganze Eieinnistung, wohl aber Andeutungen derselben und nicht seltener der Lösungsmodus den-

jenigen eines frühmonatigen Abortiveies analog seien, so würde es nicht unlogisch sein, wenn wir umgekehrt mit den Gewebebildern jener ersten Fälle diejenigen von Abortiveiern in Parallele setzen. Ich gebe deshalb hier zum Vergleiche die mikroskopischen Bilder von 4 Stadien wieder, wobei ich bemerke, dass das 2., zum Theil auch noch das 3., unserem Eingangs zuerst geschilderten Falle entsprechen.

Das 1. Bild zeigt uns die Decidua vera eines frischen acuten Abortus (Blutung nach Trauma) im ersten Schwangerschaftsmonate. (Taf. I, Fig. 1; vgl. auch spätere Abbildungen des Endometrium abortirender hypoplastischer Uteri in dies. Arch.)

Wir sehen in klarer Anordnung die Deciduaellen, stellenweise durch Transsudat oder auch durch kleine Hämorrhagien auseinandergedrängt, das Oberflächenepithel völlig intact bis auf wenige Stellen, an denen die subepithelialen Hämatoeme zu Tage getreten sind, die Drüsenquerschnitte hyperplastisch vergrößert mit colossalem, schön erhaltenem Cylinderepithel; — nur an wenigen Stellen, die von Hämorrhagien und Transsudat durchsetzt sind und wo das Blut sich nach aussen ergossen hat, haben Cylinderzellen mitsamt dem Stroma ihre Färbbarkeit und ihre scharfen Conturen verloren, wohingegen die Umgebung gegen diesen nekrotischen Herd durch eine reichliche Rundzelleninfiltration abgegrenzt ist. Am deutlichsten ist dieser Vorgang an solchen Stellen erkennbar, wo die aus dem Stromainnern sich nach aussen ergiessende Blutmenge bereits von Fibrinmassen, und zwar in der Längsrichtung nach aussen, durchzogen ist.

Hier haben wir also den Beginn der oberflächlichen, mit Transsudation, Hämorrhagien und limitirender Rundzelleninfiltration einhergehenden Nekrose der Decidua vera bei frischem Abortus.

Das 2. Bild führt uns einen Theil der puerperal gewordenen Decidua serotina vor, deren noch anhaftende Chorionreste eines dreimonatigen Abortiveies zum Theil ziemlich gut erhalten, zum Theil bereits nekrotisirt sind und deren bereits in der Regeneration begriffenes Endometrium gegen erstere eine deutliche, aber nicht gleichmässig continuirliche Demarcationsschicht durch Rundzelleninfiltration gebildet hat, sowohl in der subchorialen Fläche, als auch längs der zwischen die Zotten hineinragenden auffallend breiten und massiven Stromazapfen. In diesem Stadium (4 Wochen post abortum) waren profuse Metrorrhagien aufgetreten. (Taf. II, Fig. 1, 3, 4a.)

Es lassen sich im Schleimhautstroma keine Decidualzellen mehr auffinden; es ist ein neues, von Rundzellen reich durchsetztes Schleimhautgewebe entstanden, auf welchem nekrotische theils schollige, theils faserige, theils feinkörnige Massen aufgelagert sind. Letztere sind reichlich durchsetzt von älteren und frischen Hämorrhagien, die nach

dem Alter der Blutung und durch die ursprünglichen Gewebsgrenzen mit ihrer Fibrinfaserung schichtenweise gegen einander abgegrenzt sind. Hier und da finden sich inselweise in einer und derselben Uebergangsschicht guterhaltene Drüsenquerschnitte und in Degeneration begriffene kleine Anhäufungen deciduärer Zellen. Noch weiter gegen die Oberfläche hin befinden sich in den fibrinisirten und hämorrhagischen Deckschichten Chorionzotten, welche grösstentheils, obwohl gefässlos, doch noch gut erhalten sind, zum Theil aber auch schon ganz oder theilweise zu verfallen beginnen. (Taf. II, Fig. 4a, vergl. auch Taf. I, Fig. 1.)

Zwischen den beiden letztbeschriebenen Schichten giebt es scharf begrenzte Fibrinmassen, welche im Längscentrum reichlich grosse und Rundzellen führen und an der Spitze von sich regenerirenden Stromazapfen liegen, und zwar derart, dass sie nach Contur und Faserstructur unmerklich ihre Tinction ändernd, in jene übergeben. Es handelt sich nicht um gewöhnliche Blutcoagulationen, sondern um Decidualgewebe, welches in Coagulationsnekrose begriffen ist. Diese auffallend breiten und massiven Balken und Zapfen umklammern zum Theil die Chorionzotten, theils sind sie mit ihnen verschmolzen und weisen so den Uebergang von deciduellen Septen in die Haftzotten. (Taf. II. Fig. 3 Ne.)

Vereinzelt findet man trefflich erhalten, hochzellige Drüsenquerschnitte und ziemlich dickwandige Blutgefässe scheinbar isolirt innerhalb dieser nekrotischen Massen. Sämmtliche noch vital intacte Decidualgewebe, auch diejenigen, die sich, zum Theil von nekrotischen Massen umgeben, weit zwischen die Zotten erstrecken, sind mit Rundzellen reichlichst, aber ungleichmässig, je nach der Beschaffenheit der Blutgefässe, infiltrirt. Die Zotten tragen hier und da dunkel tingirte Syncytium-Sprossen und -Bänder; am äusseren Rande erblassen deren Kerne da, wo sie dem Fibrine anliegen. (Taf. II, Fig. 3 Reg. De.)

Das 3. Bild entstammt dem Frühabortsfalle eines hypoplastischen descendirten Uterus; es folgten dreiwöchige Metrorrhagien. Chorionreste waren nicht mehr nachweisbar; auch keine Deciduazellen. (Taf. II, Fig. 1 rechts unten.)

Zwischen den Drüsen finden sich, auf dem im Allgemeinen ausserordentlich rundzellenreichen Stroma aufsitzend, nekrotische und hämorrhagische Bindegewebspartien; auch hier fehlt das Deckepithel mitsamt einer wohlorganisirten oberen Schleimhautschicht, von der nur verhältnissmässig wenige Drüsenquerschnitte innerhalb jener nekrotischen und hämorrhagischen Massen liegen. Zum Theil sehen wir frische Hämorrhagien aus den tieferen Schleimhautschichten hervorquellen und die nekrotischen oberflächlichen Schichten ablösen.

Ich muss hinzufügen, dass dieser Befund einer in ihrer oberen Schicht noch nicht regenerirten Schleimhaut nur circumscripirt, und zwar über einem haselnussgrossen subserösen Fibromyome zu erheben war.

Das 4. Bild lässt uns nach achtwöchigen Metrorrhagien im Anschlusse an einen Frühabortus eine noch unentchiedene, theilweise durch circumscripirt Rundzelleninfiltration hochgradige, theilweise fehlende, jedenfalls nicht im Ganzen scharf be-

grenzte oder continuirlich fortgesetzte Demarcation und Abstossungsreaction seitens der sich regenerirenden Schleimhaut erkennen, so dass die Hauptmasse der degenerirten Decidua, freilich nach Abstossung der meisten Chorionmassen, aber unter Zurückbehaltung einiger freier nekrotischer Zotten und ohne Ersatz des Oberflächenepithels und der Drüsen, noch haften geblieben ist. Dieses Bild 4 ergänzt 1 und 3. (Taf. I, Fig. 2.)

Das vorwiegend grosszellige, aber schwach gefärbte Deciduagewebe entbehrt noch fast ganz der Drüsen bis auf einen kleinen rundlichen Querschnitt mit Cylinderepithel. Die Oberfläche ist theils kleinzellig infiltrirtes Fasergewebe, theils ganz hyalin entartet, theils fibrinös-nekrotisch und mit abgestorbenen Zotten spärlich besetzt. Die Gefässe sind stark erweitert und auffallend dünnwandig; nicht selten sind sie von älteren Blutaustritten umgeben. Die subchorial gelegenen Gefässe sind theils obliterirt, theils organisirt-thrombosirt. Die in das deciduale Gewebe eingedrungenen Zotten, welche die deutlich contourirte Langers'sche Zellschicht mit sich führen, sind, je tiefer sie eingelagert sind, desto besser erhalten. Wo die Deciduazellschichten an fibrilläre Gewebsschichten anstossen, erregen sie eine intensive kleinzellige Infiltration mit Einlagerung der Riesenzellen. Frische Hämorrhagien sind im Gewebe spärlich enthalten; eine solche umgibt eine gut gefärbte Drüse.

Das 5. Bild lässt schon 10 Tage nach einem 2 $\frac{1}{2}$ -monatigen Abortus, welcher von andauernden Metrorrhagien gefolgt war, keine Eireste und keine Deciduazellen mehr erkennen. (Taf. II, Fig. 2.)

Das Oberflächenepithel fehlt auch hier und statt seiner überzieht ein körniges Exsudat das hier mässig rundzellenreiche Stroma mitsamt den Buchten der klaffenden Drüsen. An einigen Stellen tieferer Defecte mischen sich faserig-nekrotische Massen mit dem körnigen Exsudate und dringen dann, reichlich umgeben und durchsetzt von Rundzellen und Leukocyten in das Stroma ein, und zwar in eine Schicht, welche besonders reich an noch mannigfach ausgebuchteten Drüsen ist; wir befinden uns hier in dem Stratum spongiosum. Diese ganze Schicht ist im Stadium lebhafter Regeneration. Hier und da stossen wir auf ältere kleinere Blutaustritte im Stroma, wie in den Drüsenlumina. In der Tiefe endlich wechseln rund- und spindelzellenreiche Partien mit einander ab. Hier sind die Drüsenquerschnitte auch wieder einfach rundlich. Als Nebenbefund ist die Dickwandigkeit der Gefässe zu erwähnen.

Dieses oberflächliche körnige Exsudat konnten wir in geeigneten Schnitten des Bildes 2 bereits als aus zu Grunde gegangenem Deciduastroma und Deciduazellprotoplasma entstanden schrittweise nachweisen. (Taf. I, Fig. 2. und Taf. II, Fig. 3.)

Vergleichen wir die Situationsbilder dieser 5 Fälle unter einander, und ferner mit dem zuerst beschriebenen postpuerperalen Metrorrhagiefalle, so fällt die Analogie von Bild 2 und 4 (retinirten Abortresten) mit dem Bilde der retinirten Placentarreste im hypoplasti-

sehen Uterus auf. Hier wie dort eine tiefe, in Regeneration begriffene Schleimhautschicht, aus der sich capilläre Blutungen unter die noch fest anhaftende Schicht nekrotisch-fibrinösen und von älteren fibrinisirten Hämorrhagien durchzogenen Deciduagewebes ergiessen. In derselben befinden sich neben hyalin zu Grunde gegangenen Arterien gut erhaltene Drüsenquerschnitte, welche mit massigen fibrösen Stromazapfen zusammenhängen, die aus der Tiefe sich in und durch diese nekrotische obere Schicht hinauf erstrecken und reactiv reichlich mit Rundzellen infiltrirt sind. An einzelnen Stellen durchbrechen die capillären Blutungen diese nekrotische Deciduaschicht und heben die oberste aus zum Theil noch gut erhaltenen Chorionzotten bestehende Schicht partienweise ab (Taf. I, Fig. 3); wo dieses noch nicht gelingt, lockern sie sie; kommt dann bald ein neuer Nachschub von Blut, so löst dieser die Schicht; unterbleibt ein solcher aber, so gerinnt die Blutsäule und unterstützt sogar das Festhaften dieser Schicht!

Ist diese oberste Chorionschicht nicht abgestossen, so geschieht mit der zweiten, der nekrotischen Deciduaschicht das Gleiche (vergl. Taf. I, Fig. 1 u. 2); die freie Blutung ist bei der directen Loslösung der nekrotischen Schichten eine heftige; diese Losstossung von nekrotischen Geweben oder von fibrinisirten Pfröpfen vorhergegangener Hämorrhagien „auf den ersten Anhieb“ sind es, welche profuse Blutungen, wie in dem eingangs beschriebenen Falle zu Stande kommen lassen!

Sind die Blutextravasate nicht so stark, dass sie die anhaftenden nekrotischen Gewebsschichten abheben und fortstossen können, so wird die Lockerung allmählig durch reactive Rundzelleninfiltration seitens der tieferen, den nekrotischen und den fibrinisirten Schichten anliegenden, intacten Schleimhautschichten besorgt; Theile der Letzteren schieben sich, wie schon erwähnt, säulenartig zwischen die nekrotischen Theile hinauf oder bleiben, gut vascularisirt oder mit rascher Umwandlung der Deciduazellen in Rundzellengewebe, daselbst erhalten; ihrer Lage entsprechend sind diese Zapfen stets reichlich mit Rundzellen infiltrirt; von ihnen aus geschieht schon früher, als von dem allgemeinen Niveau der tiefen Schleimhautschicht, eine starke Einwanderung von Leukocyten und Rundzellen in die fibrinisirten Schichten hinein. (Taf. I, Fig. 2; Taf. II, Fig. 3.)

Die Gründe, warum die Abhebung der nekrotischen Massen und das Entstehen der Rundzellendemarcation so langsam zu Stande kommen, sind die Gleichen, welche die Nekrose-Processse mit

solcher Ausdehnung und Stärke zu Wege gebracht haben. Diese Gründe lassen sich, wie wir gleich bei der Besprechung der extra-graviden Schleimhaut solcher hypoplastischer Uteri sehen werden, aus dem Mangel sowohl an stützender, eiaufnehmender Stroma-structur als auch an genügend kräftigen Blutgefässen innerhalb der letzteren erklären!

Zunächst noch führt uns die Betrachtung der Bilder der Deciduae verae zu der Erkenntniss der Analogie derselben mit dem geschilderten Serotinaaufbau; sie sind dadurch vereinfacht, dass es sich hier nur um eine z. T. nekrotische Schicht handelt (Taf. II, Fig 1—3), die noch zudem reicher an bleibenden, d. h. sich rasch in Rundzellengewebe umwandelnden Partien ist.

Damit ist der Nachweis geliefert, dass nicht nur die makroskopische Structur der Eihäute ausgetragener Früchte und besonders deren Zottenmassengruppirung bei Hypoplasie des Fruchthalters an die gleichen bei jungen Abortivova erinnert, sondern dass auch der Lösungsmodus der Placenten bei rechtzeitigen Geburten aus hypoplastischen Fruchthaltern demjenigen junger Abortiveier analog ist, d. h. dass eine glatte Lösung innerhalb der Serotina auch ohne vorhergehende Endometritis öfters nicht erfolgt.

Die Ursache also liegt in der mangelhaften Entwicklung und Vascularisirung des Endometrium hypoplastischer Uteri. Nach meinen in einer weiteren Arbeit ausführlich wiederzugebenden Untersuchungen haben diese Endometrien verschiedener Fälle keineswegs stets denselben Mangel; ihre Structur ist von vornherein, d. h. bei Virgines, jungen Frauen ante conceptionem, verschieden! Es giebt dünne gefässarme und drüsenarme Schleimhäute und andererseits wieder schwammige, leicht in langen Streifen abschabbare, deren histologische Bilder der Diagnose Endometritis glandularis bis zur cystica entsprechen, obwohl von einer Entzündung im bakteriellen Sinne hier keine Rede ist, wie denn auch das Stroma und die Gefässe keinerlei Reizerscheinungen aufweisen; vielmehr gleicht die Schleimhaut einem „flächenhaften Schleimpolypengewebe.“ Die zweitgenannte Form neigt sogar ganz besonders zur Sterilität wie zu (sogar wiederholten) Aborten, bis endlich eine Reifegeburt erfolgt. Die Neigung zu Recidiven dieser Schleimhautbildung ist trotz Abortus und trotz Abrasio mucosae gross, wenn nicht noch andere Maassregeln getroffen werden, wovon ein anderes Mal.

Hervorgehoben soll hier nur noch werden, dass in der nicht

graviden Schleimhaut die Gefässe auffallend dünnwandig sind und ausser ihrer Endothelauskleidung an dem ohnehin spärlichen und lockeren Bindegewebsstroma nur wenig Wandungsstütze finden, also zu Zerreissungen einerseits und zur Stromverlangsamung und zu Thrombosen besonders neigen!

Wenngleich also in der fehlerhaften Schleimhautstructur die primäre Ursache zu suchen ist, so sind hierdurch die abnormen Metamorphosen zur Eihautbildung und zur Eihautlösung zunächst noch nicht erklärt. Auch handelt es sich hierbei nicht nur um einen Weg der Anomalie.

Erstens geht aus der einfach-atrophischen Schleimhaut eine atrophische Decidua hervor, die entweder zum Abortus oder zur Bildung einer mehr oder weniger ausgeprägten allseitigen Placenta membranacea führt, deren Deciduastructur ein ausgeprägtes Stratum spongiosum ebenso fehlt, wie eine allseitige Deciduazellentwicklung; der Bindegewebsfaserreichtum einer solchen Decidua ist gegenüber dem gewöhnlichen Bilde einer Decidua ungemein reich und die in ihr lagernden Deciduazellen entsprechen weder an Form noch an Grösse des Protoplasmaleibes den gewöhnlichen; sie sind nicht strotzend. Die ganze Decidua ist dünn, nicht continuirlich massiv.

Zweitens geht aus der schwammigen glandulär-hypertrophischen Schleimhaut eine Decidua mit folgenden Eigenschaften hervor, welche im Grunde genommen und vor allem im Endeffect gleichfalls auf die Atrophie zurückkommen.

Hervorstechend ist die Neigung zu Blutungen in die anfangs an Bindegewebe arme und an stark ausgebuchteten und ausserordentlich vermehrten und vergrösserten Drüsen im Beginne reiche, total spongiöse Decidua, welche scheinbar nur noch aus glandulären Lumina und (in deren Stromaeinrahmungen) aus sehr dünnwandigen und weiten Gefässen und Kapillaren besteht. Die aus letzterem stammenden Blutextravate gerinnen, je näher den Verflechtungsschichten von Decidua und Chorion desto mehr, und bewirken so dreierlei:

1. Gefässthrombosen, 2. weitgehende Nekrosen der Decidua, und 3. fest adhäsive Umklammerungen der Zotten, die zum Theil ebenfalls schon früh zu Grunde gehen, soweit sie innerhalb nekrotisirender, Decidua liegen oder soweit der gerinnende Extravasateinbruch auch in die intervillösen Räume geschehen ist.

Mehr und mehr wird das schon ursprünglich spärlich vor-

handene Stroma der spongiösen Schicht in fibrinös-nekrotische Stränge und Geflechte umgewandelt, sodass es entweder zum Abortus, oder — falls die Ernährung eine genügende bleibt, wozu eine besonders grosse Flächenausdehnung der Zottenplacenta nach Art des erstbeschriebenen Falles beiträgt, — zur Lösung der Placenta in abnormer Schicht, d. h. nicht in der derbgewordenen spongiösen Schicht, sondern unter Zurücklassung der letzteren vorwiegend in der Zottenlage kommt, wodurch zahlreiche Zottenmassen in der nekrotischen und fibrinös-hämorrhagischen Zwischenschichtung hangen bleiben.

Diese deciduale Nekrobiose erklärt sich nur zum Theile aus den Blutextravasaten. Einen wesentlichen Antheil hat hieran die für die Ernährung sowohl in der Tiefe wie in der Fläche zu geringe Menge des für die deciduale Umwandlung geeigneten Stromas. Die massenhaften Drüsenräume aber collabiren zum grössten Theile, wie es an sich ja auch ein physiologischer Process ist; hier aber findet dadurch wiederum eine Schmälerung des decidualen Gebietes statt. Ein Theil der Drüsenräume nimmt schon frühzeitig extravasirtes Blut aus dem Stroma auf und wandelt sich dadurch in Fibrinklumpen um. Alles dieses vermehrt in den dünnwandigen Gefässen die Blutstauung, das Entstehen von Thrombosen. In dem Maasse aber, wie die Blutcirculation gestört wird, nimmt nicht nur die Nekrobiose zu, sondern die resorbirende und Leukocyten aussendende Fähigkeit der mütterlichen Gewebe, der basalen Serotina, ab!

Die Zotten, welche nur geringe Mengen interglandulären Decidualstromas antreffen, dringen rasch in die Tiefe bis an und zuweilen wohl auch bis in die Muscularis; die stehenbleibenden und mit den „Haftzotten“ gewöhnlich correspondirenden Pfeiler der Schleimhaut haben grösstenteils die Fähigkeit verloren, deciduale Zellen continuirlich hervorzubringen, — auch ist ihre Reaction hinsichtlich der Rundzelleninfiltration in gleichem Grade beeinträchtigt. Sie durchqueren vielmehr als breite, steife Platten, welche nur fibrös structurirt und von alten harten und kleinen spitzigen Spindelzellen gleichmässig durchzogen sind, das Gesichtsfeld; sie gewähren den Eindruck, als ob sie erst nach schweren Entzündungskämpfen sich diesen Platz dauernd errungen haben, und dass nunmehr jede stürmische Reaction hier in dem knapp ernährten und fast isolirten Gebiete unmöglich geworden sei.

Da diese meist in die „Haftzotten“ übergehenden decidualen

„Zapfen“ entweder derb-fibrös oder selbst bereits nekrotisch geworden sind, so tragen sie zur Adhärenz der chorialen Massen bei. Ihre Lage und ihre Nekrose ist aber sehr ungleichmässig, — die letztere betrifft gewöhnlich sogar nur einzelne Theile eines solchen Zapfens, — und ebenso ungleichmässig ist die Niveauhöhe der ganzen ausgedehnten nekrotischen Uebergangsschicht, der decidualen wie der chorialen Massen: es sind streckenweise wieder gesunde und nekrotische Gewebszüge und -Massen regellos und in verschiedener Niveauhöhe der Serotina wechselnd mit einander verfilzt, — erstere ohne Rundzellendemarkation und beide zusammen ausserdem noch wechselseitig aneinander haftend.

Das Resultat von allem diesem ist, dass sowohl die Continuität wie die Gleichmässigkeit der Demarcation, der reactiven Rundzelleninfiltration völlig mangelt, — wenigstens für eine lange Zeit, bis nämlich aus der Tiefe, aus der Muscularis und den ihr anhaftenden Schleimhautresten heraus eine genügende Vascularisation wieder hergestellt ist und dadurch ein energischer Rundzellenwall zu Stande kommt. Nicht nur werden also die nekrotischen Massen durch die fibrösen wie die fibrinösen Faserzüge adhärent gehalten, sondern es fehlen auch mit der zu Grunde gegangenen Vascularisation sowohl die Transsudation, wie die Blutextravasate und endlich die Rundzellentätigkeit, um für eine gewisse reactionslose Zeit jene „Fremdkörper“ abzustossen.

Die anfangs oberflächlichen, subchorialen Blutungen kommen schliesslich auch aus dem tieferen Theile der anfangs total spongiösen Decidua. Die Ursache auch dieser Blutungen sehe ich in der ausserordentlichen Dünnwandigkeit der zuführenden Gefässe, welche sowohl bei diesen, wie auch bei den Capillaren noch dadurch erhöht wird, dass das eigentliche Stroma so ausserordentlich gering zwischen den meisten Drüsen und Gefässen entwickelt ist. Dadurch bietet es einerseits dem Blutdrucke, der durch die Schwangerschaft vermehrt ist (wie auch schon sub mensibus), andererseits auch dem Vordringen des Syncytium einen um so geringeren Widerstand dar zur Unterstützung der eigentlichen Gefässwandung, also gegen den Austritt des Blutes wie auch gegen die Fortleitung des ausgetretenen Blutes in die Bindegewebslücken, wodurch es oft in die weiten Drüsenräume geräth. Zu diesen Factoren kommt die Rückstauung des Blutstromes aus den oberflächlichen thrombosirten Gefässen und nekrotisirten Deciduamassen, sowie die progressive

Zunahme der Nekrobiose seitens der, gegenüber den Chorion-sprossen ungenügenden, Decidua.

Die Wirkungen des Syncytium sind ja stets nekrobiotischer Natur, wenn auch in mässigeren Grenzen entsprechend der Widerstandskraft der Decidua, wie u. a. der bekannte, subchorial an der Grenze gelegene Nitabuch'sche Fibrinstreifen andeutet.

Dass bakteriell-entzündliche Processe gleiche Folgen mit gleichen weiteren Consequenzen und dazu noch die Bildung fibröser Stränge schaffen können (Adhärenz der Placenta), erwähne ich hier nur in dem Sinne als bekannt, dass derartige Processe in den von mir hier in Betracht gezogenen Fällen weder klinisch noch histologisch eine Rolle gespielt haben. Es handelte sich hier eben nur um uncomplicirte Fälle hypoplastischer Genitalien (auch ohne Nephritis und ohne Tuberculose). Von Anfang an bestand in der noch nicht schwangeren Gebärmutter keine Art der Entzündung, vielmehr gab es nur hypo- und dysplasische Zustände des Organs und speciell des Endometrium. Anders aber ist der Zustand aufzufassen, in den die Decidua durch die syncytialen und chorialen Massen versetzt wird; es handelt sich hier um biochemische Reactionen, welche auch ohne Bacteriotoxine typische Entzündungen hervorrufen. Die Reaction gegenüber den Blutgerinnungsmassen, die aus den mütterlichen Gefässen selbst stammen, rufen auf die Dauer die gleichen Erscheinungen in den umliegenden Geweben hervor. Einen reinen experimentellen Beweis geben hierfür die Versuche Arneth's, wonach Nuclein, Pepton u. a. im Blute selbst massenweise junge neutrophile Leukocyten herbeilocken, in Analogie zu der massenweisen Heranziehung junger Rundzellen in das Nachbargewebe zu Grunde gegangener Organtheile hinein und sogar bis in die zunächst liegenden nekrotischen und fibrinösen Massen hinein.

Immerhin bleibt hier also die durch das Eindringen des Chorions hervorgerufene Nekrose der insufficienten decidualen Gewebe die Veranlassung zu dem Eintreten der reactiven Entzündungserscheinungen; insufficient aber ist das spärliche und mangelhaft vascularisirte Gewebe der Decidua gegenüber den Stoffwechselvorgängen, die von den fötalen Geweben an der Grenze ausgelöst werden und die unter physiologischen Verhältnissen schon zu den Erscheinungen der partiellen Nekrosen und des subchorialen Nitabuch'schen Fibrinstreifens führen.

Auch im Blute der Schwangeren kennen wir analoge

Reactionen, die wir als von der placentären Grenzschicht durch Fortspülung fötaler Producte hervorgerufen ansehen müssen: die Hyperleukocytose und das in isotonischen Jodjodkalilösungen nachgewiesene progressive Auftreten der von mir als höher- und hochpotenzirt bezeichneten Erythrocytenformen, als welche sich die jungen Makro- und Mikrocyten darstellen.

Steht unsere Therapie den beschriebenen fehlerhaften Placentaranlagen und deren Folgen bei Hypoplasia uteri machtlos gegenüber? Keineswegs! Gerade die hier zur Schilderung gelangten histologischen Verhältnisse weisen uns in mancher Hinsicht klärend den Weg!

Prophylaktisch werden wir — bei guter Entwicklung der Eierstöcke zumal — durch Hervorrufung künstlicher Hyperämien der Genitalien deren Wachsthum anzuregen suchen, was in den meisten Fällen auch sowohl hinsichtlich der Blutzufuhr als auch hinsichtlich der messbaren Uteruslänge und -Maasse gelingt durch prolongirte intrauterine Laminaria- und Gazeeinführungen, mit fortgeführter Sondenbehandlung, heissen Vaginaldouchen, Sitzbädern, daneben Tonica. Ich verglich bereits früher diese „Heranzüchtung“ mit der analogen natürlichen „Selbsthülfe“ im Gefolge eines oder mehrerer Aborte, bis der Uterus endlich austrägt. Die Beseitigung der unregelmässigen, der oligo- und dysmenorrhoeischen, zuweilen aber auch menorrhagischen Menstruationen gewährt neben dem von Zeit zu Zeit genommenen Sondenmessbefunde einen gewissen Anhalt für die erzielten Fortschritte. Nur so, d. h. auf dem vasomotorisch-nutritorischen Wege, erkläre ich mir die nicht selten quoad dysmenorrhoeam günstigen Resultate der Intrauterinpassarien bei Antelexio uteri.

Nach den histologischen Schilderungen ist es verständlich, dass bestimmte Aborte zu Folge von Hypoplasia uteri unbedingt im späteren Reconvalescenzverlaufe ausgeschabt werden müssen, und zwar diejenigen, welche von länger andauernden Blutungen nach Ausstossung des anscheinend ganzen Eies gefolgt sind. Hier sind — auch ohne vorhergegangene Entzündungen — stets fötale Eihautreste in nekrotischen Deciduaesten oder nur letztere zurückgeblieben, welche, wie wir gesehen haben, die Regeneratio endometrii auf sogar Jahreslänge hintanhaltend und schwere Menstruations- und Allgemeinstörungen hervorrufen oder andererseits noch nach

Monatsfrist und länger zu lebensbedrohlichen Blutungen führen können.

Besteht hingegen nur ein andauernder blutiger Lochialfluss, so kann unser Vorgehen einem Zweifel unterliegen: entweder es sind noch thatsächlich nekrotische Partikel zurück oder wir haben es ohne dieselben mit einer schwammigen, glandulär-hypertrophischen Regenerationsmucosa zu thun.

Im letzteren Falle ist eine Abrasio mucosae meist direkt contraindicirt, weil gerade aus diesem Schwangerschaftsmateriale, welches bei frühen Aborten nicht der Nekrose in continuo verfällt, eine kräftigere, zum späteren Austragen der Frucht geeignete Schleimhaut hervorgeht; entweder wandeln sich, wie wir oben gesehen haben, die decidualen Reste der atrophischen Schleimhaut in mucöses Gewebe um oder die durch Compression seitens der decidualen und syncytialen Gewebe abgeflachten und nach Desquamation des Drüsenepithels verschmolzenen glandulären Lumina werden mit der Rückmetamorphose der decidualen Gewebe in Schleimhaut umgewandelt, so dass der glandulär-hypertrophische und zuweilen sogar cystische Charakter des Endometrium nach dem Abortus verschwunden ist.

Hat man eine solche etwas schwammige Decidua abgeschabt, so hinterbleibt gewöhnlich eine atrophische Schleimhaut, welche aufs Neue eine Fehlgeburt veranlasst; unterbleibt nunmehr eine weitere Ausschabung, so kommt es gewöhnlich zur Reifegeburt.

In zweifelhaften Fällen habe ich mich nach der Involution der ganzen Gebärmutter gerichtet und eine Ausschabung nur dann ausgeführt, wenn die erstere mangelhaft war. Immerhin hat man bei allen diesen Fällen mit der Ausschabung ganz besonders vorsichtig zu sein, niemals mit der scharfen Curette und niemals unter Anwendung eines starken Druckes; nicht etwa nur wegen der hier ganz besonders grossen Gefahr der Perforation der stets post abortum morschen Wand hypoplastischer Uteri, auch nicht nur deshalb, weil bei Letzteren die Zotten nicht selten bis zur und bis in die Muscularis vordringen, sondern mit der rationellen Absicht, nur die oberste Schicht der Decidua entfernen zu wollen! Von einem „Auskratzen“ darf gar keine Rede sein, nur von einem „Abschaben“; geätzt darf hinterher auch nicht werden; vorzüglich hingegen wirkt eine mehrtägige Tamponade mit Jodoformgaze.

In Fällen von Schwangerschaft nach bereits stattgehabten Fehlgeburten empfehle ich neben der consequent fortgeführten Bettruhe vor Allem die Hypophosphite, und zwar werden diese in

Tablettenform am zweckmässigsten dargereicht, aber Monate lang. Da es sich hier, wie wir gesehen haben, vor Allem um Hämorrhagien handelt, so glaube ich nach einigen Erfahrungen, die von den Franzosen übernommene und uns von Lomer wieder empfohlene Jodkali-(Natrium)Kur durchaus anrathen zu können, auch ohne die Absicht, antilueticisch behandeln zu wollen. Opiate halte ich in solchen Fällen für direkt verkehrt; wohl aber habe ich von Stypticin und Styptol Gutes gesehen. Bei Neigung zum Descensus uteri ist das Einlegen eines Pessarium entschieden erfolgreich; es muss aber länger als 4 Monate liegen bleiben.

Ist dann die Niederkunft rechtzeitig erfolgt, so bleiben solche ursprünglich hypoplastische Uteri leicht schlaff und voluminös; die Ursache liegt zum Theil in der geschilderten mangelhaften und erst in Monaten vollendeten Abstossung der Eirste, zum Theil aber auch in der Hypoplasie der Muscularis und der Gefässwandungen, wodurch vor Allem das relativ reichliche Bindegewebe oedematös bleibt. Die Lochien bleiben deswegen stark und lange blutig. Schon aus Gründen der Prophylaxe sollten von Anfang an grosse Dosen Secale fortdauernd gegeben werden.

Stärkere Blutungen von der zweiten Woche post partum ab sollten stets zum Eingehen in den gewöhnlich weiten Cervicalkanal und zur Entfernung gröberer flächenhafter oder polypöser Excrescenzen mit dem Finger und — zumal später — mittels stumpfer Curette auffordern, um so mehr, wenn die serotinale Fläche der Placenta bei der Ausstossung nicht spiegelnd gefunden wurde. Auch die erste Menstruation post partum ist zu überwachen.

Andererseits ist die lange dauernde Amenorrhoe post partum, welche nicht durch die gewöhnlichen Gründe erklärt werden kann, zumal wenn sie durch tiefergehende secundäre Störungen des allgemeinen Ernährungs- und Nervenzustandes complicirt ist (z. B. epileptiforme Anfälle), vor Allem auch local und zwar mittelst vorsichtiger Abrasio mucosae und nachfolgender mehrtägiger Tampnade und eventuell weiterer Sondentherapie zu behandeln. Sonst verlegt neben einer ungenügenden Menstrualhyperämie dieser Letzteren eine in der oberflächlichen Schicht statt des Epithels gelagerte restirende fibrinöse Schicht den Weg, bis endlich, oft erst nach Jahresfrist und bedeutendem Sinken des Allgemeinbefindens, die äusserst langsame Demarcation so weit

gediehen ist, dass die Functionen des Endometrium wieder normale geworden sind.

Die Ergebnisse gruppiren sich also folgendermassen:

1. Die Hypoplasia uteri bietet in der Structur ihrer Schleimhaut, wovon es verschiedene typische Formen giebt, und ihrer Vascularisation einen ungünstigen Boden für die Entwicklung einer normal vollendeten Placentation. Die Entwicklung der Eieinistung bleibt makroskopisch scheinbar ganz (= placenta membranacea) oder theilweise (= Lösung in der chorialen Masse) auf der embryonalen Stufe stehen. Thatsächlich entspricht die Placentation dem Bilde pathologischer Abortiveier.

2. Die Decidua serotina basalis ist niedrig und besitzt bei der einen Gruppe der Fälle (primär atrophisches Endometrium) von vornherein überhaupt kein umfangreicheres Stratum spongiosum; — bei der anderen Gruppe (primär glandulär hypertrophisches cystisches Endometrium) entwickelt sie dasselbe in so lockerer Weise, dass es frühzeitig zu Gewebsblutungen, zum Absterben der Frucht, zum Abortus kommt; andernfalls entstehen vielfache, aber partielle Hämorrhagien in dieser Schicht, die entweder nur zu partiellen Nekrosen und zu fibrösen und fibrinösen Verankerungen der Zottenschicht und dann bei der mehr oder weniger rechtzeitigen Geburt zu Anomalien der Placentarlösung und zu Zottenretentionen führen, — oder die das Ei, nach sehr allmählicher Eliminirung desselben von der Ernährung der Zotten zurückhalten (Retentio ovi abortivi).

3. Die Retention von Eitheilen kommt zu Folge der Störungen in der Entwicklung der Decidua und der vielfachen nekrotisch-fibrinösen Verankerung der Zotten bei beiden Gruppen und gleicherweise bei recht-, früh- und unzeitigen Geburten vor; je früher desto totaler, wobei aber zu bemerken ist, dass bei den rechtzeitigen Geburten diese „Totalität“ der Lösung auch insofern nur eine scheinbare sein kann, als auch hier von der ganzen maternen Fläche die fibrinös und fibrös verankerten Zottentheile abreißen, zurückbleiben und erst unter mannigfachen mehr oder weniger langdauernden und starken Blutungen und unter einer zwar sehr allmählich anwachsenden, dann aber besonders starken Rundzelleninfiltration (in der Demarcationsschicht und bis in die fibrinös-nekrotischen Schichten hinein) aus der zurückbleibenden Regenerationsschicht des Endometrium eliminirt werden; noch 4—3 Wochen

nach un- wie nach rechtzeitigen Geburten wurde die Ausstossung unvollendet gefunden!

4. Die hyaline und die fibrinöse Nekrose der Decidua hat ihre Ursache in der spärlichen Entwicklung derselben zwischen den zu reichlichen und zu weiten Lumina der Drüsen. Die Decidua producirt ausserdem zu wenige und zu wenig vollkommene Deciduazellen, wodurch das Fasergewebe vorwiegend bleibt und später in einzelnen Zügen, die mit den „Haftzotten“ correspondiren, breite gefässarme, spindelzellarme fibröse Stränge bis an und zwischen die Zotten bildet. Der Nekrose verfällt die Decidua zu Folge ihrer ungenügenden Ausbreitung und Vascularisation gegenüber der biochemischen Einwirkung der andringenden syncytialen und chorialen Massen, welche schliesslich bis an und in die Muscularis eindringen können.

Alle diese hier geschilderten Vorgänge vollziehen sich im hypoplastischen Uterus ohne vorhergehende oder zur Zeit der Gravidität bestehende bakterielle Entzündungen.

5. Die Vascularisation zeichnet sich durch eine progressive relative Abnahme der Gefässe aus, hervorgerufen durch Thrombose zufolge der Nekrose der umliegenden Decidua. Die Gefässe sind primär zu dünnwandig, um dem gesteigerten Druck Widerstand zu leisten; das spärliche, sie umgebende Stroma stützt sie gleichfalls nicht, daher Transsudation und Blutextravasate, eine weitere Quelle der Decidua- und weiterhin auch der Zottennekrose. Hierdurch werden wiederum Rückstauung, Thromben und neue Hämorrhagien hervorgerufen.

6. Für die Decidua vera gilt Analoges hinsichtlich des Auftretens ausgedehnter Nekrosen und fibrinisirter Hämorrhagien in der oberflächlichen Schicht; die letztere wurde noch in voller Höhe 2 und 3 Wochen post abortum im organischen Contact mit der sich regenerirenden, stark mit Rundzellen infiltrirten tieferen Schleimhautschicht gefunden. In anderen Fällen der grösstentheils vollendeten Abstossung der Deciduanekrosen wurde noch nach Wochen statt des Oberflächenepithels eine körnige Exsudatschicht gefunden, welche stellenweise mit nekrotischen und fibrinisirten hämorrhagischen Massen gemischt war; letztere kamen aus der Tiefe, aus dem mit Rundzellen infiltrirten Regenerationsgewebe.

7. In seltenen Fällen lösen die puerperalen oder ersten menstruellen Blutungen die retinirten decidualen (mit chorialen gemischten) Massen nicht ab; auch ohne Laktation oder Hyperinvolutio

uteri kommt es dann zur monatelangen (bis zu 9 und 11) Amenorrhoe (mit epileptiformen Anfällen u. s. w.); die Schleimhautoberfläche findet sich mit einer an Rundzellen reichen Fibrinschicht bedeckt, deren Fasergruppierung aber die enge Verschmelzung mit einer organisirten Gewebsstructur, d. h. dem subepithelialen Bindegewebe verräth. Die demarkirende und endlich lösende kleinzellige Infiltration kommt hier zögernd und spät zu Stande.

Diese Membranen erinnern auffallend an bestimmte, analog gebaute Häute der Endometritis exfoliativa (fibrinosa).

8. Die durch Blutungen wie durch Amenorrhoe bei puerperalen hypoplastischen Uteri (oder im Anschluss an eine rechtzeitige oder durch Abortus beendigte Gravidität) veranlasste Therapie beansprucht nach dem Gesagten eine schonende Abschabung der obersten (nekrotischen) Schleimhautschicht; es ist zu betonen, dass dadurch diese Art der Amenorrhoe beseitigt wird; stets ist die Hyperämie hernach anzuregen durch eine mehrtägige intrauterine Jodoformgaze-Tamponade.

Contraindicirt ist die Abrasio mucosae bei Hypoplasia uteri (puerperalis sive post-puerperalis) in allen anderen Fällen, weil selbst eine schwammige Glandulärhypertrophie der Schleimhaut sich derart günstig zu regeneriren und „umzubilden“ pflegt, dass sie für künftige Schwangerschaften ein besseres Substrat abgibt als früher.

Beschreibung und Erklärung der mikroskopischen Präparate auf Tafel I—III.

Tafel 1, Figur 1. Frühabort (1. Blutung am 1. Menstruationstermine) bei Hypoplasia uteri; Dysmenorrhoe, wiederholt Aborte; hochgradige Chlorose und Hysteroneurasthenie; 25jähr., II gr. — Andauernde Blutung nach Trauma seit drei Wochen; Hauptmasse des Eies mit der frischen Frucht oben ausgestossen. — Schabpartikel: Grösstentheils gut erhaltene Chorionzotten und Deciduazapfen. Letztere in Folge von Durchblutung zur Ausstossung präparirt. Die Deciduazellen sind zum Theil gut erhalten, einzelne hämorrhagisch umspült. Der intervillöse Bluterguss ist älter (Fibrin, Erythrocyten nicht mehr scharf contourirt); die deciduale Hämorrhagie in der Vera ist jünger wenn auch von verschiedenen Daten, erkennbar an dem verschiedenen Grade der Nekrobiose der Deciduazellen und ganzer Gebilde (Drüsengänge, Gefässe) im total hämorrhagisch-nekrotischen Gewebe. In letzterem erscheinen einzelne trefflich tingirbare Theile (Drüsen, Deciduainseln), welche aus der Tiefe im Gewebscontinuo oder im Wege durchgängig gebliebener Blutgefässe ernährt werden. Nirgends ist in diesen Theilen eine reactive Rundzelleninfiltration festzustellen: an einzelnen Zotten sind

Nekrobiosen zu erkennen. Stark tingirte Riesenzellen wurden sowohl nahe den Zotten als nahe den Drüseninseln im nekrobiotischen Deciduagewebe gefunden.

Die gut erhaltenen Zotten und Deciduainseln werden also aus der Tiefe der Schleimhaut ernährt; eine gleichmässige oder wenigstens continuirliche Loslösung des Eibodens ist nicht geschehen. Dieselbe geschieht allmählig durch Hämorrhagien, welche durch partielle Nekrobiosen der Decidua eingeleitet werden, deren primäre Ursache in dem Unwegsamwerden (Thrombosen) der zugehörigen Gefässe zu suchen und theilweise zu erkennen ist. Diese Vorgänge spielen sich hier noch 3 Wochen nach Ausstossung des Eies ab.

Tafel I, Figur 2. Frühabort einer kräftigen 24-jähr. Frau, II gr., worauf 4 Wochen Blutung, dann 3 Wochen Pause, jetzt wieder seit 10 Tagen heftige Blutung. I. partus praematurus. Uterus etwas infantil gebildet (kleines Corpus, spitzes Collum). — Die Schabpartikel bestehen aus einer compacten Masse mit wenigen Spuren von Drüsen! Diese Gewebsmasse ist aus Decidua- und Chorion-Elementen und älteren Hämorrhagien bunt gemischt zusammengesetzt. Das eingelagerte Chorionstroma (z) sowohl wie das kräftig gewucherte Syncytium (Sy), zum Theil auch die wohl erhaltenen Langhans'schen Zellmassen, sind gut färbbar; die Deciduazellen (de) hingegen befinden sich in verschiedenen Stadien der Nekrobiose (Ne). Auch wo wir gut durchgängige Blutgefässe (A, C) vorfinden, gehen die Deciduazellen zu Grunde; hier aber sind sie reichlichst durchsetzt und ersetzt von Rundzellen, welche eine reactive Regeneration (Re) der Schleimhaut einleiten. An der Grenze der Reactionszone finden wir inmitten der nekrobiotischen Deciduazellen stark tingirte Riesenzellen (Rt). Inmitten der nekrobiotischen Deciduazellmassen (Ne De) giebt es keine durchgängige Blutgefässe mehr. Dieselben sind thrombosirt (Thr), sogar zum Theil schon organisirt, also älteren Datums. Hingegen stossen wir auf grosse ältere Hämorrhagien (Hä), welche aber, offenbar zu Folge tiefer liegender Thrombose der zuführenden Gefässe, eine Einengung durch periphere Fibrinablagerung (Fi) und hyaline fibrinogene Deciduaneekrose erleiden. Hier und da sind an Stelle der letzteren Bindegewebszüge getreten. Ausserhalb der Gewebsmasse gelegene und hämorrhagisch eingeschlossene Zotten (Zo) sind ihres Epithels beraubt und nekrotisch.

Auch hier giebt es keine continuirliche Eilösung, da die Wegsamkeit der Blutgefässe mit ihrer reactiven Rundzellenbildung einerseits, die Obturirung anderer Blutgefässe mit nachfolgenden Hämorrhagien und Deciduaneekrosen andererseits nicht in gleicher Niveauhöhe und nicht continuirlich vorkommen. Gut und nicht ernährte Deciduapartien unterbrechen einander; die den ersteren aufsitzenden Chorion- und Syncytiummassen werden weiter ernährt—in diesem Falle sogar über 8 Wochen nach Ausstossung des Eies!

Tafel I, Figur 3. Ausstossung einer schmalen flächenhaft zurückgebliebenen maternalen Placentarschicht, 5 Wochen post partum maturum unter profuser Menstrualblutung bei einer 27-jähr. anämischen III para. Wiederholte Retentiones ovulorum abortivorum M. III., Dysoligomenorrhoe bei Hypoplasia uteri. — Die sub menstruatione ausgeschabten flächenhaften Partikel ergaben breitflächige und langsäulige, theils hämorrhagisch durchsetzte, nekrotische, theils von fibrinösem Stroma durchzogene Deciduamassen, auf denen verschieden gut erhaltene Zotten direct oder mittelst

mächtiger Haftzotten aufsitzen. Das nekrotische Deciduagewebe ist an einigen Stellen offenbar in Folge von Obturirung der ernährenden Gefässe in eine hyalin-fibrinogene Nekrose übergegangen (Ne De), an anderen Stellen aber in Folge von Hämorrhagien; hier finden wir dann trefflich erhaltene Inseln von Drüsen und Stroma neben den nekrotischen Decidua- und Stromamassen (hier auch ein leeres hyalin degenerirtes grosses Blutgefäss), kaum aber von eigentlichen unverändert gebliebenen Deciduazellen. In der tiefer gelegenen Schleimhautschicht kommen wir auf eine reactive, an Rundzellen reiche Zone (Reg. De), an welche sich eine weitere, in Deciduazell-Säulen auslaufende Zone anschliesst, welche neben nekrobiotischen Deciduapartien sich regenerirende und auch ältere fibröse Stromazüge aufweist. Hier finden wir noch glanduläre Reste und endlich wohl erhaltene Blutgefässe bis in lange, weit peripher sich erstreckende Deciduazellstränge (De). Die hier überall anhaftenden Chorionzotten sind, je nach dem Zustande ihrer decidualen Grundlage, gut erhalten, sogar Syncytium treibend, oder in verschiedenen Stadien der Nekrobiose (Ne). Die Anfangsstadien derselben sind weitaus vorherrschend, auch in dem Centrum der Haftzotten (St z), welche gewöhnlich abgestorbene grössere Gefässe führen. Nahe dem Ansätze solcher Zotten sind dem decidualen Gewebe choriale Massen eingelagert; das ganze ist dann zu Grunde gegangen und ersteres fibrinogen nekrotisch geworden (zu vergl. bei Fi) in der Art der vorigen Figur 2.

Hier wurden also erst bei der ersten und zwar abundanten Menstruation nach einer regelrechten Geburt die schmalflächenhaft zurückgebliebenen maternalen basilaren Eitheile ausgestossen, nachdem die Lösung der Placenta bei der Geburt im Wesentlichen innerhalb der chorialen Schicht erfolgt war. Der Mangel einer ampullären Schicht, wie überhaupt das spärliche Vorhandensein glandulärer Elemente in der Regenerationszone, das Vorhandensein langer continuirlicher Zellsäulen mit fibrösen Bindegewebszügen, die geringe reactive Rundzelleninfiltration und das dadurch bewirkte Erhaltenbleiben der nekrotisirten Deciduabalken in situ erklären die Retention der flächenhaften basilaren Eischicht. Erst zu Folge der menstruellen Blutung wurde die letztere abgehoben.

Tafel II, Figur 1. Post abortum M. II. anhaltende, endlich profuse Blutung — 3 Wochen nachher, bei einer chlorotischen II gr. mit Retroflexio uteri hypoplastici. — Ausschabpartikel: continuirliche Massen hyalin-fibrinös nekrotischer (Hy N D) Decidua, durchsetzt von wiederholten und schichtenweise geronnenen Blutungen (Hä). In der Tiefe die sich regenerirende Reactionsschicht der Schleimhaut (End) mit gesunden Drüsen- und Gefässschnitten. Inseln solchen Gewebes finden sich auch in der sich anschliessenden Nekrosezone (Reg); diese sind dann meist von einem ödematösen (Oe) und mit körnigem Detritus (K D) durchsetzten Deciduagewebe umgeben. Hier finden wir schon hyalin verdickte Gefässe (H G); daneben zum Theil wohl erhaltene Drüsenschnitte (Gl). Wieder weiter peripher treffen wir auf Deciduazellen im Stadium der Nekrobiose, aber untermischt mit Rundzellen (D¹). In dieser Zone können wir alle Uebergänge der Deciduazellen einestheils zum Regenerationsstroma, andererseits zum allmäligen Untergange in Gestalt des streifigen, des gewellten und canalisirten Fibrines beobachten (HyD + s. vergrössert in Fig. 3). In der weiteren vorwiegend nekrotischen und in Folge von

wiederholten Hämorrhagien geschichteten Zone finden wir immer noch wieder Decidua-Inseln oder richtiger -Säulen (D^1) im Zustande der Regenerations-Metamorphose, mehr oder weniger gut erhaltene glanduläre Elemente (Gl), aber auch schon Syncytiumhaufen. Endlich setzen sich dieser Schicht Chorionmassen, Zotten, Syncytium in verschiedenen Stadien der Nekrobiose, aber auch der völligen Intactheit auf.

Die Decidua vera (s. Fig. 1 rechts unten) weist eine sehr ungleichmässige Regeneration auf; stellenweise bedeckt noch körniger Detritus die nackte, mit Rundzellen infiltrirte Schleimhaut.

Auch hier scheinen die ungleichmässige, mehr inselartige, also nicht continuirliche Reaction und das weite säulenartige Vorspringen und Erhaltenbleiben decidualer Zellzapfen Ursache der Retention der Eitheile zu sein! Die zwischen diesen Zellzapfen wiederholt stattfindenden und gerinnenden Gewebsblutungen befestigen zunächst die ganze Masse rein mechanisch noch mehr!

Tafel II, Figur 2. Post abortum M. II. dreiwöchige Blutungen bei einer gesunden II gr. Die Ausschabung ergab von der Regenerationsfläche folgendes Bild der Reaction: In der Tiefe „normales“ Endometrium (No), welches sich durch eine continuirliche Zone der Rundzelleninfiltration (Re) abgegrenzt gegen tiefe Einbuchtungen nekrotischen Schleimhautgewebes und körniger Detritusmassen (N), welche von der Schleimhautoberfläche, die sie bedecken und zum Theil bilden, in die Tiefe dringen. Der nekrobiotische Process hat hier also Löcher in der Schleimhaut geschaffen. In der reactiven Uebergangszone sehen wir die Gefässe verdickt, die glandulären Elemente zum Theil abgestossen; in der nekrotischen Zone selbst sehen wir ein Gemisch losgelöster Drüsenkörper, zum Theil mit noch gut erhaltenem Epithel. Die hier befindlichen oder anliegenden Gefässe sind thrombosirt. Der Blut- und Lymphgefäss-Reichthum im Bereich des „normalen“ und des „reagirenden“ Endometrium ist evident. Eine „Metritis“ im klinischen Sinne hat vor- und nachher nie bestanden.

Tafel II, Figur 3. Stärkere Vergrösserung der + Stelle der Figur 1: Decidua-Metamorphose: bei NeDe in (Fi und Hy) fibrinöses Hyalin (dasselbe in vollendeter Nekrose (Ne) mit minimaler kleinzelliger Infiltration), bei Reg. De in junges Rundzellengewebe: hier werden die Decidua-zellen theils hyalin degenerirt, theils aber durchsichtig mit ihrem Protoplasma-leib; die Lymphlücken werden stark erweitert, das ganze deciduale Gewebe ödematös; die Rundzelleninfiltration überdeckt fast ganz die blassen Decidua-zellkerne; streckenweise tritt junges Bindegewebe auf. In den grösseren Lücken werden ganze Inseln decidualen Gewebes abgestossen.

Tafel II, Figur 4a. Stärkere Vergrösserung der ++ Stelle der Figur 1: Chorion-Metamorphose; im Anschlusse an die hyalinen (Hy) und canalisirten (ka) Fibrinmassen (Fi), welche erstere beide von der Decidua, letztere von intervillösen geronnenen Extravasaten ausgehen, nekrotisirt das Zottenepithel (NZ) und weiterhin das Stroma derselben; theils desquamirt der Epithelsaum (Dg). Im geronnenen intervillösen Raum sehen wir einerseits einer zum Theil gesunden Zotte eine Syncytiumkappe aufsitzen, und andererseits an einer Decidualinsel einen theilweise losgelösten Cylinderepithelsaum anhängen.

Tafel II, Figur 4b. *Suppressio mensium* wiederholt 9 bezw. 11 Monate post partum ohne Lactation und ohne Hyperinvolutio uteri mit epileptiformen Anfällen am Menstruationstermine bei III p. 31jähr. Frau, — gebessert durch *Abrasio mucosae*. Die Schabpartikel werden von einer Fibrinmembran mit verschieden reichlicher kleinzelliger Einlagerung gebildet. Die genaue Durchsicht lässt aber erkennen, dass die Structur organische Schleimhautconturen enthält und wiedergiebt, dass sie Muskelfaserpartikel (M), Theile von Gefässen (G), rundliche und ovoide Lumina grösseren und kleineren Kalibers und endlich Bindegewebsfasern mit Spindelzellen, cuboides Epithel (E), Drüsen (Gl) mit Cylinderepithel (Ep) und endlich ein an Rundzellen reiches Stroma mit Erythrocyteneinlagerung enthält. Der Vergleich mit Fig. 2 legt es nahe, an einen provisorischen Ueberzug des Endometrium theilweise mit fibrinösen Detritusmassen zu denken, die erst sehr allmählig durch die zögernde Rundzelleninfiltration zur Abstossung gelangen.

Tafel III. *Placenta membranacea* einer nahezu Reifegeburt aus hypoplastischem Uterus einer 26jähr. II gr., chlorotisch, sehr zart. Eisack rings, aber nur dünn, von Chorionzotten umwachsen. Stets, auch bei einer späteren Geburt, Blutungen während der Schwangerschaft, I. partus praematurus.

Fig.3.

Fig. 3.

Fig. 4^b

Fig. 4^a

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 7.