Beitrag zur Kenntniss der Netzhautganglienzellen unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen.

Von

Dr. med. A. Birch-Hirschfeld,
Assistenten an der Universitäts-Augenheilanstalt zu Leipzig.

Hierzu Taf. X u. XI, Fig. 1—9.

Wenn man die Entwicklung unserer Kenntnisse von der feineren Anatomie der Retina in den letzten Jahrzehnten überblickt, so lassen sich drei grosse Perioden unterscheiden, deren erste bis in die Mitte dieses Jahrhunderts zurückreicht, in deren letzter wir uns jetzt noch befinden.

Durch die sorgfältigen Untersuchungen von M. Schultze (166), H. Müller (136), Kölliker (96), Krause (102) u. A. wurde der feinere Aufbau der verschiedenen Netzhautschichten, vor Allem auch der Aufbau der nervösen Endorgane des Sehnerven kennen gelehrt. Auch die Kenntniss der physiologischen Function des Sehorgans machte, gestützt auf morphologische Befunde an der Netzhaut des hell oder dunkel adaptirten Auges, wesentliche Fortschritte. Hier sind nur die Arbeiten von van Genderen Stort (60) (Contraction der Zapfen), Boll (19), Kühne (105, Sehpurpur), Angelucci (2), Engelmann (45) u. A. (Pigmentwanderung, Veränderung im Chromatingehalt der Körnerschichten) zu erwähnen. Die zweite Periode ist gekennzeichnet durch die Einführung neuer Färbmethoden, mit deren Hilfe

es gelang, die nervösen Organe in ungeahnter Klarheit isolirt zur Anschauung zu bringen. Hier knüpft sich der Fortschritt an die Namen Ehrlich (44), Golgi (26), R. y. Cajal (26). Besonders der letztgenannte Forscher hat mit Hilfe der von ihm verbesserten Golgi'schen Chromsilber-imprägnationsmethode den Aufbau der nervösen Elemente der Retina am klarsten dargestellt. Er wies den Zusammenhang der Ganglienzellschicht mit den bipolaren Zellen der inneren Körnerschicht und dieser mit den Endverzweigungen der Stäbchen und Zapfenkörner in einer Deutlichkeit nach, wie es vorher nur theils vermuthet wurde, theils völlig unbekannt war.

So wichtig und fruchtbar die Cajal'sche Methode für die Darstellung der Nervenverzweigungen war, so ist sie doch für eine Wahrnehmung der feineren Einzelheiten im Bau der Ganglienzellen unzureichend.

Der neuesten Zeit war es vorbehalten, durch Ausbildung neuer Färbungsmethoden die Structur der Ganglienzellen so klar darzustellen, dass auf allen Gebieten der Nervenforschung ein ungeahnter Fortschritt herbeigeführt wurde. — Auch für das Studium der Anatomie, Physiologie und Pathologie der Nervenzellen des Sehorgans musste dieser Fortschritt von wesentlicher Bedeutung sein.

Die Seifen-Methylenblaufärbung von Nissl lässt, besonders unter Anwendung der Held'schen Modification (Contrastfärbung mit Erythrosin) im Protoplasma der Ganglienzellen eigenartige Körper hervortreten, die nach Form und Lage mannigfache Verschiedenheiten, aber bei demselben Zelltypus so constante Verhältnisse zeigen, dass eine Eintheilung der Zellen des Nervensystems auf Grund derselben möglich wurde, wie sie Nissl (140) selbst gegeben hat. Die Bedeutung der fraglichen Gebilde ist allerdings zur Zeit noch sehr zweifelhaft. Auch die Frage, ob dieselben bereits in der lebenden Zelle vorhanden sind, (wie Flemming (50), Arnold (4) u. A. meinen), oder ob

sie Fällungsproducte durch Einwirkung von Härtungs- und Färbungsmitteln, durch chemische Umsetzungen der Zelle beim Absterben (wie nach Held's (72) Untersuchungen anzunehmen ist) darstellen, ist noch ungelöst.

So viel ist indess sicher, dass sie einen constanten Befund der normalen Ganglienzelle bei Anwendung des Nissl'schen Verfahrens bilden, dass sie wie Nissl (139) angiebt „ein Aequivalent der normalen Constitution der Ganglienzelle sind, welches den Werth eines feinen Reagens bei der Beurtheilung pathologischer und wahrscheinlich auch functioneller Veränderungen der Nervenzelle besitzt, wie sie bisher nach anderen Färbungsmethoden nicht nachgewiesen werden konnten.“ Darin liegt ihre grosse Bedeutung für die Anatomie und pathologische Anatomie der Nervenzellen ausgesprochen.

Es lag nahe, die Nissl'sche Färbungsmethode auch auf die Ganglienzellen der Retina anzuwenden. Ja dieselbe bietet für derartige Untersuchungen besonders günstige Verhältnisse dar. Einmal sind ja die feineren anatomischen und pathologischen Zustände an keiner anderen Stelle des Körpers während des Lebens der directen Beobachtung so zugänglich wie im Augenhintergrunde. Dann aber, was von physiologischer Seite besonders wichtig erscheint, lässt sich auf die Nervenzellen der Retina ein specifischer adaequater Reiz anwenden, in seiner Intensität beliebig abstufbar, und mit Hülfe der empfindlichen Nissl'schen Färbungsmethode das Verhalten der Nervenzellen unter verschiedenen functionellen Zuständen feststellen. Das andre unter entgegengesetzten Bedingungen z. B. im Ruhezustand der Dunkeladaptation befindliche Auge, liefert die Möglichkeit eines directen Vergleichs. Auch für die Kenntniss der pathologischen Veränderungen der Netzhautganglien versprach die neue Färbungsmethode wichtige Aufschlüsse. Es giebt ja auch heute noch eine Gruppe von Amblyopieen und Amaurosen ohne ophthalmoskopischen

Befund, wobei eine Schädigung der nervösen Endorgane des Sehnerven, sei es direct oder indirect, anzunehmen ist. Hier bietet die Untersuchung der feineren Zellstructur nach der Nissl'schen Färbung die Möglichkeit, auf experimentellem Wege den Sitz der primären Schädigung und die Art derselben genauer zu ergründen. Besonders geeignet zu derartigen Untersuchungen schienen die auch experimentell zu erzeugenden Intoxicationsamblyopieen, für die eine Betheiligung der Netzhautganglien schon nach Analogie der vielfach nachgewiesenen Veränderungen an anderen Nervenzellen des Gehirns und Rückenmarkes bei Vergiftungen sich erwarten liess.

Es hat auch in den letzten Jahren nicht an Forschern gefehlt, welche, unter Anwendung der Nissl'schen Färbungsmethode functionelle oder pathologische Zustände an den Ganglienzellen und den anderen Zellformen der Netzhaut, (äussere und innere Körnerschicht) zum Gegenstande experimenteller Untersuchung machten. Ich erwähne hier nur kurz die Untersuchungen von Mann (118), Bach (7), (Veränderungen der Ganglienzellen bei Hell- und Dunkeladaptation, bei Netzhautabhebung) und Ward A. Holden (80), (experimentelle Chininamblyopie), auf die ich nachher näher einzugehen habe.

Trotzdem ist auch durch die sorgfältigen Untersuchungen von Mann (118) die Frage, ob die functionirende Netzhautganglienzelle morphologische Aenderungen in ihrer feineren Structur darbietet, noch keineswegs gelöst, — wie schon aus dem negativen Ergebniss der Bach'schen Untersuchungen hervorgeht. Das Ergebniss der Holden'schen Experimente lässt gleichfalls noch viele Fragen unbeantwortet und fordert geradezu zu einem Vergleich zwischen der Wirkung des Chinins auf die Ganglienzellen der Netzhaut und derjenigen anderer Gifte resp. andersartiger pathologischer Schädigungen auf.

Aus diesen Gründen schien eine möglichst genaue und

vielseitige Nachprüfung der gewonnenen Resultate, und zugleich eine Erweiterung derselben durch Hinzufügung neuer Untersuchungsreihen nicht überflüssig. Gerade ein Vergleich der normalen bezw. functionellen und der pathologischen Zustände der Netzhautganglienzellen, wie er sich bei einer grösseren Zahl von Versuchsreihen unter Anwendung genau der gleichen Härtungs- und Färbungsmethoden möglich macht, erschien für die Erweiterung unserer Kenntnisse von der Physiologie und Pathologie der Netzhautganglienzelle sowie der Ganglienzelle überhaupt aussichtsvoll.

Dabei war es wünschenswerth, eine Reihe von Vorfragen zunächst experimentell zu prüfen: so das Verhalten der Netzhautganglienzellen verschiedener Thiere bei Anwendung gleicher Härtungs- und Färbungsmethoden, der Einfluss verschiedener Härtungs- und Färbungsmittel auf die Ganglienzellen des gleichen Thieres.

Auch die genauere Kenntniss der Zeit des Auftretens und der Art postmortalen Veränderungen an Netzhautganglien liess sich leicht auf experimentellem Wege prüfen und lieferte wichtige Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Resultate der nachfolgenden Versuchsreihen. Demnach zerfällt die vorliegende Arbeit in drei Theile, einen anatomischen, einen physiologischen und einen pathologisch-anatomischen Theil.

Der erstere umfasst die histologischen Unterschiede in der Structur der Netzhautganglienzellen,

- a) verschiedener Thierarten,
- b) bei Einwirkung verschiedener Härtungsmittel,
- c) bei Anwendung verschiedener Färbungsmethoden,
- d) beim postmortalen Absterben der Zelle.

Er soll besonders auf die Frage Antwort geben, welche morphologischen Eigenschaften man von einer normalen Netzhautganglienzelle erwarten muss, resp. welche Abwei-

chungen von der Norm als Kunstproducte einer mangelhaften Härtungs- oder Färbungsmethode anzusehen sind.

Gelingt es, den normalen Typus einigermaassen sicher zu umgrenzen, dann erst ist die Frage nach dem Wesen functioneller und pathologischer Veränderungen zu entscheiden.

Der zweite physiologische Theil enthält eine vergleichende Untersuchungsreihe über die Einwirkung des Lichtes auf die Structur der Netzhautganglienzelle nach kürzerer oder längerer Einwirkung resp. Lichtabschluss. Eine weitere Untersuchungsreihe über den Einfluss kürzer oder länger dauernder Blendung bildet den Uebergang zu dem pathologischen Theil der Arbeit. Derselbe enthält den Einfluss der Gefässunterbindung, der Durchschneidung des Sehnerven, künstlich erzeugter Gefässembolien und schliesslich die Veränderung der Netzhautganglienzellen nach Einwirkung bestimmter Giftstoffe (des Chinins, des Extractum filicis und des Schwefelkohlenstoffs). — Eine Reihe anderer Giftstoffe werde ich späterhin in gleicher Weise einer experimentellen Prüfung unterziehen.

I. Zur Anatomie der Netzhautganglienzellen.

Die Netzhautganglienzellen bieten für die genauere anatomische Untersuchung einerseits besondere Vortheile, andererseits besondere Nachtheile dar.

Zu den ersteren ist zu rechnen, dass es möglich ist, das Untersuchungsmaterial so frisch zu erhalten, wie das kaum bei anderen Ganglienzellen möglich ist, da die Enucleation eines Auges, sofort nach Tödtung oder in Narcose des Versuchsthieres, die Eröffnung des Bulbus und die Herstellung des frischen Präparates resp. das Einbringen in schnell fixirende Reagentien nur wenige Minuten in Anspruch nimmt. Auf die Wichtigkeit derartiger Verhältnisse hat Held (72) hingewiesen.

Von Nachtheil ist es dagegen für eine Umgrenzung des normalen Typus, dass die Ganglienzellen bei den meisten Thierarten relativ klein, bedeutend kleiner als beispielsweise die der Vorderhörner der Hirnrinde und der Spinalganglien sind, und in der Anordnung ihrer Chromatinkörper, der Grösse des Protoplasmaleibs, der Lage des Kerns viel weniger constante Verhältnisse erkennen lassen, als die Ganglienzellen an anderen Orten.

So schwankten beispielsweise die Ganglienzellen in der Retina des Kaninchens bei dem gleichen Thier und im gleichen Präparat zwischen $33\mu \times 26\mu$ und $9,9\mu$ D m. Je kleiner die Zellen sind, um so grösser ist im Verhältniss ihr Kern, dessen Grösse viel geringeren Schwankungen unterworfen ist, umso schwieriger ist auch die Beurtheilung der Zahl und Lage der chromatischen Körner. Es empfiehlt sich daher, beim Studium der letzteren wesentlich die grösseren Ganglienzellen in Betracht zu ziehen, die einen genügend grossen Protoplasmasaum besitzen, um eine periphere und paranucleäre Zone unterscheiden zu lassen.

In diesen Zellen liegen die bei gelungener Färbung scharf begrenzten, theilweise länglichen, an den Enden theils scharf abgeschnittenen, theilweise mehr körnigen oder polygonalen Nisslkörper vorzugsweise in der Umgebung der Zellperipherie kranzartig angeordnet. Sie berühren die Zellmembran nicht direct, sondern lassen einen schmalen Saum an derselben frei. Vereinzelte meist kleinere ebenfalls scharfbegrenzte Körnchen finden sich im übrigen Protoplasma, häufig auch der Kernmembran anhaftend.

Das Protoplasma zeigt zwischen den Körnern an dickeren Schnitten und bei mittlerer Vergrösserung eine fein granuläre Beschaffenheit, die sich jedoch an feineren Schnitten und bei starken Vergrösserungen (1μ Zimmermann'sches Mikrotom, Zeiss: hom. Imm.) in ein feines Netzwerk auflösen lässt, in dessen Maschen die Nisslkörner eingebettet sind. Eine fibrilläre Structur, wie sie Dogiel(39) nach Methylenblau-

färbung und Fixiren des Präparates mit pikrinsaurem Ammoniak an den Netzhautganglienzellen der Eule, des Falken und des Adlers beobachtet hat, konnte ich am Kaninchen nicht nachweisen. Doch gelang es mir ebenso wie Dogiel (39), auch im Axencylinderfortsatz vereinzelte längliche Schollen von chromophiler Substanz wahrzunehmen.

Die Lage des Kernes zu der Zelle ist ebenfalls im gleichen Präparate mannigfachen Schwankungen unterworfen. In den kleineren und mittelgrossen Zellen liegt er meist excentrisch bis dicht an die Zellperipherie heranreichend, an grösseren Zellen zuweilen central, häufig ebenfalls peripher.

Dieser Umstand ist besonders für die Beurtheilung functioneller Unterschiede wesentlich.

Die Structur des Kerns stellt gleichfalls ein engmaschiges zartgefärbtes Netzwerk dar mit theilweiser Verdickung der Knotenpunkte resp. Einlagerung einer körnigen acidophilen Substanz an diesen Punkten. In derselben findet sich leicht excentrisch ein ziemlich grosser rundlicher oder ovaler Nucleolus von dunkelblauer Färbung.

Die geschilderten Verhältnisse gelten für die Netzhautganglienzellen des Kaninchens, in ganz ähnlicher Weise aber auch für andere Thierarten, die nach Sublimat-Alkoholhärtung und Paraffineinbettung nach der Nissl'schen Färbungsmethode untersucht wurden, so für die des Hundes, der Ziege, des Frosches, der Katze, des Meerschweinchens und des Hechtes. Hinsichtlich der Grösse der Zellen finden sich allerdings bei den verschiedenen Thierarten wesentliche Unterschiede. Die Chromatinschollen zeigten im allgemeinen die gleiche Gruppierung; bei der Ziege erschienen sie mehr stäbchenförmig geordnet, ähnlich wie beim Kaninchen, bei den anderen Thieren waren sie mehr von körniger Beschaffenheit ebenso wie in der Netzhaut des Menschen (von einem Hingerichteten sofort nach dem Tode) und des Affen (von denen mir allerdings nur in Osmiumsäure fixirte Präparate vorlagen).

Um die Einwirkung der Härtungsmittel auf die Form der Nisslkörper festzustellen und zugleich auch diejenige Härtungs- und Fixirungsflüssigkeit auszuwählen, welche die günstigsten Verhältnisse zur Untersuchung der Nervenzellen der Retina versprach, stellte ich Vergleichshärtungen der Netzhaut des gleichen Thieres nach folgenden Methoden an:

1. Sublimat 1:20 Aq. Alk. 50—100 % aufst. Dos.
2. Sublimat in 0,75 Kochsalz-Lösung bei 30° C gesättigt (nach Mann (119)).
3. Formalin 4 % Alk. abs.
4. Flemming'sches Chromosmiumsäuregemisch.
5. Alk. absolut.
6. Pikrinsäure (wässr. ges. Lösg.) Sublimat (conc.) ana.
7. Carnoy's Gemisch (Alk. abs. 60, Chlorof. 30, Eis-essig 10).
8. Müller'sche Lösung + Formalin 3 % Lösg.)
9. Methode nach Altmann (Eintauchen der Netzhaut in Hg von — 20°, dann Alk. abs.).

Die Sublimathärtung ergab die gleichmässigsten Resultate, besonders wenn sie in der von Mann (119) vorgeschlagenen Form angewendet wurde. Was sie besonders brauchbar macht, ist das völlige Fehlen von Vacuolen in Protoplasma und Zellkern, wie sie bei den übrigen Härtungs- resp. Fixirungsmitteln sich nicht selten finden. Die Schrumpfung des Zelleibs ist dabei, nach der Grösse des pericellulären Raumes zu urtheilen, nicht erheblicher, als bei den anderen Methoden, das Flemming'sche Chromosmiumsäuregemisch ausgenommen, das aber wiederum für die Färbung der chromatischen Substanz ungünstigere Verhältnisse darbietet. Man kann dieselbe zwar auch nach Fixirung der Präparate in Flemming'scher Lösung zur Darstellung bringen, wenn man beispielsweise eine 1 % Thioninlösung 20 Minuten bis $\frac{1}{2}$ Stunde einwirken lässt, aber der Kern der Zelle ist dann meist mitgefärbt, und die Gegenfärbung mit Erythrosin giebt weniger schöne Bilder. Aus

den angeführten Gründen — meine Erfahrungen stimmen übrigens mit denen von Trzebinsky (178) gut überein — habe ich für die weiteren Untersuchungen die Sublimathärtung in der Mann'schen (119) Modification bevorzugt.

Die Form der Chromatinschollen wies bei den übrigen Fixierungsmethoden keine wesentlichen Verschiedenheiten auf. — Nach Formalinhärtung erschienen sie im Allgemeinen etwas plumper und weniger scharf begrenzt.

Was die Färbungsmethode betrifft, so liefern die Nissl'sche Methylenblaufärbung (Modification nach Held) die Färbung mit Toluidinblau und mit Thionin wesentlich gleich schöne Bilder. Nach vielen Versuchen schien mir für meine Zwecke folgende Methode besonders brauchbar, da sie sehr gleichmässige Resultate giebt, sehr einfach im Gebrauch ist, und vor allem die Contrastfärbung sehr schön hervortreten lässt, wie Vergleichsfärbungen zeigten, besser z. B. als bei Anwendung von Toluidinblau unter den gleichen Verhältnissen.

Die mit den Paraffinpräparaten besickten Objectträger wurden 10 Minuten in 1% Thioninlösung gefärbt, mit Aqua dest. abgespült, dann schnell mit Erythrosinlösung nach Held (1:150,0 Aqua dest. + einige Tropfen Acid. Acet.) übergossen und wieder mit Aqua dest. abgespült. Daran schloss sich kurze Entwässerung mit Alk. abs., Entfernung des Alkohols mit Xylol und Controle der Färbung unter dem Mikroskop. War die Färbung geglückt — was besonders an dem Verhalten des Zellkerns der inneren und äusseren Körnerschicht geprüft werden konnte — dann wurde in Xylol nochmals abgespült und in Canadabalsam eingeschlossen. Die Praeparate hielten sich mehrere Monate gut in der Färbung, besser als diejenigen Controlpraeparate, bei deren Herstellung Entfärbung mit Anilinoxylol verwendet wurde. Dieselbe Methode erwies sich zur Färbung der Ganglienzellen des Gehirns und Rückenmarks sehr brauchbar.

Ausser den Ganglienzellen der innersten Netzhautschicht wurden natürlich auch die anderen Schichten, besonders die Körnerschichten einer genauen Untersuchung unterzogen.

Betreffs der morphologischen Unterschiede zwischen der Netzhaut des Hell- und Dunkelauges hat besonders Pergens (146) auf die Schwankungen des Chromatinsgehalts der Körnerschichten hingewiesen. Es schien daher wünschenswerth, auch für diese Zellen gleichsam ein Paradigma bei mittlerer Helladaptation aufzustellen und zu prüfen, welche Abweichungen von demselben man der speciellen Einwirkung von Härtungs- und Färbungsmitteln zuschreiben muss, welche man also wohl mit Recht auf functionelle oder pathologische Momente beziehen kann.

Dabei ergab sich, dass beim Kaninchen nach mittlerer Tagesbeleuchtung und nach Gebrauch der Sublimatfixirung (nach Mann) und Thioninfärbung diese Zellen annähernd constante Verhältnisse darbieten.

Die inneren Körner sind rundlich oder oval, färben sich mit Thionin zart blau und lassen in ihrem Inneren ein feines Netzwerk erkennen, das sich meist von dem etwas excentrisch gelegenen tiefblau gefärbten Nucleolus nach der Peripherie zu erstreckt. Zwischen den Fäden findet sich meist eine feinkörnige violett gefärbte Substanz. Häufig liegen auch 1 oder 2 Nebennucleolen in einem Korn.

Die äusseren Körner färben sich mit Thionin viel intensiver als die inneren. Man kann an ihnen zwei Arten unterscheiden. Die einen, die meist in den äusseren Schichten liegen, sind grösser, länglich oval und enthalten mehrere rundliche oder ovale, auch stäbchenförmige, scharfbegrenzte Körnchen. Dieselben entsprechen nicht durchweg den Zapfenkörnern, wie schon aus der Thatsache hervorgeht, dass sie, wenn auch seltener, in den inneren Schichten der äusseren Körner vorkommen. An den Stäbchenkörnern, die etwa $6-7\mu$ lang sind, tritt die schon von Henle (73) beschriebene eigenthümliche quere Bänderung deutlich hervor. Dieselbe ist dadurch bedingt, dass die Pole der länglich-ovalen Körner mit durch Thionin intensiv blau gefärbter Substanz erfüllt sind, die entweder einen glatten, peripheren, ungefärbten oder

acidophilen Saum übrig lassen — oder uneben höckrig, selbst zackig wie Flemming (50) hervorgehoben, mittels feiner Ausläufer mit der Kornmembran zusammenhängen. Zwischen den Polkörpern finden sich mit schmalere oder breiterem Zwischenraum, glatt begrenzt oder ebenfalls fein gezackt, in querrer Richtung Chromatinschollen eingeschaltet. Im Allgemeinen darf man behaupten, dass, je länglicher die Stäbchenkörner sind, um so breiter die Lücken zwischen den Schaltstücken und den Polkörpern hervortreten, und dass eine der ersten Veränderungen der Netzhaut, sowohl postmortal, als auch unter pathologischen Verhältnissen, in der Abrundung der Körner und dem Schwinden der Querstreifung besteht. Ausserdem ist dieselbe, wie die Vergleichshärtungen gelehrt haben, bei Alkohohlärtung, Härtung nach Flemming, Pikrinsäure-Sublimat, — weniger deutlich, als bei Sublimathärtung. Jedenfalls zeigten diejenigen Netzhäute vom normalen Kaninchen, die auch sonst als Zeichen fehlerhafter Behandlung Schrumpfungsvorgänge oder Vacuolisation der Ganglienzellen darboten, ein Fehlen der beschriebenen Querbänderung.

Wie weit man in dem mehr oder weniger deutlichen Hervortreten der Querstreifen und Zacken einen Ausdruck functioneller Unterschiede erblicken darf, wird weiter unten zu erörtern sein. Hier genügt es, auf das mit grosser Constanz wiederkehrende morphologische Verhalten dieser Gebilde in der Netzhaut des Kaninchens bei Sublimatfixirung und Thioninfärbung hinzuweisen. In ähnlicher Weise wie beim Kaninchen findet sich die Querbänderung der Stäbchenkörner bei der Katze und beim Kalbe, während dieselbe an den Netzhäuten der anderen von mir mit der gleichen Methode untersuchten Thierarten nicht oder weniger deutlich nachzuweisen war.

Von weiteren Elementen der Netzhaut, welche Thioninfärbung annehmen, sind noch die feineren cilienartigen Fortsätze zu erwähnen, die sich von der Membrana limi-

tans externa zwischen die Basen der Stäbchen und Zapfen erstrecken. Sie bilden so ein feines Gitterwerk, in welches die Sehzellen eingefügt sind.

Vereinzelte liessen sich auch in den Grundgliedern der Stäbchen und vor allem der Zapfen — hier meist an der Spitze des Conus, feine, blaue Körnchen und stäbchenförmige Gebilde auffinden, noch deutlicher, wenn man statt des Thionins das besonders von Lenhossek (110) warm empfohlene Toluidinblau anwendet, welches dagegen den Nachtheil hat, dass es die äusseren Körner zu intensiv färbt, um ihre feinere anatomische Structur genau erkennen zu lassen.

Es ist hier noch auf einen Färbungszustand hinzuweisen, der ebenso wie an den Nervenzellen des Rückenmarks und Gehirns, an den Ganglienzellen der Netzhaut und den inneren Körnerschichten sich nicht selten findet. Das Protoplasma der Zellen ist diffus dunkelblau gefärbt, ohne feinere Chromatinkörner erkennen zu lassen. Auch der Kern färbt sich häufig in einem diffus bläulichen Farbenton. Die Grösse dieser Zellen ist meist etwas geringer, als die der umgebenden normalen Zellen, was in Gemeinschaft mit dem deutlicheren Hervortreten des pericellulären Raums auf einen Schrumpfungsprocess hindeutet. Nach Nissl (139) handelt es sich bei diesem Zustande um ein Kunstproduct ohne pathologische Bedeutung, verursacht durch zufällige, bis jetzt unbekannte Wirkungen der Härtungsmittel oder postmortale Veränderungen, während Flesch und Koneff (51) in der Chromatophilie den Ausdruck eines functionellen Zustandes erblickten.

Der Umstand, dass sich zugleich mit der Chromatophilie Schrumpfungsprocesse an den Zellen nachweisen lassen, wie auch Kreyssig (103) und Trezebinski (178) angeben, lässt sich für die Nissl'sche Anschauung verwerthen.

Die Behauptung Nissls (139), dass bei Sublimat-härtung häufiger chromatophile Zellen gefunden würden,

kann ich in Bezug auf die Netzhautganglienzellen nicht bestätigen. Im Gegentheil schien es mir, als sei bei Anwendung der Mann'schen Sublimathärtung die Zahl der chromatophilen Nervenzellen geringer, als bei anderen Härtungsmethoden.

Schrumpfung des Zelleibs und Auftreten von Vacuolen in Protoplasma oder Zellkern, konnte ich in meinen Präparaten aus der Netzhaut des gesunden Thieres, die in der beschriebenen Weise gehärtet und gefärbt wurden, so selten nachweisen, dass mir die Annahme berechtigt erscheint, es handle sich dort, wo Vacuolen oder ausgedehnte Schrumpfungsprozesse an den Netzhautganglien kurz nach dem Tode und an den nach gleichen Härtungs- und Färbungsmethode behandelten Schnitten auftreten, um einen pathologischen Vorgang.

Postmortale Veränderungen an den Ganglienzellen der Netzhaut.

Je feiner die Veränderungen sind, die mit Hilfe der Nissl'schen Methode an den Nervenzellen gefunden werden, um so wichtiger ist es auch, die postmortalen Veränderungen an diesen Zellen, ihr Wesen und die Zeit ihres Auftretens genau kennen zu lernen, denn erst dadurch lässt sich eine grosse Fehlerquelle bei der Beurtheilung pathologischer Befunde ausschalten.

Für Gehirn und Rückenmark sind durch die Untersuchungen von Colucci (31), Neppi (138), Barbacci und Campacci (12), Levi (111) und Ewen (47), diese Fragen näher erörtert worden.

Nach Colucci (31) treten die ersten Veränderungen im Gehirn erst 26 Stunden nach dem Tode auf. Sie bestehen in granulärem staubförmigen Zerfall und Schrumpfung des Zelleibs, der sich diffus färbt, während der Kern erst später eine gleichmässige Schrumpfung erfährt. Der achromatische Theil der Zelle ist dabei hochgradiger verändert, als die Chromatinkörper.

Weiterhin tritt dann Ruptur der Protoplasmafortsätze ein, und in denselben, sowie im Zelleib, treten nach der Marchi'schen Methode schwarze Tröpfchen auf.

Neppi erwähnt nach 24 Stunden (Spinalzellen des Hundes) Kernchromatophilie und (nach 48 Stunden) diffuse Färbung des ganzen Zelleibs und des excentrischen Kerns. Erst nach 4 Tagen schrumpft die Zelle, und ihre Chromatinkörper verblassen. Nach Neppi ist Faltung der Kern- und Zellmembran das sicherste Unterscheidungsmerkmal zwischen postmortalen und vitalen pathologischen Veränderungen.

Barbacci und Campacci (12) die nach der Nissl'schen, Golgi'schen und Marchi'schen Methode das Rückenmark von Kaninchen untersuchten, beschreiben als erste Veränderung verminderte Färbbarkeit der chromatophilen Körper mit unregelmässiger Begrenzung der peripher gelegenen Nisslkörper, daneben partielle oder totale Chromatophilie, staubartigen Zerfall der Körper, Vacuolen in der grobgranulirten Protoplasmasubstanz. Der Kern schrumpft, wird dunkler gefärbt, rückt an die Zellperipherie und verschwindet.

Levi (111) fand (beim Kaninchen) die ersten postmortalen Veränderungen an Rindenzellen 18—24 Stunden nach dem Tode, an Spinalganglien 36—48 Stunden, im Rückenmark nach 60 Stunden, beginnen mit einem hyperchromatischen Stadium, dem sich ein Stadium der Schrumpfung mit Zerfall des Kerns und Nucleolus anschliesst.

Ewen endlich unterscheidet (beim Kaninchen) drei Stadien der postmortalen Veränderungen.

1) 24 Stunden p. m. granulärer Zerfall der chromatischen Substanz.

2) 48 Stunden diffuse nucleäre Chromatophilie.

3) Zerfall des Zelleibs und der Dendriten.

Um den Ablauf der postmortalen Veränderungen an den Nervenzellen der Netzhaut festzustellen, untersuchte ich die Retina des Kaninchens bei annähernd constanter Aussentemperatur (20° C. im Brutschrank) zu verschiedenen Zeiten nach dem Tode (Sublimathärtung, Thioninfärbung.) Es ergab sich folgender Befund:

Nach 1 Stunde zeigt sich an allen Netzhautschichten normales Verhalten der Zellen, scharf contourirte, namentlich peripher gelegene Nissl-Granula und glatte Begrenzung des Kerns und des Zelleibs.

Schon nach 2 Stunden tritt der pericelluläre Raum deutlicher hervor, und die Zelle zeigt eine leichte Fältelung ihrer Membran. Die Abgrenzung der Nisslkörper ist nicht mehr so scharf, wie vorher. Häufig sind ihre Ecken abgerundet oder durch eine diffus blaue Färbung der Grundsubstanz (häufig nur in einem Theil der Zelle), in welcher sie liegen, wird die Unterscheidung der feineren Körnchen unmöglich. Die äusseren Körner, besonders die Stäbchenkörner, haben sich mehr abgerundet, so dass nur noch ein schmaler Saum zwischen den Chromatinkörpern die Querbänderung andeutet. Die oben erwähnte feine Zackung der Chromatinkörper ist ebenfalls nicht mehr nachzuweisen.

Nach $3\frac{1}{2}$ Stunden treten alle diese Erscheinungen deutlicher hervor. Der Kern bietet Anzeichen von Schrumpfung dar und enthält vereinzelte kleine Vacuolen, die reichlicher und grösser im Protoplasma der Zelle, meist im peripheren Theil desselben, zu finden sind. Die Chromatinkörper sind zwar noch als solche zu erkennen, aber unscharf begrenzt, da fast der ganze Zelleib jetzt diffus blau gefärbt ist. Auch die inneren Körner zeigen theilweise Zerfallserscheinungen. Zwischen wohlerhaltenen Zellen liegen solche, deren Fasergerüst von der peripheren Membran losgerissen ist, oder dessen Knotenpunkte körnig verdickt sind. Auch an diesen Zellen sind Vacuolen nicht selten zu finden. Die Schichtung der äusseren Körner ist fast völlig verwischt (vergl. Fig. 1).

Nach 5 Stunden finden sich die Vacuolen in der dunkelblau gefärbten Grundsubstanz noch in grösserer Zahl. Die Nisslkörper fehlen an vielen Zellen vollständig. An andern ist ihre Lage durch feine blaue staubartige Körnchen angedeutet. Häufig lassen sich die genaueren Contouren der Zelle und des Kerns nicht mehr deutlich nachweisen. Die pericellulären Räume sind entweder beträchtlich enger oder fehlen überhaupt, was jedenfalls in einer dem Zerfall vorausgehenden Quellung der Zellen seinen Grund hat.

Nach 7 Stunden fehlen die Nisslkörper vollständig, und auch die bläuliche Färbung der Grundsubstanz ist geschwunden. An den meisten Zellen fehlt auch die Protoplasamembran, und der Kern ist theilweise ganz aus der Zelle verschwunden. Nur eine fein granuläre rothgefärbte Masse lässt nach Form und Lage die Ganglienzellen der innersten Schicht erkennen. Die gleichen Zerfallserscheinungen spielen sich an den inneren Körnern ab, gleichfalls mit Verlust der chromatischen Sub-

stanz. Die äusseren Körner sind rund, theilweise blaugefärbt und dann mit einer Andeutung der früher vorhandenen Querbänderung.

Nach 11, 12 $\frac{1}{2}$ und 18 Stunden sind die Verhältnisse annähernd die gleichen. Die Chromatinkörper fehlen vollständig in den Ganglienzellen, die nur selten noch einen geschrumpften, tiefblau gefärbten oder einen bläschenförmigen Kern mit spärlichen Resten der ursprünglichen Structur aufweisen.

Aus dem Angeführten geht hervor, dass auch an den Ganglienzellen der Netzhaut die gleichen postmortalen Veränderungen und in der gleichen Reihenfolge auftreten, wie sie von den oben erwähnten Untersuchern an den Nervenzellen des Gehirns und Rückenmarks nachgewiesen wurden. Es wurde weiterhin gezeigt, dass auch die Zellen der inneren Körnerschicht in der Hauptsache gleichartigen Veränderungen unterworfen sind, und dass an den Stäbchenkörnern ein Verlust der an frischen Präparaten bei entsprechender Härtung und Färbung constant nachgewiesenen Zackung und Querbänderung der chromatischen Substanz hervortritt.

Hinsichtlich des Zeitpunktes des Auftretens der postmortalen Veränderungen unterscheiden sich die angeführten Untersuchungsergebnisse wesentlich von den Angaben der erwähnten Autoren. Schon 2 Stunden p. m. waren an den Netzhautganglien deutliche Veränderungen aufzufinden, die dem Levi'schen hyperchromatischen Stadium mit beginnender Schrumpfung des Zelleibs entsprechen.

Es geht daraus hervor, wie wichtig gerade für das Studium der feineren Structur der Netzhaut die Fürsorge für ganz frisches Untersuchungsmaterial ist, ein Umstand, dem nicht von allen Untersuchern, wenigstens wenn es sich um pathologische Veränderungen der Netzhautzellen handelte, Rechnung getragen worden ist.

Die Ursache dieses verschiedenartigen Verhaltens der Nervenzellen der Retina von den spinalen oder cerebralen Nervenzellen wird jedenfalls in der anatomischen Verschie-

denheit ihrer Lage zu suchen sein. Der fast directen Berührung mit dem Glaskörper, den Verhältnissen der Gefäßversorgung der Retina, die von denen in der Hirnrinde und im Rückenmark verschieden sind, kommt dabei wahrscheinlich eine Bedeutung zu, ohne dass sich zur Zeit über den Chemismus, dessen Ausdruck wir in den morphologischen Veränderungen erkennen, Näheres sagen liesse.

Es wäre interessant zu erfahren, ob die postmortalen Veränderungen in anderen peripher gelegenen Nervenzellen, z. B. des Gehörorgans, ebenso frühzeitig auftreten, wie in der Retina.

Ueber funktionelle Veränderungen an den Nervenzellen der Netzhaut.

Nachdem es mir gelungen war, durch Vergleich verschiedener Härtungs- und Färbungsmethoden ein einfaches und doch zuverlässiges Verfahren zur Darstellung der feineren Nervenzellstructur der Retina auszuwählen, versuchte ich auf experimentellem Wege der Frage näher zu treten, ob, resp. welche morphologischen Unterschiede sich an den Ganglienzellen der Retina nachweisen lassen, die man mit Sicherheit als den Ausdruck einer physiologischen Function der Zellen ansehen könnte.

Es hat nicht an zahlreichen Untersuchern gefehlt, die, namentlich nach Bekanntwerden der Nissl'schen Färbungsmethode, diese wichtige Frage auf experimentellem Wege zu lösen suchten.

Die meisten derselben (Hodge (79), Vas (183), Lambert (107), Levi (111), Magini (117), Valenza (182), Lugaro (113) benutzten als Reiz den faradischen oder galvanischen Strom, nach dessen kürzerer oder längerer Einwirkung sie einerseits eine Volumzunahme der Zelle (Vas (183), Lugaro (115), Hodge (79)) und des Zellkerns (Korybutt-Daszkiewicz (101), Hodge (79), Mann (118))

eine Kernwanderung (Vas(183), Lambert(107), Magini(117)), andererseits eine Vermehrung der chromatischen Substanz beobachten. Gegen diesen Thätigkeitszustand suchte man den Ermüdungszustand der Zelle abzugrenzen, als dessen Ausdruck man Volumverminderung des Kerns und Protoplasma (Lugaro(115), Pognat(149)) Verminderung der chromatischen Substanz (Lugaro(115), Pognat(149)) und periphere Anordnung derselben (Vas(183), Lambert(107), Pognat(149)) ansah.

Im Einzelnen stimmen die Untersuchungsergebnisse der genannten Forscher wenig überein, und es finden sich solche, die sich direct widersprechen. So wird beispielsweise die vermehrte Färbbarkeit von den Einen (Nissl(141), Vas(183)) als Ausdruck der Activität, von Anderen (Hodge(99), Mann(118)) als Ausdruck der Ruhe der Zelle angesehen.

Zum Theil ist wohl diese Differenz dadurch zu erklären, dass der verwendete elektrische Reiz nach Zeit der Einwirkung und Stromstärke bald einen der Function ähnlichen Zustand der Zelle, bald einen Ermüdungsprocess derselben herbeiführte.

Aber selbst wenn man zugiebt, dass constante Veränderungen der Structur sich als Folge der elektrischen Reizung nachweisen lassen, ist damit die Frage nach einer functionellen Aenderung der Protoplasma- und Kernstruktur noch keineswegs beantwortet. Wie Nissl(141) hervorgehoben hat, ist der faradische Reiz experimentell gleichwerthig mit chemischen, thermischen und traumatischen Reizversuchen der Nervenzellen, dagegen nicht dem functionellen Reiz der Nervenzellen auch bei Verwendung schwächster Stromintensitäten gleich zu setzen. Die Resultate der genannten Forscher lassen sich mithin nicht einfach auf den functionellen Zustand der Nervenzellen übertragen.

Aus diesen Gründen ist von mehreren Autoren der

Einfluss des adaequaten Lichtreizes auf die Retinazellen untersucht worden.

Schon Gradenigo (146. 1885) hatte eine Abrundung der Körner der äusseren Körnerschicht nach Lichteinwirkung beschrieben; Denissenko (36. 1887) eine Verbreiterung der äusseren und inneren Körnerschicht, wobei die inneren Körner spindelförmiger, die pericellulären Räume der Ganglienzellen breiter werden sollten. Auch Angelucci (2 1887) schilderte eine Verdickung der äusseren Körner und ein deutlicheres Hervortreten der pericellulären Räume nach Einfluss intensiver Beleuchtung.

Die feinere Structur der Nervenzellen war diesen Forschern zu der Zeit, als sie ihre Versuche anstellten, noch unbekannt. Erst Mann (118. 1894) gelang es, an der Netzhaut des Hundes durch sorgfältige Vergleichung des hell- und dunkel adaptirten Auges und geeignete Härtungs- und Färbungsmethoden (Sublimat-Alkoholhärtung, Färbung mit Toluidinblau) morphologische Unterschiede nachzuweisen, die er in folgenden Sätzen zusammenfasst:

1. Während der Ruhe (Dunkeladaptation) speichert sich die chromatische Substanz in der Nervenzelle an, um während der Function verbraucht zu werden.

2. Activität der Zelle (an sympathischen-, motorischen, und sensorischen Zellen) ist begleitet von einer Grössenzunahme der Zellen, Zellkerne und Nucleolen.

3. Ermüdung der Nervenzelle äussert sich in Schrumpfung der Kerns und wahrscheinlich der Zelle und Bildung einer diffusen chromatischen Substanz im Kern.

Bach (7) kam bei Nachprüfung der Mann'schen Resultate an den Netzhautganglienzellen von Hunden nach Einwirkung von Gasglühlicht, Gaslicht, concentrirtem Lampenlicht (20 Stunden) (Färbung nach Nissl oder mit Thionin, 18 mal Alkohol 4 mal Sublimathärtung) zu einem negativen Resultate. „Weder in der Menge, noch in der Anordnung, der Form der färbbaren Plasmaschollen, noch in der Grösse, der Lagerung, der Tinction und Durchsichtigkeit der Kerne konnte ich constante, markante principielle Unterschiede zwischen beleuchteten, verdunkelten, normalen Netzhäuten entdecken.“

Bach (7) weist darauf hin, dass sich auch an normalen Ganglienzellen der Netzhaut Unterschiede hinsichtlich Menge, Anordnung und Form der färbbaren Plasmaschollen finden, dass

auch normaler Weise Vacuolen im Zelleib gefunden würden, dass die Kerne sich ebenfalls verschieden verhalten könnten.

Ebenso war seine Untersuchung der übrigen Elemente der Netzhaut bisher negativ. — Trotzdem hält Bach (7) „wegen der Verschiedenheit seiner Versuchsanordnung von derjenigen Mann's (Mann hatte an vier Hunden experimentirt, die er zwölf Stunden herumlaufen liess, das eine Auge verbunden, das andere offen) und der geringeren Anzahl von Färbungs- und Härtungsmethoden die Angaben von Mann (118) nicht für widerlegt.“

Schon aus dem eben Angeführten geht hervor, dass eine Nachprüfung der Mann'schen Experimente und der Versuch, die von ihm gefundenen Zellveränderungen auch an der Netzhaut anderer Thiere nachzuweisen, nicht zu umgehen ist, umsomehr, da es sich um eine Frage von der grössten physiologischen Bedeutung handelt und um ein Organ, das besonders günstige Verhältnisse zum Studium dieser Frage darbietet.

Ehe ich zu einer Schilderung der eigenen Experimente übergehe, habe ich noch einige Arbeiten aus neuerer Zeit zu erwähnen, die sich auf die durch Lichteinfluss in der Netzhaut und im Sehcentrum bewirkten morphologischen Aenderungen beziehen.

Pergens (146) fand an Fischen, die er nach längerer Dunkeladaptation dem Tageslichte aussetzte, und deren Netzhaut er mit Salpetersäure härtete und mit Methylenblau oder nach der Biondi-Ehrlich'schen Methode färbte, die Zellen der ganglionären Schicht mit kleineren Kernen (Chromatinverminderung) contrahirtem Protoplasma und verdickten Protoplasmafortsätzen. Ebenso soll nach ihm nach Lichtwirkung das Nuclein der anderen Schichten, mit Ausnahme der molecularen Schicht, vermindert sein. Im Dunkeln soll ein Theil des Protoplasma der Stäbchen- und Zapfenkörner die Membrana limitans überschreiten, so dass nach Pergens die äussere Körnerschicht eine Protoplasma- und Nucleinreserve darstellt, die in directer Beziehung zur Function der Stäbchen und Zapfen steht. Diese Nucleinverminderung der Sehzellen soll nach demselben Forscher am stärksten im grünen, am schwächsten im blauen Spectrallicht vor sich gehen.

Demoor (35) endlich untersuchte die Zellen im psycho-optischen Centrum von Hunden, deren eines Auge er wie Mann (118) zwölf Stunden lang dem Tageslicht ausgesetzt hatte. Er fand die dem geöffneten Auge entsprechenden Zellen weniger reich an Chromatin, die Form ihrer Kerne unregelmässig, ihr Zellvolumen vermindert. Nach 10 Minuten langer Einwirkung mittleren Tageslichtes fand sich keine Aenderung, nach halbstündiger Einwirkung eine Verminderung ihres Chromatinreichthums ohne Formänderung des Kernes.

Meine eigenen Untersuchungen habe ich an der Netzhaut des Kaninchens angestellt, einmal, um die Untersuchungen von Mann (118) und Demoor (35) am Hunde zu ergänzen, und dann, weil mir die Netzhautganglienzellen dieses Versuchstieres durch die Voruntersuchungen am genauesten bekannt und wegen der Grösse und Structur der Chromatinschollen besonders geeignet erschienen.

Ausserdem habe ich auch die Mann'schen (118) Resultate am Hunde nachgeprüft.

Dem Versuchsthier wurden die Lider des einen Auges vernäht, und der Abschluss vom Licht durch eine an die Haut genähte Kappe von geschwärztem Waschleder gesichert. Dann wurde das Thier, nach mehrstündigem Aufenthalt im Dunkeln, auf das hell von der Sonne beschienene Dach eines Gebäudes gesetzt, wo es etwa sieben Stunden verweilte. Nach Ablauf dieser Zeit wurde es durch Genickschlag oder Decapitiren schnell getödtet, das Hellauge bei diffusum Tageslicht, das Dunkelauge im Dunkelzimmer bei rothem Licht enucleirt und sofort in warm concentrirter Lösung von Sublimat (nach Mann (119) fixirt, später in Alkohol von aufsteigender Concentration gehärtet.

Bei Härtung und Paraffineinbettung wurden genau die von Mann (119) gegebenen Vorschriften befolgt, besonders auch auf eine völlig gleichartige Behandlung der Netzhäute des Hell- und DunkelAuges geachtet.

Die gleich dicken Paraffinschnitte des Hell- und DunkelAuges (im Durchschnitt 3μ Zimmermann'sches Mikrotom) wurden neben einander paarweise und in grösserer Zahl, um die Einwirkung der Farblösungen möglichst gleichartig zu gestalten, auf dem Objectträger aufgeklebt und auf demselben durch Eintauchen resp. Uebergiessen nach der oben erwähnten

Modification der Nissl-Färbung (Thionin 10 Minuten, Erythrosin nach Held, Aqua dest. Alkohol abs., Xylol) gefärbt. In dieser Weise wurde die Netzhaut von sieben Kaninchen untersucht.

Was zunächst die Grösse der Zellen der ganglionären Schicht betrifft, so ist auf die in derselben Netzhaut vorhandene Schwankungsbreite hinzuweisen, die den Werth einer Durchschnittsberechnung auch bei grosser Zahl der Messungen wesentlich beeinträchtigt.

Es würde sich nach meinen Messungen ein Ueberwiegen der Längen- Breitendimensionen der Zellen zu Gunsten der Zellen des Hellauges ergeben:

	breit	lang
Hellauge	0,0170	0,0215 mm
Dunkelauge	0,0149	0,0198 mm
	breit	lang
Hellauge	0,0118	0,0185 mm
Dunkelauge	0,0116	0,0184 mm

Diese Unterschiede sind jedoch zu gering, um von einer Volumenzunahme des Hellauges zu sprechen.

Bedenkt man, dass weder für die Zellen des Rückenmarks nach elektrischer Reizung (Grössenzunahme der Zelle — Mann(118), Vas(183), keine Grössenzunahme — Lambert(107), Grössenabnahme — Hodge(77)), noch für die Ganglienzellen der Netzhaut nach Beleuchtung (Grössenabnahme, Contraction des Protoplasma — Pergens(146), Grössenzunahme — Mann(118)) eine Uebereinstimmung unter den Forschern besteht, so wird man jedenfalls bei der Beantwortung dieser Frage grosse Vorsicht walten lassen müssen.

Ein Moment, das bei der Beurtheilung der Grössenzunahme resp. Abnahme einer Nervenzelle eine besondere Bedeutung hat, ist die Weite des pericellulären Raumes.

Auch hier konnte ich keine durchgreifenden Unterschiede zwischen den Ganglienzellen des Hell- und Dunkel-Auges nachweisen, da sich Zellen mit weiten, eben ange-

deuteten und fehlenden Pericellular-Räumen nicht selten in derselben Netzhaut finden. Im Allgemeinen schien es mir, als ob die pericellulären Räume am Dunkelauge breiter sind, was auf eine Protoplasmacontraction während des functionellen Ruhezustandes oder eine Grössenzunahme während der Function deuten würde.

Als zweites Moment kommt das Verhalten der Nissl-körper in der Netzhaut des Hell- und Dunkelauges in Betracht. Hier ergibt sich aus meinen Untersuchungsergebnissen ein durchgreifender Unterschied, hinsichtlich der Art der Begrenzung dieser Gebilde!

Die Chromatinschollen des Dunkelauges, sind (wenigstens beim Kaninchen und nach den angewandten Methoden), scharf begrenzt, häufig an ihren Enden wie abgeschnitten oder feinkörnig, aber auch dann scharf von einander zu scheiden (vergl. Fig. 3).

Am Hellauge ist dagegen die Abgrenzung der einzelnen Körner viel schwieriger, oft unmöglich, was zum Theil wohl durch die diffus blaue Färbung der Protoplasmazwischensubstanz bedingt ist. Doch erhält man häufig den Eindruck, als ob die Nissl-körper eine Art von Schmelzungs- oder Verflüssigungsprocess durchgemacht hätten, wodurch auch die grösseren Gebilde an ihren Enden mehr abgestumpft, theilweise sogar mit den Nachbarkörnern zu grösseren Schollen verschmolzen erscheinen. Dabei ist es schwer zu entscheiden, ob eine Zunahme oder Abnahme der chromatischen Substanz stattgefunden hat oder ob dieselbe nur einen anderen Aggregatzustand eingegangen ist (vergl. Fig. 4).

Ein Ortswechsel der Chromatinkörper ist jedenfalls nicht nachzuweisen. Im Hell- und Dunkeladaptationszustand nehmen dieselben mit Vorliebe die Randzone der Zelle ein, doch sind bei beiden Zuständen vereinzelt Zellen zu finden, bei denen die Nisslkörper im ganzen Protoplasma verstreut liegen.

Am Kern der Ganglienzellen konnte ich, weder was seine Grösse, noch was seine Lagerung in der Zelle und die Art seiner Begrenzung betrifft, einen merklichen Unterschied zwischen dem Hell- und Dunkelauge nachweisen. Eine Wanderung des Kerns nach der Seite des Axencylinderfortsatzes zu (wie sie Magini (117) für die Ganglienzellen des Lobus electricus von Torpedo anführt), habe ich in keinem Falle beobachten können, ebenso wenig Schrumpfungsvorgänge oder Veränderungen des Kernchromatins oder des Nucleolus.

Hier ist zu bemerken, dass die Unterschiede in der Chromatinkörnung der Nervenzellen der Retina nicht so augenfällige sind, dass man ohne weiteres nach Betrachten weniger Zellen ein richtiges Urtheil über den Adaptationszustand fällen könnte. Eine grosse Zahl von Zellen stellt in ihrer Nisslgranulirung Uebergangsformen dar, welche bald mehr dem Dunkel, bald dem Helltypus entsprechen. Trotzdem gelang es mir nach ausreichender Uebung an Controlpräparaten, in der Mehrzahl der Fälle (9 von 10) nach genauer Untersuchung zahlreicher Zellen den Adaptationszustand, von dem die betreffenden Präparate stammten, richtig zu bestimmen. In gleicher Weise gelang dies meinem Freunde Herrn Dr. Garten, Assistent am physiologischen Institute, dem ich eine grössere Zahl von Präparaten ohne Bezeichnung vorlegte.

Die Körner der inneren Netzhautschicht liessen bei meinen Untersuchungen mit grosser Uebereinstimmung eine Verschiedenheit im Verhalten zwischen belichtetem und unbelichtetem Auge erkennen. Die Körner der dunkeladaptirten Netzhaut besitzen eine annähernd rundliche Gestalt. In ihrem Innern sind durch Thioninfärbung ein oder mehrere intensiv blau gefärbte Kernkörperchen zu erkennen, und ein zartes Netz dünner blauer Fäden, in dessen Maschen mit Erythrosin röthlich gefärbte Granula liegen, die, wenn sie deutlich hervortreten, den Körnern ein fein

granuläres Aussehen geben (vergl. Fig. 3). In der Netzhaut des belichteten Auges tritt dieses feinkörnige Chromatin weniger hervor. Es erscheint auch nicht mehr so gleichförmig vertheilt. Während es stellenweise in Form gröberer Körnchen in den Maschen des Reticulum enthalten ist, fehlt es an anderen Stellen fast vollständig, so dass die Structur des Kernes aus einer feinkörnigen in eine mehr grobkörnige umgewandelt ist, und das blaue Fadengerüst stellenweise deutlicher hervortritt. Manche Zellen erscheinen sogar auffallend blass, fast bläschenförmig und lassen nur noch Andeutungen des blauen Fadengerüsts erkennen. Die Form der Körner ist im Hellauge eine vorwiegend länglich ovale (vergl. Fig. 2).

Auf einen Umstand möchte ich noch hinweisen, der im Hellauge nicht selten zur Beobachtung kommt. Neben den geschilderten Zellformen finden sich mehr polygonal begrenzte Zellen, die sich mit Thionin lebhafter tingiren, so dass die Einzelheiten der Structur mehr verwaschen sind. Es handelt sich hierbei jedenfalls um chromophile Zellen, die wohl auch im dunkeladaptirten Auge, vielleicht in gleicher Zahl vorhanden sind, dort jedoch wegen des Chromatingehaltes der anderen Zellen weniger deutlich hervortreten.

Die äusseren Körner liessen bei der genauen vergleichenden Untersuchung zwischen der belichteten und unbelichteten Netzhaut in fast allen Fällen einen Unterschied erkennen, den man deshalb wohl mit Recht auf die Aenderung des functionellen Zustandes beziehen wird. Während die Grösse ihrer Chromatinkörner und damit die Breite der bandartigen Zwischenräume bei beiden Adaptationszuständen annähernd gleiche Verhältnisse zeigen, ist am dunkeladaptirten Auge auffällig das deutliche Hervortreten der Zackung an den Chromatinkörpern, die nach Einwirkung des Lichtes ganz fehlt oder eben nur angedeutet ist (vergl. Fig. 2).

Es haben sich somit folgende Unterschiede beim Ver-

gleiche der Structur der einzelnen Netzhautschichten des Hell- und Dunkelauges (beim Kaninchen) ergeben:

1) An den Ganglienzellen ist weder hinsichtlich der Grösse und Form der Zelle noch der Weite des pericellulären Raumes ein durchgreifender Unterschied nachzuweisen. Dagegen verlieren die Chromatinkörper im Protoplasma der Zellen nach mehrstündiger Einwirkung des hellen Tageslichtes ihre scharfe Begrenzung, erscheinen an den Enden abgestumpft und verschmelzen scheinbar zu grösseren Schollen.

Am Kern und Kernkörperchen treten keine typischen Unterschiede hervor.

2) Die Körner der inneren Körnerschicht sind im Dunkelauge chromatinreicher, von rundlich ovaler Gestalt, im Hellauge chromatinärmer, länglich oval.

3) An der äusseren Körnerschicht verliert sich die am Dunkelauge fast constant nachweisbare Zackung der Chromatinkörper nach längerer Lichteinwirkung.

Zu einem genaueren Studium der Pigmentwanderung und der morphologischen Veränderungen an den Sehzellen war die angewandte Härtungsmethode wenig geeignet, doch lag deren Untersuchung auch nicht im Plan der vorliegenden Arbeit.

Vergleicht man diese Resultate mit denen, die Mann (118) von der Netzhaut des Hundes berichtet, so ergibt sich vor allem an der Kaninchennetzhaut das Fehlen einer nachweisbaren Grössenzunahme der Zellen, Zellkerne und Nucleolen, während der Activität der Zelle. Der von Mann (118) beschriebene Chromatinreichthum der ruhenden Netzhautzelle kann, was die inneren und äusseren Körner betrifft, ohne weiteres, hinsichtlich der Ganglienzellen unter der Voraussetzung bestätigt werden, dass man in dem an den Zellen des Hellauges bemerkbaren Undeutlichwerden den Beginn eines Chromatinschwundes erkennen will.

Für diese Ansicht liesse sich die Thatsache anführen

dass nach Anwendung besonders intensiver Lichtreize (wie bei den später zu berichtenden Blendungsversuchen) ein vollständiger Schwund der Chromatinkörper einzutreten pflegt.

Die Differenz der vorliegenden Resultate von denen Manns (118) forderte naturgemäss dazu auf, die gleichen Experimente am Hunde zu wiederholen.

Es geschah dies in zwei Fällen und in der gleichen Versuchsanordnung. Die Thiere bewegten sich, das eine Auge vernäht und verbunden, an einem sonnighellen Augusttag im Freien und wurden am Nachmittage des gleichen Tages enthauptet, das eine Auge im diffusen Tageslicht, das andere bei rothem Licht in der Dunkelkammer fixirt. Die mikroskopische Untersuchung führte zu folgenden Resultaten:

Beim Hunde sind die Netzhautganglienzellen, wenigstens die grössten Exemplare — auch hier bestehen beträchtliche Schwankungen in der Grösse —, erheblich grösser als die des Kaninchens, und ihre chromatische Structur zeigt wesentliche Abweichungen. Die Nisslkörper sind nämlich über das ganze Zellprotoplasma verstreut und erinnern in ihrer Anordnung an die Chromatinkörper der Spinalganglienzellen, auch insofern, als sie grobschollige Massen darstellen, die sich rundlich und scharf begrenzt von der zwischen ihnen netzartig zusammenhängenden Grundsubstanz abheben. Wenn auch in manchen Zellen ein besonders dichter Kranz von Schollen die Peripherie einnimmt, so ist dies doch bei weitem nicht so häufig, als in den Netzhautganglienzellen des Kaninchens. Man findet andererseits auch Zellen, bei denen die directe Umgebung des Kerns den Hauptsitz der Nisslkörper darstellt, während der ganze periphere Theil der Zelle dieselben fast völlig entbehrt.

Der Vergleich zwischen den Zellen des helladaptirten und dunkeladaptirten Auges wurde an Präparaten vorgenommen, die genau nach der Mann'schen (119) Vorschrift fixirt und gehärtet, zusammen eingebettet (die Netzhaut des

Dunkelauges an der anhaftenden Chorioidea kenntlich), geschnitten und auf gleichem Objectträger gefärbt wurden, so dass der Einwurf, dass kleine Variationen in der Färbungs- und Härtungsmethode zu Differenzen in der Zellstructur geführt haben könnten, fast mit Sicherheit abzuweisen ist.

Hinsichtlich der Grösse der Zellen konnte ich zwischen Hell- und Dunkellauge keinen merklichen Unterschied nachweisen. Vielleicht traten die pericellulären Räume bei letzterem etwas deutlicher hervor, ohne dass ich mich für berechtigt halte, von einer Volumzunahme der Zelle nach der Beleuchtung zu sprechen. Auch der Kern der Ganglienzellen bot weder Schrumpfs- noch Schwellungserscheinungen dar, während der Nucleolus der Ganglienzellen des Dunkelauges meist grösser und dunkler blau gefärbt erschien. Eine Wanderung des Kerns an die Zellperipherie konnte ich im Gegensatz zu Mann (118) nicht wahrnehmen. Sowohl im Hell-, als auch im Dunkeladaptationszustand finden sich reichlich Zellen, deren Kern central gelegen ist neben solchen, wo er die Protoplasma-membran berührt.

An den Nisslkörpern tritt im Hellauge gegenüber dem Dunkelzustand eine leichte Verwaschenheit und blassere Färbung hervor, ohne dass man von einem deutlichen Schwund derselben reden könnte. Auch in ihrer Lagerung zeigen sie keine durchgreifende Aenderung. Die Grundsubstanz ist im Hellauge an manchen Stellen leicht bläulich gefärbt und erschwert dadurch die Abgrenzung der Chromatinkörper ganz in gleicher Weise, wie ich das an der Kaninchennetzhaut beobachten konnte. Der Chromatinverlust des Hellauges ist an den inneren Körnern deutlich ausgesprochen. Während dieselben beim Dunkellauge von rundlicher Form mit feinen blauen Körnchen erfüllt sind, erscheinen sie in der Netzhaut des Hellauges vielfach polygonal und auffallend blass (vergl. Fig. 4).

Die äusseren Körner, die bei Dunkeladaptation wie beim Kaninchen eine deutliche Querbänderung jedoch ohne Zackung der Chromatinkörper zeigen, lassen im Hellauge bei Verminderung ihres Chromatingehaltes ein feines blaues Netzwerk hervortreten, welches im Dunkelauge nicht zu erkennen war.

Als drittes Versuchsthier schien mir die Katze besonders geeignet wegen ihrer hochgradigen Lichtscheu im Vergleich mit Hund und Kaninchen.

Betrug auch die Zahl der angestellten Versuche nur zwei, so war doch das Ergebniss der mikroskopischen Untersuchungen übereinstimmend genug, um einen Schluss auf das Verhalten der Nervenzellstructur dieses Versuchstieres bei Hell- und Dunkeladaptation zu gestatten.

Die Chromatinkörper der Netzhautganglienzellen der Katze sind im Dunkelauge sehr feinkörnig und über das ganze Protoplasma verstreut, wenn sie auch peripher und in directer Umgebung des Kerns am reichlichsten lagern und daselbst stellenweise zu länglichen Schollen dicht geordnet sind. Der Kern liegt, rundlich und scharf begrenzt, meist excentrisch und enthält ein feinkörniges Chromatinnetz und einen centralen, runden Nucleolus. Auch in den Protoplasmafortsätzen und vereinzelt im Axencylinderfortsatz sind Chromatinkörnchen nachweisbar.

Die inneren Körner, rundlich oder oval, enthalten ein violettgefärbtes, aus feinen Körnchen zusammengesetztes Netzwerk und 1 bis 3 relativ kleine, meist peripher gelegene Nucleolen.

Die äusseren Körner, von länglicher Gestalt, lassen 3 bis 5 scharfbegrenzte, durch eine röthliche körnige Zwischensubstanz von einander getrennte Chromatinkörper unterscheiden.

Im Hellauge sind die Ganglienzellen ärmer an Chromatinkörnern, die entweder in directer Umgebung des Kerns oder in der Zellperipherie kranzartig angeordnet sind und

sich von der in ihrer Umgebung leicht bläulich gefärbten Grundsubstanz weniger scharf abheben. Der Kern der Ganglienzellen ist ziemlich gross, vielleicht etwas grösser als im Dunkelauge, findet sich aber ebensowohl peripher als, wenn auch seltener, in der Mitte der Zelle. Das Kernkörperchen zeigt die gleiche Structur wie am Dunkelauge.

Die inneren Körner sind im Allgemeinen blasser gefärbt. Ihre körnige Structur und besonders die blauen Kernkörperchen treten viel weniger deutlich hervor.

Die äusseren Körner sind kleiner, entschieden chromatinärmer. Viele derselben enthalten helle Tröpfchen, die nach Form und Lage Chromatinkörnern entsprechen.

Es ergibt sich also wesentlich eine Uebereinstimmung in den functionellen Unterschieden der Netzhautzellen im Kaninchen-, Hunde- und Katzenauge.

Auch bei letzterem besteht die Differenz in einem Chromatinverlust der inneren und äusseren Körner, in einem Verwaschensein der Structur der Nisslkörper der Ganglienzellen, das wohl als der Beginn eines Auflösungsprocesses der chromatischen Substanz aufzufassen ist. Dagegen fehlte auch beim Hund und bei der Katze Volumänderung der Zelle und des Zellkerns, und eine Wanderung des letzteren nach der Zellperipherie.

Immerhin sind auch bei Hund und Katze wie beim Kaninchen die bezeichneten Unterschiede nicht hochgradig genug, um nach Betrachtung einer oder weniger Ganglienzellen und ohne Berücksichtigung der anderen Schichten, mit Sicherheit die Diagnose des Adaptationszustandes zu ermöglichen. Sowohl im Hell-, als auch im Dunkelauge giebt es chromophile Ganglienzellen und solche, die nach Zahl und Form ihrer Nisslkörper die Mitte einhalten zwischen dem, was ich als Typus des Hell- und Dunkelauges beschrieben habe. Ferner kommt dabei in Betracht, dass auch bei gut gelungener Sublimathärtung nicht so selten Schrumpfungerscheinungen an einem Theil der Zellen

hervortreten, während andere Ganglienzellen des gleichen Präparates oft unmittelbar neben geschrumpften Zellen nicht die geringste Andeutung von Schrumpfung erkennen lassen. Dass die gleichen Verhältnisse auch die Beurtheilung feiner Structuränderungen in anderen Ganglienzellen erschweren, ist von fast allen Untersuchern zugegeben worden.

Trotzdem wäre es zu weit gegangen, wenn man die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen Hell- und Dunkelauge auf Grund genauer Untersuchung der chromatischen Structur der Ganglienzellen bestreiten wollte.

Ueber Veränderungen der Netzhautzellen nach Blendung mit elektrischem Bogenlicht.

Die Zahl der Untersuchungen, welche die Einwirkung des elektrischen oder intensiven Sonnenlichtes auf das Auge zum Gegenstand haben, ist keine geringe. Es genüge an dieser Stelle, auf einige derselben einzugehen, die nicht nur über Veränderungen an den vorderen Medien berichten, sondern auch die anatomischen Verhältnisse im Augenhintergrunde, speciell in der Netzhaut, genauer ins Auge fassen.

Hier sind zunächst die Versuche von Czerny (32, 1865) zu erwähnen, der bei vielen Thierarten durch Blendung mit concentrirtem Sonnenlicht ein Exsudat zwischen Pigmentepithel und Choriocapillaris, Zerfall der Stäbcheninnenglieder und Umwandlung der Netzhaut in eine dünne bindegewebige Membran beobachtete. Sulzer (174) und Deutschmann (37, 1882) fanden exsudative chorioretinitische Veränderungen der Maculagegend nach Sonnenblendung, Leber (109) nach Blitzschlag partielle Atrophie des Sehnerven, die er auf directe elektrische Entladung bezog, Laker (106), Vossius (185), Uhle (179), Silex (168), Knies (94) Netzhautablösung, Blutungen der Macula, Anaemie und partielle Atrophie des Sehnerven, Neuritis optica.

Die Einwirkung des elektrischen Lichtes auf das Auge untersuchten besonders in klinischer Hinsicht Rockliffe (155), Emry Johnes (85), David Little (112) und Terrier (176). Der Letztgenannte unterscheidet eine leichte

Form der Blendung mit unverändertem Augenhintergrund und eine schwere Form mit meist vorübergehender partieller oder totaler Amaurose.

Objectiv war in diesen Fällen analog denen von Schneeblindheit (Envall (46), Reich (151) u. A.) und Blendung durch Blitzschlag [Vossius (185), Martin (125), Terrier (176)] nur eine Hyperaemie der Retina nachzuweisen.

Durch die Experimente von Widmark (186) wurde fernerhin wahrscheinlich gemacht, dass bei all diesen Blendungen die ultravioletten Strahlen das wesentlich schädigende Moment darstellen. Wenigstens besitzen diese Strahlen allein die Fähigkeit, in den vorderen Augenmedien des Kaninchens Reizungs- und exsudative Vorgänge zu erzeugen.

In der Netzhaut riefen dieselben Strahlen scheiben- und ringförmige grauweisse Heerde mit ziegelrother oder gelber Umgebung hervor, die mikroskopisch zunächst einen Zerfall der Stäbchen und Zapfen und äusseren Körnerschicht, später der Nervenfaserschicht und des Pigmentepithels, erst zuletzt (nach mindestens zweistündiger Blendung) einen Zerfall der inneren Körnerschicht und Ganglienzellen erkennen liessen.

In neuerer Zeit (1896) hat Ogneff die Wirkung des elektrischen Bogenlichtes auf die Gewebe des Auges untersucht.

Er fand im Vergleich mit den an der Cornea und Uvea gefundenen Veränderungen die der Netzhaut ausserordentlich gering.

Eine genauere Untersuchung der feineren Zellveränderungen nach experimentell erzeugter Blendung mit Hilfe der Nissl'schen Färbungsmethode ist meines Wissens bisher noch nicht angestellt worden.

Derartige Versuche beanspruchen sowohl als Ergänzung zu den oben erwähnten Versuchen über functionelle morphologische Aenderung der Netzhautzellen, als auch als Uebergang zu den Veränderungen der Netzhautganglienzellen nach anderen pathologischen Einwirkungen ein besonderes Interesse.

Die Blendungsversuche habe ich im physiologischen Institut zu Leipzig an Kaninchen in der Weise vorgenommen, dass ich die durch eine Convexlinse gesammelten, durch einen Wassertrog ihrer Wärmewirkung beraubten

Strahlen einer elektrischen Bogenlampe auf das Auge des Versuchsthieres verschieden lange Zeit (5 Minuten, 20 Minuten, 50 Minuten) einwirken liess.

Schon ca. 1 Minute nach Beginn des Versuches machte sich eine leichte Trübung der Hornhaut und der Linse bemerkbar, die während der ersten 5 Minuten annähernd constant blieb.

Die Pupille, anfangs maximal eng, erweiterte sich dann nach wenigen Minuten bis über Mittelweite und blieb dann mittelweit und reactionslos bis zum Ende des Versuches.

In einem Falle (Fall I) wurde erst das rechte Auge des Thieres 5 Minuten lang geblendet, dann nach einer Erholungszeit von 1 Stunde das linke Auge ebenfalls 5 Minuten lang, und dann das Thier sofort getödtet. In den anderen beiden Fällen wurde nur ein Auge 20 resp. 50 Minuten lang geblendet und mit dem gesunden Auge des Thieres sofort nach Beendigung des Versuches in Sublimat fixirt und nach der oben erwähnten Methode untersucht.

Nach 20 Minuten dauernder Blendung war eine milchig weisse Trübung im Centrum der Hornhaut mit mangelndem Glanz und feiner Stichelung der Oberfläche zu bemerken. Nach 50 Minuten Blendungsdauer war die vordere Kammer fast aufgehoben, die Iris lag der hinteren Hornhautfläche an. Die Linse zeigte sich in den vorderen Schichten intensiv getrübt, während ihr hinterer Theil klar durchsichtig geblieben war. Am Glaskörper und der Netzhaut waren makroskopisch keine Veränderungen sichtbar.

Die mikroskopische Untersuchung der Netzhaut ergab folgende Einzelheiten:

Fall I, linkes Auge, 5 Minuten geblendet, dann sofort enucleirt. Die pericellulären Räume der Ganglienzellen treten auffallend wenig hervor, meist fehlen sie ganz. Die einzelnen Zellen sind scharf begrenzt, bieten keine Schrumpfungerscheinungen. Auch der meist peripher, selten central gelegene Kern ist ziemlich gross, scharf begrenzt und enthält ein ziemlich grosses, scharf begrenztes Kernkörperchen

und feinkörniges, acidophiles, netzartig geordnetes Chromatin. Die Nisslkörper sind nur spärlich vorhanden und feinkörnig dabei scharf begrenzt (vergl. Fig. 5a). Die innere und äussere Körnerschicht bietet dieselben Verhältnisse dar, wie sie oben für das Hellauge beschrieben sind. Die Aussenglieder der Stäbchen und Zapfen sind zerfallen. Die Netzhaut des rechten Auges, das nach ebenfalls 5 Minuten langer Blendung sich 1 Stunde lang im Dunkeln kaum erholt hatte, zeigt einen grösseren Reichthum an Nisslkörpern, die auch weniger körnig als spindel- und stäbchenförmig, besonders den peripheren Theil des Protoplasmas einnehmen (vergl. Fig. 5b).

Die Kerne sind durchschnittlich kleiner als am anderen Auge. Der pericelluläre Raum ist deutlich ausgeprägt, was auf eine Volumverminderung der Zelle und des Kernes während der Erholungszeit und eine Anreicherung an chromatischer Protoplasmasubstanz schliessen lässt. Auch die inneren und äusseren Körner zeigen vermehrten Chromatingehalt — an letzteren tritt die für das Dunkelauge charakteristische Zackung hervor.

Fall II. Nach einer Blendung von 20 Minuten machen sich sowohl am Protoplasma als am Kern Schrumpfungs- und Zerfallerscheinungen bemerkbar. Die Zellen sind ziemlich gross, entschieden grösser, als die des nicht geblendeten anderen Auges. Ihre Begrenzung ist häufig unscharf oder zeigt sinuöse Einkerbungen. Ebenso ist der Kern buchtig geschrumpft, häufig unscharf. Der meist ganz peripher gelegene Nucleolus ist unregelmässig begrenzt.

Das Protoplasma der Zellen ist fast homogen diffus violett gefärbt — Nisslkörper sind auch im peripheren Theil desselben nicht nachzuweisen. Doch finden sich blässere Stellen in der Grundsubstanz, die nach Form und Lage den Chromatinkörpern entsprechen. An den inneren Körnern ist ein Zerfall des Reticulums in feine blaugefärbte Körnchen und ein sehr kleiner, häufig peripher gelegener Nucleolus auffällig. Die Stäbchenkörner sind länglich oval, nicht gezackt und zeigen nur eine Andeutung der Querbänderung. Die Stäbchen- und Zapfenschicht ist vollständig zerfallen.

Fall III. Nach einer Blendung von 50 Minuten Dauer sind die Schrumpfungerscheinungen der Ganglienzellen noch mehr ausgeprägt. Die Zellen sind kleiner, als in Fall II, ihre Begrenzung ist häufig unscharf. Die ebenfalls geschrumpften Kerne sind fast homogen, röthlich gefärbt und enthalten einen

kleinen häufig eckigen Nucleolus. Nisslkörper fehlen vollständig in der diffus violett gefärbten Grundsubstanz. Die inneren Körner sind theilweise auffallend dunkel gefärbt, mit krümligem Inhalt und unregelmässiger Contour, theilweise bläschenförmig hell. Die äusseren Körner sind rundlich, nicht gezackt, mit schmaler Trennungsschicht der Chromatinkörper, während an den entsprechenden Zellen des nicht geblendeten anderen Auges die Zackung und Querbänderung deutlich hervortritt.

Es ergibt sich somit als Effect der Blendung des Kaninchenauges mit intensivem elektrischem Licht zu einer Zeit, wo makroskopische gröbere Veränderungen der Netzhaut noch nicht nachzuweisen sind, ein Schwund des Protoplasmachromatins der Ganglienzellen mit diffuser Hyperchromatose der Grundsubstanz und eine Volumzunahme der Zelle und des Zellkernes, dem bald ein Schrumpfungsprocess beider nachfolgt. Dass es sich, wenigstens nach kurz dauernder Blendung, um eine reparable Veränderung der Zellen handelt, beweist der Vergleich des geblendeten mit dem erhaltenen Auge (vergl. Fig. 5a und b).

Aus diesem Grunde und wegen der auffallenden Uebereinstimmung der Befunde von Fall I mit den von Mann (118) geschilderten Resultaten, möchte ich annehmen, dass in Fall I durch kurzdauernde Blendung ein erhöhter physiologischer Reizzustand der Netzhautganglienzelle geschaffen wurde, während bei den anderen Versuchen die länger dauernde Blendung einen der Ermüdung andersartiger Nervenzellen analogen (Hodge (79), Pognat (149), Mann (118) u. A.) Zustand erzeugte oder zu pathologischen Veränderungen führte.

Für die Beurtheilung der Bedeutung der Nisslkörper in der Nervenzelle sind die Versuche insofern lehrreich, als sie zeigen, dass ein Zerfall und Schwund der Chromatinkörper noch vor dem Auftreten tiefgreifender Zellveränderungen Platz greifen kann (wie das auch an den

Rückenmarks- und Gehirnzellen durch die Beobachtungen erwiesen ist) und dass dieselben nach relativ kurzer Zeit neuersetzt werden können. Das spricht für die besonders von Goldscheider und Flatau (61) vertretene Ansicht, dass den Nisslkörpern wesentlich eine nutritive Bedeutung für die Nervenzelle zukommt, und dass die Function der Zelle nicht ausschliesslich an die Chromatinkörper gebunden ist.

Ueber Veränderungen der Netzhautzellen nach Sehnervdurchschneidung.

Die Veränderungen, welche nach Ligatur oder Durchschneidung von Nervenstämmen in der feineren Structur der zugehörigen Ganglienzellen auftreten, sind in neuerer Zeit durch eine grosse Zahl von experimentellen Arbeiten erforscht worden. Ich erinnere hier nur an die Untersuchungen Nissl's (141) am Facialiskern des Kaninchens, bei denen schon nach 24 Stunden Zerfall der chromatischen Substanz in feine, blasse Körnchen auftrat, während in späteren Stadien, besonders nach dem 10. Tag Schwellung und Unregelmässigkeit der Grenzlinien der Zellen, Färbung der chromatischen Substanz, Wanderung des Kerns nach der Zellperipherie hervortraten.

Diese Befunde Nissl's wurden von Onuf (145), Flatau (49) am Oculomotoriuskern der Katze — (nach Durchschneidung der Nerven), Colenbrander (30) (Durchschneidung des Plex. brach.), Bernheimer (15) (am Oculomotoriuskern) bestätigt.

Durch die Untersuchungen von Lugaro (113), Marinesco (122) und Flemming (50) wurden weiterhin die gleichen oder ähnliche Veränderungen an den sensiblen Ganglienzellen der Spinalganglien nach Durchschneidung der peripheren Wurzeln nachgewiesen. Marinesco (122) unterscheidet hier ein Stadium der Reaction mit Auflösung der chromatophilen Elemente und Verschiebung des Zellkerns an die Peripherie, an das sich ein Stadium der Reparation

mit Volumzunahme des Zellkörpers, Rückwanderung des Kerns und Pyknomorphie anschliessen soll.

Nach Flemming (50) treten schon zwischen 4. und 7. Tag nach Durchschneidung der Nervenstämmе Veränderungen der Spinalganglienzellen auf, die in Schrumpfung des Kerns und Nucleolus, Seitenwanderung desselben, Verminderung der Zahl und Grösse der Nisslkörper und Gruppierung derselben um den Kern bestehen.

Auf die interessanten Fragen, die sich an die erwähnten Untersuchungen hinsichtlich der Bedeutung der Chromatolyse und Kernwanderung und hinsichtlich der neuerdings besonders von Bethe (16) und Apathy (3) angefochtenen Neuronenlehre anschliessen, ist hier nicht näher einzugehen.

Dass nach Sehnervdurchschneidung degenerative Prozesse der Netzhautganglienzellen eintreten, ist durch zahlreiche Untersuchungen, welche die Ermittlung des Faserverlaufs zum Zweck hatten (Samelsohn (158), Uthoff (180), Schmidt-Rimpler (164), Monakow (133), Henschen (74) u. s. w.) erwiesen worden. Doch bedienten sich die betr. Autoren keiner zur feineren Darstellung der Zellstructur so geeigneten Methode, wie sie erst in neuerer Zeit durch die Nissl'sche und ähnliche Färbungsmethoden gewonnen ist.

Die Durchschneidung des Opticus begegnet, wenn sie zu einwandsfreien Resultaten in dieser Hinsicht führen soll, in technischer Beziehung ziemlich beträchtlichen Schwierigkeiten. Es handelt sich darum, um den Einfluss der Nervendurchschneidung allein zu untersuchen, möglichst jede Gefässverletzung, vor allem die Verletzung der Art. centralis, der hinteren Ciliargefässe und Nerven zu vermeiden. Aus diesem Grunde muss die Durchschneidung in der Tiefe der Orbita geschehen, wo wiederum eine Verletzung der dicht neben dem Sehnerven gelegenen hinteren Ciliargefässe schwer zu vermeiden ist.

Doch gelang es mir in einigen Fällen, die Durch-

schneidung beim Kaninchen nach Luxation des Bulbus von oben her mit einem geknüpften Messerchen fast blut-leer auszuführen.

Die sofortige Spiegeluntersuchung überzeugte mich, das keine merkliche Aenderung im Volumen der Netzhautgefässe eingetreten war, wie sie nach einer Blutung aus den Centralgefässen recht gut nachzuweisen ist.

In einem Falle durchschnitt ich den Sehnerven vom Gehirn aus dicht vor seinem Eintritt durch das Foramen opticum und tödtete das Thier 55 Stunden später durch Genickschlag. Die anderen Versuchsthiere wurden 5, 10 und 15 Tage nach der Durchschneidung des Sehnerven in gleicher Weise getödtet.

Die Veränderungen an den Netzhautzellen stimmten in allen Fällen gut überein, nur dass sie bei den später getödteten Thieren deutlicher ausgesprochen waren.

Aber schon nach 55 Stunden fanden sich beträchtliche Abweichungen von der normalen Structur.

Während in der Netzhaut der normalen Seite die Ganglienzellen mässig reich an scharfbegrenzten peripher gelegenen Chromatinkörpern, ohne Zeichen von Volumänderung, die innere und äussere Körnerschicht wohl erhalten sind, zeigen die Ganglienzellen desjenigen Auges, dessen Sehnerv durchschnitten wurde, das Bild der Chromatolyse mit verwaschen blau gefärbtem Protoplasma und unscharfer Begrenzung der Chromatinschollen. Der Kern ist gross, anscheinend geschwollen, diffus violett gefärbt. Meist berührt er die Membran der Zelle, doch trennt ihn an manchen Zellen noch ein Protoplasmasaum von der Peripherie, so dass die Diagnose einer Ortsveränderung des Kerns, da schon, wie erwähnt, in den Netzhautganglien normaler Weise erhebliche Schwankungen in der Lage des Kerns vorkommen, mit grosser Vorsicht zu stellen ist. Das Kernkörperchen ist gross, häufig unregelmässig geformt.

Die inneren Körner sind klein, chromatinreich,

häufig unregelmässig begrenzt, die äusseren Körner rundlich, ohne Zackung, nur theilweise mit Andeutung der normalen Schichtung.

Nach 5, 10 und 15 Tagen sind die Erscheinungen der Chromatolyse, der Schrumpfung der Zelle und des Zellkerns noch deutlicher ausgesprochen. An Stelle der Nisslkörper ist nur noch eine dunkelblau gefärbte krümlische unscharf begrenzte Masse zu erkennen. In anderen Zellen fehlt die chromatische Substanz gänzlich. Dafür enthält das röthlich gefärbte Protoplasma zahlreiche kleinere und grössere Vacuolen.

Dass es sich auch bei letzteren nicht um Kunstproducte handeln kann, lehrt das Fehlen derselben an der genau in gleicher Weise behandelten Netzhaut des anderen Auges.

Wie man sieht, stimmen die nach Sehnervdurchschneidung an den Netzhautganglienzellen gefundenen Veränderungen mit den Beobachtungen der oben erwähnten Autoren fast völlig überein.

Doch zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen Ergebnissen und den an sensiblen Nervenzellen (der Spinalganglienzellen) erhobenen Befunden.

Von Lugaro (114), Marinesco (124) u. A. wird behauptet, dass die Spinalganglienzellen nur nach Schädigung ihrer peripheren Aeste zu Grunde gehen, nach Läsion ihrer centralen Fortsätze dagegen unverändert bleiben. Danach hätte man nach Durchschneidung der centralen Sehnervenfasern ein Intactbleiben der Zellen des Ganglion retinae erwarten sollen.

Wie diese Verschiedenheit in dem Verhalten sensibler Ganglienzellen zu erklären ist, ob die von einzelnen Autoren behaupteten centrifugalen Fasern im Sehnerven hierbei eine Rolle spielen, oder ob in anderen anatomischen Differenzen eine Ursache dieses scheinbaren Widerspruches zu finden ist, bleibt weiteren Untersuchungen überlassen.

Ueber den Einfluss von Circulationsstörungen auf die Structur der Netzhautganglienzellen.

Dass schon vorübergehende Störungen in der Blutcirculation wesentliche Aenderungen in der feineren Structur der Ganglienzellen des Gehirns und Rückenmarkes herbeizuführen vermögen, ist durch eine Reihe experimenteller Versuche aus neuerer Zeit dargethan worden.

So fand Sarbo (159) nach einstündiger Compression der Bauchaorta nach $1\frac{1}{2}$ Stunden die Nisslkörper in den Spinalganglienzellen weniger scharf, den Kern hellblau gefärbt, nach 24 Stunden Zerfall der chromatischen Substanz mit Auftreten von Vacuolen und acuter Homogenisation mit Atrophie des Kernes. Lamy (108) beobachtete nach Aortenligatur ebenfalls fortschreitenden Zerfall der Nisslkörper, in den Dendriten beginnend.

Zu gleichen Resultaten kamen Marinesco (122), Ballet und Dutil (10), während Juliusburger (86) nach Aortencompression einen vom Centrum der Zelle beginnenden oder sectorenförmigen Zerfall der chromatischen Substanz schildert.

Ganz analog waren die Befunde nach localer Anaemie durch embolische Gefässverstopfung. Hier ist auf die Untersuchungen von Monti (134) (Varicositäten der Dendriten, Entartung der Ganglienzellen 48 Stunden nach Gehirnenbolie) und Lamy (108) (peripherer Zerfall der Nisslkörper, Wanderung des Kernes an die Peripherie, Abbröckelung der Protoplasmafortsätze nach Injection von Lycopodium) hinzuweisen.

Das auch beim Menschen acute Anaemie zum Zerfall der Nisslsubstanz in Gehirn, Rückenmark und Kleinhirn führen kann, wurde durch Scagliosi's (166) Untersuchung eines Falles tödtlicher Uterinblutung bewiesen.

Für das Auge hat es bisher an derartigen Untersuchungen nach Bekanntwerden der Nissl'schen Färbungsmethode gefehlt, obgleich gerade die Circulationsverhältnisse dieses Organs durch eine grosse Zahl grundlegender anatomischer und experimenteller Arbeiten erforscht worden sind. Allerdings berichtet Herrnhaiser (75) über experimentell erzeugte Embolien der Blutgefässe im Auge von

Kaninchen und Hunden, denen er Oelfarben von der Carotis interna injicirt hatte.

Derselbe macht besonders auf directe Uebergänge der Arterien in die Venen der Markstrahlen aufmerksam, welche selbst nach Verlegung des Hauptastes schon nach 24 Stunden in manchen Fällen eine vollständige Wiederherstellung der Netzhautcirculation ermöglicht. „Wegen dieser beträchtlichen Unterschiede zwischen Menschen- und Kaninchenauge können die Veränderungen, wie sie nach Embolie der Arteria centralis retinae beim Menschen entstehen, durch Embolisirungsversuche am Kaninchen nicht erforscht und erklärt werden.“ Ueber die feineren histologischen Veränderungen des Auges nach experimenteller Embolisirung macht Herrnheiser (75) in seiner Arbeit keine näheren Angaben.

Um diese näher zu untersuchen, habe ich zwei Embolisirungsversuche beim Kaninchen ausgeführt.

Es wurde eine feine Canüle in die Carotis interna eingebunden und mittelst einer Pravaz'schen Spritze ca. 1,5 ccm chemisch reines Quecksilber injicirt.

Direct nach der Injection war in einem oberen Aste der Arteria centralis ein hell glänzender Quecksilberembolus ophthalmoskopisch nachzuweisen. Die übrigen Arterien waren in der Nähe der Papille ziemlich eng, stellenweise unterbrochen, eingeschnürt. Die Pupille des embolisirten Auges war mittelweit (5 mm), reactionslos. Cornealreflex und Lidschlag fehlten auf dieser Seite. Die Haut war bis zur Mittellinie des Kopfes völlig anaesthetisch. Die Pupille des anderen Auges war normalweit (8 mm), reagierte prompt. Der Lidschlag erfolgte spontan. Einige Stunden nach der Injection traten heftige klonische und tonische Krämpfe ein. Die Extremitäten waren in der Zwischenzeit gestreckt, starr, passiv schwer zu bewegen. Beim Versuche, das Thier zu stellen, rollte es auf die Seite, stützte sich auf die linke Vorderpfote, wobei es die rechte gestreckt hielt, und fiel dann hilflos nieder. Der Tod trat etwa 6 Stunden nach der Injection ein. Leider konnte die Section erst etwa 2 Stunden später ausgeführt werden.

Dabei zeigten sich zahlreiche Gehirnarterien vorzugsweise

der embolisirten Seite mit Quecksilber gefüllt, und im rechten Auge war ein Quecksilberembolus schon makroskopisch als feines silbernes Fädchen zu erkennen. Die mikroskopische Untersuchung ergab folgenden Befund:

An Schnittserien durch die Papille und Retina lässt sich eine merkliche Differenz zwischen den beiden Seiten des Präparates nachweisen, während die Ganglienzellen auf der nicht embolisirten Seite zwar stellenweise beginnende Kern- und Protoplasmaschrumpfung und diffusen Zerfall der Nisslkörper zeigten, Symptome, die man auf postmortale Veränderungen beziehen kann, waren die Chromatinkörper auf der embolisirten Seite (der Embolus war in den Präparaten selbst nachweisbar) auffallend spärlich, und in dem stark geschrumpften Zellleib fanden sich zahlreiche Vacuolen. Das andere Auge enthielt in seinen Ganglienzellen reichliche krümliche unscharf begrenzte Nisslkörper.

Bei dem zweiten Fall, bei dem die Embolisirung ganz in gleicher Weise von der Art. carotis int. vorgenommen wurde, gelang es, ganz frisches Untersuchungsmaterial zu gewinnen. Der Tod trat hier 7 Stunden nach der Injection ebenfalls unter Krämpfen ein.

Hier fanden sich in beiden Augen Quecksilberembolien. In dem rechten Auge hatten dieselben sogar, wie die Untersuchung an Celloidinschnitten ergab, zur Ruptur von Chorioidealgefässen, Netzhautabhebung, Erguss von Quecksilber in den Glaskörperaum, Quecksilberembolie des Circulus art. irid. major und minor geführt. Am anderen Auge fand sich ein kleiner Embolus in einem Ast der Centralarterie.

Die Untersuchung der Netzhaut dieses Auges ergab, dem verstopften Gefässgebiet entsprechend, Veränderungen der Ganglienzellen und inneren Körnerschicht.

Die ersteren sind geschrumpft, unregelmässig begrenzt und enthalten in einer diffus blau gefärbten Grundsubstanz vereinzelte grosse, peripher gelegene Chromatinklumpen, die eine feine Körnelung vermissen lassen. Die Kerne sind theilweise im ersten Stadium der Schrumpfung, das Kernkörperchen ist häufig blass, gross und unscharf begrenzt.

Die inneren Körner sind zum Theil geschrumpft, dunkel, fast homogen gefärbt, theilweise in körnigem Zerfall begriffen. Die äusseren Körner sind rundlich, ungezackt, fast ohne

Andeutung der normalen Querschichtung. In den übrigen Theilen der Netzhaut zeigte die Structur der nervösen Zellen keine merklichen Abweichungen der Norm.

Man könnte die beschriebenen Veränderungen der Netzhautzellen wenigstens zum Theil auf eine chemische Wirkung des Quecksilbers beziehen — doch ist eine solche bei der geringen Löslichkeit des Mittels und der kurzen Zeitdauer zwischen Injection und Tod des Versuchsthieres wenig wahrscheinlich, so dass man mit grösserem Recht die gefundenen Zellalterationen auf die Circulationsstörung durch Gefässverschluss zurückführen wird.

Dafür lässt sich auch anführen, dass sich kein mikroskopisch wahrnehmbares Zeichen für eine chemische Wirksamkeit des Quecksilbers nachweisen liess. Wenigstens konnte weder in der Umgebung der mit Quecksilber embolisirten Gefässe, noch in der Nachbarschaft der frei im Glaskörper liegenden Quecksilberkugeln eine Infiltration von Wanderzellen beobachtet werden.

Um so mehr ist man dazu berechtigt, da sich die beschriebenen Zellveränderungen auch nach auf andere Weise erzeugter Anaemie nachweisen lassen.

Um die Veränderungen zu verstehen, die nach Unterbindung der Arteria carotis im Kaninchenauge hervortreten, muss man bedenken, dass der Verlauf der Augenarterien des Kaninchens von dem des Menschen nicht unerheblich abweicht.

Das Kaninchen besitzt eine Arteria ophthalmica externa, die aus der Arteria maxillaris interna und eine Arteria ophthalmica interna, die aus der Carotis interna stammt. Beide anastomosiren reichlich mit einander. Die Arteria centralis retinae stammt meist aus der inneren Augenarterie, die hinteren Ciliargefässe aus der äusseren. Die Centralarterie versorgt mit ihren Aesten nur den mittleren Theil der Retina und anastomosirt reichlich mit den Ciliargefässen. Sie bildet also keine Enderterie im Sinne

Cohnheim's, nach deren Verschluss das zugehörige Gefäßgebiet jeder Blutzufuhr beraubt wäre, sondern es ist von vornherein zu erwarten, dass sich nach ihrem Verschluss ein Collateral-Kreislauf ausbilden wird, der die Blutversorgung von der Carotis externa her gewährleistet.

Immerhin ist es zweifelhaft, ob derselbe einen vollen Ersatz für das unterbundene Gefäß bieten kann, wenigstens in der ersten Zeit nach Unterbindung der Carotis interna.

Vergleicht man beim Kaninchen den Augenhintergrund der unterbundenen Seite mit dem des anderen Auges, so kann man keinen Unterschied nachweisen, aber das Thier ist auf dem der unterbundenen Seite entsprechenden Auge entschieden amblyopisch, was man daran erkennt, dass es nach Zubinden des normalen Auges sich an Hindernissen stösst, die es sonst vermeidet. Die Pupille ist weiter als auf der nicht unterbundenen Seite, wenn ihr Reaktionsvermögen auch noch erhalten sein kann. Nach einigen Tagen stellt sich indess normales Verhalten wieder her.

Untersucht man die Netzhaut eines solchen Auges 14 Tage nach Unterbindung der Arteria carotis interna, so lässt sich keine wesentliche Abweichung in der Zellstructur vom normalen Verhalten erkennen. Auffallend ist nur neben ganz normalen Ganglienzellen mit reichlichen scharfbegrenzten Chromatinschollen das gehäufte Auftreten pyknomorpher Zellen d. h. solcher, deren Protoplasma fast ganz mit blauen Körnchen erfüllt ist, während der Kern normal oder gleichfalls bläulich gefärbt erscheint. Schrumpfungserscheinungen sind in diesem Falle nur sehr spärlich an den Ganglienzellen nachzuweisen. Dagegen befinden sich noch viele Körner der inneren Körnerschicht im Stadium der Schrumpfung und Hyperchromatose, d. h. sie sind polygonal begrenzt und enthalten ein dichtes Netz von blauen Körnchen. An den äusseren Körnern ist die normale Schichtung nur angedeutet.

Es liegt nahe, die geschilderten Verhältnisse als den

Ausdruck eines Reparationsstadiums aufzufassen. Dafür spricht einmal die Wiederherstellung der Function des Auges und andererseits die Analogie anderer Ganglienzellen, die ebenfalls im Stadium der Erholung besonders reich an chromatischer Substanz sind (Nissl, Marinesco u. A.)

Vergleicht man mit diesem Befund die Verhältnisse in der Netzhaut eines Auges, dessen Carotis communis unterbunden wurde, (ebenfalls 8 Tage vor Tödtung des Thieres), so ergibt sich ein wesentlicher Unterschied.

Hier sind die Ganglienzellen hochgradig geschrumpft und enthalten eine feinkörnige, acidophile oder diffus bläulich gefärbte Grundsubstanz mit Andeutung von Vacuolen. Die Chromatinkörper fehlen in den meisten Zellen ganz, in anderen sind sie in der Zellperipherie als verwaschene, klumpige Massen noch spurenweise vorhanden. Auch der Kern zeigt partielle oder totale Zackung seiner Membran und einen chromatinarmen oder homogen bläulichen Inhalt. Das Kernkörperchen ist häufig unregelmässig, von violetter Farbe. Die inneren Körner lassen kaum noch eine Andeutung ihres normalen Körnchennetzes erkennen, während die äusseren Körner, klein und chromatinarm, breite Querspalten, keine Zackung darbieten.

Es handelt sich demnach in diesem Falle um einen Zerfall und Schwund der Chromatinsubstanz mit Schrumpfung der Zellen und Zellkerne, wie es sich ganz ähnlich, nur nicht so hochgradig, in den Fällen von Embolisirung nachweisen liess.

An dritter Stelle habe ich noch über einige Versuche zu berichten, die angestellt werden, um den Einfluss der Verblutungsanaemie auf die Netzhautzellen festzustellen.

Bei drei Kaninchen wurde die Carotis communis durchschnitten, aus der sich die Thiere in Zeit von 5 bis 10 Min. mit hochgehaltenem Kopf verbluteten.

Bei gleichzeitiger Untersuchung mit dem Augenspiegel sah man die Retinalgefässe beträchtlich enger werden.

Die Netzhautganglienzellen dieser Thiere boten übereinstimmend das Bild der beginnenden Chromatolyse dar. Sie enthielten grössere, aber spärliche Chromatinschollen mit verwaschener Begrenzung. Der Kern war klein, in seiner Structur unverändert, die inneren und äusseren Körner chromatinarm.

Das mikroskopische Bild der Netzhaut war dem des helladaptirten Auges sehr ähnlich, obgleich die Versuche Abends bei Lampenlicht ausgeführt wurden, und die Netzhautganglien eines zur Controlle durch Genickschlag getödteten Kaninchens in ihrer feineren Zellstructur den Verhältnissen bei Dunkeladaptation entsprachen, d. h. scharfbegrenzte reichliche Nisslkörper enthielten.

Man wird deshalb annehmen können, dass schon die kurz dauernde Verblutungsanaemie ihre Wirkung auf die Netzhautganglien in der Weise äussert, dass sie zu den ersten Stadien des Chromatinschwundes führt.

Verhalten der Zellstructur der Netzhautganglien nach Steigerung der Eigenwärme.

Ehe ich zur Schilderung der Netzhautzellveränderungen nach Vergiftung übergehe, möchte ich hier nur kurz das Resultat einiger Versuche erwähnen, die ich, angeregt durch die Untersuchungen von Goldscheider und Flatau (61) und Ewen (47) angestellt habe.

Durch diese Autoren wurde der Beweis erbracht, dass es gelingt, nach künstlicher Steigerung der Eigenwärme wenigstens beim Kaninchen Zellzerfall und Schwund der Chromatinkörper der Hirn- und Rückenmarksganglienzellen zu beobachten, was wichtige Rückschlüsse auf die Einwirkung fieberhafter Erkrankungen auf die Ganglienzellstructur zulässt.

Es fragt sich nun, ob sich die Ganglienzellen der Netzhaut in gleicher Weise beeinflussen lassen, ob auch sie

nach Temperaturerhöhung Zeichen der Chromatolyse erkennen lassen?

Diese Frage wurde durch meine Untersuchungen bejaht, und zwar genügt schon ein zweistündiger Aufenthalt des Kaninchens in einer Temperatur von 42° C., um merkliche Veränderungen der chromatischen Structur der Netzhautzellen hervorzurufen. Nach dieser Zeit fehlen die Nisslkörper in den Netzhautganglien fast vollständig (vgl. Fig. 6). Das Protoplasma ist in eine feinkörnige, roth gefärbte Masse umgewandelt, nur stellenweise diffus bläulich gefärbt. Der Kern ist scharf begrenzt, ziemlich gross, bläschenförmig und enthält einen blassgefärbten Nucleolus.

Die inneren Körner sind chromatinarm, häufig polygonal, mit blassen Kernkörperchen, die äusseren Körner klein, rundlich, ebenfalls chromatinarm, ungezackt. Sie finden sich auffallend häufig auch in der Zwischenkörnerschicht und im äusseren Theil der inneren Körnerschicht. Dabei boten die Versuchsthiere kein Zeichen von Sehstörung und keine Veränderungen des Augenhintergrundes dar.

Dieser hochgradige Chromatinschwund der Netzhautganglienzellen nach Hyperthermie ist um so auffälliger, als er sich auch nach langdauernden Schädigungen anderer Art, die zu Vacuolisirung, Schrumpfungs- und Zerfallerscheinungen der Zelle und des Zellkerns führen, und bei denen auch deutliche Zeichen von Amblyopie vorhanden waren, nicht nachweisen liess, wenigstens nicht in dieser Ausdehnung.

Das deutet darauf hin, dass auch für die Ganglienzellen der Retina die chromatische Structur nicht die gleiche Bedeutung in physiologischer und pathologischer Beziehung beanspruchen darf, wie die Structur der anderen Zellbestandtheile, dass man also sehr vorsichtig sein muss, von der Chromatolyse als einem pathologischen Symptom zu sprechen. Die Function der Ganglienzellen kann erloschen sein ohne merkbare Veränderung der Nisslgranula, und

andererseits können diese fehlen, ohne dass eine deutliche Functionsstörung nachzuweisen wäre.

Man wird also der Ansicht von Goldscheider und Flatau (61) beipflichten müssen, dass den Chromatinkörpern keine vitale Bedeutung für die Zelle zukommt, wenn sie auch gemeinsam mit anderen Structurbestandtheilen ein wichtiges Characteristicum der normalen Zellstructur darstellen, das uns bei unserer geringen Kenntniss feiner Nervenzellveränderungen doppelt willkommen sein muss.

Ueber die Einwirkung von Giften auf die Netzhautzellen.

Für keinen anderen Theil der pathologischen Anatomie der Nervenzelle hat sich zum Nachweis feiner Veränderungen die Nissl'sche Untersuchungsmethode so fruchtbar erwiesen, wie für die Lehre von den Intoxicationen.

Bis dahin trotz typischer klinischer Unterschiede in den Giftwirkungen ohne nachweisbare Structurveränderungen, wurde die vergiftete Nervenzelle, nach der Nissl'schen Methode untersucht, zum Schauplatz eines complicirten pathologischen Processes, dessen einzelne Stadien und morphologische Einzelheiten nach Art des Giftes charakteristische, constante, typische Unterschiede zeigten.

Gerade hier bot auch das Thierexperiment wegen der Möglichkeit der Abstufung der Giftwirkung und der Erzeugung, soweit das überhaupt möglich ist, gleichartiger pathologischer Erscheinungen bei verschiedenen Versuchsthiern, die Möglichkeit, nicht nur die specifischen Giftwirkungen genauer kennen zu lernen, sondern auch den Werth der neuen Methode zu prüfen und für die Beurtheilung der Chromatinkörper wichtige Anhaltspunkte zu gewinnen.

Es ist darum kein Wunder, dass gerade in dieser Richtung eine grosse Zahl von Untersuchungen in neuerer Zeit angestellt worden sind, unter denen in erster Linie die von Nissl (139) selbst (Arsen, Trional, Phosphor, Vera-

trin, Alkohol, Silber, Strychnin, Morphin und Blei), Vas (183) (Nicotin, Alkohol), Lugaro (113) (Arsen), Schaffer (166) (Arsen), Sarbo (159) (Phosphor), Köster (97) (Schwefelkohlenstoff), Andriezen (1), Berkley (14) Golgi, Stewart (172) (Alkohol), Goldscheider und Flatau (61) (Malonnitril) unternommenen Untersuchungen zu erwähnen sind. Dieselben haben mit grosser Uebereinstimmung zu dem Ergebniss geführt, dass die Structur der Nervenzelle durch die Einwirkung besonderer Gifte in besonderer Weise verändert wird, dass verschiedene Arten von Nervenzellen sich verschieden, aber die gleiche Art demselben Gift gegenüber sich gleichartig verhält.

In der Hauptsache spielen sich diese Veränderungen an den Chromatinkörpern des Zellprotoplasmas ab. Es kommt zu einem granulären Zerfall, Verschmelzung und Schwund, eventuell Ortsänderung der Nisslkörper. Die achromatische Substanz färbt sich dunkler. Auch der Kern nimmt häufig eine dunklere Färbung an. Je nach Localisation, Grad und Reihenfolge dieser Veränderungen und nach Art der betroffenen Nervenzellen zeigen die verschiedenen Giftstoffe charakteristische Unterschiede.

Es lag nahe, diese Verhältnisse auch an den Nervenzellen der Retina zu prüfen. Bildet doch die grosse Zahl von toxischen Amblyopieen mit oder ohne ophthalmoskopisch wahrnehmbare Veränderungen ein fruchtbares Forschungsgebiet für die neue Untersuchungsmethode, die den älteren Methoden an Genauigkeit und Feinheit weit überlegen ist.

Trotzdem existirt, soweit mir bekannt ist, bisher nur eine einzige experimentelle Untersuchung die sich dieser Methode bediente und zwar von Ward A. Holden (80) und zwar über die experimentelle Chininamblyopie und die Intoxication mit Methylalkohol, auf die ich weiter unten genauer einzugehen habe.

Aus der grossen Zahl von Giften, die erfahrungsgemäss Störungen am Sehorgan hervorzurufen vermögen, ohne

dass bisher über die feineren pathologischen Veränderungen, die sie erzeugen, genauere Kenntniss gewonnen wäre, habe ich zunächst das Chinin, das Extractum filicis und den Schwefelkohlenstoff ausgewählt.

Die Einverleibung des Giftes geschah auf drei verschiedene Weisen.

Chinin wurde in concentrirter wässriger Lösung subcutan gegeben, das Extractum filicis in Gelatinecapseln per os, die Vergiftung mit Schwefelkohlenstoff wurde in gleicher Weise, wie es Köster (97) zur Untersuchung der Rückenmarksveränderungen gethan hat, durch häufig wiederholte Inhalationen in einem Glastroge bewerkstelligt. Als Versuchsthiere dienten in der Hauptsache Kaninchen, bei den beiden letzten Versuchsreihen auch Hunde.

Als Härtungs- und Fixirungsflüssigkeiten wurden auch hier Sublimat-Alkohol, zur Färbung die Nissl'sche Methylenblaufärbung, Toluidinblau und besonders Thionin angewandt.

Ehe ich des näheren auf meine Befunde eingehe, habe ich in Kürze aus der einschlägigen Literatur über die drei Giftstoffe speciell, was deren Wirkung auf das Auge betrifft, die Hauptpunkte zusammenzufassen.

I. Chinin.

Seit A. v. Graefe (63) über einige Fälle von Amaurose nach Chiningebrauch berichtet hat, bei denen eine schwache Netzhauttrübung den einzigen objectiven Befund darstellte, ist eine grosse Zahl von derartigen Fällen in der Literatur berichtet worden, die bis zum Jahre 1896 De Schweinitz (167) in seiner Monographie über toxische Amblyopieen zusammenfasst.

Das klinische Bild der Chininamblyopie zeigt mancherlei Schwankungen.

Die wirksame Dosis soll von 0,75 bis 30 g innerhalb 24 Stunden betragen. Die Symptome steigern sich von zeitweiser Amblyopie, verringerter Accommodationskraft,

mässiger Pupillenerweiterung, (in vereinzeltten Fällen ist von Nystagmus (Knapp(93), Williams(187)) Anaesthesie der Hornhaut und Conjunctiva (Voorhies(184)) und Exophthalmus (de Schweinitz(167)) Einschränkung des Gesichtsfeldes, centrales Skotom (Jodko, de Wecker(167)) berichtet), bis zur völligen, zuweilen rapid eintretenden Blindheit ohne Lichtempfindung, die wenige Stunden oder Wochen und Monate andauern kann.

Was den objectiven Befund betrifft, so wird von fast allen Autoren Blässe der Papille und hochgradige Verengung der Retinalgefässe angegeben, daneben häufig ein grauer Nebel in der Retina, ein kirschrother Fleck in der Maculagegend, der dem Bild bei Embolie der Centralarterien entspricht, (Gruening (68), Buller(25), Browne(22)).

Auf welche Weise die beschriebenen Symptome durch die Giftwirkung hervorgerufen werden, darüber sind sich die verschiedenen Autoren uneins.

Die einen sprechen von einer Entzündung Endovasculitis, Obliteration der Gefässe mit Verdickung ihrer Wand (Brunner(167), De Schweinitz(167)). Andre suchen die Ursache der Gefässverengung in einem Reizzustand der vasomotorischen Centra (Barabaschew(11), in einem Erguss in die Lymphscheiden des Opticus (Buller(25)). De Schweinitz(167) berichtet von einer Thrombose der Centralgefässe, an die sich nach 2 Monaten Degeneration des Nervus opticus anschloss. Dagegen glaubt De Bono(20) auf Grund seiner an Hunden angestellten Versuche, dass die Chininwirkung sich direct an den Nervenendigungen der Retina geltend macht. Derselbe fand bei Fröschen nach Chininjection, dass die Bewegungsvorgänge der Netzhautelemente bei Belichtung gelähmt werden und rechnet darum das Chinin zu den Protoplasmagiften.

Ich habe den Versuch in derselben Weise wiederholt und speciell auf das Verhalten der Ganglienzellen geachtet,

ohne in ihrer Grösse, Reichtum und Form der Nisslkörper Unterschiede zwischen dem mit Chinin behandelten und dem Controlfrosche aufzufinden. Doch wage ich daraus keinen weiteren Schluss zu ziehen, da es noch nicht feststeht, ob überhaupt beim Frosch an den Ganglienzellen typische Unterschiede zwischen dem Hell- und Dunkeladaptationszustand nachzuweisen sind.

Die Vermuthung von de Bono (20) wurde in neuester Zeit durch die Untersuchungen von Ward A. Holden (80) bestätigt, dem es gelang, an Hunden nach Injection in die tiefen Schichten des Hypogastrium (0,07 Chinin. Cimuriat. carbamid. auf 1 kgr Körpergewicht) an den Ganglienzellen verschiedene Stadien von Degeneration, Vacuolenbildung, Wanderung des Kerns an die Zellperipherie, Zerfall und Schwund der Chromatinkörper nachzuweisen. Daneben fand er in der Nervenfaserschicht Ausscheidung von hyalinen Körnchen, aber keine Gefässalterationen.

Der pathogene Prozess beruht nach Holden auf einer Contraction der Netzhautgefässe, besonders der Arterien, auf welche eine stark eiweissbaltige seröse Ausschwitzung in die Nervenfaserschicht erfolgt, sowie in einer Degeneration der Ganglienzellen. Ob dieselbe auf einer direkten toxischen Wirkung beruht oder eine Folge der Gefässcontraction darstellt, lässt sich nach Ward Holden nicht entscheiden.

Was die Kritik der Holden'schen 7 Versuche anlangt, so ist einmal zu bemerken, dass die Resultate derjenigen 3 Fälle, bei denen die Section des Versuchstieres erst 4 Stunden und später nach dem Tode erfolgte, nicht eindeutig sein können, wie sich aus den oben (S. 181) angeführten Untersuchungen über postmortale Veränderungen der Netzhautganglien ergibt. Gerade der Zerfall und Schwund der Nisslkörper und Vacuolisation derselben waren eine der constantesten postmortalen Veränderungen, die schon 3½ Stunden nach dem Tode deutlich ausgeprägt waren. In

den übrigen Fällen hat Holden seine Versuchsthiere durch Verbluten in Chloroformnarkose getötet. Auch diese Methode scheint wenig geeignet, Fehlerquellen auszuschliessen, wenigstens müsste erst bewiesen werden, dass eine derartige Tödtungsart die Ganglienzellen der Netzhaut bei Hunden unbeeinflusst lässt. Nach Analogie der oben erwähnten Verblutungsversuche an Kaninchen ist das kaum anzunehmen (vergl. S. 211).

Barabaschew(11) hält Kaninchen für ungeeignet zu derartigen Vergiftungsversuchen, da die Thiere nach 5 bis 10 g. Chinin sehr bald unter Lähmungserscheinungen zu Grunde gehen. Das mag für diese grossen Chinindosen gelten. Wendet man aber nach Nissl's(142) Vorschlag den Modus der subacuten Vergiftung an und injicirt einem kräftigen Thier täglich nur $2 \times 0,5$ g Chinin muriatic. subcutan, so gelingt es, bei fortgesetzter Injection dasselbe 4—6 Tage am Leben zu erhalten und alle bei Hunden nachgewiesenen Erscheinungen der Chininintoxication (Blässe der Papille, Gefässverengerung, Mydriasis) meist schon am 2. oder 3. Tage nachzuweisen.

Die Injectionen wurden in meinen Fällen bis zum Tode des Thieres fortgesetzt, und durch beständige Beobachtung (mit wiederholter ophthalmoskopischer Untersuchung) für ganz frisches Untersuchungsmaterial Sorge getragen.

Die Entscheidung, ob schon intra vitam Sehstörungen bei den Versuchsthiere auftraten, ist allerdings beim Kaninchen schwerer zu treffen als beim Hunde. Die Kaninchen machten schon wenige Stunden nach der ersten Injection einen entschieden kranken Eindruck, sassen ruhig da, frassen nicht und reagierten kaum auf Anstossen. Die Gefässveränderungen waren am nächsten Tage meist deutlicher vorhanden. Einige Stunden vor dem Tode traten dann meist Lähmungserscheinungen auf, Nachschleppen der hinteren Extremitäten oder Unmöglichkeit zu gehen. In zwei Fällen stellten sich kurz vor dem Tode einige Stunden nach

der letzten Injection heftige klonische Krämpfe ein, die sich in kurzen Intervallen wiederholten. — Anaesthetie der Cornea war nicht immer nachweisbar. Exophthalmus konnte ich niemals beobachten.

Ich habe im Ganzen 8 Vergiftungsversuche mit Chinin ausgeführt 4, die man als acute bezeichnen kann, da die Thiere nach ein oder mehrmaliger Injection am gleichen Tage starben, 4 subacute, bei denen der Exitus 4, 5, 6 Tage nach der ersten Injection erfolgte.

Typische Unterschiede zwischen beiden Vergiftungsarten konnte ich nicht auffinden.

Bei der grossen Uebereinstimmung im Befund der einzelnen Fälle sei es mir gestattet, ohne auf jeden Fall besonders einzugehen, die Hauptveränderungen der Netzhautzellen nach Chininvergiftung im Zusammenhang zu besprechen.

Was zunächst die Ganglienzellen betrifft, so zeigten dieselben im allgemeinen eine geringe Volumverminderung, soweit sich eine solche aus dem deutlichen Hervortreten der Pericellularräume und der Begrenzungslinie der Zelle, die häufig leichte Einbuchtungen zeigte, erschliessen lässt. Häufig war die Begrenzung stellenweise unscharf, in einigen Fällen (Fall VII und VIII), bei grösseren Ganglienzellen überhaupt unmöglich. Die Grundsubstanz des Protoplasma war theilweise grob- oder feinmaschig reticulirt, wobei das Reticulum, das sich mit Thionin diffus blau gefärbt hatte, deutlicher als unter normalen Verhältnissen hervortrat, theilweise erschien sie wie bestäubt mit röthlichen oder violetten Punkten. In 6 Fällen enthielt das Protoplasma grössere oder kleinere Vacuolen. (Vergl. Fig. 7.)

Die Chromatinkörper boten hochgradige Veränderungen dar. In keinem der 8 Fälle waren sie von normaler Beschaffenheit. Meist waren sie noch als feine blaue Körnchen peripher oder an der Kernmembran zu erblicken oder zeigten eine krümelige Beschaffenheit. Der Kern der Gang-

lienzellen war theils geschwellt, bläschenförmig mit einem weitmaschigen Chromatinreticulum als Inhalt, doch auch ohne solches, theils geschrumpft, dunkelgefärbt, von unregelmässiger, häufig unscharfer Begrenzung. Am Nucleolus fiel die Unregelmässigkeit der Form und die häufig ganz periphere Lage im Zellkern auf.

Die inneren Körner boten fast in allen Fällen das Bild des feinkörnigen Zerfalls, wobei sie häufig eine unregelmässige Form angenommen hatten. Von einer netzartigen Anordnung ihres basophilen Chromatins war fast keine Spur mehr vorhanden.

Die äusseren Körner zeigten wenig Veränderungen. Auffallend war, dass an ihnen die Schichtung und Zackung durchweg deutlich ausgesprochen war, in analoger Weise, wie das in den Präparaten des normalen dunkeladaptirten Auges der Fall war.

Die Stäbchen und Zapfen waren meistens in Zerfall begriffen.

Ueberblicken wir die beschriebenen Veränderungen, so ergeben sich mit auffälliger Uebereinstimmung an den Ganglienzellen der Netzhaut nach Chininvergiftung feinkörniger Zerfall der Chromatinkörper mit Vacuolisation des Protoplasma, Schwellung oder Schrumpfung des Zellkerns, in dem gleichfalls Vacuolen auftreten können, und Unregelmässigkeit des Nucleolus. Daneben findet sich an den inneren Körnern als constantes Symptom feinkörniger Zerfall. An den Gefässen der Netzhaut konnte ich keine Veränderungen auffinden, weder endovasculäre Processe, noch thrombotischen Verschluss, wofür sich auch durch die ophthalmoskopische Untersuchung kein Anhaltspunkt ergab.

Die Frage, ob die erwähnten Zellveränderungen das Resultat einer directen toxischen Einwirkung des Chinins sind oder ob sie einfach als eine Folge der Gefässcontraction angesehen werden können, lässt sich durch einen Vergleich mit den Befunden nach experimentell erzeugter Anaemie der

Netzhaut mit ziemlicher Sicherheit beantworten. Darnach ergibt sich:

Auch nach längerer Absperrung der Blutzufuhr ist das Auftreten von Vacuolen im Protoplasma der Netzhautzellen viel weniger ausgeprägt als nach Chininintoxication, dagegen stehen die Schrumpfungerscheinungen an Zelle und Zellkern mehr im Vordergrund, während sie sich nach Chininintoxication weit spärlicher finden. Die übrigen objectiven Befunde (Chromatolyse, Zerfall der inneren Körner) stimmen bei beiden pathologischen Einwirkungen überein.

Immerhin sind die Unterschiede der pathologischen Veränderungen nach beiden Eingriffen gross genug, um für die Veränderung der Netzhautganglienzellen nach Chininvergiftung die Mitwirkung noch anderer Momente wahrscheinlich zu machen, als die durch Gefässcontraction bedingte Anaemie. Derartige Momente werden jedenfalls in einer directen toxischen Beeinflussung der Ganglien zu suchen sein, um so mehr, als das Chinin schon nach den klinischen Vergiftungssymptomen entschieden einen Einfluss auf nervöse Organe ausübt.

Die Veränderungen an den Ganglienzellen als secundäre nach primärer Laesion des Sehnerven aufzufassen, liegt kein Grund vor. Im Gegentheile spricht das frühzeitige Ergriffensein der Netzhautganglien zu einer Zeit, wo am Sehnerven selbst weder klinisch noch pathologisch-anatomisch Veränderungen nachzuweisen sind, gegen ein derartiges Verhalten.

Um auch am Hunde die Art der Chininwirkung auf die Netzhautzellen festzustellen und zugleich ein directes Vergleichsobject mit den Versuchsergebnissen Ward Holdens zu gewinnen, stellte ich noch folgenden Controlversuch an:

Einem mittelgrossen, glatthaarigen Hunde wurden an fünf aufeinander folgenden Tagen je 0,75 g Chinin muriatic. subcutan gegeben.

Vom vierten Tage ab waren beide Pupillen maximal weit, doch vermochte das Thier anscheinend noch gut zu sehen. Am fünften Tage traten Allgemeinsymptome hervor — unsicherer, schwankender Gang, grosse Abgeschlagenheit und beschleunigte Athmung, zu denen sich weiterhin heftige Krämpfe und völlige Erblindung gesellten. Die eine Pupille hatte sich wieder erheblich verengert.

Ein grelles Licht selbst unmittelbar vor das Auge gehalten, führte zu keinerlei Reaction. Am nächsten Tage, es war keine neue Dosis gegeben worden, hatte sich auch die andere Pupille verengert, und das Befinden hatte sich so weit gebessert, dass das Thier wieder Speise zu sich nahm; auch die Motilität stellte sich wieder her. Auf eine erneute Injection von 0,37 Chinin zeigte sich eine grosse Reizbarkeit. Das Thier schnappte bei Annäherung, knurrte und bellte den ganzen Tag.

Auch diese Symptome gingen vorüber, während die totale Erblindung zurückblieb. Nach drei Wochen wurde das Thier enthaupet und die Netzhaut beider Augen nach der oben angeführten Methode untersucht.

Die mikroskopisch nachweisbaren Veränderungen an den Netzhautzellen des Hundes nach Chininvergiftung entsprachen fast in jeder Beziehung denen beim Kaninchen.

Es fanden sich alle jene oben näher beschriebenen Stadien des Chromatinschwundes, dem sich Schrumpfung der Zelle und des Kerns und das Auftreten von Vacuolen im Protoplasma, anfangs der Lage der Nisslschollen entsprechend, hinzugesellte. Nur war der Grad der Veränderungen im vorliegenden Falle nicht so weit fortgeschritten, wie in mehreren Fällen beim Kaninchen, wo auch das Endstadium des pathologischen Processes, bestehend in völligem Zerfall des Kerns und der Zelle, zu Tage trat. Beim Hunde war die Form des Kernes und der Zelle noch relativ gut erhalten — ein Theil der Ganglienzellen war überhaupt wenig verändert, während die Auflösung der Chromatinkörner, die Mitfärbung der Grundsubstanz, das Auftreten von Vacuolen keinen Zweifel daran liessen, dass

sich auch hier an den Ganglienzellen pathologische Veränderungen abgespielt hatten.

Entsprechend den Veränderungen an der Nervenzellschicht, zeigte auch die innere Körnerschicht weniger ausgeprägte Zerfallserscheinungen als beim Kaninchen. Ihre Structur entsprach zwar nur selten dem normalen Typus. Meist erschien sie homogenisirt oder in eine grössere Zahl regelloser Körnchen aufgelöst, ohne dass es zu einem Zerfall der Kornmembran gekommen wäre, wie das beim Kaninchen häufig geschah.

Die äusseren Körner waren von rundlicher Form und, was ihren Chromatingehalt betraf, dem Typus des Dunkelauges entsprechend.

In diesem Falle wurde noch besonderes Gewicht auf die Untersuchung des N. opticus gelegt. Nach Marchi gehärtet, wurde derselbe in Celloidin eingebettet und an Serienschnitten auf Degenerationserscheinungen untersucht, ohne dass es gelungen wäre, das geringste Anzeichen für Entartung nachzuweisen. Auch für die Annahme entzündlicher oder exsudativer Processe am Sehnerven liess sich aus der Untersuchung kein Anhaltspunkt gewinnen.

Da in diesem Falle unzweifelhaft eine hochgradige Beeinträchtigung des Sehvermögen durch das Chinin stattgefunden hatte und da nach der Nissl'schen und verwandten Methoden deutliche Veränderungen an der Structur der Ganglienzellen nachgewiesen werden konnten, ohne irgend welche Veränderung des Sehnervenstammes, so scheint der Schluss berechtigt, dass auch beim Hunde die primäre Schädigung durch den Giftstoff die nervösen Elemente der Retina betrifft, während ja nicht zu leugnen ist, dass im weiteren Verlauf der chronischen Intoxication eine Degeneration und Atrophie der nervösen Leitungsbahnen sich ausbilden kann.

Die ersten Veränderungen sind nach dem klinischen Verhalten zu urtheilen jedenfalls noch reparabler Natur.

Dafür spricht auch die Thatsache, dass Kern und Protoplasmamembran noch leidlich gut erhalten sind. Kam es zu Kern- und Zellzerfall, dann ist eine Wiederherstellung der normalen Function wohl auszuschliessen.

Auch das Ergebniss dieser Experimente lässt sich im Sinne der Anschauung von Goldscheider und Flatau (61) verwerthen, dass den Chromatinkörpern der Nervenzelle keine vitale Bedeutung zukommt, wenn sie auch insofern eine besondere Wichtigkeit beanspruchen, als die ersten Anzeichen pathologischer Vorgänge an ihnen offenbar werden.

II. Extractum filic. aether.

Der erste, der über Sehstörungen nach Anwendung des Filixextractes berichtet hat, soll nach Katayama und Okamoto (91) Reinlein (153) gewesen sein (1812.) Später (1881) veröffentlichte May (28) 2 Fälle von Amblyopie nach Gebrauch dieses Bandwurmmittels.

Katayama und Okamoto (91) stellten 23 Fälle von Vergiftungen mit Filix zusammen, unter denen 10 zu vorübergehender oder dauernder Amblyopie einer oder beider Augen geführt hatten. Den gleichen Autoren gelang es, experimentell an Hunden und Kaninchen Amblyopie zu erzeugen. Leider fehlt diesen Experimenten eine pathologische Untersuchung.

Die Hauptsymptome der Vergiftung bestehen nach de Schweinitz (167) neben der Sehstörung in einer heftigen Gastroenteritis und Verlangsamung der Circulation, während Kobert (95) ausserdem Pupillenerweiterung, Erregungs- und Lähmungserscheinungen des Centralnervensystems anführt.

Die Grösse der toxischen Dosis schwankt beträchtlich; 3 Gramm pro die an 12 aufeinander folgenden Tagen erzeugten nach de Schweinitz (167) völlige Erblindung, während selbst tödtlich endende Vergiftungen zum Theil ohne Sehstörungen verliefen.

Hinsichtlich des ophthalmoskopischen Befundes bei Filixvergiftung sind die Angaben sehr spärlich. Bei mehreren Fällen wurde überhaupt nicht der Augenhintergrund untersucht. So berichteten Kono (99), Korach (100), J. Tanaka (175), Kumagaye (167) nur über Mydriasis, Pupillenstarre und vorübergehende Amblyopie. Baer (9) und Schleier (163) konnten keine Veränderungen des Augenhintergrundes im Stadium der Blindheit nachweisen. Mikiji Yoda (130) fand Verengung der Arterien und Blässe der Papille, Gross (67) Atrophie des Nervus opticus, Inoye (84) beobachtete in einem Fall neben Verengung der Arterien und Schlängelung der Venen in der Maculagegend stark lichtreflectirende gelblich weisse, radiär geordnete Flecke, die er jedoch auf die in seinem Falle nachgewiesene Albuminurie bezieht.

Eine grössere Zahl von Vergiftungsversuchen mit Filix-extract wurde von de Schweinitz (167) ausgeführt. Derselbe fand an Hunden (seine Resultate an Kaninchen waren ungenügend, da die Thiere an Darmerkrankungen und ohne Sehstörungen zu Grunde gingen) die gleiche Sehstörung, wie sie am Menschen beobachtet war. Nur bei jungen und schwächlichen Hunden konnte er sie hervorrufen. Auch in diesen Fällen konnte er weder ophthalmoskopisch, noch bei der mikroskopischen Untersuchung des Sehnerven und der Retina (Härtung in Müller'scher Flüssigkeit, Carmin, Weigert'sche Methode) pathologische Veränderungen nachweisen.

Dagegen fanden in neuester Zeit Masius und Mahaim (127) bei ihren Versuchen an Hunden, denen sie 18 Capseln à 0,5 Extr. filic. in 6 Tagen gegeben hatten, eine hochgradige Atrophie der Nervenfaserschicht mit Erweiterung der Capillargefässe, Verdickung der Septa, Atrophie und Auftreten von Lacunen im Sehnerven. Die Retina selbst war bei ihren Versuchen wenig verändert. Nur die Zellen der Fossa centralis zeigten

Chromatolyse, woraus sie schlossen, dass die Alterationen bei Filixvergiftung nicht in der Retina, sondern im Opticus beginnen und von Gefässveränderungen herrühren, die schon vor dem Auftreten manifester Blindheit entstehen.

Erscheint es schon von vornherein unwahrscheinlich, dass eine so hochgradige Veränderung des Sehnerven Platz greifen kann, ohne dass die empfindliche Ganglienzellenschicht der Netzhaut Veränderungen darbietet, so wird diese Angabe durch den Befund meiner Untersuchungen geradezu widerlegt. Dieselben zeigen auch, dass sich nicht nur Hunde, sondern auch Kaninchen zu derartigen Versuchen eignen, wenn man wenigstens die Dosis des Giftes nicht über $3 \times 0,5$ g. Filixextract pro die steigert. Dann gelingt es die Thiere 4—6 Tage am Leben zu erhalten und alle Vergiftungssymptome, Reizerscheinungen des Magens und des Darmes, Sehestörungen, Pupillenerweiterung, Erregungs- und Lähmungserscheinungen des Centralnervensystems nachzuweisen, letztere namentlich als klonische und tonische Krämpfe, die etwa eine Stunde vor dem Exitus einsetzen und Parese mit Anaesthesie der hinteren, seltener der vorderen Extremitäten hinterlassen.

Sehestörungen sind allerdings nicht immer hervorzurufen. Nur in 2 Fällen von 5 machte das schwer erkrankte Thier den Eindruck, als ob es erblindet sei, stiess sich an Gegenständen und reagierte nicht auf einen plötzlich mit dem Spiegel ins Auge geworfenen Lichtreflex. Doch ist zu bedenken, dass, wie schon vorher erwähnt, der Nachweis der Erblindung oder Sehschwäche, namentlich bei einem schwer erkrankten Kaninchen, das still zusammengekauert dasitzt und auf Reize viel weniger reagiert, als ein gesundes Thier, schwer zu erbringen ist.

Die ophthalmoskopische Untersuchung, die täglich vorgenommen wurde, hatte eine völlig negatives Resultat. An den Gefässen liessen sich keine Veränderungen auffinden, ebensowenig an der Papille. Die Pupillen waren in allen

Fällen in den späteren Stadien der Vergiftung ziemlich weit und verengten sich nur sehr wenig auf Lichteinfall.

Die anatomische Untersuchung der Netzhaut ergab in einem Falle (11 g Extr. in 4 Tagen, Tod $\frac{1}{2}$ Stunde nach der letzten Dosis) normales Volumen der Ganglienzellen mit wohlerhaltener Structur der Zelle und des Zellkerns, grossem runden Kernkörperchen, und reichlichen Nisslkörpern, die aber unscharf begrenzt, häufig zu grösseren Klumpen verschmolzen erscheinen. An der inneren und äusseren Körnerschicht war in diesem Fall ebenfalls keine pathologische Abweichung aufzufinden. Die Retina bot in jeder Beziehung ein normales Bild und zwar dasjenige, das ich besonders beim Helladaptationszustande gesehen hatte, obgleich das betreffende Thier am späten Abend gestorben und sofort secirt worden war. Sehstörungen hatte es intra vitam nicht dargeboten.

In einem zweiten Falle (7 g Extr. in 4 Tagen) ergab sich ein ähnlicher Befund, doch traten hier schon hochgradigere Veränderungen an den Netzhautzellen hervor. Das Volumen der Ganglienzellen war grösstentheils nicht vermindert. Nur an einigen derselben trat der pericelluläre Raum deutlicher hervor. Letztere wiesen auch schon die ersten Stadien von Kernschrumpfung auf mit dunkler Färbung der Kernsubstanz und unregelmässig geformtem Kernkörperchen. Die Chromatinkörper waren auffallend spärlich, fast nur in der Zellperipherie zu finden, meist zu länglichen, wenig distincten Schollen verschmolzen. Die inneren Körner waren blass gefärbt mit feinkörnigem Inhalt und blassem Nucleolus. An den äusseren Körnern waren Schichtung und Zackung nur angedeutet.

Bei dem dritten Versuchsthier (10 g Extr. in 4 Tagen) waren Chromatinkörper in der feinkörnig zerfallenen Grundsubstanz der häufig unscharf begrenzten Ganglienzellen nur noch in Spuren als blasse stäbchenartige Gebilde nachweisbar. Der Kern war an den meisten Zellen geschrumpft,

hyperchromatisch, der Nucleolus unregelmässig. Die inneren Körner boten theilweise das Bild des feinkörnigen Zerfalls des Chromatins, theilweise waren sie geschrumpft, polygonal, und fast homogen dunkelblau gefärbt. Die äusseren Körner zeigten normales Verhalten.

Im 4. und 5. Fall (9 gr in 3 Tagen, 12 gr in 6 Tagen) (es waren dies die beiden Fälle, bei denen das Versuchsthier schon intra vitam Sehstörungen erkennen liess) fehlten die Chromatinkörper im Protoplasma der Ganglienzellen vollständig. Die Begrenzung der Zellen war häufig ganz unscharf und die Grundsubstanz in einen feinkörnigen Detritus mit reichlichen kleinen Vacuolen umgewandelt. Der Kern war unscharf, zackig begrenzt, kleiner als normal und enthielt ein grosses, häufig unregelmässig begrenztes Kernkörperchen. Der feinkörnige Zerfall und die hyperchromatische Schrumpfung waren noch weiter fortgeschritten, und auch die äusseren Körner waren insofern in ihrer Structur verändert, als sie, von rundlicher Form, ungezackte Chromatinkörper mit Andeutung von Querschichtung erkennen liessen (vergl. Fig. 8).

Auf einen Befund ist hier noch hinzuweisen, den ich ausser in den beiden letzterwähnten Fällen mehrmals beim Kaninchen hatte, das 2 Stunden einer Temperatur von 42° C. ausgesetzt worden war. Es fanden sich hier an mehreren Stellen Körner in der Zwischenkörnerschicht, ja selbst im äusseren Theil der inneren Körnerschicht, die, nach ihrem Gehalt an dunkelblau gefärbten, geschichteten Chromatinkörpern, unzweifelhaft aus der äusseren Körnerschicht stammten. Dieselben hatten also eine Ortsänderung ausgeführt, ob activ oder passiv bleibt zweifelhaft, wenn man nicht als dritte Möglichkeit gelten lassen will, dass eine derartige Verlagerung von Körnern der äusseren Netzhautschicht schon unter normalen Verhältnissen vorkommt. Einen Beweis für diese Anschauung habe ich trotz genauer Durchsicht vieler normaler Kaninchenretinae bei Gelegen-

heit der Adaptationsexperimente nicht erbringen können. — Die Nervenfaserschicht der Retina bei den mit Filixextract vergifteten Thieren zeigte ausser einer mässigen Auflockerung keine pathologischen Veränderungen. Auch im Sehnerven konnte ich weder Atrophie noch Lacunen nachweisen, wie sie Masius und Mahaim (127) beschrieben haben, ebensowenig abnorme Erweiterung der Capillargefässe.

Ich möchte daher im Gegensatz zu den beiden französischen Autoren und in Uebereinstimmung mit Nuel (143) annehmen, dass das toxische Princip des Filix-extractes zuerst und in ausgedehntem Maasse die nervösen Zellen der Retina angreift, und zwar lassen sich selbst in denjenigen Fällen, wo intra vitam Sehstörungen nicht nachgewiesen werden konnten, Veränderungen der Ganglienzellen- und inneren Körnerschicht erkennen. Dieselben bestehen in Verklumpung und Schwund der Nisslkörper, Kernschrumpfung und Zerfall der Ganglienzellen, feinkörnigem Zerfall und hyperchromatischer Schrumpfung der inneren Körner. Dabei soll nicht in Abrede gestellt werden, dass sich an diese Veränderungen weiterhin Degeneration und Atrophie der Nervenfasern ausschliessen können.

III. Schwefelkohlenstoff.

Seitdem Delpech (34) (1856 und 63) unter 93 Fällen von Schwefelkohlenstoffvergiftung 15 Fälle von Amblyopie berichtet hat, ist in der ophthalmologischen Literatur eine grössere Zahl von Fällen erwähnt, bei denen, meist bei Arbeitern in Gummifabriken mit ungenügender Ventilation, durch Einathmung des Giftes neben anderen Symptomen auch Sehstörungen mit oder ohne objectiven ophthalmoskopischen Befund auftraten.

So berichteten in Frankreich Gourdon (62), Huguin (83), Marche (120) und Galezowski (56), in England Al. Bruce (23) und Nettleship (137), von deutschen

Autoren Hirschberg (78) (1886) und in neuerer Zeit Reiner (152), Kalischer (89) und Stadelmann (170) über einschlägige Fälle.

Das Comité der engl. ophth. Gesellschaft, das zum genaueren Studium dieser Intoxications-Amblyopie niedergesetzt wurde, berichtete über 24 Fälle, zu denen weitere 24 Fälle von de Schweinitz (167) hinzukommen. Nach letzterem treten in etwa 40% aller Schwefelkohlenstoffvergiftungen Sehstörungen auf.

In den meisten genauer berichteten Fällen handelt es sich klinisch um eine Verschleierung des Gesichtsfeldes, anfangs meist besonders gegen Abend, später auch bei hellem Tageslicht, Erweiterung der Pupille bei erhaltener Reaction, Einengung des Gesichtsfeldes analog derjenigen bei Tabaksamblyopie. In einigen Fällen wurde auch Accommodationsparese als Symptom angeführt.

Bei der ophthalmoskopischen Untersuchung wurde in einigen Fällen Blässe der Papille, Perineuritis leichten Grades, partielle oder complete Sehnervenatrophie nachgewiesen. Hirschberg (77) beschreibt stippchenartige Heerde in der Maculagegend analog denen bei Naphthalinvergiftung, Kalischer (89) fand das ophthalmoskopische Bild einer abgelaufenen retrobulbären Neuritis. In anderen Fällen (Reiner (152), Gallemaerts (57)) konnte die Untersuchung des Augenhintergrundes keine pathologischen Veränderungen nachweisen.

Ueber die Pathogenese der Schwefelkohlenstoffamblyopie ist wenig bekannt. Soviel scheint aus den Beobachtungen der erwähnten Autoren hervorzugehen, dass sie in ihren Symptomen eine grosse Aehnlichkeit mit der Tabaksamblyopie zeigt, für welche durch die Untersuchungen von Samelsohn (158), Nettleship (37), Vossius (185) und Uhthoff (180) als anatomische Grundlage eine interstitielle Neuritis besonders des papillomacularen Bündels des Sehnerven sicher gestellt ist. Man wird daher nicht fehlgehen, wenn man für die Schwefelkohlenstoffamblyopie eine

ähnliche Erkrankung des Sehnerven annimmt, um so mehr, als sich auch bei ihr, wie bei der Tabaksamblyopie, im Gegensatz zur Chinin- und Filixamaurose keine Gefäßalterationen ophthalmoskopisch nachweisen lassen.

An anatomischen und experimentellen Untersuchungen über die genauen Structurverhältnisse der Netzhaut nach Schwefelkohlenstoffvergiftung fehlt es meines Wissens noch vollständig, was um so mehr zu verwundern ist, als durch die neueren Untersuchungen von Köster (97) die pathologischen Veränderungen der Ganglienzellen des Rückenmarkes nach Schwefelkohlenstoffintoxikation genau erforscht worden sind. Köster lieferte auch den Beweis, dass sich durch Inhalation von Schwefelkohlenstoff bei Kaninchen charakteristische, nach der Nissl'schen Methode darstellbare Nervenzellenveränderungen herbeiführen lassen.

Aus diesem Grunde schien gerade diese Intoxicationsamblyopie für die vorliegenden experimentellen Untersuchungen besonders geeignet.

Die Vergiftung wurde in der Weise ausgeführt, dass die Thiere in einem verschliessbaren Glasbehälter den durch ein Gebläse erzeugten Schwefelkohlenstoffdämpfen so lange ausgesetzt wurden, bis typische Vergiftungserscheinungen hervortraten, die nach etwa 5 Minuten mit lebhafter Unruhe und Abwehrbewegungen der Thiere einsetzten und zu heftigen klonischen, später tonischen Krämpfen übergingen. Im Streckkrampf wurde das Versuchsthier schnell aus dem Behälter genommen, worauf ein zweiter Anfall intensiver klonischer Krämpfe erfolgte, von denen sich das Thier allmählich erholte. Noch längere Zeit nach der Inhalation blieben Lähmungen der hinteren Extremitäten, Starre und Weite der Pupille und beschleunigte Athmung mit starker Schleimsecretion zurück.

Das erste Thier, dessen Netzhaut genau untersucht wurde, starb kurze Zeit nach der ersten Inhalation, ohne dass es sich von dieser erholt hatte.

An dem 2. und 3. Versuchsthier konnten die Inhalationen 34 resp. 40 mal, anfangs täglich, dann täglich mehrmals wiederholt werden. Erscheinungen von Sehstörung waren auch in diesen Fällen nicht mit Sicherheit nachzuweisen, und auch die Untersuchung des Augenhintergrundes ergab weder Veränderungen an den Gefässen, noch Zeichen einer Entzündung der Retina und des Sehnerven, noch das Bild einer Opticus-Atrophie.

Das 4. Versuchsthier endlich wurde, nachdem es 50 Inhalationen in Zeit von 40 Tagen ohne dauernde Schädigung des Allgemeinbefindens vertragen hatte, an einem Tage 4 mal in Zeit von 8 Stunden den Dämpfen ausgesetzt und sofort nach dem, unmittelbar nach der letzten Inhalation erfolgten Tode secirt.

Die Untersuchung der Netzhautzellen ergab bei allen Versuchsthiereu annähernd den gleichen Befund.

Nur im ersten Fall waren die Nisslkörper mehr scharf begrenzt, eckig und stäbchenförmig, während sie in den anderen Fällen in ihren Umrissen verwaschen und in grösseren Klumpen, meist in der Zellperipherie, angeordnet lagen. Hinsichtlich der Grösse der Zelle liess sich kein merklicher Unterschied vom normalen Verhalten auffinden, und auch die Structur der Protoplasmagrundsubstanz, die Lage und Begrenzung des Kerns und des Kernkörperchens zeigte keine merklichen pathologischen Veränderungen. Ebenso wenig waren solche an der inneren und äusseren Körnerschicht nachzuweisen (vergl. Fig. 9).

Dieser in pathologischer Beziehung negative Befund — denn die verwaschene Structur der Chromatinkörper in den letzten Fällen fällt noch nach den oben angeführten Versuchen in die physiologische Schwankungsbreite und ist um so besser zu verstehen, als die Thiere bei ziemlich heller Tagesbeleuchtung zum Exitus kamen — steht in einem gewissen Gegensatz zu den hochgradigen Veränderungen, die Köster(97) nach gleicher Versuchsanordnung an den

Rückenmarks- und Spinalganglienzellen beschrieben hat und die ich am Rückenmark der gleichen Versuchsthiere nachweisen konnte. Hier fanden sich an Paraffinpräparaten Erweiterungen des pericellulären Raumes, Einbuchtungen und Auszackungen des Kerns, staubförmiger Zerfall oder Klumpung der Nisslkörper.

Man kann hier den Einwand machen, dass die Vergiftungsversuche nicht lange genug fortgesetzt wurden, um eine Beeinflussung der nervösen Elemente der Retina, wie sie klinisch als Amblyopie zu Tage tritt, zu erzeugen. Doch war jedenfalls in den vorliegenden Fällen die Vergiftung intensiv genug, um klinische und pathologische Veränderungen der Rückenmarkszellen zu bewirken, wie sie bei Menschen, die an Schwefelkohlenstoffamblyopie leiden, in gleichem Maasse nicht zu finden sind.

Ein anderer Einwand wäre der, dass Kaninchen zu derartigen Experimenten ungeeignete Versuchsthiere sind, dass bei ihnen speciell die Erscheinungen von Seiten des Auges nach Schwefelkohlenstoffvergiftungen weniger zu Tage treten. Das ist zuzugeben, da sich Störungen geringeren Grades bei diesen Thieren nur sehr unsicher nachweisen lassen. Aber daraus zu schliessen, dass sie ganz gefehlt hätten, hiesse zu weit gegangen. Haben doch die oben beschriebenen Untersuchungen der Netzhaut nach Chinin- und Filixvergiftung bewiesen, dass sehr wohl auch bei Kaninchen Nervenzellveränderungen in der Netzhaut vor sich gehen können, ohne dass intra vitam eine Sehstörung in allen Fällen sich nachweisen liess. Richtiger erscheint die Vermuthung, dass bei Schwefelkohlenstoffvergiftung das Symptom der Amblyopie in anderer Weise pathogenetisch zu erklären ist, als bei den anderen beiden Vergiftungsarten.

Die erkennbare Structur der Netzhautnervenzellen, speciell ihre Chromatinkörper scheinen besonders durch diejenigen Gifte alterirt zu werden, denen man auch nach dem ophthalmoskopischen Befund eine Wirkung auf das Gefäss-

system der Netzhaut zuerkennen muss. Diese Annahme lässt sich gut in Einklang bringen mit der Thatsache, dass sowohl im Rückenmark und im Gehirn, als auch in der Netzhaut, Aenderungen in der Blutzufuhr schon frühzeitig zu pathologischen Processen der zugehörigen Nervenzellen, besonders zu Zerfall und Schwund der Nissl'körper führen, während auch nach schweren Nervenstammlaesionen erst relativ spät sich derartige Veränderungen der Ganglienzellen bemerkbar machen. Daneben mag freilich, wie aus dem oben geschilderten Vergleich zwischen den Nervenzellbefunden nach Chininvergiftung und nach Gefässversperrung hervorgeht, für die betreffenden Intoxicationen noch directe Einwirkung des Giftes auf die Nervenzelle in Betracht kommen.

Ob aber derartige Nervenstammveränderungen etwa in Form einer retrobulbären Neuritis, die in ihren Anfängen noch keinerlei ophthalmoskopisch nachweisbare Veränderungen darzubieten braucht, auch bei der Schwefelkohlenstoffvergiftung eine Rolle spielen, wie sie für Alkohol- und Tabaksamblyopie nachgewiesen sind, das müsste durch andere Untersuchungsmethoden, als ich sie bei den vorliegenden Experimenten angewandt habe, erwiesen werden.

Ueberblicken wir zum Schlusse nochmals kurz die Resultate der angestellten Experimente und fragen wir uns, zu welchen weiteren Schlüssen dieselben berechtigen.

Es ergab sich aus einer grösseren Zahl von Untersuchungen am Kaninchen, dass auch unter anscheinend gleichartigen Bedingungen bei gleichem Adaptationszustand in der Netzhaut desselben Thieres beträchtliche Schwankungen in der Grösse der Ganglienzellen, der Lage des Kerns, dem Gehalt an Chromatinkörpern vorkommen, welche die Feststellung functioneller Unterschiede beträchtlich erschweren. Bei einem genauen Vergleich der Strukturverhältnisse der Ganglienzellen bei Hell- und Dunkeladaptation fand sich mit annähernder Constanz nach völlig

gleicher Behandlung beider Netzhäute mit Härtungs- und Färbungsmitteln für das Kaninchen ein Unterschied in dem Sinne, dass die Ganglienzellen des Dunkelauges reicher an feinkörnigen, namentlich in der Peripherie der Zelle angehäuften Nisslkörpern sind, während diese im Hellauge spärlicher vorhanden, in ihren Conturen häufig verwaschen erscheinen, als ob sie in Auflösung begriffen seien. Dieser Unterschied liess sich auch in der Netzhaut des Hundes und der Katze nachweisen. Dagegen kann ich auch beim Hunde die von Mann (118) als charakteristisch angegebenen Unterschiede in der peripheren Wanderung des Kerns und Schwellung der Zelle und des Zellkerns nicht bestätigen.

Hinsichtlich des Chromatingehaltes der äusseren und inneren Körnerschicht stimmen meine Untersuchungen mit denen von Pergens (146) (an Fischen) überein. Es zeigte sich, dass der Chromatingehalt dieser Schichten im Dunkeladaptationszustand ein grösserer ist, als nach Belichtung.

Nach kurzdauernder Blendung mit elektrischem Bogenlicht war der Chromatingehalt der Ganglienzellen beträchtlich vermindert, ohne dass sich zunächst an Grundsubstanz und Begrenzung der Zelle und des Zellkerns Veränderungen fanden. Es zeigte sich auch, dass nach einer Erholungszeit von 1 Stunde eine Anreicherung der chromatischen Substanz stattfindet.

Länger dauernde Blendung führte zu völligem Schwund der Nisslkörper, Schrumpfung der Zelle und des Zellkerns und Auftreten von Vacuolen.

Der Vorgang der Chromatolyse, welcher zunächst an einem Undeutlichwerden und einer Verklumpung der Nisslsubstanz unter Mitfärbung der Grundsubstanz kenntlich ist, an die sich weiterhin Schrumpfung der Zellmembran, Schrumpfung und Blaufärbung des Kerns, und fast völliger Schwund der Chromatinsubstanz anschliessen, liess sich nach isolirter Durchschneidung des Sehnerven (im Gehirn) lang-

samer Verblutung, nach Unterbindung der Carotis interna und communis, nach Embolie mit Quecksilber und nach kurzdauernder experimenteller Hyperthermie (2 Stunden, 42° C.) des Versuchsthieres nachweisen.

Die Körnerschichten boten bei diesen Versuchen theils Schrumpfungs-, theils Zerfallserscheinungen dar.

Nach subacuter Vergiftung mit Chinin und Extrac-tum filicis fand sich beim Kaninchen eine hochgradige Veränderung der Netzhautganglienzellen, die in einem Zerfall der chromatophilen Elemente, Auftreten von Vacuolen im Protoplasma und Kernsubstanz, Schwellung oder Schrumpfung des Kerns und der Zelle bestand. Dabei war der Chromatingehalt der äusseren Körner wenig verändert, während die inneren Körner theilweise Schwellungs-, theils Zerfallserscheinungen erkennen liessen.

Nach wiederholten Inhalationen mit Schwefelkohlenstoff (50 mal), die zu deutlichen Veränderungen der Chromatinsubstanz der Vorderhornzellen geführt hatten, zeigten die Netzhautganglienzellen nur geringe Structurveränderungen.

Durch die geschilderten Versuche ist nur ein kleines Gebiet der Pathologie der Netzhautzellen bearbeitet worden. Es bleibt vor allem noch eine grosse Reihe auch klinisch wichtiger Vergiftungen übrig, unter denen besonders Alkohol, Nicotin- und Bleiintoxication, die auch am Auge häufig genug krankhafte Störungen verursachen, nach den neuen feineren Methoden zu untersuchen sind.

Gerade für diese Giftstoffe bieten sich in den Ergebnissen neuerer Arbeiten über Structurveränderungen der Rückenmarks- und Gehirnzellen durch das gleiche Gift (Nissl (139), Vas (183), Lugaro (113), Marinesco (122), Goldscheider und Flatau (61)) wichtige Vergleichspunkte.

Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass auf experimentellem Wege der Nachweis zu erbringen ist, dass, ehe noch

Veränderungen an den Opticusfasern auftreten, sich bei diesen Intoxicationen pathologische Processe an den Netzhautganglien abspielen, die das Wesen der Sehstörung zu erklären vermögen, wenn es auch andererseits möglich ist, dass sich solche erst an primäre Nervenfaserslaesionen anschliessen.

Diese Fragen näher zu untersuchen, wird künftig meine Aufgabe sein. *Meinem verehrten Chef, Herrn Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Sattler, bin ich für sein lebhaftes Interesse und manche Förderung bei vorliegender Arbeit zu grösstem Danke verpflichtet, in gleicher Weise Herrn Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Hering und meinem verstorbenen Vater.

Literaturverzeichniss.

- 1) Andriezen, Newer aspect of pathologie of insanity. Brain 1894. p. 548.
- 2) Angelucci, Ricerche istologiche sull epitelio retinico dei vertebrati. Arch. f. Anat. u. Phys. 1878.
- 3) Apathy, Das leitende Element des Nervensystems und seine topographische Beziehung zu den Zellen. Mitthlg. d. zoolog. Stat. Neapel 1897. S. 495.
- 4) Arnold, Ueber Structur und Architektur der Zellen. Arch. f. mikr. Anat. 1898. S. 535.
- 5) Ayres, Quinine Amblyopia. Amer. j. of ophthalm. 1897. Jan.
- 6) Babes, Ueber den Einfluss verschiedener Infectionen auf die Nervenzellen des Rückenmarkes. Berl. klin. Wochenschr. 1898. S. 1—3.
- 7) Bach, Zur feinen Anatomie und Pathologie der Ganglienzellen der Retina. Transact. of the VIII. internat. ophthalm. Congress. Edinburgh 1894. S. 137.
- 8) Bach, Die Nervenzellenstructur der Netzhaut in normalen und pathologischen Zuständen. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XLI. 1895. S. 62.
- 9) Baer, Prager med. Wochenschr. 1888. S. 41.
- 10) Ballet et Dutil, Sur quelques lésions expérimentales de la cellule nerveuse. Centralbl. f. Nervenheilk. 1897. S. 21.
- 11) Barabaschew, Zur Frage von der Chininamaurose. Arch. f. Augenheilk. 1891. S. 91.
- 12) Barbacci u. Campacci, Sulle lesioni cadaveriche delle cellule nervose riv. di path. nerv. e ment. II. p. 8.
- 13) Benda, Die Bedeutung der durch basische Anilinfarben darstellbaren Nervenzellstructuren. Neurol. Centralbl. 1895. S. 759.
- 14) Berkley, Studies on the lesions produced by the action of certain poisons on the cortical nerve cell. Brain 18. 1895.

- 15) Bernheimer, Zur Kenntniss der Localisation im Kerngebiet des Oculomotorius. Wiener med. Wochenschr. 1896. S. 7.
- 16) Bethe, Das Verhalten der Primitivfibrillen in den Ganglienzellen des Menschen. Arch. f. Psych. 1899. S. 855.
- 17) Binz, Chinاريندن. Eulenburg's Realencyclopädie der med. Wissensch.
- 18) Birnbacher, Ueber eine Farbenreaction d. belichteten und unbelichteten Netzhaut. v. Graefe's Archiv f. Ophthalm. XL. 1894.
- 19) Boll, Beiträge zur physiologischen Optik. Arch. v. du Bois. 1871.
- 20) De Bono, L'amaurose et l'amblyopie quinique. Annal. d'oculist. 116. 1896. p. 73.
- 21) Brasch, Ueber den Einfluss der Wasserentziehung auf die Nervenzelle. Fortschr. d. Med. 1898. S. 21.
- 22) Brown, A case of quinine amaurosis. Transact. ophthalm. soc. 1887. p. 193.
- 23) Bruce, Chronic poisoning by bisulphid of Carbon. Edinb. med. J. May 1884. p. 1009.
- 24) H. D. Bruns, Case of Quinine amaurosis. Observations extending over 10 years. Americ. Journ. of Ophthalm. Jan. 1897.
- 25) Buller, Transact. of americ. Ophthalm. Assoc. 1881. p. 262.
- 26) R. y. Cajal, Neue Darstellung vom histologischen Bau des Centralnervensystems. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1893. S. 399.
- 27) R. y. Cajal, Die Structur des nervösen Protoplasmas. Monatsschr. f. Psych. u. Neurolog. I. S. 156 f. Neurolog. Centralbl. 1897. S. 1098.
- 28) R. y. Cajal, Nouvelles contributions à l'étude histologique de la rétine et à la question des anastomoses des prolongements protoplasmiques. Journ. de l'Anat. XXXII. p. 481.
- 29) Chochrjakow, Ueber die pathologischen Veränderungen der Netzhaut bei acuter Uraemie. Diss. Petersburg. Ref. Nagel's Jahresb. 1897. S. 179.
- 30) Colenbrander, Dissert. Utrecht 1896.
- 31) Colucci, Conseguenze della recisione del n. ottico nella retina di alcuni vertebrati. Annal. di Neur. 1893.
- 32) Czerny, Ueber Blendung der Netzhaut durch Sonnenlicht. Sitzungsber. d. Wiener Akad. 1867. Bd. XLVI.
- 33) Demichieri, L., L'amaurose quinique et paludéenne. Annal. d'Oculist. 115. p. 32.
- 34) Delpech, A. T. D., Nouvelles recherches sur l'intoxication spéciale que détermine le Sulfure de Carbone l'industrie du caoutchouc soufflé. Paris, 1863.
- 35) Demoor, La plasticité morphologique des neurones cérébraux. Arch. de biol. XLV. 1896. S. 723.
- 36) Denissenko, Bemerkungen über d. Bau der Netzhaut. Med. Centralbl. LII. 1880.
- 37) Deutschmann, v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. 1882. Bd. XXVIII. 3. S. 241.
- 38) Dexler, Zur Histologie der Ganglienzellen des Pferdes in normalem Zustande und nach Arsenikvergiftung. Arbeiten aus Prof. Obersteiner's Laborat. Wien 1897.

- 39) Dogiel, Die Structur der Nervenzellen der Retina. Arch. f. mikr. Anatom. XLVI. S. 394. 1895.
- 40) Dogiel, Die Retina der Vögel. Arch. f. Anat. XLIV. 1895. S. 622.
- 41) Dolganoff, Ueber die Veränderungen des Auges nach Ligatur der Gallenblase. Arch. f. Augenheilk. 1897. S. 196.
- 42) Dolganoff, Ueber die anatom. Veränderungen der Netzhaut bei Eklampsie. Warschau. Ref. Nagel's Jahresb. 1897. S. 170.
- 43) Dor, Action de la lumière sur les noyaux des cônes et des bâtonnets. Annal. d'ocul. 115. S. 224.
- 44) Ehrlich, Ueber die Methylenblaureaction der lebenden Nervensubstanz. Deutsche med. Wochenschr. Bd. XII. 1886. S. 49.
- 45) Engelmann, Physiol. Laborat. Utrecht. 1884.
- 46) Envall, Svensksa Läkares ällskapets nya handlingar. Serie II. Th. V. 3. S. 109.
- 47) Ewen, Studies on Ganglion cells. Arch. on Neurology and Psychopathology. 1898. Vol I. 3.
- 48) Fick, Netzhaut und Sehnerv. Ergebn. d. spec. Patholog., Morphol. u. Physiolog. d. Sinnesorgane. Lubarsch. Ostertag. 1896.
- 49) Flatau, Einige Beobachtungen über die Neuronenlehre im Anschluss an frühzeitige experimentell erzeugte Veränderungen der Zellen des Oculomotoriuskernes. Fortschr. d. Medicin. 1896. Bd. 14. S. 6.
- 50) Flemming, Morphologie der Zelle und Nervenzellen. Anat. Hefte. Bd. VI. 1896. S. 218.
- 51) Flesch und Koneff, Bemerkungen über die Structur der Ganglienzellen. Neurol. Centralbl. Bd. V. 1886. S. 145.
- 52) Fränkel, Die Wirkung der Narcotica auf die motorischen Vorderhornzellen des Rückenmarkes. Berlin 1898.
- 53) Friedenwald, Die Bedeutung von Verengerungen und Erweiterungen im Caliber der retinalen Arterien. Arch. f. Augenheilk. 1897. S. 242.
- 54) Fuchs, Siegm., Untersuchungen über die im Gefolge der Belichtung auftretenden galvanischen Vorgänge in der Netzhaut und ihren zeitlichen Verlauf. Pflüger's Arch. 1894. 56. S. 408.
- 55) Gad, Der Energieumsatz in der Retina. Arch. f. Physiol. 1894. S. 491.
- 56) Galezowski, Des Amblyopies et des Amauroses Toxyques. Paris 1878. p. p. 86, 143.
- 57) Gallemaerts, Amblyopie par le Sulfure de Carbone. Ann. d'Ocul. Bruxelles 1890, 103—104, 15ter, i. v. p. 154—158.
- 58) Ganfini, Sulle alterazioni delle cellule nervose, dell'asse cerebrospinale consecutive all' inanizione. Monit. zool. 1897. VIII. Acur. Centralbl. 1898. S. 458.
- 59) van Gehuchten, L'anatomie fine de la cellule nerveuse. Int. Cgr. Moskau 1897. Neurol. Centralbl. 1897. S. 905.
- 60) van Genderen, v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. XXXI.
- 61) Goldscheider und Flatau, Normale und pathologische Anatomie der Nervenzellen. Berlin 1898.
- 62) Gourdon, De l'intoxication par le sulfure de Carbon. Paris, 1867. (Thesis.)
- 63) A. v. Graefe, Fälle von Amaurose nach Chiningebrauch. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. III. Bd. S. 96.

- 64) Greeff, Die Morphologie und Physiologie der Spinnenzellen im Chiasma, Sehnerven und Retina. v. Graefe, Archiv f. Ophthalm.
- 65) Greeff, Ueber Zwillingsganglienzellen. Neurol. Centralbl. 1897. S. 336.
- 66) Groenow, Ueber die Intoxicationsamblyopie. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXVIII. 1.
- 67) Grosz, Durch ein wurmabtreibendes Mittel verursachter Fall vollständiger Erblindung. Centralbl. f. Augenheilk. 1895. S. 19. 41.
- 68) Gruening, On Quinine Amaurosis. Arch. of Ophthalm. New York 1881. Vol. X. p. 81.
- 69) Herbert Harlan, Quinine Amblyopia. Ophthalmie Record. III. 1897.
- 70) Heimann, Ueber die Structur der Spinalganglienzellen. Neurol. Centralbl. 1898. S. 797.
- 71) Heimann, Ueber einige neuere Arbeiten auf dem Gebiete der Histologie des Centralnervensystems. Fortschr. d. Med. 1898. S. 24.
- 72) Held, Beiträge zur Structur der Netzhautzellen und ihrer Fortsätze. Arch. f. Anat. 1895. S. 396.
- 73) Henle, Beitr. zur Anatomie der Retina. Gött. Nachr. 1864.
- 74) Henschen, Les centres optiques cérébraux. Rev. génér. d'Ophthalm. 1894.
- 75) Herrnheiser, Zur Kenntniss der Netzhautveränderungen bei septischen Allgemeinleiden. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1894. S. 157.
- 76) Herrnheiser, Ueber experimentelle Erzeugung von Embolien der Blutgefässe im Inneren des Auges. Zehender's Monatsbl. f. Augenheilk. 1895. XXXIII. S. 315.
- 77) Hirschberg, Centralbl. f. prakt. Augenheilk. 1886. S. 49.
- 78) Hirschberg, Schwefelkohlenstoffvergiftung. Centralbl. f. prakt. Augenheilk. Leipzig 1889. S. 268—269.
- 79) Hodge, A microscopical study of changes due to functional activity in nerve cells. Journ. of Morph. 1892. Vol. VII. 1892.
- 80) Ward A. Holden, Die Pathologie der experimentellen Chinin-Amblyopie. Arch. f. Augenheilk. 1899. Juni.
- 81) Holmgren, Zur Kenntniss der Spinalganglienzellen von Lophius piscator. Anat. Hefte. 1899. XXXVIII.
- 82) Hosch, Bau der Säugethiernetzhaut nach Silberpräparaten. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XLI. 1895. 3. S. 84.
- 83) Huguin, Contribution à l'étude de l'intoxication par le Sulfure de Carbon chez les ouvriers en caoutchouc soufflé. (Thesis.) Paris, 1874.
- 84) Inoye, Ein Fall von Veränderung des Augenhintergrundes durch Filixvergiftung. Bericht d. ophthalm. Gesellschaft. Heidelberg. 1896. S. 300.
- 85) Jones, Ophthalm. Review. 1883. S. 106.
- 86) Juliusburger und Meyer, Zur Färbung und Histologie der Nervenzellen. Deutsche med. Wochenschr. 1898. S. 689.
- 87) Juliusburger und Meyer, Beitrag zur Pathologie der Spinalganglienzellen. Neurol. Centralbl. 1898. S. 159.
- 88) Juliusburger und Meyer, Berliner Gesellschaft f. Psych. u. Nervenheilk. 13. XI. 1897. Autor. Neurol. Centralbl. 1898. S. 37.

- 89) Kalischer, S., Ueber Schwefelkohlenstoffvergiftung. Allgem. med. Centralzeitg. 55.
- 90) Kallius, E., Untersuchungen über die Netzhaut der Säugethiere. Anat. Hefte. 1894. S. 529.
- 91) Katayama und Okamoto, Vierteljahrschr. f. ger. Med. 1894. 3. VIII.
- 92) Kempner und Pollack, Die Wirkung des Botulismus-Toxins und seines specifischen Antitoxins auf die Nervenzellen. Deutsche med. Wochenschr. 1897. S. 32.
- 93) Knapp, Ueber Chininamaurose. Bericht d. Ophth. Gesellschaft. 1882. S. 100.
- 94) Knies, v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Bd. XXXII. 3. S. 236.
- 95) Kobert, Intoxicationen. Stuttgart. 1893.
- 96) Kölliker, Ueber die feinere Anatomie und die physiologische Bedeutung des sympathischen Nervensystems. Wiener klinische Wochenschr. Bd. VII. 1894. S. 747.
- 97) Köster, Experimenteller und pathologisch-anatomischer Beitrag zur Lehre von der chronischen Schwefelkohlenstoffvergiftung. Neurol. Centralbl. 1898. S. 493.
- 98) Kohnstamm, Ueber retrograde Degeneration. Schmidt's Jahrb. 256. S. 253.
- 99) Kono, Ibid. cit. bei Katayama u. Okamoto.
- 100) Korach, Deutsche med. Wochenschr. 1891. Nr. 32.
- 101) Korybutt und Daszkiewicz, Wird der thätige Zustand des Centralnervensystems von mikroskopisch wahrzunehmenden Veränderungen begleitet? Arch. f. mikrosk. Anat. 1889. S. 5.
- 102) Krause, Allgem. u. mikroskop. Anatomie. 1876.
- 103) Kreyszig, Ueber die Beschaffenheit des Rückenmarks bei Kaninchen und Hunden nach Phosphor- und Arsenikvergiftung nebst Untersuchungen über die normale Structur desselben. Virchow's Arch. Bd. CII. 1885. S. 286.
- 104) Kronthal, Zur Färbung des Nervensystems. Neurol. Centralbl. 1895. S. 795.
- 105) Kühne, Zur Photochemie der Netzhaut und über Sehpurpur. Heidelberg. 1. 1877.
- 106) Laker, Arch. f. Augenheilk. 1885. Bd. XIV. S. 161.
- 107) Lambert, Compt. rend. Soc. Biol. 1893. p. 879.
- 108) Lamy, Sur les lésions médullaires d'origine vasculaire. Arch. d. Physiol. 1895—1897.
- 109) Leber, v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. 1882. Bd. XXVIII. 3. S. 255.
- 110) v. Lenhossek, Bemerkungen über den Bau der Spinalganglienzellen. Neurol. Centralbl. 1898. S. 13.
- 111) Levi, Ricerche citologiche comparate sulla cellula nervosa dei vertebrati. Riv. di patol. nerv. e ment. II. Ref. Neurol. Centralbl. 1897. S. 788.
- 112) Little, Toxic Amblyopia-Bisulphide of Carbon. Transact. Ophthalm. Soc. 1897. S. 257.
- 113) Lugaro, Sulle alterazioni delle cellule nervose nell'ipertermia sperimentale Riv. di Patolog. nerv. e ment. 1898. III. 5. V.
- 114) Lugaro e Chiezzi, Sulle alterazioni degli elementi nervosi nell'inaizione. Riv. di patol. nerv. e ment. 1897. S. 394.

- 115) Lugaro e Chiezzì, Sur les modifications des cellules nerveuses dans les divers états fonctionnels. Arch. Ital. de Biol. 24. p. 258.
- 116) Luithlen und Sorgo, Zur Färbung der Ganglienzellen. Neurol. Centralbl. 1898. S. 640.
- 117) Magini, L'orientation des nucléoles des cellules nerveuses motrices dans le lobe électrique de la torpille à l'état de repos et à l'état d'excitation Arch. ital. de Biol. 22. p. 212.
- 118) Mann, histological changes induced in sympathetic motor and sensory nerve cells by functional activity. Journ. of Anat. and Phys. 1895. S. 100.
- 119) Mann, Ueber die Behandlung der Nervenzellen f. experimentelle histologische Untersuchungen. Arch. f. Wsch. Mikr. 1894. S. 479.
- 120) Marche, De l'intoxication par le Sulfure de Carbon. Paris 1876.
- 121) Marina, Eine Fixationsmethode bei welcher sowohl die Nissl'sche als die Weigert'sche Markscheidenfärbung gelingt. Neurol. Centralbl. 1897. S. 166.
- 122) Marinesco, Pathologie de la cellule nerveuse. Internat. Congress Moskau 1897. Neurol. Centralbl. p. 913.
- 123) Marinesco, Recherches sur l'histologie de la cellule nerveuse avec quelques considérations physiologiques. Compt. rend. de l'Acad. des sciences. Paris 1897. Ref. Neurol. Centralbl. 1898. S. 950.
- 124) Marinesco, Veränderungen der Nervencentren nach Ausreissung der Nerven mit einigen Erwägungen betreffs ihrer Natur. Neur. Centralbl. 1898. S. 882.
- 125) Martin, Pathogenèse de l'ophthalmie électr. Annal. d'oculist. C. p. 25.
- 126) Masius, Sur la production expérimentale de l'amaurose par l'extract éthère de fougère mál. Annal. d'oculist. 114. 1895. S. 127.
- 127) Masius und Mahaim, Recherches sur les altérations de la rétine et du nerf optique dans l'intoxication filicique. Bull. de l'acad. royale de med. de Belg. 26. III. 1898. Ref. Revue Générale d'ophtalm. 1899. 3.
- 128) May, cit. de Schweinitz l. c. S. 217.
- 129) Michel, J. v., Congrès douzième intern. des sciences medic. Annal. d'oculist. 148. p. 288.
- 130) Mikiji Joda, cit. bei Katayama und Okamoto.
- 131) Modestow, Pathologische Veränderungen der Netzhaut bei chronischer Nikotinvergiftung. Diss. Petersburg. Ref. Nagel's Jahresb. 1896. S. 208.
- 132) Moglie, Retinite albuminurica. Ibid. Policlinico III. 12. p. 284.
- 133) Monakow, Experimentelle Untersuch. über Opticuscentren und Bahnen. Neurol. Centralbl. 1889. S. 13.
- 134) Monti, Sur l'anatomie pathologique des éléments nerveux, dans les processus provenant d'embolisme cérébral. Arch. Ital. de biol. XXIV. 1895.
- 135) Moxter, Ueber Ganglienzellenveränderungen bei künstlicher Steigerung der Eigenwärme. Fortschr. d. Med. 1898. Nr. 4.

- 136) Müller, Heinr., Ges. u. hinterlassene Schriften zur Anatomie und Physiologie des Auges. Leipzig 1872.
- 137) Nettleship, Severe Quinine Amblyopia. Transact. Ophthalm. Soc. of united Kingd. (1886—87). S. 218, 219, London.
- 138) Neppi, Sulle alterazioni cadaveriche delle cellule nervose rilevabili col metodo di Nissl. Riv. di Patol. nerv. e ment. Vol. II. 1897. p. 152.
- 139) Nissl, Rindenbefunde bei Vergiftungen. Arch. f. Psych. 1899. S. 853.
- 140) Nissl, Ueber die Nomenclatur in der Nervenzellenanatomie. Neurol. Centralbl. 1895. S. 66.
- 141) Nissl, Die Beziehungen der Nervenzellsubstanzen zu den thätigen, ruhenden und ermüdeten Zellzuständen. Neurol. Centralbl. 1896. S. 59.
- 142) Nissl, Ueber die Veränderungen der Nervenzellen nach experimentell erzeugter Vergiftung. Vortrag in Heidelberg. Neurol. Centralbl. 1896. S. 947.
- 143) Nuel and Leplat, Amblyopia due a l'intoxication par le Sulfure de Carbon. Annal. d'ocul. Bruxelles 1889. p. 101—102. 14ser.
- 144) Ogneff, Einige Bemerkungen über die Wirkung des elektrischen Bogenlichtes auf das Gewebe des Auges. Pflüger's Arch. 63. 1896. S. 269.
- 145) Onuf, The biological and morphological Constitution of Ganglion Cells as influenced by section of the spinal nerv roots or spinal nerves. Journ. of N. and Ment. Diseases, Oct. 1895. XX. 10. p. 507—64.
- 146) Pergens, Action de la lumière sur la rétine. Ref. Annal. d'ocul. 1897.
- 147) Pergens, Action de la lumière sur la rétine. Annal. de la soc. roy des sciences méd. et nat. de Bruxelles. 1896. V. S. 389.
- 148) Pergens, Action de la lumière colorée sur la rétine. Annal. de la soc. roy. des sciences méd. et nat. de Bruxelles. 1897. VI. S. 1.
- 149) Pognat, Des modifications histolog. de la cellule nerveuse dans ses divers états fonctionnels. Bibliogr. anatom. Nicolas VI. 1898. p. 27.
- 150) Ræhlmann, Ueber einige Beziehungen der Netzhautcirculation zu allgemeinen Störungen des Blutkreislaufes. Virchow's Arch. 103. S. 184.
- 151) Reich, v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. 1880. Bd. XXVI. 3. S. 135.
- 152) Reiner, Siegrfr., Zur Casuistik der Schwefelkohlenstoffamblyopie. Wiener klin. Wochenschr. 52. 1895.
- 153) Reinlein, cit. bei Katayama u. Okamoto,
- 154) Renaut, Fonctionnalité rétinienne et voi des impressions lumineuses. Rev. génér. d'ophthalm. 1899.
- 155) Rockcliffe, Ophthalm. Review. 1882. S. 308.
- 156) Rosin, Zur Färbung und Histologie der Nervenzellen. Deutsche med. Wochenschr. 1898. S. 615.
- 157) Sacerdotti u. Ottolenghi, Sur les altérations des éléments nerveux dans la dyscrasie urémique. Arch. ital. de Biol. p. 27.

- 158) Samelsohn, Zur Anatomie und Nosologie der retrobulbären Neuritis. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXVIII. 1. 1882.
- 159) Sarbo, Ueber die normale Structur der Ganglienzellen des Kaninchen Rückenmarkes und deren patholog. Veränderungen bei Vergiftungen mit Phosphor und Morphinum. Ungar. Archiv. 1893. 1. S. 264.
- 160) Scagliosi, Beitrag zur pathologischen Anatomie des Centralnervensystems bei der acuten Anaemie. Deutsche med. Wochenschr. 1898. S. 309.
- 161) Schaffer, Ueber Nervenzellveränderungen während der Inanition. Neurol. Centralbl. 1897. S. 832.
- 162) Schaffer, Das Verhalten der Ganglienzellen bei Tabes, auf Grund Nissl's Färbung. Neurol. Centralbl. 1898. 2.
- 163) Schleier, Münch. med. Wochenschr. Nr. 32. 1890.
- 164) Schmidt-Rimpler, Ueber maculare Sehnervenatrophie bei Diabetes. Ophthalm. Gesellschaft Heidelberg. 1896. S. 99.
- 165) Schultén, Experimentelle Untersuchungen über die Circulationsverhältnisse des Auges. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXX. 3. S. 1.
- 166) M. Schultze, M. z. Anat. u. Physiol. d. Retina. Schultze's Arch. II. 1866.
- 167) de Schweinitz, The Toxic amblyopias. Their classification, history, symptoms pathology and treatment. Philadelphia 1896.
- 168) Silex, Arch. f. Augenheilk. 1887. Bd. XVIII. S. 65.
- 169) Singer, Ueber experimentelle Embolien im Centralnervensystem. Zeitschr. f. Heilk. 18. S. 105. 1899.
- 170) Stadelmann, Ueber Schwefelkohlenstoffvergiftung. Berl. Klinik. Augenheilk. 1896. 1898.
- 171) Stadelmann, Ueber Schwefelkohlenstoffvergiftung mit Kranken-vorstellung. Münch. med. Wochenschr. 1896. S. 600.
- 172) Steinhaus, Ueber die Veränderungen der Netzhaut bei Phosphorvergiftung. Ziegler's Beitr. z. pathol. Anat. 22. S. 406.
- 173) Stewart, Influence of acute Alcohol Poisoning on Nerve Cells. Journ. of Exper. Med. 1896. Nov. S. 623.
- 174) Sulzer, Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1883. S. 129.
- 175) Tanaka, cit. bei Katayama u. Okamoto.
- 176) Terrier, Pathogénie de l'ophthalm. électrique. Annal. d'ocul. 1880. p. 31.
- 177) Trömmer, Pathologisch-anatomische Befunde bei Delirium tremens nebst Bemerkungen zur Structur der Ganglienzellen. Arch. f. Psych. 1899. S. 700.
- 178) Trzebinski, Einiges über die Einwirkung der Härtungsmeth. auf die Beschaffenheit der Ganglienzellen im Rückenmark der Kaninchen und Hunde. Virchow's Arch. 107. 1.
- 179) Uhle, Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1886. S. 379.
- 180) Uhthoff, Untersuchungen über den Einfluss des chronischen Alkoholismus auf das menschliche Sehorgan. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. 1887. S. 257.
- 181) Ulrich, Ueber Netzhautblutungen bei Anaemie sowie über das Verhalten des intraocularen Druckes bei Blutverlusten bei Chinin- und Chloralvergiftungen. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. XXXIII. 2. 1887. S. 1.

- 182) Valenza, I cambiamenti microscopici nelle cellula non nella
lova attvitta funzionale e satti l'orfeine di agenti stimolanti e
destructori. Atti della R. Ac. della scienze fisiche e naturali di
Napoli. Vol. VIII. 1. 2. No. 3.
- 183) Vas, Zur Kenntniss der chronischen Nikotin u. Alkoholvergiftung.
Arch. f. experim. Pathol. 1894. S. 141.
- 184) Voorhies, Temporary Blindness from Quinine. Transact. of the
amer. med. Assoc. 1879. p. 411.
- 185) Vossius, Berl. klin. Wochenschr. 1886. S. 304.
- 186) Widmark, Ueber d. Einfluss d. Lichtes auf d. vorderen Medien
d. Auges. Skandin. Arch. I. 1889. 264.
- 187) Williams, Quinine Amaurosis-Report of two Cases. Transact.
amer. ophthalm. Soc. Boston, 1885—87. p. 66.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. X u. XI, Fig 1—9.

- Fig. 1. Postmortale Veränderungen der Netzhautganglienzellen. 3½ Std.
post mort. Subl. Alk. Thionin. (Erythrosin.)
- Fig. 2. Kaninchen. Hellauge (von 8 U. morgens bis 3 U. mittags
auf einem freistehenden, von der Sonne beschienenen Dach) durch
Genickschlag getödtet, in den gleichen Lösungen fixirt und ge-
härtet, auf gleichem Objectträger mit dem Dunkelaugae gefärbt.
(Leitz homog. Imm. Ocul. IV. (Zeiss.)
- Fig. 3. Kaninchen. Dunkelaugae (das gleiche Thier). Lider ge-
näht und mit geschwärzter Waschlederkappe übernäht, nach 7 stün-
diger Helladaption des anderen Auges bei rothem Licht enucleirt
und wie das Hellauge behandelt. (Leitz, homog. Imm. Zeiss,
Ocul. IV.)
- Fig. 4. a) Hellauge vom Hunde. 10 Stdn. Helladaption von 7 U. morgens
bis 5 U. nachmittags an wolkenlosem Augusttag.
b) Dunkelaugae desselben Thieres (mit schwarzer Lederkappe ver-
näht).
- Fig. 5. a) Kaninchenretzhautganglienzellen nach 5 Min. langer Blen-
dung mit elektrischem Bogenlicht.
b) Vom anderen Auge des gleichen Thieres, das ebenfalls 5 Min.
in gleicher Weise geblendet war und sich dann 1 St. lang im
Dunkeln erholt hatte.
- Fig. 6. Hyperthermie. Das Kaninchen 2 Stdn. lang bei 42° C. im
Brutschrank, dann sofort post mort. enucleirt. (Leitz, homog.
Imm. Zeiss, Ocul. IV.)
- Fig. 7. Chinivergiftung (Kaninchen E.) 4,75 g Chin. mur. in 0,5g Dosen
in 4 Tagen, am letzten Tage Gefäßverengerung im Augenhintergrund
deutlich. Tod unter klonischen und tonischen Krämpfen nachts
11 U. Sofort p. m. enucleirt. (Leitz, homog. Imm. Zeiss, Ocul. IV.)
- Fig. 8. Vergiftung mit Extractum filicis aether. (Kaninchen.) 12 g in
6 Tagen (Caps. gelat. pro dos.). Augenhintergrund o. B. Durchfälle
Paresis d. hint. Extr. Pup. weit reactionslos. Klonische Krämpfe
sub finem. (Leitz, homog. Imm. Zeiss, Ocul. IV.)
- Fig. 9. Schwefelkohlenstoffvergiftung. (Kaninchen III.) 50 Mal in Zeit
von 40 Tagen inhalirt, zuletzt dauernde Paresen der hinteren
Extremitäten. Sublimat-Alkohol, Thionin-Erythrosin.

Fig. 3.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.