Beitrag zur Steckschußoperation.

Von San.-Rat Dr. O. Heinemann in Berlin.

Die Methoden der Steckschußoperation haben in beschränktem Maße auch für die Friedenspraxis Interesse und sind auch mutatis mutandis für eingedrungene Fremdkörper, Nadelspitzen, abgebrochene Injektionskanülen anwendbar.

Im Anfang des Krieges begnügte man sich mit der Durchleuchtung oder Photographie in zwei aufeinander senkrechten Richtungen. Doch führte dies in schwierigen Fällen zu zahlreichen Misserfolgen. Dann kamen die verschiedenen genaueren Lokalisationsmethoden, die aber auch nicht recht befriedigten, da das Geschöß samt den Weichteilen, in denen es sitzt, durch veränderte Körperlage oder den Haken des Assistenten seinen Platz ändert. Endlich kam als unbedingt sichere Methode die Operation im Röntgenlicht, und es wurden besondere Steckschußabteilungen großer Lazarette gebildet, die mit einer kostspieligen Apparatur ausgerüstet waren. Nach Ch. Müller (M. m. W. 1919 Nr. 34) besaß die Steckschußabteilung des Reserve Lazarettes München I zwei stereoskopische Röntgenrichtungen, Einrichtung zur Aufnahmen mit Plattenverschiebung, Röntgen. ö. r. auf Schichten unter dem Operationstisch, Riesnmagnet über dieselben.

Demnach konnte es fast scheinen, als ob nur in solchen luxuriös eingerichteten Spezialabteilungen mit Erfolg Steckschüsse operiert werden konnten. Dem ist jedoch glücklicherweise nicht so. Ich bin der Meinung, daß man im Kriege mit möglichst einfachen Hilfsmitteln auszukommen suchen soll. Die Steckschüsse sind viel zu zahlreich, als daß sie alle nach Speziallazaretten überführt werden konnten. Für welche Verletzungen sind während des Krieges nicht schon Spezialabteilungen verlangt worden? Wohin soll das führen, wenn dies sogar für Schubfrakturen, das tägliche Brot des Kriegschirurgen, geschieht, wie dies ein Autor gefordert hat? Was bleibt schließlich dem Durchschnittschirurgen für eine Tätigkeit übrig, wenn solche Forderungen durchgehen?

Ich möchte nun zeigen, daß man in der großen Mehrzahl der Steckschüsse, selbst in den schwierigsten Fällen, mit den einfachen Hilfsmitteln kleiner Lazarette schnell und sicher zum Ziele kommt, wenn man sich der Nadellokalisation bedient. Diese ist bereits vor dem Kriege von Perthes ertunden und während desselben von Keppich (Bruns Beiträge, Bd. 108) methodisch angewandt worden. Sie scheint jedoch wenig Anklang gefunden zu haben. Des mag wohl daran liegen, daß sie mit Unterischlöhre ausgeführt wurde, die nur wenigen Anstalten zur Verfügung steht. Ich habe sie, wie es ja öfter zu geschehen pflegt, in Unkenntnis obiger Arbeiten mit den nur zur Verfügung stehenden einfachen Mitteln zur Ausführung gebracht. Bei der kryptoskopischen Operation wird das Operationsgebiet von unten durch Unterischlöhre durchleuchtet, der Operateur trägt vor dem einen Auge das Kryptoskop und erblickt auf dessen Leuchtplatte das Geschöß, das andere Auge ist unbewaffnet. Das Geschöß wird nun entfernt.

Bei der Nadellokalisation werden vorher Nadeln auf den Fremdkörper eingestochen, sodann der gesamte Röntgenapparat ausgeschaltet und unter Leitung der Nadel auf das Geschöß eingegangen. Man kann nun allerdings verschiedener Ansicht sein, ob unter diesen

¹⁾ C. Brunner, Zbl. f. Chir. 1915 S. 569, 1916 S. 1019, 1917 S. 546; derselbe, v. Gonszenbach, Ritter, Bruns Beitr. 111. 1918. H. 3.

Umständen die Nadellokalisation Vorzüge hat. Deren Vorzüge treten erst dann hervor, wenn nichts als ein gewöhnlicher mittelmäßiger Röntgenapparat und ein Leuchtschirm zur Verfügung steht, und noch dazu in einem besonderen Raum außerhalb des Operationssaales, wie es in kleinen Anstalten die Regel ist. Die Nadellokalisation und die Operation können hier ohne Schaden in beiden Räumen getrennt vorgenommen werden. Der das Geschöß tragende Körperteil befindet sich zwischen Röntgenrohre und Leuchtschirm. Der Operateur benutzt einige Nadeln von 10—15 cm Länge, wie sie in Gestalt dünner Punktionskanülen stets zur Verfügung stehen. Man kann sich auch leicht geeignete lange Nadeln improvisieren, z. B. aus den Hutnadeln der Damen. Man sticht nun unter Leitung des Schirmes auf das Geschöß ein, bis es die Nadel berührt oder wenigstens dicht an ihm vorbeigeht. Dies erkennt man daran, daß das Geschöß durch die Nadelspitze bewegt werden kann. Noch besser ist es, wenn man zwei Nadeln benutzt, die man von verschiedenen Punkten der äußeren Haut aus einsticht. Im ersteren Fall schneidet man später der Nadel entlang, im letzteren Fall geht man auf die Spitze des Winkels ein, den die beiden Nadeln bilden. Es würde auch nichts hindern, erforderlichenfalls eine dritte Nadel zu benutzen. Zwei Nadeln sind erforderlich, wenn man nicht auf dem kürzesten Wege einstechen kann, da große Gefäße oder Nerven im Wege sind. Man umgeht sie auf diese Weise. Nach geschickener Lokalisation wird der Patient in den Operationsraum gebracht, narkotisiert und unter Leitung der Nadeln operiert. Das Einstachen der Nadeln macht nur geringe Beschwerden.

Die Nadellokalisation ist streng aseptisch auszuführen, wenn Operateur und Körperteil vorher desinfiziert sind und der Leuchtschirm mit sterilem Mull umhüllt ist. Vor dem Transport wird gleichfalls das Operationsgebiet samt darin steckenden Nadeln steril umhüllt.

Ich habe auf diese Weise eine ganze Reihe Steckgeschosse mit Leichtigkeit entfernt, die von mir selbst und anderen ein oder mehrere Male nach anderen Methoden vergeblich gesucht waren. Die Weichteilwunden waren infolge der vergeblichen Arbeit oft beträchtlich, die Schnittländer der Weichteile nichts weniger als glatt. In einem Fall besaß sogar ein Soldat den Mut, nach dreimaliger vergeblicher Operation sich ein viertes Mal mit der Nadel operieren zu lassen. Auch hier wurde das Geschöß rasch gefunden. Die Operation dauert auf diese Art nur wenige Minuten, man kommt mit sehr kleinen Schnitten aus, und Fehlschläge sind mir bisher nicht passiert. Sitzt das Geschöß eingekeilt im Knochen, so meißelt man ihn in der Mitte zwischen den beiden Nadelspitzen auf.

Man sieht, ein Röntgenologe ist nicht erforderlich. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß das Verfahren bei allen Steckgeschüssen der Extremitäten und der oberflächlichen Rumpfschichten ohne weiteres anwendbar ist, und das ist die große Mehrzahl der Fälle. Bei Steckgeschüssen der Körperhöhlen ist es nur ausnahmsweise anwendbar. So verträgt die Leber ohne Schaden zahlreiche Punktionsstiche, und man könnte hier bei uneröffneter Bauchhöhle lokalisieren. Bei eröffneten großen Körperhöhlen ist dagegen eine Untertischröhre nötig. Bei Herz und Auge sind natürlich Nadelpunktionen ausgeschlossen.