Verfassern immer etwa 80—90¹⁾). Wesentlich erniedrigt wird die Jodzahl des Unverseifbaren auch dann nicht, wenn das Leinöl monatelang in kleinen Mengen unter Luftzutritt im Dunkeln aufbewahrt wird; eine merkbare, für den Nachweis von Mineralöl jedoch noch nicht in Betracht kommende Erniedrigung tritt bei der Aufbewahrung unter Luft- und Lichtzutritt ein. Erst wenn das Leinöl zu Firnis eingetrocknet ist, wird die Jodzahl des Unverseifbaren wesentlich erniedrigt. Die Ansicht von Niegemann, dass durch Berührung des Leinöles mit Leinölschlamm der Gehalt an Unverseifbarem erhöht und die Jodzahl des letzteren wesentlich erniedrigt wird, ist unzutreffend.

Dem gegenüber bedingt ein geringer Mineralölgehalt des Leinöles bereits eine bedeutende Erniedrigung der Jodzahl des Unverseifbaren. So lieferte ein Leinöl, dem 2⁰/₀ Mineralöl zugesetzt waren, etwa 3⁰/₀ Unverseifbares von der Jodzahl 30. Das Unverseifbare aus reinem Leinöl ist in warmem 90-prozentigem Alkohol völlig löslich, dasjenige aus mineralöhlhaltigem hinterlässt in Alkohol unlösliche Öltropfen.

2. Auf Pharmazie bezügliche.

Von

H. Mühe.

Über die Prüfung von Chininsalzen auf Reinheit berichtet Tutin²⁾. Der Verfasser hat die Prüfungsvorschriften, welche verschiedene Pharmakopöen für Chininsalze vorschreiben, einer vergleichenden Prüfung unterzogen; von den Resultaten dieser Versuche hebe ich die folgenden hervor: Die von der französischen Pharmakopö angegebenen Zahlen für die optische Drehung von schwefelsaurem und salzsaurem Chinin stimmen unter einander überein. Tutin erhielt andere Zahlen, die unter einander, aber nicht mit den von Oudemans für Chininmonosulfat beobachteten übereinstimmen. Zur Prüfung der Chininsalze auf Cinchonidin verfährt man nach der englischen Pharmakopö

¹⁾ Ich fand neuerdings statt dessen den Wert 110 auf; doch arbeitete ich mit grösseren Jodüberschüssen als Thoms und Fendler. Diese liessen auf das Unverseifbare aus 10 g Leinöl 10 ccm Hübl'sche Jodlösung 2 Stunden einwirken; ich benutzte hingegen 20 ccm Hübl'sche Lösung und eine sechs-stündige Einwirkungsdauer. L. G.

²⁾ Pharm. Weekblad 1910, S. 125; durch Zeitschrift d. allgem. österr. Apotheker-Vereins **64**, 130.

in folgender Weise: 4 g des zu prüfenden Chininsalzes löst man in 120 *ccm* siedendem Wasser, kühlt unter Rühren auf 50° ab, filtriert, dampft das Filtrat auf 10 *ccm* ein und schüttelt die abgekühlte Lösung mit 10 *ccm* Äther und 5 *ccm* Ammoniak aus; man lässt nun wenigstens 24 Stunden an einem kühlen Orte stehen, sammelt die abgeschiedenen Kristalle, wäscht sie mit Äther ab, trocknet bei 100° und wägt; das Gewicht soll höchstens 0,12 g betragen. Nach Tutin ist diese Methode sehr wenig empfindlich, weil man nach seinen Beobachtungen noch 7 % absichtlich zugesetztes Cinchonidin übersehen kann; wendet man statt Äther Äther purificatus an, so gelingt es nach dem Verfasser noch 3 % Cinchonidin nachzuweisen.

Zur Wertbestimmung von Chininsalzen wendet man ganz allgemein die von Kerner angegebene Ammoniakprobe an; die Menge zehnpromentlichen Ammoniaks, welche man zu 5 *ccm* des Filtrates fügen muss, um eine klare Lösung zu erhalten, ist nach den Vorschriften verschiedener Pharmakopöen sehr verschieden; so verlangt die amerikanische 7, die französische 5, die niederländische 4,5 und das D. A. B. IV 4 *ccm*. Nach den Untersuchungen von Tutin ist die von der französischen Pharmakopöe angegebene Modifikation der Kerner'schen Methode die zweckmässigste. Der Verfasser verbrauchte nach dieser Methode unter Anwendung von möglichst reinem Chininsulfat, welches fünfmal aus Wasser umkristallisiert war, 4,4 *ccm* Ammoniak von der angegebenen Konzentration; die Forderung des D. A. B. IV, das 4 *ccm* Ammoniak genügen sollen, ist deshalb auch bei den reinsten Präparaten nicht erfüllbar. Wenn es trotzdem Handelspräparate gibt, welche dieser Forderung entsprechen, so ist der Grund hiervon in gewissen Verunreinigungen zu suchen, die den Ammoniakverbrauch herabdrücken. Tutin fand, dass zum Beispiel schon die Gegenwart von 0,1% Natriumsulfat im Chininsulfat genügt, um den Ammoniakverbrauch von 4,4 auf 4 *ccm* herabzusetzen. Tutin hat ferner Gemische von Chininsulfat und den Sulfaten der Nebenalkaloide nach der Kerner'schen Methode untersucht; aus diesen Versuchen geht hervor, dass der Ammoniakverbrauch am wenigsten erhöht wird bei einem Gehalt von 5 % Cinchonidinsulfat, und zwar auf 5,6 *ccm*; am meisten bei einem Gehalt von 5 % Chinidinsulfat und zwar auf 14,0 *ccm*. Die klare Ammoniaklösung bleibt bei den häufigsten Verunreinigungen mit Cinchonidin und Hydrochinin auch beim Stehen klar, während Cinchonin und Chinidin beim Stehen sich kristallinisch abscheiden. Da nach der Ansicht von Tutin das

Hydrochinin dem Chinin gleichwertig ist, so hält er die Forderung der niederländischen Pharmakopöe mit 4,5 *ccm* und selbst die der französischen mit 5 *ccm* Ammoniak für zu streng. Ausserdem macht Tutin noch darauf aufmerksam, dass das Resultat der Kerner'schen Probe nicht nur von dem Gehalt an Nebenalkaloiden, sondern auch von der Reaktion des zu untersuchenden Präparates abhängig ist; so erhöhte Umkristallisieren des Chininsulfates aus schwach saurem und ebenso auch aus schwach ammoniakalischem Wasser die Ammoniakzahl. Bei Chininum bisulfuricum soll die Kerner'sche Probe ganz wertlos sein; bei Chininum hydrochloricum macht sich nach der Umsetzung mit Alkalisulfat der Einfluss des gebildeten Alkalichlorids dadurch geltend, dass die Ammoniakzahl ganz beträchtlich steigt; durch einen etwa angewandten Überschuss an Alkalisulfat kann man den Mehrverbrauch an Ammoniak zum Teil wieder aufheben. Eine Probe Chininsulfat kann demnach genau 4,4 *ccm* Ammoniak verbrauchen und braucht doch nicht frei von Nebenalkaloiden zu sein, während bei etwas abgeänderten Versuchsbedingungen ein reines Präparat weit über 4,4 *ccm* Ammoniak verbrauchen kann, um eine klare Lösung zu geben; Tutin hat in einzelnen Fällen 8,5 bis 8,6 *ccm* zusetzen müssen.

3. Auf Physiologie und Pathologie bezügliche Methoden.

Von

K. Spiro.

Kohlehydrate. Für die Bestimmung von Mannose, Arabinose, Xylose und hydrolisiertem Milchzucker haben R. O. Herzog und F. Hörth¹⁾ das Verfahren nach Kjeldahl ausgearbeitet, indem sie in folgender Weise verfahren:

In einen Erlenmeyer'schen Kolben von zirka 150 *ccm* Inhalt bringt man 30 *ccm* Fehling'scher Lösung und 30 *ccm* der Zuckerlösung und verdünnt hierauf genau auf 100 *ccm*. Dann leitet man einen Wasserstoffstrom durch die Flüssigkeit (doppelt durchbohrter Kork) und erhitzt während genau 20 Minuten durch Einstellen in ein kochendes Wasserbad. Das gebildete Kupferoxydul wird mittels eines Soxhlet'schen Asbeströhrchens abfiltriert. Nach sorgfältigem Auswaschen mit heissem

¹⁾ Zeitschrift f. physiolog. Chemie **60**, 152.