1. Das bekannte rothe Salz, erhalten durch Fällung einer Kobaltoxydullösung in der Kälte mit einfach-kohlensaurem Alkali, das sich in überschüssiger Kohlensäure löst und durch Kochen unverändert niederfällt :

2. Ein heller rothes Salz, durch Fällen einer Oxydullösung mit zweifach-kohlensaurem Natron in der Kälte :

3. Ein indigblaues, entstanden durch Fällung einer kochenden Kobaltoxydullösung mit kochendem kohlensauren Natron, das an der Luft grün wird, indem es sich höher oxydirt :

Häufig erhält man Mischungen, wie es scheint, von diesen drei Salzen, Niederschläge, die keine constante Zusammensetzung zeigen.

Kupfersäure.

Krüger *) stellte durch Einleiten von Chlor in Kali oder Natronlauge, worin Kupferoxydhydrat vertheilt war, die Lösung einiger kupfersauren Salze dar, aus welcher er sie jedoch nicht isoliren konnte, indem alsbald nach der Bildung der Sauerstoff stürmisch entweicht. Durch Versetzen von Chlorkalk mit einer Lösung von salpetersaurem Kupferoxyd erhielt er jedoch ein Kalksalz von schön carmoisinrother Farbe, welches sich langsamer zersetzte.

*) Pogg. Annal. Bd. LXII S. 445.