Schwankungen in der amylytischen Wirkung des menschlichen Speichels finden, veranlassten Verf. mit gemischtem Speichel gesunder Menschen sowie mit Ptyalinum activum von Merk entsprechende Versuche anzustellen. Es ergab sich dabei, dass die durch Speichel oder Ptyalinlösung entstehende Zuckermenge von der angewendeten Ferment- und Stärkemenge nicht abhängig ist. Ebenso hat der Procentgehalt der Verdauungsprobe an Stärke keine Bedeutung, sofern nur die Stärkemenge die gleiche bleibt, dagegen wird um so mehr Zucker gebildet, je grösser die Stärkemenge in der Verdauungsprobe ist.

Max Müller.

F. Umber: Ueber die fermentative Spaltung der Nukleoproteide im Stoffwechsel. — Zeitschr. klin. Med. 1901, 43, 282.

Karl Glässner: Ueber die Vorstufen der Magenfermente. — Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol. 1901, 1, 1—23.

Karl Glässner: Ueber die örtliche Verbreitung der Profermente in der Magenschleimhaut. — Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol. 1901, 1, 24—33.

C. Jackson: Ueber die Zersetzung der Eiweisssubstanzen bei Menschen, welche sich starken Strapazen unterworfen haben. — Atti R. Accad. dei Lincei Roma 1901, [5], 10, II, 186—188.

O. Kellner und Mitarbeiter: Untersuchungen über den Einfluss des Asparagins und Ammoniaks auf den Eiweissumsatz der Wiederkäuer. — Zeitschr. Biologie 1900, [N.F.], 21, 313—376.

G. Ascoli: Zur Methodik und Bedeutung der Blutanalyse für die Kenntniss des Eiweissstoffwechsels. — Pflüger's Archiv 1901, 87, 103—115.

Fleisch, Fleischwaaren und diätetische Nahrungsmittel.

Johannes Frentzel und Max Schreuer: Verbrennungswärme und physiologischer Nutzwert der Nährstoffe. I. Nutzwert des Fleisches. — Arch. Anat. u. Physiol. (His-Engelmann). Physiol. Abth. 1901, 284—298.

Verfasser fütterten in einem 5-tägigen Versuche einen Hund mit einer täglichen Nahrung, die aus 470 g frischem Rinderhackfleisch und 130 g durch Aether von der Hauptmenge des Fettes befreitem Fleischmehl bestand. Die chemische Zusammensetzung des frischen Fleisches ergab 73,89 % Feuchtigkeit, 3,51 % Stickstoff, 1,04 % Asche und 2,78 % Rohfett. Nach Feststellung des Stickstoffes und des Kalorienwerthes der Nahrung wurden diese Bestimmungen auch mit dem täglich abgesetzten Harn und Koth des Versuchstieres ausgeführt. Dabei gelangten die Verfasser zu dem Ergebniss, dass von den in der gereichten Nahrung vorhandenen Kraftstoffen 74,84 % dem Körper nutzbar gemacht worden waren.

Max Müller.

Joseph Nerking: Quantitative Bestimmungen über das Verhältniss des mit siedendem Wasser extrahirbaren Glykogens zum Gesamtglykogen der Organe. — Pflüger's Arch. 1900, 85, 313—319.

In seiner letzten Arbeit (Pflüger's Arch. 1901, 81, 636) hat Verf. 2 Versuche mitgetheilt, aus denen hervorgeht, dass durch noch so langes Ausziehen mit siedendem Wasser die gesammte Glykogenmenge aus den Organen nicht erhalten werden kann. Wenn man nämlich das durch Ausziehen mit siedendem Wasser von

löslichem Glykogen völlig befreite Organpulver mit Kalilauge aufschloss, so erhielt man noch recht beträchtliche Mengen Glykogen, die fest gebunden waren und erst durch die Behandlung mit siedender Kalilauge aus der Verbindung frei gemacht wurden. Diese Versuche hatte Verf. mit Kalbsleber ausgeführt, in vorliegender Arbeit dehnt er nun die Untersuchungen auf Muskelsubstanz aus, und zwar benutzte er diesmal Kalbfleisch und Hammelherz als Ausgangsstoffe. Das Ausziehen der von allem sichtbaren Fett und Sehnen befreiten, gemahlenen Masse mit siedendem Wasser wurde so lange fortgesetzt, bis in dem wässrigen Auszug keine Spur von Glykogen mehr nachzuweisen war, oft zeigte dabei schon der zweite oder dritte Auszug nicht die geringste Opaleszenz mehr, ein Beweis, wie trüglisch es ist, das Ausbleiben derselben als Beweis für Glykogenfreiheit eines Organauszuges anzusehen. Der mit Wasser vollständig erschöpfte Fleischbrei wurde alsdann mit Kali behandelt. Verf. fand nun, dass von dem Gesamtglykogen des Kalbfleisches in 2 Versuchen 66,92 bzw. 72,53 % in wasserlöslicher und 33,08 bzw. 27,47 % in gebundener Form vorhanden waren. Das untersuchte Hammelherz enthielt 83,42 % wasserlösliches und 16,58 % gebundenes Glykogen.

Max Müller.

Martin Schlesinger: Zur Kritik der Fettbestimmungsmethoden. — Dissertation Leipzig 1900. — Chemisches Centralblatt 1901, I, 1181—1182.

Genauere Ergebnisse bei Fettbestimmungen in Organen werden nach Angabe des Verf's. bei Verwendung des Chloroforms als Extraktionsmittel erzielt, und zwar genügt schon ein sechsstündiges Ausziehen des in gewöhnlicher Weise getrockneten Stoffes. Die so erhaltenen Werthe übertreffen die durch Aetherauszug erhaltenen. Auch die Alkoholvorbehandlung soll von nicht unerheblichem Nutzen für die Ergebnisse sein. Durch die Hinzufügung der peptischen Erschliessung nach dem Verfahren von Dormeyer zu der Chloroformmethode, sei es mit oder ohne Alkoholvorbehandlung, erhält man immer noch einen kleinen Extraktüberschuss, dessen Zusammensetzung aber erst noch durch weitere Untersuchungen erforscht werden muss.

Max Müller.

Joseph Nerking: Ueber Fetteiweissverbindungen. — Pflüger's Arch. 1901, 85, 330—344.

Es dürfte eine nunmehr allgemein anerkannte Thatsache sein, dass man aus getrockneten und gepulverten Organen durch Ausziehen im Soxhlet'schen Apparat nicht im Stande ist, die gesammte Fettmenge zu gewinnen, sondern dass es vielmehr einer Aufschliessung des Organpulvers durch künstliche peptische Verdauung bedarf. Thatsächlich wird die Hauptmenge des in dem Organpulver enthaltenen Fettes durch Aetherauszug im Soxhlet'schen Apparate nach einigen Stunden erhalten, der Rest aber nur äusserst schwierig und langsam. Dieser schwer ausziehbare Teil des Fettes hat einen höheren Gehalt an freien Fettsäuren und zwar nimmt der Gehalt an freien Fettsäuren um so mehr zu, je länger man die Ausziehung mit Aether fortsetzt. Es wäre nun denkbar, dass der ständig siedende Aether auf die Dauer an sich zersetzend einwirkt und die beobachtete Zunahme der fetten Säuren auf einer Abspaltung dieser aus anderen im Muskel vorhandenen Körpern beruht. Die peptische Verdauung würde in diesem Falle ebenfalls nicht nur als blosses Auflösungsmittel, sondern aufschliessend auf vorhandene Fetteiweissverbindungen wirken. Dass gewisse, den Fetten gewöhnlich zugezählte Stoffe, wie Lecithin, mit Eiweisskörpern unter gewissen Bedingungen Verbindungen eingehen, ist eine schon öfter beobachtete Thatsache.

Wenn nun das Lecithin sich mit den Eiweisskörpern chemisch verbindet, so ist es auch denkbar, dass die Fette oder die fetten Säuren Verbindungen mit Eiweisskörpern eingehen, auf welche Aether an sich nicht einwirken kann, die aber durch die peptische Verdauung zerfallen, sodass der Fettrest derselben dem Aether zugänglich gemacht wird. Ist es wirklich ein chemischer Grund, der die Langsamkeit des Aetherauszeuges und die Wirkung der peptischen Verdauung fetthaltiger Stoffe erklärt, und nicht nur eine mechanische Aufschliessung die Ursache, so muss bei fetthaltigen Stoffen, bei denen dieser physikalische Grund wegfällt, der Aetherauszug derselbe sein, mag man unmittelbar mit Aether ausschütteln oder erst mit Pepsin verdauen. Solche Stoffe sind diejenigen, welche nicht Gewebe sind und daher auch kein Fett mechanisch in Gewebebestandtheilen eingeschlossen enthalten können, nämlich die gleichartigen thierischen Flüssigkeiten, soweit dieselben überhaupt Fett enthalten. Ein solcher Körper ist das Blutserum. Ist in dem Blutserum das Fett zum Theil in gebundenem Zustande vorhanden, so wird sich das Serum hinsichtlich des Fettauszuges gerade so verhalten wie die Gewebe, d. h. auch hier wird man nach der Verdauungsmethode mehr Aetherauszug erhalten als durch einen unmittelbaren Auszug. Ist aber das Fett nur in freiem Zustande vorhanden, so ist kein Grund einzusehen, weshalb die vorhergehende Pepsinverdauung mehr liefern sollte; es müsste denn sein, dass durch die Digestion in salzsaurer Lösung etwa vorhandene Seifen gespalten und die frei gewordenen Fettsäuren einen vermehrten Aetherauszug geben würden. Nachdem Verf. sich durch besondere Prüfungen davon überzeugt hatte, dass diese letztere Annahme nicht zutrifft, stellte er gemäss obiger Ueberlegung Versuche mit Pferdeblutserum und Magermilch an. In der That lieferte das mit Pepsin-Salzsäure verdaute Pferdeblutserum einen grösseren Aetherauszug (rund 0,25 %) als frisches oder nur mit Salzsäure behandeltes Serum (0,18 bzw. 0,207 %), so dass angenommen werden kann, dass hier Fett durch die peptische Verdauung aus einer Verbindung abgespalten wird. Bei der Magermilch dagegen war durch die Versuche kein Unterschied im Aetherauszug festzustellen. Durch das Ergebniss dieser Prüfung veranlasst, stellte Verf. mit einer Reihe reiner Eiweisskörper Untersuchungen an, durch die festgestellt werden sollte, ob durch Digestion mit Pepsin-Salzsäure die vorher mit Aether erschöpften Eiweisskörper wieder einen Aetherauszug zu liefern im Stande seien. Die Eiweisskörper stellte sich Verf. sämmtlich nach den besten bekannten Verfahren her. Während es bei einer Reihe dieser reinen Eiweisskörper (nämlich Serumglobulin, Musculin, Myoglobulin, Myosin, Kasein, Laktalbumin, Oxyhämoglobin, Ovalbumin, Ovomukoid, den Pflanzeneiweissstoffen aus Hafer, Erbsen, Linsen, Bohnen und dem Maisfibrin) gelingt, durch Aetherauszug im Soxhlet'schen Apparat eine vollkommene Entfettung vorzunehmen, so dass eine nachfolgende peptische Verdauung keinen Aetherauszug liefert, gelingt dies bei einer anderen Reihe nicht und man erhält durch peptische Verdauung noch recht beträchtliche Mengen Aetherauszug, nämlich beim Paraglobulin 1,45 %, beim Muscin aus der Unterkieferdrüse des Rindes 3,08 %, bei Muskelstromasubstanz rund 3,5 % und beim Kleber 10,5 %. Es scheint somit, dass es Eiweissstoffe giebt, die Fett chemisch gebunden enthalten und es ist bemerkenswerth, dass gerade die eine Kohlenhydratgruppe enthaltenden Eiweisskörper bei der Pepsin-Salzsäure-Verdauung einen Aetherauszug ergaben.

Max Müller.

Wilhelm Rohardt: Ueber Konservirung von frischem Fleisch und über Fleischkonserven vom hygienischen und sanitätspolizeilichen Standpunkte aus. — Vierteljahresschrift gerichtl. Med. u. öffentl. Sanitätsw. 1901, [3], 21, 321—355.

Verf. erörtert die Veränderungen, die das Fleisch bei seiner Aufbewahrung erleiden kann, bespricht darauf den Werth der einzelnen Verfahren zur Konservirung von gesundem Fleisch und den Einfluss, den eine Konservirung auf krankhaft verändertes Fleisch ausübt. Die vom hygienischen und sanitätspolizeilichen Standpunkt aus zu erhebenden Forderungen sind nach Ansicht des Verf.'s die folgenden: 1. Zu einer Konservirung eignet sich nur gutes, frisches Fleisch. 2. Für die Konservirung von „frischem“ Fleisch (in Markthallen, Schlachthöfen) ist die Anwendung der Kaltluftbehandlung in gut gelüfteten und genügend grossen Räumen das beste Verfahren. 3. Fäulnisswidrige Mittel dürfen unter keinen Umständen in solchen Mengen dem Fleisch zugesetzt werden, dass der Genuss desselben auf die menschliche Gesundheit schädlich wirken könnte. Bei Beurtheilung der zulässigen Mengen solcher Mittel sind sorgfältig alle in Betracht kommenden Umstände zu berücksichtigen. 4. Von diesen Gesichtspunkten aus betrachtet giebt es kein fäulnisswidriges Mittel, welches als gänzlich einwandfrei und zugleich als genügend und passend zur Konservirung bezeichnet werden könnte. 5. Die Büchsenkonserven sind für Schiffe, Heere und Expeditionen u. s. w. von grossem Werthe; ihrer Verwendung im gewöhnlichen Leben steht ihr verhältnissmässig hoher Preis entgegen. 6. Die durch Austrocknen hergestellten Fleischzubereitungen haben wegen ihres geringen Geschmackswerthes für den Bedarf im gewöhnlichen Leben keine Bedeutung; sie erlangen eine solche erst unter aussergewöhnlichen Umständen (Krieg, Belagerungen) durch ihren hohen Nährwerth und ihre hohe Versendungsfähigkeit. 7. Eine einzelne Fleischkonserve, besonders das Pökelfleisch, soll niemals für längere Zeit die ausschliessliche Fleischnahrung des Menschen bilden, sondern möglichst mit frischem oder andersartig konservirtem Fleisch und Gemüse abwechselnd genossen werden. 8. Einzig und allein die Hitze ist ein verhältnissmässig sicheres Mittel, um Fleisch keimfrei zu machen. 9. Da es kein wirklich sicheres Mittel giebt, gesundheitsschädliches Fleisch von unschädlichem zu unterscheiden, so sollten Fleischwaaren überhaupt — auch frisch aussehende —, besonders aber vom Auslande eingeführte, nur in gekochtem Zustande genossen werden.

Max Müller.

Ludwig Lange: Beitrag zur Frage der Fleischkonservirung mittelst Borsäure-, Borax- und schwefligsauren Natron-Zusätzen. — Mit einem Anhang, Milchkonservirung betreffend. — Arch. Hyg. 1901, 40, 143—186.

Ausgehend von der Erwägung, dass die Veränderung oder Konservirung der Farbe des Fleisches vor allem in einer Umsetzung bezw. Erhaltung des rothen Blutfarbstoffes begründet ist, wurde zunächst das Verhalten des vom Faserstoff befreiten Rinderblutes nach Zusatz der Konservierungsmittel beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass bei keinem der angewandten Zusätze in irgend einer Konzentration eine wirkliche Konservirung d. h. Sterilhaltung stattfindet. Darauf wurden Versuche mit Hackfleisch angestellt und zwar kam fettfreies, durch die Fleischhackmaschine möglichst fein zertheiltes Rindfleisch zur Verwendung, von dem je 50 g mit Borsäure, Borax oder wasserhaltigem Natriumsulfit in wechselnder Menge ($\frac{1}{4}$ —2 g) innig ver-

menget und bei beschränktem Luftzutritt in nicht sterilisirten Schalen aufbewahrt wurden. Als Vergleichsprobe kam das Verhalten des mit einem Konservierungszusatz nicht versehenen Fleisches zur Beobachtung. Bei diesem zeigte sich schon nach sehr kurzer Zeit eine leichte Dunkelfärbung der Oberfläche, die nach 24 Stunden schmutzig rothbraun wurde, während in der Mitte des Haufens die Muskeln noch roth erschienen. Die Reaktion und der Geruch war ein schwach saurer, die Konsistenz nicht verändert. Nach 48 Stunden wurde der Geruch schon unangenehm säuerlich, die Konsistenz leicht schmierig; nach 72 Stunden befand sich über der dunkelrothbraunen Oberfläche ein braungrüner, glänzender Ueberzug, hervorgebracht durch dicht stehende, stecknadelkopfgrosse, grünbraune Kolonien von Fäulnisserregern. Der Geruch war stechend, stinkend, mit Spuren von obstartigem Geruch. Nach 4 Tagen war die Zersetzung der oberflächlichen Theile des Fleischhaufens eine vollständige, neben einem Ueberzuge von dicker grüner Schmiere, trat aashaft stinkender Geruch auf, die Reaktion war alkalisch. Bei den mit Konservierungsmitteln versetzten Fleischproben waren die Ergebnisse folgende: Hackfleisch mit Borsäure in verschiedenen Konzentrationen ($\frac{1}{2}$ —4 %) versetzt, zeigt schon nach 24 Stunden eine derartige graubraune Verfärbung der Oberfläche, dass es zum Verkaufe nicht mehr gelangen kann. Der Geruch erweist sich als unangenehm säuerlich, nicht gerade faulig, bei 3—4 % Zusatz zum Theil auch widerlich süsslich. Bakterienansiedlung und Vermehrung wird bei Konzentrationen bis zu 2 % in bemerkbarer Weise nicht verhindert. Bei 2 % Zusatz bleiben die Kolonien anfänglich in der Entwicklung etwas zurück, ohne jedoch ganz gehemmt zu werden. Auch bei 3—4 % Zusatz zeigen sich nach wenigen Tagen Kolonien auf der Oberfläche. Diese bestehen aber nur aus Hefe. Für Schimmelpilze erwiesen sich sämtliche Proben als gute Nährböden. Die Borsäure muss somit als zur Konservierung von Hackfleisch so gut wie ungeeignet bezeichnet werden. Abgesehen davon, dass sie in niedrigeren Konzentrationen bis zu 3 % (die in der Praxis verwendeten Zusätze sind $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ %) die Ansiedlung und Vermehrung der verschiedensten Saprophyten nicht verhindert, bei grossem Zusatz (3 und 4 %) aber noch Hefe und Schimmelpilze üppig gedeihen lässt, wird durch ihre Beigabe, schon bevor noch eine Wirkung der Verunreinigung mit Keimen angenommen werden kann, das Fleisch an Farbe und Geschmack derart verändert, dass es niemand mehr wird kaufen wollen. Bei den mit Borax versetzten Proben war nach 24 Stunden eine deutliche Umwandlung des Muskelgewebes zu einer ziemlich trockenen, zähklebrigen, braunrothen bis dunkelbraunen, fest zusammenhängenden Masse erkennbar, an deren glatter Oberfläche das Licht stark gebrochen wird. Auch hier waren sämtliche Proben im Aussehen so gegen frisches Hackfleisch verändert, dass man es von einiger Entfernung vielleicht gar nicht gleich als Fleisch erkannt hätte. Die Zersetzung unter Bildung von stinkenden Erzeugnissen wurde bis zur Konzentration von 3 % nicht verhütet. Auch bei 4 % Zusatz trat schon nach 3 Tagen stinkender Geruch auf, neben schmieriger Umwandlung der Oberfläche. Wir können demnach im Borax ebensowenig wie in der Borsäure ein geeignetes Konservierungsmittel für Hackfleisch erblicken. Die mit Natriumsulfit versetzten Proben boten nach Verlauf von 24 Stunden einen deutlichen Unterschied gegenüber den Borsäure- und Boraxmischungen dar. Während jene innerhalb dieses Zeitraumes im Allgemeinen graubraun, diese dunkelbraunroth verfärbt waren, wiesen die Sulfitproben thatsächlich eine Konservierung der Farbe auf. Die 2, 3 und 4 % enthaltenden Proben hatten vollständig das Aussehen und den Geruch des frischen Fleisches, bei den niedrigeren Konzentrationen war eine geringe Dunkelfärbung

zu bemerken. In diesem günstigen Zustande blieben die Proben jedoch höchstens 2 Tage, dann trat bei allen unter sichtbarer Gegenwart von Kleinsporen Zersetzung ein und zwar verlief diese von da ab mit einer Schnelligkeit und Stärke, die weit die bei Borsäure- und Boraxproben vorgefundenen Verhältnisse übertraf. Nach den vorliegenden Untersuchungen muss demnach der Borsäure, dem Borax und dem schwefligsauren Natrium eine wirkliche Konservierungsfähigkeit, d. h. die Vermeidung von Fäulnis und Zersetzung abgesprochen werden. Verf. stellte fernerhin mit Fleischstücken einige Versuche in der Weise an, dass er diese mit den trockenen Salzen überschichtete. Dabei übten Borsäure und Borax eine sehr geringe wasserentziehende Wirkung aus, veränderten die Konsistenz des Fleisches nicht und konnten durch den Geschmack nicht erkannt werden. Kochsalz dagegen verursachte Schrumpfung und Hartwerden des Fleisches.

Im Anschluss an obige Versuche wurde der Einfluss geprüft, den Zusätze von Borsäure, Borax und schwefligsaurem Natron auf die Spontan- und die Labgerinnung der Milch auszuüben im Stande sind. Die Ergebnisse sind nun, dass mit steigendem Borsäurezusatz ($\frac{1}{8}$ —1 %) auch die Verzögerung der Spontangerinnung zunimmt, um bei einer Zugabe von 2 % ganz aufzuhören; bei der Labgerinnung dagegen ist ein Zusatz von 4 % Borsäure nöthig, um die Wirkung des Labfermentes aufzuheben und eine Gerinnung zu verhindern. Durch Borax konnte eine geringe Verzögerung der Labgerinnung festgestellt werden, die wohl durch die schwache alkalische Reaktion des Salzes zu erklären ist. Ein Zusatz von $\frac{1}{8}$ —1 % Natriumsulfit endlich vermochte weder die Spontan- noch die Labgerinnung wesentlich zu beeinflussen. Demnach scheint erwiesen, dass der gewünschte Zweck, der Milch ein frisches Aussehen zu geben, selbst durch grosse Mengen obiger Konservierungsmittel nicht erreicht wird.

Max Müller.

A. Stroscher: Konservierung und Keimzahlen des Hackfleisches. — Arch. Hyg. 1901, 40, 291—319.

Nach Angaben der Fabrikanten sollen die Präservesalze, von denen die meisten schwefligsaures Natrium enthalten, dem Fleische zugesetzt, die natürliche Farbe desselben erhalten und auch durch Zerstörung der Gährungs- und Fäulnisbakterien verhindern, dass das Fleisch übelriechend wird. Da der Genuss derart behandelter Fleischwaaren indess in einer grossen Anzahl von Fällen zu Gesundheitsschädigungen und gerichtlichen Verurtheilungen Anlass gegeben hat, so erschien es dem Verf. von Bedeutung, die angeblich fäulniswidrige Wirkung dieser Salze zu prüfen und genau festzustellen, wie weit den Sulfiten überhaupt abtödtende oder wenigstens entwicklungshemmende Wirkungen, namentlich auf die Saprophyten des Fleisches zukommen. Die ausgeführten Untersuchungen erstreckten sich zunächst auf den Gehalt an schwefliger Säure in einer Anzahl von Hackfleischproben, gleichzeitig wurde in diesen Proben die Zahl der anwesenden Keime bestimmt. Die quantitative Bestimmung der freien, einschliesslich der als Salze vorhandenen schwefligen Säure erfolgte in üblicher Weise durch Destillation im Kohlensäurestrom und durch Bestimmung als Schwefelsäure in dem jodhaltigen Destillate. Zur Feststellung des Keimgehaltes diente die Tropfglas-Methode von Ficker (M. Ficker: Ueber Wachsthumsgeschwindigkeit des *Bacterium coli* auf Platten. Dissertation. Leipzig 1893). Dabei ergab sich, dass die Einwirkung der Präservesalze auf den Keimgehalt des Hackfleisches nur von geringer Bedeutung ist, da in den verschiedenen Proben mit verhältnissmässig hoher Keimzahl sich be-

trächtliche Mengen schwefliger Säure vorfinden. Die Fäulniskeime werden somit durch das Konservsalz nicht abgetödtet und auch in ihrer weiteren Entwicklung nur wenig gehemmt. Aus den Versuchen geht weiter hervor, dass jedes Hackfleisch, wie es der Käufer erhält, mehr oder weniger keimreich ist, mag der Fleischer Präservesalz zugefügt haben oder nicht. Den Grund hierzu sieht Verf. vor allem in der Einwirkung der Fliegen, die namentlich in der warmen Jahreszeit an keimreichen Stätten der Fleischereien (Düngergruben, Aborte) sich aufzuhalten pflegen und überall die Uebertragung der Keime auf das Fleisch herbeiführen. Ferner wurde geprüft, eine wie grosse Menge Konservsalz dem Fleische zugesetzt werden müsse, um die erstrebte Rothfärbung desselben hervorzubringen. Es wurde nun gefunden, dass die Fleischfarbe um so schöner wird, je mehr Konservsalz zugesetzt ist. Die Wirkung dieser künstlichen Rothfärbung hält um so länger an, je grösser die Zugabe des Konservsalzes war. Bei Fleisch mit 0,1 % Konservsalz (0,012 % schweflige Säure) lässt sich nur eine geringe Wirkung erzielen, da dasselbe bereits nach 24 Stunden verfärbt und übelriechend wird, aber auch Fleisch mit 0,3 % Konservsalz (= 0,036 % schweflige Säure) konnte die äussere Beschaffenheit des Hackfleisches nur 1–2 Tage erhalten, und trotz eines Zusatzes von 0,5 % (= 0,060 schweflige Säure) Konservsalz vollzog sich der Vorgang der Zersetzung nach dem 3. Tage. Es geht daraus hervor, dass der Zusatz von Konservsalz wohl günstig wirkt auf die Erhaltung der rothen Farbe, aber die Entwicklung und Vermehrung der im Fleische vorhandenen Keime nicht hindert, dass vielmehr Hackfleisch mit Konservsalzzusätzen ebenso in Fäulniss übergeht wie Hackfleisch ohne Konservsalz. Die Konservsalze besitzen somit keinerlei nennenswerthe fäulniswidrige Wirkungen, können in Folge ihrer Eigenschaft dem Fleische ein besseres Aussehen zu verleihen, die Käufer über die wahre Beschaffenheit der Waare täuschen und sind endlich nach den Untersuchungen verschiedener anderer Forscher (Ogata, Pfeiffer, Kionka) im Stande, in Folge ihres Gehalts an schwefliger Säure und schwefligsauren Salzen dem Fleische gesundheitsschädliche Eigenschaften zu verleihen. Aus diesen Gründen sind demnach die Präservesalze als Konservierungsmittel zu verwerfen.

Max Müller.

L. Janke: Ueber den Zusatz von Natriumsulfit zu Hack- und Schabe-fleisch. — Chem.-Ztg. 1901, 25, 794–795.

Verf. hat die Konservierungsfähigkeit des Natriumsulfits bei Zusatz zu Hackfleisch in einer Reihe von Versuchen geprüft. Bei denselben wurden je 100 g frisches Ochsen- bzw. Rindhackfleisch mit 0,2, 0,4 und 0,6 g Natriumsulfit mittelst der Fleischmischmaschine vermengt und theils auf offenen, theils in lose mit Glasdeckeln überdeckten Petri-Schalen bei Zimmertemperatur (15–18°) einige Tage aufgestellt. Es ergab sich nun, dass das schwefligsaure Natrium die Fleischfäulniss kurze Zeit aufzuhalten und die rothe Farbe des Fleisches zu erhalten vermag, letzteres jedoch nur an der Oberfläche. Ferner wurde beobachtet, dass einmal missfarbig gewordenes Hackfleisch nicht mehr durch Zusatz von Natriumsulfit in der Farbe aufge bessert und seines Fäulnisgeruches nicht mehr behoben werden kann. Wenn ein derartiges Hackfleisch zur Hälfte mit frisch bereitetem Fleisch versetzt wird, so gelingt es nicht, mit Natriumsulfit ein frisch und regelrecht aussehendes Fleisch wieder zu erhalten; auch bereits wahrgenommener Fäulnisgeruch kann mit diesem Salze nicht entfernt werden. Somit konservirt Natriumsulfit Hackfleisch nur auf kurze Zeit in seiner Farbe, und zwar nur bei Luftzutritt; es vernichtet ferner nicht alle Keime im Fleische, ist also

als wirkliches Konservierungsmittel nicht anzusehen. Hackfleisch, dem Natriumsulfit zugefügt ist, kann äusserlich einwandfrei erscheinen und doch bereits im Zustande beginnender Zersetzung sich befinden.

Max Müller.

P. Soltsien: Sanguis und Rosalit. — Apotheker-Zeitung 1901, 16, 545—546.

Sanguis, trockene konservirende Wurströthe, heisst ein Präparat, von dem etwa 5 g mit dem zu 1 Centner Wurstfleisch nöthigen Salze vermischt und dem Fleische vor dem Feinwiegen zugefügt werden sollen. Es besteht aus einem Gemische von Borsäure mit einem mit dunkelrother Farbe in Wasser vollkommen, in Alkohol nur unvollkommen löslichen Theerfarbstoffe, welcher in concentrirter Schwefelsäure mit unveränderter Farbe löslich ist und auch durch Alkalien nicht verändert wird. Durch Schwefelsäure und Zink wird er entfärbt. Mit Kalisalpeter geschmolzen, giebt er eine natron- und schwefelsäurehaltige Schmelze. Das Verhalten des Farbstoffes weist darauf hin, dass derselbe das Natriumsalz einer Sulfosäure, und zwar wahrscheinlich die Vereinigung einer Naphtholdisulfosäure mit einer Azoverbindung, ein sogen. Ponceau ist.

Rosalit ist die Bezeichnung für eine flüssige Farbe, von welcher 10 g zum Färben von 1 Centner Wurstfleisch verwendet werden sollen. Die Farbe besteht aus einer ammoniakalischen Lösung von Karmin mit Safranauszug. Nach dem Abdampfen giebt sie an Alkohol 2,01 % Safranauszug ab, während 14,2 % Karmin, bezw. karminsaures Ammonium, zurückbleiben. Der Gehalt an Mineralstoffen beträgt 1,058 %, die Asche ist frei von Borsäure. Salicylsäure ist in der Farbe nicht vorhanden.

Max Müller.

G. Ambühl: Wurstfärbung. — Jahresbericht des Kantonchemikers St. Gallen 1900, S. 10.

Verf. hat beobachtet, dass künstlich gefärbte Würste auch Rindfleisch anfärben können, mit dem sie zusammen gekocht werden. Ein solcher Fall gab Anlass, dass auch das Rindfleisch als künstlich gefärbt verdächtigt wurde.

C. Mai.

G. Wesenberg: Die Untersuchung von Fleisch und Fleischwaaren in Fällen von Fleischvergiftungen. — Pharm. Ztg. 1901, 46, 409—412.

Verf. giebt in vorliegender Arbeit eine kurze Anleitung zur bakteriologischen Untersuchung von Fleisch bzw. Fleischwaaren, welche Krankheitserscheinungen hervorgerufen haben, bespricht im Anschluss daran die bisherigen Bakterienbefunde bei Fleischvergiftungen, sowie die Entstehung derartiger Erkrankungen und die zum Schutze gegen dieselben zu ergreifenden Maassregeln.

Max Müller.

Heinrich Zellner: Ueber Roborat. — Pharm. Ztg. 1901, 46, 501. — Vergl. diese Zeitschrift 1901, 4, 648.

Die Analyse des lufttrocknen Roborats ergab folgende Werthe: Eiweiss 85,31 %, Fett 3,16 %, Wasser 8,26 %, Stärke und Dextrin 1,09 %, Asche 1,45 %, Lecithin 0,53 %. Das Lecithin bestimmte Verf. wie folgt: 25 g Roborat wurden mehrfach mit einer grösseren Menge Wasser ausgeschüttelt, das gelöste abfiltrirt und ausgewaschen, bis im Filtrate Phosphorsäure nicht mehr nachweisbar war. Filter und Trichter wurden darauf bei mässiger Temperatur getrocknet, die Substanz, nebst zerschnittenem Filter in einen Kolben gebracht, mit Methylalkohol übergossen und am Rückflusskühler eine Stunde lang ausgekocht. Darauf wurde in einen grösseren Porcellantiegel filtrirt, mit heissem

Methylalkohol ausgewaschen, auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft, der Rückstand verascht, wiederholt mit Salpetersäure eingedampft, in Wasser gelöst, filtrirt und im Filtrat die Phosphorsäurebestimmung nach der Molybdänmethode ausgeführt. Das gefundene Magnesiumpyrophosphat wurde, unter Zugrundelegung des Molekulargewichtes 775 für Lecithin auf dieses berechnet und ergab im Mittel aus zwei Analysen 0,532 % Lecithin. Von dem untersuchten Roboratbackwerk enthielt Roboratnährzwieback: Eiweiss 21,21 %, Fett 11,26 %, Wasser 5,53 %, Asche 1,02; Roboratnährzwieback für Diabetiker 32,12 % und Roboratbrot 30,25 % Eiweiss.

Max Müller.

A. Beythien: Nährpräparate. — Jahresbericht des chemischen Untersuchungs-Amtes Dresden 1900, S. 23.

Sanatogen, ein schneeweisses Pulver, das beim Verrühren mit wenig kaltem Wasser stark aufquillt und sich beim Erwärmen zu einer milchigen Flüssigkeit löst, aus der es durch Säuren wieder gefällt wird, ergab: Wasser 8,34, Asche 5,37, Phosphorsäure 2,49, Stickstoffsubstanz 82,75 %. Es ist demnach als ein mit Glycerinphosphorsäure gelöstes Kasein zu betrachten.

Soson zeigt sich als vorwiegend aus Muskelfasern zusammengesetzt. Die Untersuchung ergab: Wasser 9,18, Asche 0,61, Aetherextrakt (Fett) 0,17, Stickstoffsubstanz 90,04 %. Es zeigt, analog dem Tropon, die Zusammensetzung von ziemlich reinem, unlöslichem Eiweiss. Vor dem Tropon hat es den Vorzug, ausschliesslich thierischen Ursprunges zu sein, während es den Nachtheil des ersteren theilt, dass die darin enthaltenen Nährstoffe wesentlich theurer sind, als in den üblichen Nahrungsmitteln; es stellt also eine billige Eiweissquelle nicht dar und kann daher für die Massenernährung ebensowenig wie das Tropon in Frage kommen.

C. Mai.

Lebbin: Ueber Ovos, ein neues, aus Hefe hergestelltes Fleisch-extraktersatzmittel. — Med. Woche 1901, 2, 195—197.

Die Darstellung des Ovos geschieht in folgender Weise: Die Hefe wird zunächst mit Wasser mehrmals angerührt und dadurch gründlich ausgewaschen. Nach ungefähr 12 Stunden wird das Wasser abgehoben, die Hefe in Filtrirsäcke gelassen und gepresst und nunmehr in einem offenen Gefäss mittelst Dampf gekocht, wodurch ein Platzen der Zellen und Lösen des Zellensaftes bezw. des Protoplasmas herbeigeführt wird. Die dadurch entstehende dickflüssige Masse wird gepresst, der ausfliessende Saft filtrirt und im Vakuum zur richtigen Konsistenz eingedampft. Das so gewonnene Erzeugniss ist von brauner Farbe, besitzt einen angenehmen, würzigen Geruch und einen kräftigen Geschmack. Seine Lösung in warmem Wasser giebt nach Zugabe einer entsprechenden Salzmenge eine wohlschmeckende Brühe, die noch erheblich gewinnt, wenn zu ihrer Herstellung statt Wasser eine Suppenkräuter-Abkochung Verwendung gefunden hat. Die Zusammensetzung des Ovos, welches in fester und flüssiger Form in den Handel kommt, ist folgende: Wasser 27,36 %, Eiweissstoffe 40,27 %, Mineralstoffe (kochsalzfrei) 10,92 %, Phosphorsäure 5,31 %, stickstofffreie Extraktivstoffe 21,45 %. Fast der gesammte Stickstoff findet sich in Form nutzbarer Eiweissstoffe, im Gegensatz zu den thierischen Extrakten, die den grössten Theil des Stickstoffes in Form nicht weiter verwertbarer Basen (Kreatin und Kreatinin) enthalten. Um über die Wirkung des Ovos auf die Verdauungsthätigkeit Aufschluss zu erhalten, machte Verf. an einem gesunden 31-jährigen Manne Ausnutzungsversuche; bei dem ersten derselben wurde nur Kommissbrot und Wasser, bei den übrigen dasselbe Brot

mit Liebig's Fleischextrakt bzw. Ovos verabreicht. Dabei zeigte es sich, dass unter dem Einfluss des Ovos eine viel grössere Menge Brot verzehrt werden konnte als bei den übrigen Versuchen. Während nämlich im ersten Versuch 1301 g Brot (wasserfrei) und im Liebig-Versuch 1275 g gegessen wurden, wirkte im Ovos-Versuch das Erzeugniss so appetitanregend, dass die Menge des verzehrten wasserfreien Brotes auf 1821 g stieg, d. h. also, dass das Ovos zu einer Mehrleistung von 40% anregte.

Max Müller.

Georg Berju: Ueber eine Aenderung der Methode der künstlichen Verdauung eiweisshaltiger Nahrungsmittel. — Deutsche Medicinal-Zeitung 1901, 22, 567—568.

Verf. versuchte festzustellen, ob durch Aenderung des üblichen Verfahrens der künstlichen Verdauung auch ein Einblick in die Dauer der Magenverdauung bei vergleichenden Untersuchungen gewonnen werden kann. Für die Versuche wählte er Plasmon, Tropon, Roborat und trocknes Blutfibrin (Schering). Es wurde in diesen Stoffen zunächst der Gehalt an Eiweiss nach Kjeldahl festgestellt und alsdann soviel von jedem Nahrungsmittel abgewogen, dass die Mengen je 1 g Eiweiss entsprachen, darauf wurden diese mit salzsaurer Pepsinlösung nach dem von Kühn angegebenen Verfahren der künstlichen Verdauung unterworfen. Nach zwei Tagen waren bei 38—38,5° von dem Eiweiss verdaut worden im: Tropon 89,08, Plasmon 93,69, Roborat 97,42 und Blutfibrin 99,81%. Es wurden nun von jedem der genannten Stoffe die gleichen Mengen mit derselben Pepsinlösung, die aber nur $\frac{1}{2}$ % Salzsäure enthielt und auf die Versuchstemperatur vorgewärmt war, in einem grossen Wasserbade bei einer Temperatur von 38—38,5° im Becherglase der Verdauung unterworfen. Während der ersten Stunde wurde nach je 5 Minuten und später nach je 10 Minuten bei jeder Versuchsreihe die Lösung tüchtig durchgerührt. Nach Verlauf von je einer Stunde wurde hierauf ein Becherglas dem Wasserbade entnommen und, um eine weitere Einwirkung der Pepsinlösung möglichst zu verhindern, sofort durch kaltes Wasser abgekühlt. Aus den Stickstoffbestimmungen des unverdauten Antheils der untersuchten Nahrungsmittel wurden Ergebnisse erzielt, die sich von denen der ersten Versuchsreihe auffallend unterschieden. Während z. B. von dem Eiweiss im Tropon nach einer Stunde nur 8,12% verdaut waren, war die Pepsinverdauung im Roborat nahezu vollständig beendet. Nach der üblichen Verdauungszeit von drei Stunden, in welcher das Blutfibrin, welches wohl als Einheit betrachtet werden kann, bis auf geringe Spuren verdaut war, waren von dem Eiweiss des Tropons erst 29,95% und nach sechs Stunden erst 55% durch den Magensaft gelöst worden. Setzen wir Blutfibrin gleich 1, so wäre demnach während der ersten Stunde das Verhältniss in der Geschwindigkeit der künstlichen Verdauung des Blutfibrins zum Roborat, zum Plasmon zum Tropon wie 1:1,08:0,76:0,17.

Max Müller.

Heinrich Zellner: Ernährung, Nahrungsmittel, Nährpräparate. — Apoth.-Ztg. 1901, 16, 741—742.

Patente.

Deyke in Konstantinopel: Verfahren zur Verarbeitung von Fleisch, Fischen und dergl. auf Eiweissstoffe und Extrakt. D.R.P. 118963 vom 8. November 1899. — Patentbl. 1901, 22, 621.

Fein gehacktes Fleisch oder dergl. wird mit dem gleichen Gewicht einer 2—3%-igen

Natronlauge bei etwa 37° behandelt, die erhaltene Lösung filtrirt und das Filtrat mit Aether ausgeschüttelt. Aus dem Filtrat werden hierauf die Eiweissstoffe mittelst verdünnter Säure ausgefällt, nach dem Abfiltriren, Abpressen oder Ausschleudern durch Waschen mit 50%-igem Alkohol gereinigt, getrocknet und pulverisirt. — Aus der vom Eiweiss abfiltrirten, abgepressten oder ausgeschleuderten Flüssigkeit kann noch ein dem Fleischextrakt ähnliches Produkt gewonnen werden, indem man diese Flüssigkeit mit Alkali bis zur schwach sauren Reaktion versetzt, eindickt, dialysirt und dann zur Trockne eindampft.

Julius Schäfer in Bonn a. Rh.: Verfahren zur Herstellung von geruch- und geschmacklosem Fischmehl. D.R.P. 121317 vom 17. November 1899. — Patentbl. 1901, 22, 1082.

Geschuppte und ausgenommene Fische werden in ihrer eigenen Feuchtigkeit unter Druck gedämpft, sodann erkalten gelassen, getrocknet und gemahlen, worauf das so erhaltene Produkt zwecks Entfernung der Fett- Leim- und Mineralstoffe mit Citronen- oder Salzsäure enthaltendem Alkohol mehrmals gekocht, dann getrocknet und nochmals gemahlen wird.

Lebbin in Berlin: Verfahren zur Herstellung eines eine reine, hellfarbige Fleischbrühe liefernden Fleischextrakts. D.R.P. 122459 vom 21. Januar 1900. — Patentbl. 1901, 22, 1185.

Bei Auflösung von Fleischextrakt, einer konzentrirten Fleischbrühe, erhält man nicht die ursprüngliche, sondern eine dunkelbraune Lösung, da Aroma, Geschmack und Farbe in Folge der beim Eindampfen der Fleischbrühe eintretenden Zersetzung stark verändert worden sind. Die Ursache des Vorhandenseins solcher Zersetzungsprodukte ist in der Wechselwirkung zwischen dem im Fleisch bezw. Fleischsaft stets vorhandenen Eisensalzen und dem Eiweiss- und Leimgehalt des Fleisches zu suchen. Diese störenden Eisensalze werden nun dadurch beseitigt, dass die sauer reagirende, von koagulablem Eiweiss befreite, in üblicher Weise hergestellte Fleischbrühe, vorübergehend alkalisch gemacht wird. Man setzt zu diesem Zweck der Fleischbrühe z. B. kohlensaure Alkalien in Mengen von 0,1 bis 1% des angewendeten Fleisches zu, wodurch das Eisenphosphat ausgefällt wird. Nachdem letzteres durch Filtration entfernt worden ist, wird die Fleischbrühe durch Zusatz der berechneten Säuremenge wieder auf die ursprüngliche Acidität gebracht und hierauf in der üblichen Weise eingedampft.

Robert Stauf in Posen: Verfahren zur Herstellung von trockenem Blutpulver. D.R.P. 118321 vom 14. Juni 1899. — Patentbl. 1901, 22, 550.

Die durch Zerstäubungsdüsen fein zertheilte Blutflüssigkeit wird in einen oberen Raum geblasen und in diesem mit einem von unten aufsteigenden erwärmten Luftstrom derartig in Berührung gebracht, dass einerseits das Wasser vollständig verdampft, andererseits das so entstehende Blutpulver in einen Sammelraum getragen wird.

Adolf Jolles in Wien: Verfahren zur Herstellung eiweissreicher Futtermittel unter Verwendung von Blut. D.R.P. 118339 vom 1. Februar 1900. — Patentbl. 1901, 22, 550.

Den aus Blut abgeschiedenen, d. h. von Fibrin und Blutserum befreiten flüssigen Blutkörperchenbrei mischt man mit einem oder mehreren der gebräuchlichen Futtermittel (z. B. Melasse), bezw. lässt ihn von letzteren (z. B. getrockneten Rübenschnitteln) aufsaugen.

Maria Dahmen in Köln a. Rh.: Verfahren zur Darstellung eines Bluteiweisspräparates. D.R.P. 118289 vom 11. Dezember 1895. — Patentbl. 1901, 22, 551.

Eiweissstoffe werden bekanntlich durch Alkalien in Alkalialbuminate umgewandelt. Im Blut ist diese Umwandlung daran zu erkennen, dass unter völliger Lösung der Blutkörperchen eine vollkommen klare Flüssigkeit entsteht. Die Erfindung beruht nun auf der Beobachtung, dass die Umwandlung in resorbirbare, leicht lösliche Eiweissstoffe viel leichter vor sich geht, wenn das Blut vorher mit stark verdünnten Säuren oder sauren Salzen behandelt wird. Demgemäss besteht das neue Verfahren darin, dass man z. B. defibrinirtes Blut zunächst der Ein-

wirkung einer etwa 20 %-igen Weinsäurelösung aussetzt, hierauf etwa 36 Stunden mit einer 10 %-igen Ammoniaklösung auf 40—50° erhitzt und der so erhaltenen klaren Lösung dann 40 %-ige Salzsäure zusetzt. Die in Form eines Breies ausgeschiedenen Eiweissstoffe werden durch Pressen von der Lauge befreit und darauf bei einer Temperatur von 90° getrocknet.

Eberwein und Diefenbach in Bensheim: Verfahren zur Darstellung eines Bluteisenpräparates. D.R.P. 119249 vom 27. Mai 1899. — Patentbl. 1901, 22, 614.

Defibrinirtes Blut wird von einem grossen Theile seines Serums befreit, mit säurefreien Eisensalzlösungen versetzt, das Gemisch durch Alkohol ausgefällt und der unlösliche Rückstand ausgepresst, getrocknet und gepulvert.

Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) in Berlin: Verfahren zur Darstellung von Tannin-Formaldehydeiweissverbindungen. D.R.P. 122098 vom 3. Oktober 1897. — Patentbl. 1901, 22, 1094.

Lässt man Formaldehyd auf Eiweisskörper, z. B. auf Albumin, Albumose, Kasein, Fibrin, einwirken, so erhält man wasserunlösliche Formaldehydeiweissverbindungen, die wahrscheinlich als Anhydroformaldehydeiweisskörper aufzufassen sind.

Es wurde nun gefunden, dass diese unlöslichen Formaldehydeiweisskörper im Stande sind, sich mit Tannin zu verbinden. Es geschieht dies z. B. beim Kochen der pulverförmigen Formaldehydverbindungen wie Formaldehydalbumin, -kasein, -albumose, -fibrin, mit wässriger Tanninlösung. Es entstehen tanninhaltige, unlösliche pulperförmige Körper, aus denen das Tannin sich nicht mehr auswaschen lässt. Auch durch Säuren wird das Tannin nicht daraus abgespalten, wohl aber durch verdünnte Sodalösung.

Die beschriebenen Tannin-Formaldehydeiweissverbindungen sollen als Darmadstringentien Verwendung finden. A. Oetker.

Gebrauchsgegenstände.

Metalllegierungen und Metallgeräte.

K. B. Lehmann: Die Bedeutung der hygienisch wichtigen Metalle (Aluminium, Blei, Kupfer, Nickel, Zinn und Zink) im Haushalt und in den Nahrungsgewerben. — Deutsche Viertelsschr. öffentl. Gesundheitspfl. 1902, 34, 119—131.

Gelegentlich seines auf der 26. Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Rostock gehaltenen Vortrages kommt Verf. zu folgenden Schlüssen:

Die verbreiteten Ansichten über die gesundheitsschädliche Bedeutung der einzelnen Metalle bedürfen in wesentlichen Stücken der Korrektur.

Es ist stets streng auseinander zu halten, ob es sich um die Frage der Schädlichkeit einmaliger grösserer oder wiederholter kleiner Dosen handelt.

Wirklich schädlich und gefährlich sind das Blei und alle Bleipräparate. Akute Vergiftungen sind selten, chronische recht häufig im Haushalt. Die Veranlagung für chronische Bleivergiftung scheint sehr verschieden. Die deutsche Gesetzgebung ist nicht durchweg glücklich; Bleichromat ist z. B. kein zulässiges Färbemittel für Textilstoffe; die Gesetze über den Bleigehalt von Glasuren bedürfen der Revision. Verf. schlägt dafür folgende Fassung vor. Geschirre, die mehr als 5 oder 10 mg Blei bei der ersten Auskochung pro Liter abgeben (oder bei der dritten mehr als 2 mg) sind zu konfisciren; Geschirrvorräthe, in denen solche Exemplare in grösserer Zahl gefunden werden, sind zu vernichten; besondere Strafen treten nur im Wiederholungs-