ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o. 865.

Ueber die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns, von Professor Dr. C. A. F. Peters.

Die neueste Abhandlung des Herrn Dr. *Wichmann* über die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns (Astron. Nachrichten Nr. 841--44) hat ohne Zweifel bei den Astronomen viel Interesse erregt, nicht allein wegen der neuen darin mitgetheilten Beobachtungsreihe, sondern vorzüglich wegen des unerwarteten Resultats, zu welchem Herr Dr. *Wichmann* in Bezug auf jene Parallaxe gelangt ist. Denn wenn gleich der Werth, welchen Herr *Faye* vor längerer Zeit gefunden hat, demjenigen, welcher in jener Abhandlung als der richtigste hervorgehoben wird, nahezu gleich kam, so wichen doch die von andern Astronomen ermittelten Werthe sämmtlich in gleichem Sinne davon ab, so dass der *Faye'sche* Werth allgemein für unrichtig wird gehalten sein.

Da ich mich gleichfalls mit der Untersuchung der Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns beschäftigt und die Arbeiten anderer Astronomen über diesen Gegenstand mit Aufmerksamkeit verfolgt habe, so glaube ich, dass es nicht unpassend sein wird, wenn ich meine Ansicht darüber hier mittheile, weil dieses vielleicht dazu beitragen könnte, ein Urtheil in dieser streitigen Angelegenheit zu erlangen, bevor sie durch neue Beobachtungsreihen zu einer unzweifelhaften Entscheidung gebracht ist.

Zuvörderst werde ich die verschiedenen Werthe, welche bisher für die Parallaxe des genannten Sterns gefunden sind, hier im Kurzen zusammenstellen. Um abzukürzen bezeichne ich den *Argelander'schen* Stern mit *A* und die von den verschiedenen Astronomen damit verglichenen Sterne, deren Anzahl vier ist, mit *a*, *b*, *c* und *d*.

Herr *Faye* beobachtete im Jahre 1846, in den Monaten März bis November, eine Reihe von Rectascensions-Differenzen zwischen *A* und einem nahe dabei befindlichen Stern *a* von der 8^{ten} bis 9^{ten} Grösse. Aus diesen Beobachtungen fand er:

jährl. Parallaxe von *A* = 1^o085, mit dem wahrscheinlichen Fehler 0^o044 *)

(Comptes rendus de l'Acad. des Sciences de Paris, T. XXIII, p. 1078).

*) Herr *Faye* giebt nicht den wahrscheinlichen, sondern den mittleren Fehler 0^o065. Da indess in Herrn Dr. *Wichmann's* Abhandlungen und in meinen *Recherches sur la parallaxe des étoiles fixes* wahrscheinliche, nicht mittlere

Aus Zenithdistanzen des *Argelander'schen* Sterns, welche ich in dem Zeitraume vom 19^{ten} März 1842 bis zum 2^{ten} Mai 1843 mit dem grossen *Ertel'schen* Verticalkreise *) der Pulkowaer Sternwarte beobachtet habe, fand ich die absolute jährliche Parallaxe jenes Sterns = 0^o226, mit dem wahrsch. Fehler 0^o141.

Schlüter maass an 41 Tagen, vom 13^{ten} October 1842 bis zum 26^{ten} August 1843, Abstände des Sterns *A* von zwei Sternen *b* und *c*, von denen der erste von der 10^{ten}, der zweite von der 9^{ten} Grösse ist. Der *Argelander'sche* Stern befand sich damals zwischen den beiden Vergleichsternen fast genau auf dem grössten Kreise, der sie mit einander verbindet, und war von dem erstern 26,5 Minuten, von dem zweiten 27,7 Minuten entfernt. Die Berechnung der Parallaxe, welche aus diesen Beobachtungen folgt, wurde, nach *Schlüter's* Tode, von Herrn Dr. *Wichmann* ausgeführt, der die Resultate seiner Arbeit in der Abhandlung „De parallaxi stellae Argelandriae Regiomonti 1847“ dargelegt hat. Zuerst nahm Herr Dr. *Wichmann* die Abstände von den einzelnen Vergleichsternen getrennt in Rechnung, und fand

die jährl. Parallaxe von *A* — jährl. Par. von *b* = —0^o170, mit dem wahrsch. Fehler 0^o125,

und die jährl. Parallaxe von *A* — jährl. Par. von *c* = +0,211, mit dem wahrsch. Fehler 0^o125.

Bei der Vergleichung der beobachteten Distanzen mit den berechneten zeigte es sich, dass die an einem und demselben Abende gemessenen Abstände von beiden Vergleichsternen oft in demselben Sinne abwichen. So waren z. B. am 2^{ten} Jan. 1843 beide beobachtete Distanzen grösser, als die berechneten; die Distanz von *b* um 0^o54, die von *c* um 0^o41. Am folgenden Tage waren dagegen die beobachteten Abstände beide

Fehler gegeben sind, so habe ich der Gleichförmigkeit wegen hier die von andern Astronomen gefundenen mittlern Fehler in wahrscheinliche verwandelt.

*) Ich nenne diesen Kreis hier, so wie in frühern Abhandlungen, in denen von meinen damit angestellten Beobachtungen die Rede ist, den grossen *Ertel'schen* Verticalkreis, um ihn von kleinern, die sich auf derselben Sternwarte befinden, zu unterscheiden; nicht weil er an sich so sehr gross ist (sein Limbus hält 43 Zoll im Durchmesser).

kleiner, als die berechneten; die erstere um $0''35$, die zweite um $0''34$. Die Abweichungen behalten zuweilen für mehrere Tage nach einander dasselbe Zeichen; so sind z. B. die beobachteten Distanzen vom 15^{ten} bis zum 20^{ten} Mai sämmtlich kleiner, dagegen vom 22^{ten} Mai bis zum 11^{ten} August sämmtlich grösser als die berechneten. Solche Abweichungen, die schon einige Jahre früher einer der ausgezeichnetsten Astronomen bei seinen Heliometer-Beobachtungen gleichfalls bemerkt hatte, können zum Theil allerdings durch Fehler in den benutzten Rechnungs-Elementen, namentlich durch einen etwaigen Fehler in der angenommenen Grösse des Wärme-Einflusses entstanden sein; dass sie sich jedoch nicht allein durch den letztern Fehler erklären lassen, ist schon bei einer andern Gelegenheit von mir bemerkt worden. Um nun die Parallaxe von A unabhängig von dem Einflusse der genannten constanten Fehler zu erhalten, leitete Herr Dr. *Wichmann* sie aus den Unterschieden zwischen den von b und c gemessenen Distanzen ab, die nahezu frei von dem Einflusse jener Fehler sind. Auf solche Art fand er:

$$\text{jährl. Parallaxe von } A - \frac{1}{2}(\text{Par. } b + \text{Par. } c) = +0''182, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0''019.$$

In dem Zeitraume vom 22^{ten} November 1847 bis zum 2^{ten} December 1849 beobachtete Herr *Otto Struve* am grossen Refractor der Pulkowaer Sternwarte eine Reihe von Declinations-Unterschieden des Sterns A mit dem Sterne a , von der 8,5^{ten} Grösse, den auch Herr *Faye* als Vergleichstern benutzt hatte, und einem Sterne d von der 9^{ten} bis 10^{ten} Grösse. Aus diesen Beobachtungen findet er:

$$\text{jährl. Parallaxe von } A - \frac{1}{2}(\text{Par. } b + \text{Par. } c) = +0''180, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0''018,$$

aus seinen Beobachtungen:

$$\text{jährl. Parallaxe von } A - \frac{1}{2}\left(\text{Par. } b + \frac{\text{Par. } c + \text{Par. } a}{2}\right) = +0''091 + 0,0027\left(\frac{\text{Par. } c + \text{Par. } a}{2} - \text{Par. } b\right),$$

mit dem wahrsch. Fehler $0''018$.

Sieht man die Parallaxe der Vergleichsterne als verschwindend klein an, so folgt als wahrscheinlichster Werth aus den beiden so eben gegebenen Ausdrücken:

$$\text{jährl. Parallaxe von } A = 0''135, \text{ mit dem wahrsch. Fehl. } 0''013.$$

Bei Herrn Dr. *Wichmann's* Beobachtungen zeigte sich eben so wohl, wie bei den *Schlüter'schen*, dass sämmtliche Distanzmessungen eines Abends öfter mit constanten Fehlern behaftet waren. In der That am 11^{ten} März 1851 zum Beispiel, ist die Summe der beobachteten Ab und $\frac{Ac + Aa}{2}$ um $1''2$ grösser, als am 9^{ten} April desselben Jahrs; am 3^{ten} October 1851 ist jene Summe gleichfalls um mehr als eine Secunde grösser, als am Tage vorher (am 2^{ten} October). Dass diese Abweichungen nicht allein von der Temperatur abhängen,

$$\text{jährl. Parallaxe von } A - \frac{1}{2}(\text{Par. } a + \text{Par. } d) = +0''034, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0''029.$$

Die vorher erwähnten von *Schlüter* angestellten Beobachtungen wurden in den Jahren 1847 bis 1852 von Herrn Dr. *Wichmann* fortgesetzt. Im Jahre 1847 verglich er A mit denselben Sternen b und c , mit welchen auch *Schlüter* ihn verglichen hatte. Später verglich er ihn, ausser mit diesen beiden Sternen, auch noch mit dem *Faye'schen* Vergleichstern a . Für die Berechnung der Parallaxe benutzte er von seinen Beobachtungen nur diejenigen, welche in dem Zeitraume vom 20^{ten} December 1850 bis zum 6^{ten} Januar 1852 angestellt sind, deren Anzahl = 52 ist. Die Sterne a und c liegen nahezu nach derselben Richtung von A aus; Herr Dr. *Wichmann* zog daher die an jedem Beobachtungstage gemessenen Distanzen Aa und Ac zu einem Mittelwerthe zusammen, und benutzte für die fernere Rechnung diese Mittel und die Distanzen Ab . In der Abhandlung, in welcher Herr Dr. *Wichmann* seine Beobachtungen und die daraus abgeleiteten Resultate mittheilt, giebt er auch eine neue Bearbeitung der *Schlüter'schen* Beobachtungen, weil er jetzt einen genauern Werth für die jährliche Eigenbewegung des Sterns A relativ zu den Vergleichsternen benutzen konnte, als früher. Anfänglich leitete er die Parallaxe von A aus den Unterschieden zwischen Ab und Ac der *Schlüter'schen* und zwischen Ab und $\frac{Ac + Aa}{2}$ seiner eigenen Beobachtungen ab. Auf diese Weise erhielt er jetzt aus *Schlüter's* Beobachtungen:

ersieht man aus den so eben gegebenen Beispielen; denn die grössere Summe gehört im erstern Falle zu einer um 24 Grad (Fahrenheit) niedrigeren, im zweiten zu einer um 9 Grad F. höhern Temperatur. Eben so wenig hängen sie allein von der Jahreszeit ab, indem die beiden zuletzt genannten Beobachtungen nur um einen Tag von einander abliegen. Indess stellte sich dennoch, und zwar bei Herrn Dr. *Wichmann's* Beobachtungen mit grösserer Entschiedenheit, als bei den *Schlüter'schen*, heraus, dass im Allgemeinen die Summe der Entfernungen im Sommer grösser ist, als im Winter; wenn nämlich bei der Reduction der Beobachtungen die letzte *Bessel'sche* Bestimmung für den Einfluss der Wärme auf die Messungen benutzt wird. Solche mit der Jahreszeit sich ändernde Abweichungen der Distanz-Summen, könnten, zum

Theil wenigstens, wie auch Herr Dr. *Wichmann* bemerkt, im vorliegenden Falle, ebensowohl durch eine Einwirkung der Temperatur auf das Instrument, als durch eine Differenz der Parallaxen der Vergleichsterne erzeugt werden, weil die Zeiten der entgegengesetzten Maxima der Wärme sehr nahe mit den Zeiten der entgegengesetzten Maxima der Parallaxen zusammenfallen. Herr Dr. *Wichmann* behandelte daher die Summen der Distanzen unter zwei verschiedenen Hypothesen. Einmal nahm er an, die Parallaxen der Vergleichsterne seien Null und

suchte unter dieser Annahme die Aenderung des bei der Reduction der Beobachtungen benutzten *Bessel'schen* Werthes für den Thermometer-Coefficienten, welche erforderlich ist, um die Messungen in die beste Uebereinstimmung zu bringen. Darauf suchte er die Differenz der Parallaxen der Vergleichsterne, welche die beste Uebereinstimmung hervorbringt, unter der Annahme dass der *Bessel'sche* Thermometer-Coefficient fehlerfrei sei. Unter Anwendung der ersten Hypothese fand er:

ξ (die Zunahme des Werthes einer Schrauben-Revolution durch die Abnahme der Temperatur um einen Grad Fahrenheit)			
aus <i>Schlüter's</i> Beobachtungen		=	0"001045 u. d. w. F. 0"000097
aus seinen	„	 ξ	= 0,000621 „ „ 0,000098
nach <i>Bessel</i> ist dagegen		ξ	= 0,000200 „ „ 0,000024

Setzt man mit *Bessel*, den Winkelwerth einer Windung der Schraube II. am Heliometer, mit welcher alle Distanzen gemessen sind,

$$= \frac{52''89329}{1 + (\tau - 50)\varepsilon},$$

wo τ die in Graden des *Fahrenheit'schen* Thermometers ausgedrückte Temperatur bezeichnet, so ist

nach <i>Schlüter's</i> Beobachtungen	ε	=	0,00001976	mit dem wahrsch. Fehler	0,00000183;
nach Herrn Dr. <i>Wichmann's</i> Beob.	ε	=	0,00001174	„ „ „ „	0,00000185;
nach <i>Bessel</i>	ε	=	0,00000378	„ „ „ „	0,00000045.

Unter Anwendung der zweiten Hypothese findet Herr Dr. *Wichmann*:

aus <i>Schlüter's</i> Beobachtungen, jährl. Par. von b — jährl. Par. von c	=	1"148, m. d. wahrsch. Fehler	0"118;
aus seinen Beobachtungen, „ „ „ b — $\frac{\text{Par. } c + \text{Par. } a}{2}$	=	1,186, „ „ „	0,110.

Aus beiden Bestimmungen folgt, wenn man die Parallaxe von c und a einander gleich setzt,

$$\text{jährl. Par. von } b - \text{jährl. Par. von } c = 1''17, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0''081.$$

Sieht man den letztern Werth als richtig an, so folgt daraus in Verbindung mit dem vorhin gegebenen Ausdruck, nämlich

$$\text{jährl. Parallaxe von } A - \frac{\text{Par. } b + \text{Par. } c}{2} = 0''135 \pm 0''013$$

$$\text{jährl. Parallaxe von } A - \text{Parallaxe von } c = 0,720, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0''0425,$$

oder wenn man, mit Herrn Dr. *Wichmann*, die jährliche Parallaxe von c als verschwindend klein ansieht,

$$\text{jährliche Parallaxe von } A = 0,720 \pm 0''0425.$$

Nach der im Vorhergehenden gegebenen Zusammenstellung der verschiedenen für die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns gefundenen Werthe, werde ich jetzt eine Kritik derselben zu geben versuchen. Ich wende mich in dieser Beziehung zuerst zu den aus *Schlüter's* und *Wichmann's* Beobachtungen abgeleiteten Resultaten, weil diese in mehrfacher Hinsicht die interessantesten sind.

Herr Dr. *Wichmann* ist der Ueberzeugung, dass der zuletzt aufgeführte Werth für die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns,

nämlich 0"720 mit dem wahrsch. Fehler 0"0425

gegenwärtig als die sicherste und demnach beste der vorhandenen Bestimmungen angesehen werden müsse.

Wie bemerkt, hat Herr Dr. *Wichmann* die grosse Parallaxe des Sterns b , welche dem letztern Werthe der Parallaxe von A zum Grunde liegt, aus den Summen $Ab + Ac$ und $Ab + \frac{Ac + Au}{2}$ abgeleitet, die mit dem vollen Einfluss der öfter erwähnten für jeden Beobachtungstag constanten Fehler der Heliometer-Messungen behaftet sind. Diese Fehler sind in Hinsicht ihrer Grösse von gleicher Ordnung mit dem Werthe den Herr Dr. *Wichmann* für die Parallaxe von b gefunden hat. Man würde daher nur dann einiges Vertrauen zu der letztern Parallaxe bekommen können, wenn nachgewiesen würde, dass die erwähnten Fehler sich nicht mit der Jahreszeit ändern. Einen solchen Beweis liefert Herr Dr. *Wichmann* nicht, sondern er stellt in dieser Beziehung die Frage auf,

„was uns zu der Annahme periodisch wirkender Fehlerquellen berechtige, und welche andere Ursache, als allenfalls die Temperatur solche periodische Aenderungen in den Theilen des Heliometerapparats erzeugen könne, welche bei zwei verschiedenen Beobachtern in zwei durch einen achtjährigen Zeitraum getrennten Beobachtungen in ganz gleicher Weise auftreten? Wolle man die Temperatur, als die alleinige Ursache jener Periodicität aufstellen, so gerathe man, wie seine Rechnung nachweise, nicht nur in einen bedeutenden Widerspruch mit *Bessel's* frühern Resultaten, sondern erlange auch für die Beobachtungen von 1851 durchaus keine genügende Darstellung und überdiess ein so beträchtliches Wachsen der Brennweite bei zunehmender Temperatur, dass schon aus physikalischen Gründen die Richtigkeit dieser Erklärung der periodischen Aenderung von $Ab + \frac{Aa + Ac}{2}$ weit weniger wahrscheinlich werde, als das Vorhandensein einer beträchtlichen Parallaxe von b “.

Untersuchen wir nun zuvörderst, ob die genannten Fehler im Laufe des Jahres ihr Zeichen und ihren Werth im Allgemeinen wirklich nicht ändern, so findet sich, dass der Annahme einer solchen Unveränderlichkeit die Messungen der Plejadensterne widersprechen, aus denen *Bessel* den von Herrn Dr. *Wichmann* benutzten und bei der Bestimmung der Parallaxe von b als richtig angenommenen Werth des Thermometer-Coefficienten abgeleitet hat. Man findet diese Plejaden-Beobachtungen im ersten Bande der astronomischen Untersuchungen von *Bessel*, Seite 212 bis 221. Sie bestehen in Reihen von Messungen der Abstände der Alcyone von 10 andern Plejadensternen, die in den Jahren 1830 bis 1840 von *Bessel*, *Plantamour* und *Schlüter* ausgeführt sind. *Bessel* giebt daselbst die Abweichungen der einzelnen Beobachtungen von ihren Mittelwerthen, nachdem den erstern die nöthigen Reductionen, nämlich der Fehler der Mikrometerschraube, die optische Verbesserung, der Einfluss der Strahlenbrechung, die Reduction auf 1840 und die Verbesserung mittelst des von ihm gefundenen Thermometer-Coefficienten hinzugefügt sind. Vergleichen wir nun die auf solche Weise berichtigten Beobachtungen der Monate September, October und November 1838 mit denen welche in den drei darauf folgenden Monaten December 1838, Januar und Februar 1839 von demselben Beobachter angestellt sind, so ergibt sich, dass die letztern Messungen sämmtlich grösser sind als die erstern, und zwar beträgt der Unterschied im Mittel

für $\eta-g$ Plejadum	+0 ^m 59,	die Entf. der Sterne beträgt	43 ^m 4
„ $\eta-b$ „	+0,12	„ „ „	40,5
„ $\eta-e$ „	+0,98	„ „ „	43,0
„ $\eta-c$ „	+0,58	„ „ „	31,3
„ $\eta-k$ „	+0,62	„ „ „	39,2

für $\eta-l$ Plejadum	+0 ^m 72,	die Entf. der Sterne beträgt	36 ^m 4
„ $\eta-d$ „	+0,33	„ „ „	20,9
„ $\eta-s$ „	+0,40	„ „ „	28,2
„ $\eta-f$ „	+0,25	„ „ „	26,3
„ $\eta-h$ „	+0,27	„ „ „	26,5
Mittel	+0,49		33,6

Man könnte gegen die Ableitung dieser Differenzen das Bedenken erheben, sie möchten zum Theil dadurch entstanden sein, weil das Instrument am 3^{ten} October 1838 auseinander genommen wurde, und die Mikrometerschrauben darauf neue Unterlegeplatten erhielten. Allein eine aus der letztern Ursache möglicher Weise entstandene Abweichung der Messungen wird durch die Anbringung der Fehler der Mikrometerschraube unschädlich gemacht sein und ist daher auch von *Bessel* bei der Bestimmung des Thermometer-Coefficienten nicht berücksichtigt. Lässt man indess die Beobachtungen, welche vor jener Aenderung am Instrumente angestellt sind, weg, so erhält man nahezu dieselben Unterschiede. Es ist dann der Unterschied im Mittel

für $\eta-g$ Plejadum	+0 ^m 80,	die Entf. der Sterne beträgt	43 ^m 4
„ $\eta-b$ „	+0,07	„ „ „	40,5
„ $\eta-e$ „	+0,69	„ „ „	43,0
„ $\eta-c$ „	+0,47	„ „ „	31,3
„ $\eta-k$ „	+0,64	„ „ „	39,2
„ $\eta-l$ „	+0,66	„ „ „	36,4
„ $\eta-d$ „	+0,23	„ „ „	20,9
Mittel	+0,51		36,4

Die Abstände von s , f und h Plejadum fallen hier aus, weil diese im November 1838 nicht beobachtet sind.

Noch grössere Unterschiede finden sich zwischen den Messungen, welche *Bessel* in den Monaten December 1838, Januar und Februar 1839 und denen, welche *Schlüter* in den Monaten October und November 1839 angestellt hat. Die letztern Distanzen sind sämmtlich kleiner und zwar beträgt der Unterschied

für $\eta-g$ Plejadum	-0 ^m 99,	die Entf. der Sterne beträgt	43 ^m 4
„ $\eta-b$ „	-0,77	„ „ „	40,5
„ $\eta-e$ „	-1,27	„ „ „	43,0
„ $\eta-c$ „	-0,57	„ „ „	31,3
„ $\eta-k$ „	-0,67	„ „ „	39,2
„ $\eta-l$ „	-0,78	„ „ „	36,4
„ $\eta-d$ „	-0,29	„ „ „	20,9
„ $\eta-s$ „	-0,43	„ „ „	28,2
„ $\eta-f$ „	-0,41	„ „ „	26,3
„ $\eta-h$ „	-0,41	„ „ „	26,5
Mittel	-0,66		33,6

Zwischen den Messungen, welche *Schlüter* im October und November 1839 angestellt hat und seinen Messungen in den Monaten Juli, August und Sept. 1840 findet gleichfalls ein constanter Unterschied statt, indem die letztern durchschnittlich um 0^m30 grösser sind, als die erstern.

Die hier hervorgehobenen Aenderungen der beobachteten Distanzen, von einer Jahreszeit zur andern, sind von gleicher Ordnung mit der von Herrn Dr. *Wichmann* gefundenen Parallaxe des Sterns *b* von 1"17, wenn man bedenkt, dass letztere aus den Summen zweier Distanzen abgeleitet ist, die einzeln nahezu von derselben Grösse sind, wie im Mittel die *Bessel'schen* Plejadendistanzen, so dass also die Fehler bei ihnen doppelt so gross sein werden, wie bei den Plejadensternen.

Die beträchtlichsten der vorhin bemerkten Abweichungen finden zwar zwischen Messungen statt, die von zwei verschiedenen Beobachtern, *Bessel* und *Schlüter*, angestellt sind, allein eine etwaige persönliche Gleichung scheint zu der Grösse der Abweichungen nicht beigetragen zu haben. Es finden sich nämlich unter den Plejadendistanzen vier, die an einem und demselben Tage (am 1^{sten} November 1839) von beiden gemessen sind. Von diesen sind im Mittel die *Schlüter'schen* nicht kleiner als die *Bessel'schen*, wie es bei den vorhin zusammengestellten der Fall ist, sondern im Gegentheil noch um die geringe Quantität von 0"07 grösser. Aus Parallaxen lassen sich die Abweichungen gleichfalls nicht erklären, weil die Sterne, deren Abstände von *Aleyone* gemessen sind, nach allen Seiten um letztere herumliegen. Es ist demnach keineswegs eine willkürliche Annahme, sondern eine erwiesene Thatsache, dass die Heliometermessungen mit Fehlern behaftet sein können, die im Laufe des Jahres ihre Grösse und ihr Zeichen ändern, zum wenigsten dann, wenn die Beobachtungen unter Anwendung des *Bessel'schen* Thermometer-Coefficienten reducirt werden. Hieraus folgt übrigens auch noch, dass die Unsicherheit des Werthes, den *Bessel* für den Thermometer-Coefficienten aus den Plejaden-Beobachtungen abgeleitet hat, viel grösser sein wird, als der mittlere Fehler angiebt, den er unter der Annahme, dass die Beobachtungsfehler als zufällige angesehen werden können, berechnet hat. Hierauf scheint auch *Bessel* bereits hinzudeuten indem er (*Astronomische Untersuchungen* Bd. I. Seite 127, 222) bemerkt, „die übrig bleibenden Fehler der einzelnen Beobachtungen seien einige male weit grösser, als die Beobachtungsart erwarten lasse. Man finde die grösste Abweichung indess nur bei solchen Beobachtungen, die bei heftiger Kälte gemacht worden. Diese sei der Bestimmung einer von der Wärme abhängenden Grösse auf der einen Seite zwar vortheilhaft, auf der andern aber nachtheilig, indem sie mit starkem Zittern der Sterne verbunden sei und, durch die Verhärtung des Oels an der Mikrometerschraube, eine Fehlerursache herbeiführe, welche ohne sie nicht, oder doch in einem geringern Maasse vorhanden sei.“

Wie wenig Werth dem mittlern oder wahrscheinlichen Fehler eines aus den erwähnten Plejadenbeobachtungen ab-

geleiteten Thermometer-Coefficienten beizulegen ist, ersieht man besonders deutlich, wenn man diesen Coefficienten allein aus den *Schlüter'schen* Messungen ableitet und letztern Werth nebst seinem wahrscheinlichen Fehler mit demjenigen Werth vergleicht, den *Bessel* aus dem Complex aller Beobachtungen berechnet hat. Die *Schlüter'schen* Messungen haben, beiläufig bemerkt, noch den Vorzug, dass keine derselben bei strenger Kälte angestellt ist.

Bezeichnet ε , wie früher, den Wärme-Coefficienten für das *Fahrenheit'sche* Thermometer, so erhält man aus *Schlüter's* Messungen

von $\eta-g$ Plejaden	769500. $\varepsilon = + 20,056$
$\eta-b$ „	1168700. $\varepsilon = + 18,118$
$\eta-e$ „	2562470. $\varepsilon = + 45,217$
$\eta-c$ „	1757000. $\varepsilon = + 16,867$
$\eta-k$ „	3043360. $\varepsilon = + 37,181$
$\eta-l$ „	2649300. $\varepsilon = + 24,283$
$\eta-d$ „	941850. $\varepsilon = - 2,935$
$\eta-s$ „	1640440. $\varepsilon = + 17,414$
$\eta-f$ „	1334720. $\varepsilon = + 23,767$
$\eta-h$ „	1627190. $\varepsilon = + 17,450$

Summe 17494530. $\varepsilon = + 217,418$

Hieraus folgt $\varepsilon = +0,00001243$. Mit diesem Werthe werden die *Schlüter'schen* Messungen so genau dargestellt, dass man für den wahrscheinlichen Fehler einer einzelnen Messung 0"16, und damit für den wahrscheinlichen Fehler des so eben für ε gefundenen Werthes 0,00000073 erhält.

Aus den *Schlüter'schen* Messungen der Plejadensterne folgt also

$\varepsilon = +0,00001243$, m. d. wahrsch. Fehler 0,00000073, aus allen Messungen der Plejadensterne folgt dagegen, nach *Bessel*,

$\varepsilon = +0,00000378$, m. d. wahrsch. Fehler 0,00000045.

Der Unterschied zwischen beiden Werthen ist zehnmal so gross als der wahrscheinliche Fehler des Unterschiedes. Man ersieht hieraus, dass die Unsicherheit der *Bessel'schen* Bestimmung weit grösser ist, als ihr wahrscheinlicher Fehler andeutet. Ich halte es daher für nöthig noch eine auf directe Messungen der Focalweite gegründete Bestimmung des Wärme-Einflusses auszuführen. Bevor jedoch dieses geschehen ist, wird jede Parallaxe, welche aus Distanzmessungen am Heliometer auf solche Art abgeleitet ist, dass die Unsicherheit in dem benutzten Werth von ε merklichen Einfluss darauf hat, schon dieses Einflusses wegen als illusorisch anzusehen sein.

Der aus *Schlüter's* Plejadenmessungen gefundene Werth von ε ist noch grösser, als derjenige, den Herr Dr. *Wichmann* aus den von ihm selbst beobachteten Distanz-Summen

$Ab + \frac{Ac + Aa}{2}$, unter der Annahme, dass die Parallaxen der Vergleichsterne verschwindend klein sind, abgeleitet hat. Auf die von Herrn Dr. *Wichmann* hervorgehobene Abweichung des letztern Werthes von dem *Bessel'schen*, der beträchtlich kleiner ist, ist also durchaus kein Gewicht zu legen.

Herr Dr. *Wichmann* macht noch darauf aufmerksam, dass Herr *Biot* (*Astron. phys.* 3ème édit. II. p. 220) eine stärkere Einwirkung der Temperatur auf die Brennweite des Heliometers, als auf die Schraube, wie sie nach dem von *Bessel* gefundenen Werth von ϵ , noch mehr aber nach dem aus *Schlüter's* und *Wichmann's* Beobachtungen, unter der Hypothese I, gefundenen Werthe stattfinden müsste, mit seinen analytischen Betrachtungen unvereinbar finde. In Bezug hierauf erlaube ich mir folgendes zu bemerken. Herr *Biot* entwickelt a. a. O. auf theoretischem Wege den Einfluss der Aenderung der Temperatur auf den Werth einer Schraubenwindung, indem er die Höhe der Stufen der Mikrometerschraube, so wie die Grösse und den Brechungsexponenten der Linsen, aus denen das Objectiv zusammengesetzt ist, als mit der Temperatur veränderlich ansieht. Diese theoretische Entwicklung ist an sich, wie auch Herr *Biot* bemerkt, unvollkommen, weil dabei auf eine etwaige Formänderung der Linsen, durch den mit der Temperatur veränderlichen Druck der Fassung, keine Rücksicht genommen werden konnte. Grössern Einfluss, als diese Aenderung des Drucks möchte der Umstand haben, dass bei grosser Wärme die innern Theile des Objectivs kälter, bei grosser Kälte wärmer sein werden, als die äussern, besonders wenn das Fernrohr, wie das des hiesigen Heliometers, mit einem schlechten Wärmeleiter umgeben ist. Allein, abgesehen hiervon, lässt sich die von Herrn *Biot* entwickelte Formel auf den vorliegenden Fall schon deshalb nicht anwenden, weil die numerischen Werthe, welche er für die oben genannten Veränderungen angenommen hat, zu unsicher sind. Die Ausdehnungen des Flint- und Crown-Glases mit der Temperatur nimmt er so an, wie sie früher von *Laplace* und *Lavoisier* gefunden sind, und hinsichtlich der Brechungs-Exponenten setzt er voraus, dass sie sich für beide Glasarten gleich stark mit der Temperatur verändern. Unter diesen Annahmen findet er allerdings, dass der Werth einer Schraubenwindung bei zunehmender Wärme wachsen und nicht abnehmen müsse. Allein die Gläser, deren Ausdehnung *Laplace* und *Lavoisier* untersuchten, waren aus einer andern Officin und ohne Zweifel von anderer Beschaffenheit, als diejenigen des Objectivs am hiesigen Heliometer, so dass man ihre Ausdehnungen nicht so ohne Weiteres einander gleich setzen kann. Herrn *Biot's* Annahme, dass die Brechungsexponenten für Flint- und Crownglas sich auf gleiche Weise

mit der Temperatur ändern sollten, stützt sich auf keine Beobachtungen und ist an sich unwahrscheinlich. Die Resultate welche aus einer Formel abgeleitet werden, die auf so unsichern Annahmen beruht, können den Ergebnissen directer Beobachtungen gewiss nicht entgegengestellt werden. Weit entfernt auch, dass Untersuchungen, welche bei andern Fernrohren der Münchener Officin, über die Aenderungen ihrer Werthe der Mikrometerschrauben angestellt sind, die Folgerung aus Herrn *Biot's* Formel bestätigen sollten, ergeben solche vielmehr Resultate, welche mit dem aus *Schlüter's* Plejadenbeobachtungen abgeleiteten nahezu übereinstimmen. Für den grossen Refractor der Pulkowaer Sternwarte findet Herr Staatsrath v. *Struve* aus directen Messungen der Focallänge, die bei verschiedenen Temperaturen angestellt sind, den Winkelwerth einer Revolution der Mikrometerschraube

$$= 9^{\circ}7319 - 0^{\circ}00022.t,$$

wenn t die Temperatur in *Réaum.* Graden bezeichnet (*Description de l'obs. astron. de Poulkova*, p. 193). Daraus folgt:

$$\epsilon = \frac{+0,00022}{9,7319} \cdot \frac{1}{2} = +0,00001005.$$

Für den Dorpater Refractor ermittelte Herr Staatsrath *Struve* den Thermometer-Coefficienten dadurch, dass er bei verschiedenen Temperaturen die Winkelabstände zwischen drei kleinen weissen Kreisen maass, die in gerader Linie und in gleichen Abständen auf einer eisernen Stange angebracht waren. Die beiden äussersten Kreise waren 132,9 Pariser Zoll von einander entfernt, und die Stange in einem Abstände von 783 Faden vom Refractor aufgestellt. Aus diesen Messungen fand *Struve* den Thermometer-Coefficienten für's *Réaumursche* Thermometer

$$= +0,0000265, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0,0000025;$$

darnach ist für's *Fahrenheit'sche* Thermometer

$$\epsilon = +0,00001178, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0,00000111$$

(*Mens. micr.* p. CLX.) Früher hatte er aus Messungen der Entfernungen zwischen zwei um $9^{\circ}27'$ von einander abstehenden Sternen, 28 und ρ Cephei, die er im Winter und im Sommer zu wiederholten Malen und mit der grössten Sorgfalt ausgeführt hatte (*Mens. micr.* p. XVI), einen noch viel grössern Werth für den Thermometer-Coefficienten gefunden, nämlich 0,0000678 für das *Réaum.* Thermometer, woraus

$$\epsilon = +0,00003013$$

folgen würde.

Alle diese Untersuchungen geben also für ϵ Werthe, die beträchtlich grösser sind, als der *Bessel'sche*. Die Widersprüche in welche man, nach Herrn Dr. *Wichmann's* Ansicht, gerathen würde, wenn die Beobachtungen unter Anwendung seiner ersten Hypothese berechnet werden, sind demnach

keineswegs vorhanden. Die Fehler, welche in den Summen der Distanzmessungen übrig bleiben, wenn man *Bessel's* Thermometer-Coefficienten als richtig annimmt, und die Unterschiede zwischen den Parallaxen der Vergleichsterne Null setzt, werden zum Theil eine Folge der Ungenauigkeit jenes Thermometer-Coefficienten sein. Zum Theil sind die Ursachen derselben noch unbekannt; ich vermute jedoch, dass die Verschiedenheiten zwischen der Temperatur im Innern des Rohrs und ausserhalb desselben grossen Einfluss darauf haben. *Struve* und *Wichmann* sind der Meinung, dass eine Verschiebung des Oculars wesentlichen Einfluss auf die Grösse der gemessenen Distanz zwischen zwei Sternen haben könne, und sie berechnen die Aenderung der Distanz, welche einer solchen Verschiebung entspricht, unter der Annahme, dass jedesmal diejenige Scheibe senkrecht zur Achse des Kegels, (von halbkreisförmiger Basis), welchen die von einem leuchtenden Punct auf eine Objectivhälfte gesandten Strahlen, im Innern des Fernrohrs bilden, gesehen wird, die so weit vom Oculare abliegt, dass die von den einzelnen Puncten dieser Scheibe auf das Ocular fallenden Strahlen, in einer zum deutlichen Sehen erforderlichen Divergenz aus dem Oculare treten. Eine solche Annahme ist jedoch nicht zulässig, da von den einzelnen Puncten einer solchen Scheibe nicht Lichtstrahlen nach allen Richtungen ausgehen, sondern von jedem Puncte nur ein einziger Strahl in der Richtung, die er vom Objective aus bis dahin bereits hatte. Würden die Strahlen, welche von zwei verschiedenen Sternen ausgehend die beiden Objectivhälften treffen, sich genau in einem und demselben Puncte vereinigen, so müssten sie nach ihrem Durchgange durch das Ocular sich wieder in einem Puncte auf der Netzhaut des Auges vereinigen, wenn das Ocular in optischer Hinsicht ganz vollkommen und dabei gehörig für das Auge gestellt wäre. Würde unter sonst gleichen Umständen das Ocular verstellt, und könnte das Auge einer solchen Verstellung sich nicht accommodiren, so würden die von den einzelnen Sternen ausgehenden Strahlen sich auf der Netzhaut nicht mehr in Puncten vereinigen, sondern daselbst Scheiben bilden, die sich aber gleichfalls vollkommen decken müssten, so dass eine Verschiebung der Objectivhälften, um eine Deckung der Bilder hervorzubringen, nicht nöthig sein würde. Die Sache macht sich anders, wenn auf die Unvollkommenheiten der Gläser Rücksicht genommen wird; allein der Einfluss dieser Unvollkommenheiten auf die Messungen ist ein wesentlich anderer, als sie die *Struve'sche* oder *Wichmann'sche* Berechnung für den Einfluss der Verstellung des Oculars ergibt.

Dass die Summe der Quadrate der übrig bleibenden Fehler, unter der Annahme der Richtigkeit des *Bessel'schen* Thermometer-Coefficienten und des Vorhandenseins einer

merklichen Differenz zwischen den Parallaxen der Vergleichsterne, für Herr Dr. *Wichmann's* Beobachtungen etwas kleiner ausfällt, als wenn die Beobachtungen unter Anwendung seiner vorhin erwähnten ersten Hypothese berechnet werden, kann nichts für die Gültigkeit der gefundenen Parallaxen-Differenz beweisen; weil die Annahme der Richtigkeit des *Bessel'schen* Thermometer-Coefficienten, wie vorhin auseinander gesetzt worden, nicht gestattet ist, und weil, wenn diese Annahme richtig wäre, Fehler in den reducirten Messungen übrig bleiben, die in Hinsicht ihrer Grösse von gleicher Ordnung mit der von Herrn Dr. *Wichmann* gefundenen Parallaxen-Differenz sind, und sich mit der Jahreszeit ändern.

Daraus, dass die mit dem Heliometer ausgeführten Distanzmessungen, zum Wenigsten wenn bei der Reduction der *Bessel'sche* Thermometer-Coefficient angewandt wird, mit periodischen Fehlern behaftet sind, folgt jedoch keineswegs, wie Herr Dr. *Wichmann* für solchen Fall behauptet, dass das Heliometer zu Untersuchungen über die Parallaxen ganz unbrauchbar sein müsse. Meiner Ueberzeugung nach verdient im Gegentheile die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns relativ zur Parallaxe der Vergleichsterne,

nämlich $0''135$, mit dem wahrsch. Fehler $0''013$, welche Herr Dr. *Wichmann* aus den Unterschieden der Distanzen Ab und Ac bei *Schlüter's* Beobachtungen, und aus den Unterschieden zwischen Ab und $\frac{Ac + Aa}{2}$ seiner eigenen Beobachtungen abgeleitet hat, grosses Vertrauen. Denn da die Distanzen Ab , Ac , $\frac{Ac + Aa}{2}$ nahezu von gleicher Grösse

sind, so müssen die constanten Fehler der Messungen jedes Beobachtungstages, aus ihren Unterschieden zum grössten Theil herausgehen, gleichviel ob die optische Unvollkommenheit des Instruments, die ungleiche Erwärmung der Luft im Innern des Fernrohrs, wie Herr *Faye* annimmt, die Differenz zwischen der Temperatur im Innern des Fernrohrs und ausserhalb desselben, die Ungenauigkeit des bei der Reduction der Beobachtungen gebrauchten Thermometer-Coefficienten, oder ein Zusammenwirken mehrerer dieser Ursachen, jene Fehler erzeugt haben. Obgleich jedoch die Parallaxe, welche Herr Dr. *Wichmann* aus den Differenzen der Distanzen gefunden hat, sehr nahe richtig sein wird, so schien mir die Wichtigkeit des Gegenstandes es doch zu erfordern, sie auch noch auf solche Weise aus *Schlüter's* und *Wichmann's* Beobachtungen abzuleiten, dass die Unsicherheit in der Bestimmung des Thermometer-Coefficienten und überhaupt jeder Fehler, welcher der gemessenen Entfernung proportional gewirkt haben kann, vollständig eliminirt würde. Ich habe daher die Parallaxe aus den genannten Beobachtungen auf ähnliche Weise

abgeleitet, wie bei einer andern Gelegenheit, die Parallaxe von 61 Cygni aus *Bessel's* und *Schlüter's* Messungen. Jede einzelne Bedingungsgleichung welche, bei *Schlüter's* Messungen, die Distanz *Ab* ergibt, multiplicirte ich mit dem Verhältniss $\frac{Ac}{Ab}$ beider Distanzen und subtrahirte von dem Producte

die zu demselben Beobachtungstage gehörende Bedingungsgleichung der Distanz *Ac*. Bei *Wichmann's* Beobachtungen multiplicirte ich jede Bedingungsgleichung für die halbe Summe der Distanzen *Ac* und *Aa* mit $\frac{2Ab}{Ac+Aa}$ und subtrahirte das Product von der Bedingungsgleichung der Distanz *Ab*. Auf solche Art erhielt ich eine Reihe von Bedingungsgleichungen, die von dem Einflusse der Wärme auf die Messungen frei sind.

Wenden wir uns zunächst zu *Schlüter's* Beobachtungen. Herr Dr. *Wichmann* befreite jede einzelne der beobachteten Distanzen *Ab* und *Ac* von Refraction, corrigirte sie wegen Aberration, reducirte sie mittelst eines schon sehr nahe richtigen Werthes für die Eigenbewegung auf 1843,25 und subtrahirte sie dann von einem gleichfalls nahe richtigen Werth der mittlern Distanz für die genannte Epoche. Die auf solche Weise erhaltenen Differenzen nennt er für den Stern *b*, Δ , für den Stern *c*, Δ' . Nennen wir jetzt die Verbesserungen, welche an die von Herrn Dr. *Wichmann* für 1843,25 angenommenen Werthe der Abstände *Ab* und *Ac* noch anzubringen sind, x und x' ; die Correctionen der von ihm angenommenen jährlichen Veränderungen derselben Distanzen y und y' ; die jährliche Parallaxe des Sterns *A*, $= p$, und die Correctionen welche, der Parallaxe wegen, die berechneten Distanzen *Ab* und *Ac* noch erfordern, resp. $k p$ und $k' p$, so führen die zur Zeit 1843,25 + t angestellten Messungen der Distanzen *Ab* und *Ac* zu den Bedingungsgleichungen:

$$0 = \Delta + x + t y + k p \dots\dots\dots(1)$$

$$0 = \Delta' + x' + t y' + k' p \dots\dots\dots(2)$$

Im Mittel ist, für die *Schlüter's*chen Beobachtungen, $Ab = 1589''$, $Ac = 1659''$. Ich multiplicirte daher Gl. (1) mit $\frac{1659}{1589} = 1,044$ und subtrahirte von dem Producte die dazugehörige Gl. (2); dadurch erhielt ich statt der Gleichungen (1) und (2) folgende Bedingungsgleichung:

$$0 = 1,044 \cdot \Delta - \Delta' + 1,044 \cdot x - x' + t(1,044 \cdot y - y') + (1,044 \cdot k - k') p \dots\dots\dots(3)$$

oder, wenn man, um abzukürzen,

$$1,044 \cdot \Delta - \Delta' = D,$$

$$1,044 \cdot x - x' = \xi,$$

$$1,044 \cdot y - y' = \eta$$

und $1,044 \cdot k - k' = \kappa$ setzt,

$$0 = D + \xi + t \eta + \kappa p.$$

Indem ich die Werthe von Δ , Δ' , k , k' und t so annahm, wie Herr Dr. *Wichmann* sie in seiner Abhandlung (*Astron. Nachr.* Bd. 36, Seite 27, 28, 39 und 40) gegeben hat, erhielt ich folgende Bedingungsgleichungen:

				t	κ	D.	Uebrig bleibende Fehler.
1	1842	Oct.	13	$0 = \xi - 0,47 \eta + 0,57 p - 0,74$			$-0,65$
2			22	$0 = \xi - 0,44 \eta + 0,82 p - 0,30$			$-0,17$
3		Nov.	15	$0 = \xi - 0,37 \eta + 1,38 p - 0,21$			$+0,01$
4		Dec.	21	$0 = \xi - 0,27 \eta + 1,74 p - 0,18$			$+0,10$
5			27	$0 = \xi - 0,26 \eta + 1,74 p - 0,15$			$+0,13$
6	1843	Janr.	2	$0 = \xi - 0,24 \eta + 1,71 p - 0,40$			$-0,13$
7			3	$0 = \xi - 0,24 \eta + 1,70 p - 0,18$			$+0,09$
8			13	$0 = \xi - 0,21 \eta + 1,62 p - 0,23$			$+0,03$
9		Febr.	3	$0 = \xi - 0,16 \eta + 1,27 p - 0,35$			$-0,15$
10			15	$0 = \xi - 0,12 \eta + 1,00 p - 0,20$			$-0,04$
11		März	3	$0 = \xi - 0,08 \eta + 0,56 p + 0,01$			$+0,09$
12			8	$0 = \xi - 0,07 \eta + 0,42 p + 0,15$			$+0,21$
13			9	$0 = \xi - 0,06 \eta + 0,39 p - 0,05$			$0,00$
14			22	$0 = \xi - 0,03 \eta + 0,00 p + 0,27$			$+0,26$
15			23	$0 = \xi - 0,02 \eta - 0,03 p + 0,02$			$+0,01$
16			24	$0 = \xi - 0,02 \eta - 0,06 p - 0,02$			$-0,04$
17			26	$0 = \xi - 0,02 \eta - 0,13 p + 0,24$			$+0,21$
18			28	$0 = \xi - 0,01 \eta - 0,19 p + 0,29$			$+0,25$
19		April	19	$0 = \xi + 0,05 \eta - 0,83 p - 0,05$			$-0,20$
20			24	$0 = \xi + 0,06 \eta - 0,96 p + 0,12$			$-0,05$
21			25	$0 = \xi + 0,07 \eta - 0,98 p - 0,29$			$-0,46$
22			28	$0 = \xi + 0,08 \eta - 1,06 p + 0,16$			$-0,02$
23			29	$0 = \xi + 0,08 \eta - 1,09 p + 0,31$			$+0,12$
24		Mai	1	$0 = \xi + 0,08 \eta - 1,13 p + 0,42$			$+0,22$
25			4	$0 = \xi + 0,09 \eta - 1,20 p + 0,11$			$-0,10$
26			5	$0 = \xi + 0,09 \eta - 1,22 p + 0,29$			$+0,08$
27			12	$0 = \xi + 0,11 \eta - 1,37 p + 0,05$			$-0,19$
28			14	$0 = \xi + 0,12 \eta - 1,41 p - 0,01$			$-0,25$
29			15	$0 = \xi + 0,12 \eta - 1,43 p + 0,12$			$-0,13$
30			17	$0 = \xi + 0,13 \eta - 1,46 p + 0,20$			$-0,05$
31			18	$0 = \xi + 0,13 \eta - 1,48 p + 0,38$			$+0,12$
32			19	$0 = \xi + 0,13 \eta - 1,50 p + 0,24$			$-0,02$
33			20	$0 = \xi + 0,14 \eta - 1,51 p + 0,21$			$-0,05$
34			21	$0 = \xi + 0,14 \eta - 1,53 p + 0,27$			$+0,01$
35			22	$0 = \xi + 0,14 \eta - 1,55 p + 0,38$			$+0,11$
36		Juni	3	$0 = \xi + 0,17 \eta - 1,70 p + 0,25$			$-0,04$
37			11	$0 = \xi + 0,20 \eta - 1,76 p + 0,19$			$-0,11$
38			17	$0 = \xi + 0,21 \eta - 1,79 p + 0,37$			$+0,06$
39		Aug.	11	$0 = \xi + 0,36 \eta - 1,22 p + 0,34$			$+0,13$
40			14	$0 = \xi + 0,37 \eta - 1,15 p + 0,74$			$+0,54$
41			26	$0 = \xi + 0,40 \eta - 0,85 p + 0,23$			$+0,08$

Nennt man den Coefficienten von ξ in diesen Gleichungen, der überall = 1 ist, a , so findet man, nach der *Gauss's*chen Bezeichnung:

$$\begin{aligned} (aa) &= 41,0000 & (tt) &= 1,6446 & (xx) &= 62,0263 \\ (at) &= + 0,3800 & (tx) &= -8,2154 & (xD) &= -10,4755 \\ (ax) &= -15,6700 & (tD) &= 1,8722 & (DD) &= 3,3522 \\ (aD) &= + 3,0000. \end{aligned}$$

Da *Schlüter's* Beobachtungen kein ganzes Jahr umfassen, so kann aus denselben η neben p nicht mit Sicherheit abgeleitet werden. Lässt man daher η einstweilen unbestimmt, so folgt aus obigen Producten-Summen:

$$\xi = -0''0095 + 0,0458 \cdot \eta, \text{ Gew. } 37,04;$$

$$p = +0,1665 + 0,1440 \cdot \eta, \text{ Gew. } 56,04 \dots\dots\dots(4)$$

Summe der Quadrate der übrig bleibenden Fehler

$$= 1,5796 + 1,0018 \cdot \eta + 0,4788 \cdot \eta^2 \dots\dots\dots(5)$$

Den Werth von η erhält man mit grosser Sicherheit aus der Vergleichung der *Schlüter'schen* Beobachtungen mit den 8 Jahr später angestellten *Wichmann'schen*. Behalten wir die frühern Bezeichnungen bei und nennen wir ausserdem die Correction, welche an Herrn Dr. *Wichmann's* für 1851,50 be-

$$0 = +0''0849 - 0,0230 (1,044 \cdot \gamma - \gamma') + (1,044 \cdot X - X') - 0,2704 \cdot p \dots\dots\dots(9)$$

oder, wenn für X und X' ihre Werthe aus (6) und, wie früher, η für $1,044 \cdot \gamma - \gamma'$, ξ für $1,044 \cdot x - x'$ substituirt werden,

$$0 = +0''0849 + 8,2270 \cdot \eta + \xi - 0,2704 \cdot p \dots\dots\dots(10)$$

Setzt man hierin für ξ den Werth, der aus der Auflösung der Bedingungsgleichungen der *Schlüter'schen* Beobachtungen hervorging, so kommt

$$0 = +0''0754 + 8,2728 \cdot \eta - 0,2704 \cdot p,$$

woraus folgt

$$\eta = -0''0091 + 0,0327 \cdot p \dots\dots\dots(11)$$

Der wahrscheinliche Fehler einer aus *Wichmann's* Beobachtungen abgeleiteten Grösse $1,044 \cdot \Delta - \Delta'$ ist $= 0''16$; daraus folgt, unter Berücksichtigung des wahrscheinlichen Fehlers des Werthes von ξ , der in (10) substituirt wurde, der wahrscheinliche Fehler von η (Gl. (11), wenn von dem wahrsch. Fehler von p einstweilen abstrahirt wird, $= 0''0040$. Der wahrscheinlichste Werth von p , der aus *Schlüter's* und *Wichmann's* Beobachtungen hervorgeht, ist, wie man sogleich ersehen wird, $= 0''141$, mit dem wahrsch. Fehler $0''013$. Dieses in (11) substituirt, giebt

$$\eta = -0''0045, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0''0040 \dots\dots\dots(12)$$

Wird dieser Werth von η in (5) substituirt, so wird die Summe der Quadrate der übrig bleibenden Fehler $= 1,5751$. Daraus folgt der wahrscheinliche Fehler einer Bedingungsgleichung $= 0''136$, und der wahrsch. Fehler von p Gl. (4), wenn man den Fehler von η einstweilen unberücksichtigt lässt, $= 0''0182$. Substituirt man nun in Gl. (4) für η seinen Werth aus (12), so erhält man, unter Berücksichtigung der wahrsch. Fehler der Gl. (4) und (12),

$$p = +0''1659, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0''0182.$$

Die Fehler welche übrig bleiben, wenn in die Bedingungsgleichungen die gefundenen wahrscheinlichsten Werthe von ξ , η und p substituirt werden, sind, neben den Bedingungs-

rechnete mittlere Werthe der Distanzen Ab und Ac anzubringen sind, X und X' , so dass also

$$\begin{aligned} X &= x + (1851,50 - 1843,25) \gamma \} \\ X' &= x' + (1851,50 - 1843,25) \gamma' \} \dots\dots\dots(6) \end{aligned}$$

so giebt das arithmetische Mittel aus allen Bedingungsgleichungen der *Wichmann'schen* Distanzen Ab

$$0 = -0''0628 - 0,0230 \cdot \gamma + X - 0,1325 \cdot p \dots\dots\dots(7)$$

Das arithmetische Mittel aus den Bedingungsgleichungen der von Herrn Dr. *Wichmann* gemessenen Distanzen $Ac^*)$ giebt

$$0 = -0''1505 - 0,0230 \cdot \gamma' + X' - 0,1321 \cdot p \dots\dots\dots(8)$$

Um den Einfluss der Temperatur auf die Messungen zu eliminiren, multiplicirte ich die Gleichung (7) mit 1,044 und subtrahirte vom Producte die Gl. (8). Auf solche Art erhält man:

gleichungen, in der Columnne „Uebrig bleibende Fehler“ zusammengestellt.

Gehen wir jetzt zu den *Wichmann'schen* Beobachtungen über. Herr Dr. *Wichmann* corrigirt die beobachteten Ab und $\frac{Ac + Aa}{2}$ wegen Refraction und Aberration, und subtrahirt sie

darauf von berechneten Werthen, die auf sehr nahe richtigen mittlern Distanzen für die Epoche 1851,50 und ihren jährlichen Veränderungen beruhen. Die auf solche Art für Ab und $\frac{Ac + Aa}{2}$ erhaltenen Differenzen bezeichnet er mit Δ und Δ'' .

Nennen wir nun die Correction, welche an den von *Wichmann* für 1851,5 angenommenen Werth von $\frac{Ac + Aa}{2}$ anzubringen ist, x'' , die Correction des für die jährliche Veränderung von $\frac{Ac + Aa}{2}$ angenommenen Werthes γ'' , die von 1851,50 bis zu dem Zeitpunkte einer Beobachtung verflossene Zeit t' , so giebt die Beobachtung der Grössen Ab , Ac und Aa folgende Bedingungsgleichungen:

$$0 = \Delta + X + t' \gamma + k p \dots\dots\dots(13)$$

$$0 = \Delta'' + x'' + t' \gamma'' + k'' p \dots\dots\dots(14)$$

Für *Wichmann's* Beobachtungen ist im Mittel $Ab = 1616''$, $\frac{Ac + Aa}{2} = 1511''$; ich habe daher jede Gleichung (14) mit $\frac{1616}{1511} = 1,070$ multiplicirt und das Product von der für denselben Beobachtungstag geltenden Gl. (13) subtrahirt. Setzt man also

$$\Delta - 1,07 \cdot \Delta'' = D'; \quad X - 1,07 \cdot x'' = \xi';$$

$$\gamma - 1,07 \cdot \gamma'' = \eta'; \quad k - 1,07 \cdot k'' = \kappa';$$

*) Die Werthe von Δ' für diese Distanzen Ac sind nicht unmittelbar von Herrn Dr. *Wichmann* gegeben; man erhält sie aber aus den von ihm gegebenen Werthen von Δ u. $\Delta - \Delta'$.

so erhält man auf solche Weise eine Reihe Bedingungsgleichungen von der Form

$$0 = D' + \xi' + t' \eta' + \kappa' p \dots \dots \dots (15)$$

Die Werthe von Δ , Δ'' , t' , k und k'' habe ich so angenommen, wie Herr Dr. *Wichmann* sie in seiner öfter erwähnten Abhandlung gegeben hat. Zur Entwicklung der Bedingungsgleichungen (15) konnte ich von den *Wichmann'schen* Beobachtungen nur diejenigen benutzen, welche in beiden Lagen der bewegten Objectivhälfte angestellt sind. Diese gaben mir folgende Gleichungen:

				Uebrig bleibende			
				t'	κ'	D'	Fehler.
1	1850	Dec.	20	0 = ξ'	-0,53 η'	+1,80 p	-0,43 -0,31
2	1851	Janr.	4	0 = ξ'	-0,49 η'	+1,74 p	-0,11 0,00
3			8	0 = ξ'	-0,48 η'	+1,70 p	-0,07 +0,04
4			10	0 = ξ'	-0,47 η'	+1,68 p	-0,07 +0,04
5			15	0 = ξ'	-0,46 η'	+1,62 p	-0,17 -0,07
6		Febr.	10	0 = ξ'	-0,39 η'	+1,11 p	-0,14 -0,10
7		März	9	0 = ξ'	-0,31 η'	+0,34 p	+0,28 +0,25
8			10	0 = ξ'	-0,31 η'	+0,31 p	-0,12 -0,15
9			11	0 = ξ'	-0,31 η'	+0,28 p	+0,07 +0,03
10		April	9	0 = ξ'	-0,23 η'	-0,62 p	+0,06 -0,07
11			10	0 = ξ'	-0,23 η'	-0,65 p	+0,16 +0,03
12			14	0 = ξ'	-0,22 η'	-0,77 p	+0,80 +0,65
13			15	0 = ξ'	-0,21 η'	-0,79 p	+0,28 +0,13
14			17	0 = ξ'	-0,21 η'	-0,85 p	+0,12 -0,04
15		Mai	16	0 = ξ'	-0,13 η'	-1,53 p	+0,21 -0,02
16			18	0 = ξ'	-0,12 η'	-1,56 p	+0,55 +0,32
17			20	0 = ξ'	-0,12 η'	-1,60 p	+0,05 -0,18
18			29	0 = ξ'	-0,09 η'	-1,72 p	+0,60 +0,36
19		Juni	3	0 = ξ'	-0,08 η'	-1,77 p	+0,20 -0,05
20			22	0 = ξ'	-0,03 η'	-1,86 p	+0,21 -0,04
21			30	0 = ξ'	-0,00 η'	-1,83 p	+0,11 -0,14
22		Juli	1	0 = ξ'	-0,00 η'	-1,83 p	+0,45 +0,20
23			7	0 = ξ'	+0,02 η'	-1,79 p	-0,07 -0,31
24			10	0 = ξ'	+0,02 η'	-1,76 p	+0,37 +0,13
25			25	0 = ξ'	+0,06 η'	-1,56 p	+0,09 -0,12
26		Aug.	8	0 = ξ'	+0,10 η'	-1,28 p	+0,14 -0,03
27			10	0 = ξ'	+0,11 η'	-1,23 p	+0,01 -0,16
28			11	0 = ξ'	+0,11 η'	-1,21 p	+0,18 +0,02
29			13	0 = ξ'	+0,12 η'	-1,17 p	-0,08 -0,24
30			19	0 = ξ'	+0,13 η'	-1,02 p	-0,03 -0,17
31			23	0 = ξ'	+0,14 η'	-0,91 p	-0,27 -0,40
32			26	0 = ξ'	+0,15 η'	-0,83 p	+0,25 +0,13
33		Sept.	16	0 = ξ'	+0,21 η'	-0,20 p	+0,38 +0,34
34			22	0 = ξ'	+0,23 η'	-0,00 p	+0,17 +0,15
35			28	0 = ξ'	+0,24 η'	+0,19 p	-0,08 -0,07
36			29	0 = ξ'	+0,24 η'	+0,20 p	-0,32 -0,31
37		Octb.	2	0 = ξ'	+0,25 η'	+0,31 p	+0,18 +0,20
38			3	0 = ξ'	+0,26 η'	+0,33 p	-0,17 -0,15
39			16	0 = ξ'	+0,29 η'	+0,73 p	-0,10 -0,03
40			22	0 = ξ'	+0,31 η'	+0,90 p	-0,66 -0,57
41		Dec.	12	0 = ξ'	+0,45 η'	+1,78 p	-0,06 +0,15
42			22	0 = ξ'	+0,47 η'	+1,80 p	+0,03 +0,24
43	1852	Janr.	6	0 = ξ'	+0,52 η'	+1,72 p	+0,05 +0,26

Nennt man den Coefficienten von ξ' , der hier überall = 1 ist, a' , so erhält man, wenn allen Beobachtungen dasselbe Gewicht beigelegt wird,

$$\begin{aligned} (a'a') &= 43,0000 & (t't') &= 3,2561 & (\kappa'\kappa') &= 70,7640 \\ (a't') &= -0,9900 & (t'\kappa') &= -0,9813 & (\kappa'D') &= -8,3988 \\ (a'\kappa') &= -11,8000 & (t'D') &= -0,2407 & (D'D') &= 3,2635 \\ (a'D') &= +3,0500. \end{aligned}$$

Der dritte von Herrn Dr. *Wichmann* verglichene Stern a ist von *Schlüter* nicht beobachtet; es lässt sich daher die jährliche Veränderung von $Ab - 1,07 \cdot \frac{Ac + Aa}{2}$, oder die

Grösse η' aus der Vergleichung mit *Schlüter's* Beobachtungen nicht bestimmen; man erhält sie aber mit Sicherheit aus den *Wichmann'schen* Beobachtungen allein, da diese einen Zeitraum von mehr als einem Jahre umfassen. Bestimmt man also aus obigen Bedingungsgleichungen, neben ξ' und p , auch noch η' , so erhält man:

$$\begin{aligned} \text{wahrscheinlicher Fehler einer Bedingungsgleichung} &= 0,157; \\ \xi' &= -0,0375 \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0,0246; \\ \eta' &= +0,0968 \text{ „ „ „ „ } 0,0877; \\ p &= +0,1138 \text{ „ „ „ „ } 0,0192. \end{aligned}$$

Aus *Schlüter's* Beobachtungen folgte:

$$p = +0,1659, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0,0182;$$

der Unterschied zwischen beiden Werthen von p ist nur doppelt so gross, als der wahrscheinliche Fehler des Unterschiedes, hat also nichts Auffallendes. Nimmt man aus beiden Werthen von p ein Mittel mit Rücksicht auf die wahrscheinlichen Fehler, so erhält man:

$$p = +0,141, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0,013.$$

Dieser Werth weicht von demjenigen ($0,135 \pm 0,013$) welchen Herr Dr. *Wichmann* aus den Differenzen $Ac - Ab$ und $Ab - \frac{Ac + Aa}{2}$ abgeleitet hat, nur wenig ab; welches mit der vorhin gemachten Bemerkung, dass auf den letztern Werth die Unsicherheit in dem benutzten Thermometer-Coefficienten und andere Fehlerursachen, welche den Distanzen proportional wirken, nur einen geringen Einfluss könnten gehabt haben, übereinstimmt.

Der so eben für die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns gefundene Werth ist, wie schon bemerkt worden, nur der Ueberschuss der Parallaxe jenes Sterns über die durchschnittliche Parallaxe der Vergleichsterne. Es ist sehr wahrscheinlich, dass letztere nur geringe ist. Für Sterne, von denen man ihres hellen Glanzes wegen vermuthen kann, dass sie zu den nächsten gehören, sind nur geringe Werthe für die Parallaxen gefunden worden: z. B. für α Lyrae $0,26$ nach *Struve's*, $0,10$ nach meinen Beobachtungen, für Sirius $0,23$ nach *Henderson* und *Maclear*. Für 61 Cygni, von dem wegen seiner

starken Eigenbewegung gleichfalls anzunehmen ist, dass er zu den nähern gehört, ist die jährliche Parallaxe nach *Bessel's* Beobachtungen $0''36$. Selbst für α Centauri, einen Stern, der sich sowohl durch seinen hellen Glanz, als durch eine starke Eigenbewegung auszeichnet, ist nur eine jährliche Parallaxe von etwa einer Secunde gefunden worden. Für die Parallaxen der Vergleichsterne des *Argelander'schen* Sterns, die sehr klein sind (von der 8^{ten} bis 10^{ten} Grösse) und keine merkliche Eigenbewegung haben, sind daher wohl nur sehr kleine Werthe zu vermuthen. Es wäre allerdings möglich, dass die Eigenbewegung eines oder mehrerer der verglichenen Sterne uns nur deshalb klein erscheint, weil die Richtung der Bewegung mit der geraden Linie von uns zum Sterne nahe zusammenfällt; allein auch dafür ist die Wahrscheinlichkeit nur geringe.

Nach meinen frühern Untersuchungen über den durchschnittlichen Werth der Parallaxen der Sterne von verschiedenen Helligkeiten, ist im Mittel die Parallaxe eines Sterns 8.5 Grösse (a), $= 0''008$, eines Sterns 9. Grösse (c), $= 0''007$ und eines Sterns 10. Grösse (b), $= 0''005$; so dass hiernach die vorhin gefundene relative Parallaxe um etwa $0''007$ zu vergrössern sein würde, um die absolute Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns zu erhalten. Letztere würde demnach $= 0''148$ anzunehmen sein.

Herr Staatsrath v. *Struve* hat in der Einleitung zu dem kürzlich von ihm herausgegebenen Catalog: *Stellarum duplicium positiones mediae*, Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der in meinen *Recherches sur la parallaxe des étoiles fixes* gegebenen mittlern Werthe für die Parallaxen der Sterne verschiedener Helligkeiten erhoben. Ich halte es daher für passend, hier eine kurze Uebersicht des Verfahrens zu geben, welches ich zur Ermittlung jener Parallaxen angewandt habe. Im Wesentlichen bestand es darin, dass ich aus den bis dahin beobachteten Parallaxen von Sternen verschiedener Helligkeiten, in Verbindung mit den von *Struve* gegebenen Entfernungen derselben, den mittlern Werth der Parallaxe eines Sterns 2. Grösse berechnete, und daraus ferner, mit Hülfe der *Struve'schen* Entfernungen, auch die mittlern Parallaxen der Sterne anderer Grössenklassen. Die Sicherheit dieser mittlern Parallaxen hängt also zunächst von der Zuverlässigkeit der benutzten Entfernungen und Parallaxen ab. Ein Urtheil über die Zuverlässigkeit der erstern, wird man sich aus der Darstellung des zu ihrer Berechnung angewandten Verfahrens bilden können.

Einen Versuch zur Bestimmung der relativen Entfernungen der Fixsterne findet man bereits in der Einleitung zu *Struve's Catalogus novus stellarum duplicium* von 1827 pag. XXXIV und XXXV. *Struve* hatte die Anzahl der Sterne 1ster, 2ter, 3ter etc. bis 7ter Grösse, durch Abzählen auf *Harding's* Karten

ausgemittelt. Es ging daraus hervor, dass für die Grössen 1 bis 5, die Zahl der Sterne einer folgenden Grösse nahezu dreimal so gross war, als die der vorhergehenden. Von diesem Gesetze weichen jedoch die Zahlen der 6. und 7. Grösse ziemlich stark ab, was er einer Unvollkommenheit der Karten zuschrieb. Er nahm also an, dass das erwähnte einfache Gesetz bis zu den Sternen 7. Grösse gelte. Indem er nun die Hypothese aufstellte, dass die Sterne im Weltraume so gleichförmig als möglich vertheilt seien und dass alle dieselbe absolute Helligkeit haben, fand er durch eine sehr einfache Rechnung die Entfernungen für die verschiedenen Grössenklassen. Dieses sind dieselben Entfernungen, welche Herr *Otto Struve* bei der Berechnung der Präcessions-Constante benutzt hat. Später, in der Einleitung zum *Weisse'schen* Catalog und in den *Etudes d'Astronomie stellaire* hat *Struve* Distanzen gegeben, denen genauere Data zum Grunde liegen. Bei dieser neuern Untersuchung konnte er die Zahlen der Sterne bis zur 6. Grösse herab, für die nördliche Halbkugel und einen Theil der südlichen Halbkugel, mit der grössten Sicherheit, aus der Uranometrie des Herrn *Argelander* entnehmen. Für die schwächeren Sterne, bis zur 9. Grösse, benutzte er den Theil der *Bessel'schen* Zonenbeobachtungen, der von Herrn *Weisse* in einen Catalog gebracht ist. *Bessel* hat zwar nicht alle Sterne, welche die von ihm durchmusterten Zonen enthalten beobachtet, allein die Zahl der fehlenden liess sich, mit Hülfe der Wahrscheinlichkeits-Rechnung für die 6. bis 8. Grösse ziemlich sicher aus der Vergleichung mit dem *Piazz'schen* Cataloge, und für die 9. Grösse aus der Vergleichung der von *Bessel* zwei oder mehrmal beobachteten Theile des Himmels ergänzen. Aus den Zahlen, welche er auf solche Weise für die Zone von -15 bis $+15$ Decl. ermittelt hatte, fand er, indem er annahm, dass nach allen Richtungen hin, die Zahlen der Sterne der auf einander folgenden Grössenklassen in gleichem Verhältnisse wachsen, und dass alle Sterne dieselbe absolute Helligkeit haben, folgende Werthe für die Halbmesser der Kugeln, deren Oberflächen die Sterne einer Ordnung von denen der folgenden trennen:

5 A *)	6 A.	6 B.	7 B.	8 B.	9 B.
0,7078	1,0000	0,9314	1,5672	2,4251	3,7201

Aus den Sternen die in der genannten Zone nur in den Gegenden der Milchstrasse sich befinden, erhielt er:

5 A.	6 A.	6 B.	7 B.	8 B.	9 B.
0,7126	1,0000	0,9599	1,6113	2,5560	3,9350

*) Die Buchstaben *A.* und *B.* bezeichnen hier die Grössenbestimmung nach *Argelander* und *Bessel*.

Diese Entfernungen sind übrigens, wie Herr Staatsrath *Struve* auch bemerkt, schon deshalb noch fehlerhaft, weil die Annahme einer dem Raume proportionalen Vertheilung der Sterne nicht richtig ist. Die Ungleichheiten in der Vertheilung mit aller Strenge zu berücksichtigen würde unmöglich sein; allein auf die wesentlichste Abweichung von der Gleichförmigkeit, die in der Verdichtung nach der Milchstrasse hin besteht, wurde bei einer neuen Berechnung der Entfernungen Rücksicht genommen. Ich stellte für die durchschnittliche Dichtigkeit der Sterne, in jeder beliebigen mit der Milchstrasse parallelen sehr schmalen Zone, eine Formel auf, welche den Winkelabstand der Zone von der Mitte der Milchstrasse als veränderliche Grösse enthielt, und deren Constanten Herr Staatsrath *Struve* aus den Dichtigkeiten der Sterne von der 1. bis zur 8. Grösse berechnete, welche für verschiedene Abstände von der Milchstrasse die *Besselschen* Zonen ergaben. Aus dieser Formel leitete ich eine zweite ab, welche die durchschnittliche Dichtigkeit einer mit der mittlern Ebene der Milchstrasse parallelen Ebene, für jeden gegebenen Abstand der letztern von der erstern ausdrückt. Mit Hülfe der letztern Formel berechnete *Struve* die Entfernungen der Sterne 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Grösse aus den Zahlen welche, nach *Argelander's* Uranometrie, von jeder Klasse an der nördlichen Hemisphäre vorkommen. Die Entfernungen der Sterne 7, 8, und 9. Grösse, bestimmte er aus der Anzahl derselben, welche die Zone von -15° bis $+15^{\circ}$ Decl. enthält. Diese Distanzen sind von mir bei meinen Parallaxen-Rechnungen gebraucht worden. Für die äussersten Sterne von der 5. bis zur 9. Grösse sind ihre Werthe:

5 A.	6 A.	7 B.	8 B.	9 B.
0,6998	1,0000	1,6271	2,8001	4,2531

Die bei der Berechnung dieser Distanzen gemachte Voraussetzung, dass alle Fixsterne dieselbe absolute Helligkeit haben, ist ohne Zweifel unrichtig, wie schon aus der verschiedenen Helligkeit zusammengehörender Doppelsterne hervorgeht. Im Allgemeinen werden indess die Sterne um so weiter von uns entfernt sein, je schwächer ihr Glanz ist; denn offenbar müsste jeder Stern, seine absolute Helligkeit mag nun sein welche sie wolle, uns schwächer erscheinen, wenn er in eine grössere Entfernung versetzt würde. Es ist bei einer andern Gelegenheit von mir bewiesen worden, dass die *Struve'schen* Distanzen, als Mittelwerthe für die Entfernungen der Sterne verschiedener Grössenklassen, ihre Gültigkeit behalten, wenn man die Hypothese aufstellt, dass unter den absoluten Helligkeiten alle möglichen Abstufungen von 0 bis zu irgend einem grössten Werthe vorkommen und jede dieser Helligkeiten gleich wahrscheinlich ist.

Die Distanzen, welche mit Rücksicht auf die Zunahme der Dichtigkeit der Sterne nach der Milchstrasse hin berechnet sind, weichen von denen welche *Struve* unter der Annahme einer gleichförmigen Vertheilung gefunden hatte, nicht um den 10^{ten} Theil der gefundenen Distanzen ab; man kann daher wohl annehmen, dass die Unregelmässigkeiten in der Vertheilung der Sterne und die Bifurcation der Milchstrasse, die bei den erstern noch unberücksichtigt geblieben sind, keinen erheblichen Einfluss darauf werden gehabt haben.

Eine Bestätigung der Gültigkeit dieser Distanzen findet *Struve* noch in der Vergleichung der Eigenbewegungen der Sterne verschiedener Grössenklassen. In der Einleitung zu dem Catalog: *Stellarum fixarum positiones mediae* vergleicht er nämlich die durchschnittlichen Eigenbewegungen von 180 Sternen, deren Grösse im Mittel 3,15 ist; von 206 Sternen, die im Mittel von der 5,66 Grösse sind und von 1276 teleskopischen Sternen von der 7,34ten durchschnittlichen Grösse, mit den ihnen entsprechenden Entfernungen, und findet für die drei Gruppen die Eigenbewegungen den Distanzen so nahe proportional, dass die Abweichungen allein aus den wahrscheinlichen Fehlern der mittlern Eigenbewegungen erklärt werden können. Wenn nun gleich Herr Professor *Müller* eine weniger gute Uebereinstimmung mit den Eigenbewegungen der Sterne 1, 2, etc. bis 5ter Grösse gefunden hat, so glaube ich doch, dass die von mir benutzten Distanzen Vertrauen verdienen und um weniger als den 10^{ten} Theil ihres Werthes fehlerhaft sein werden. Meine mittlern Parallaxen werden daher gleichfalls, in so fern sie auf diesen Distanzen beruhen, nicht erheblich unrichtig sein. Sehen wir jetzt, welches Vertrauen diese mittlern Parallaxen in Bezug auf die bei ihrer Berechnung benutzten beobachteten Parallaxen verdienen. Letztere sind: die Parallaxe von α Lyrae, welche *Struve* mit dem Dorpater Refractor bestimmt hat; die Parallaxen von α Centauri und Sirius nach den Beobachtungen von *Macleay*; die Parallaxe des Polaris nach der Berechnung von *Lindenau* und nach den Rectascensions- und Declinations-Beobachtungen in Dorpat; die Parallaxen von α Aurigae, ι Urs. maj., α Bootis, α Lyrae, α Cygni und des Polaris nach meinen Beobachtungen am Pulkowaer Verticalkreise und die Parallaxe von δ Urs. min. so wie die Relationen zwischen den Parallaxen von 16 Sternenpaaren, nach *Struve's* Beobachtungen am *Dollond'schen* Passageninstrument der Dorpater Sternwarte. Die Parallaxen von δ Cygni und des *Argelander'schen* Sterns musste ich bei dieser Untersuchung ausschliessen; denn diese Sterne sind deshalb, in der Absicht ihre Parallaxen zu bestimmen, beobachtet worden, weil ihre sehr starke Eigenbewegung es wahrscheinlich macht, dass sie uns näher sind, als andere Sterne von gleicher oder selbst von beträchtlich grösserer Helligkeit;

sie konnten also als ausgewählte, im Verhältniss zu ihrer Helligkeit ausnahmsweise nahe Sterne bei der Bestimmung der durchschnittlichen Entfernungen um so weniger benutzt werden, weil die Zahl der Sterne, deren Parallaxen ich als bekannt ansehen konnte, nur geringe ist.

Jede Parallaxe eines einzelnen Sterns, oder jede Bedingungsgleichung zwischen den Parallaxen zweier Sterne, deren Rectascensionsunterschied an einem Passageninstrument beobachtet ist, gab mir mit Hülfe der *Struve'schen* Distanzen einen Werth für die Parallaxe eines Sterns 2ter Grösse, $= p$. Ich wählte diese Grössenklasse, weil sie zwischen denen der Sterne, deren Parallaxen ich benutzte, nahezu in der Mitte liegt. Um die einzelnen Werthe, welche ich für p erhielt zu einem Mittelwerthe vereinigen und den wahrscheinlichen Fehler des Mittelwerthes angeben zu können, war es nöthig, das Gewicht jeder einzelnen Bestimmung zu ermitteln. Hiebei berücksichtigte ich zuvörderst die wahrscheinlichen Fehler der Parallaxen, welche die Abweichungen der Beobachtungen in jeder einzelnen Beobachtungsreihe ergeben hatten. Mehrere dieser Parallaxen sind indess wahrscheinlich noch mit kleinen Fehlern behaftet, die in den so eben erwähnten wahrscheinlichen Fehlern nicht mit einbegriffen sind und die aus kleinen unerkannt gebliebenen periodischen Veränderungen in den Instrumenten, aus kleinen unbekannten Gliedern der Refraction oder aus andern unbekannten Ursachen können hervorgegangen sein. Für die Beobachtungen am Dorpater Passageninstrumente machte ich in Folge eines Ueberschlages, der auf einer kleinen Abweichung der Aberrations-Constante, welche diese Beobachtungen ergeben hatten, von dem neuesten *Struve'schen* Werthe beruhte, die Annahme, dass der aus allen 16 Stern-Paaren und aus δ Urs. min. abgeleitete Mittelwerth von p , ausser dem wahrscheinlichen Fehler, der aus den einzelnen Werthen folgt, noch mit einem wahrsch. Fehler von $0^{\circ}044$ behaftet sei. Denselben Fehler nahm ich auch für die *Lindemann'sche* Bestimmung der Parallaxe des Polarsterns an, obgleich wegen der nahen Richtigkeit der Aberrations-Constante, welche die für jene Bestimmung benutzten Beobachtungen gegeben hatten, wohl anzunehmen sein dürfte, dass der Fehler etwas kleiner ist. In Bezug auf die Parallaxen, welche mir die Beobachtungen am Pulkowaer Verticalkreise gegeben hatten, so wie auf die Parallaxen, welche aus den am Cap und in Dorpat beobachteten Zenithdistanzen berechnet sind, nahm ich an, dass die periodischen Fehler für dieselben noch einen wahrsch. Fehler von $\frac{0^{\circ}04 \lg z}{\mu}$ hervorgebracht habe, wo z die Zenithdistanz des Sterns und μ den Coefficienten bezeichnet, mit welchem die jährliche Parallaxe zu multipliciren ist, um die grösste Parallaxe in Declination zu erhalten. Diese

Formel dürfte die Fehler wohl etwas zu gross für meine Beobachtungen, dagegen etwas zu klein für die übrigen geben. Es ist jedoch einleuchtend, dass wenn die vorhin genannten Fehler berücksichtigt sind, der wahrsch. Fehler des aus allen beobachteten Parallaxen abgeleiteten mittlern Werthes für die Parallaxe eines Sterns der zweiten Grösse noch zu klein gefunden wird; einmal weil die bei der Berechnung der Entfernungen der Sterne angenommenen Grössen derselben nicht strenge richtig sind, und dann auch, weil der Verschiedenheiten in den absoluten Helligkeiten der Sterne wegen, die Entfernung jedes einzelnen Sterns von der durchschnittlichen Entfernung aller Sterne, die zu derselben Grössenklasse gehören, mehr oder weniger abweichen wird. Es wurden daher bei der Berechnung des wahrscheinlichen Fehlers von p auch noch die letztgenannten beiden Fehlerquellen berücksichtigt. Bei der Schätzung des Einflusses der erstern, nahm ich an, dass der Fehler der angenommenen Grösse eines Sterns zwischen den Gränzen $-\frac{1}{4}$ und $+\frac{1}{4}$ liegt, und dass zwischen diesen Gränzen die Wahrscheinlichkeit für jeden Fehler derselbe sei. In Bezug auf die zweite Fehlerursache war ich genöthigt eine Hypothese aufzustellen, weil uns die Verschiedenheiten zwischen den absoluten Helligkeiten der Sterne, im Allgemeinen, unbekannt sind. Ich nahm an, dass alle Grade der absoluten Helligkeiten gleich möglich sind, von der Helligkeit 0 bis zu der grössten die überhaupt vorkommt. Diese Hypothese empfiehlt sich durch ihre Einfachheit, und nach derselben findet ohne Zweifel eine grössere Verschiedenheit unter den absoluten Helligkeiten der Sterne Statt, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist. Diese verschiedenen Annahmen haben übrigens ihren wesentlichsten Einfluss auf den wahrscheinlichen Fehler von p , auf p selbst ist ihr Einfluss verhältnissmässig nur geringe. Ohne Berücksichtigung der Fehler, die sich auf den Glanz, oder auf die kleinen constanten Fehler der beobachteten Parallaxen beziehen, findet man nämlich

$$p = +0^{\circ}107, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0^{\circ}006;$$

mit Berücksichtigung jener Fehler

$$p = +0^{\circ}116, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0^{\circ}014.$$

Obgleich ich in meiner Parallaxen-Abhandlung letztere Bestimmung nur für einen Versuch zur Kenntniss der mittlern Parallaxen der Sterne zweiter Grösse zu gelangen ausgegeben habe, so sprach ich meine Ansicht darüber doch dahin aus, dass ich sie der Wahrheit bereits sehr nahe kommend ansähe. Dieser Meinung stimmte Herr Staatsrath v. *Struve* früher bei, wie man aus den *Etudes d'Astronomie stellaire* ersehen kann. In der Einleitung zu dem neuen Catalog *Stellarum dupl. posit. med.* p. CXXXIII äussert er dagegen, „jener Werth gebe deshalb einem Verdachte Raum, weil die ganze

Grösse 0"116 so klein sei und der Gränze, welche die Kraft der Instrumente setze, so nahe komme, dass es zum Wenigsten sehr wünschenswerth erscheine, dass diese Grösse durch mehr Parallaxenbestimmungen einst noch bestätigt oder genauer bestimmt werde.“ Dass es für die Bestimmung der Grösse p von Wichtigkeit wäre, wenn die Parallaxen der Sterne erster, zweiter Grösse etc. beobachtet würden, unterliegt keinem Zweifel, und ist auch bereits in meiner Parallaxen-Abhandlung von mir ausgesprochen worden. Allein man kann eine Grösse, die nicht unmittelbar beobachtet, sondern durch Rechnung aus Beobachtungen abgeleitet ist, nicht deshalb unsicher nennen, weil sie klein ist. Wenn der Fehler der von mir gefundenen Parallaxe der Sterne zweiter Grösse etwas grösser sein sollte, als der wahrscheinliche Fehler andeutet, so würde dieses wohl hauptsächlich nur darin liegen können, dass ich für die Berücksichtigung der Verschiedenheiten in dem absoluten Glanz der Sterne eine Hypothese aufstellen musste und dass ich die *Struve'schen* Distanzen als fehlerfrei angenommen habe.

Wenden wir uns von dieser Abschweifung wieder zu der Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns. Es wurde bemerkt, dass die Parallaxen der Sterne, mit welchen jener Stern am hiesigen Heliometer verglichen ist, nach meinen öfter erwähnten Untersuchungen im Mittel 0"007 beträgt. Der wahrscheinliche Fehler dieses Werthes, insofern er von dem wahrscheinlichen Fehler meiner Parallaxe der Sterne zweiter Grösse abhängt, würde sehr geringe sein, wegen der Grösse der Zahl, womit jener Fehler dividirt wird. Allein dieser geringe Fehler (von 0"001) würde nur gelten können, wenn man 0"007 als den durchschnittlichen Werth der Parallaxen aller Sterne von der Grösse der verglichenen ansieht. Das Mittel aus den mittlern Parallaxen weniger Sterne hat einen grössern wahrscheinlichen Fehler, wegen der Verschiedenheiten zwischen den absoluten Helligkeiten der Fixsterne. Nach meiner Hypothese über diese Verschiedenheiten, ist der durch dieselben erzeugte wahrsch. Fehler der Parallaxe eines einzelnen Sterns, welche, für den Grad seiner Helligkeit, aus dem von mir gefundenen Werth von p berechnet wird, $= \frac{0"046}{r}$, wenn r die in mittlern Entfernungen der Sterne zweiter Grösse ausgedrückte Entfernung des Sterns bezeichnet. Da die Parallaxe des Sterns $= \frac{0"116}{r}$ ist, so verhält sich also der Fehler zu der Parallaxe, wie 0"046 zu 0"116, ist also im vorliegenden Falle

$$= 0"007 \cdot \frac{0,046}{0,116} = 0"003.$$

Dieser Fehler ist durch $\sqrt{3}$ zu dividiren, weil die Zahl der Vergleichsterne $= 3$ ist, und der Quotient alsdann auf be-

kannte Weise, mit dem aus dem wahrsch. Fehler von p hervorgehenden Fehler zu vereinigen. Wenn man noch annimmt, dass die *Struve'schen* Distanzen, welche bei der Ableitung der Parallaxe 0"007 benutzt sind, um den 10^{ten} Theil ihres Werthes fehlerhaft sein können, so erhält man 0"003 für den wahrscheinlichen Fehler der durchschnittlichen Parallaxe der Vergleichsterne. Durch die Hinzufügung der letztern Parallaxe zu der relativen Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns, wird der wahrsch. Fehler der letztern noch nicht um eine halbe Einheit der dritten Decimale vergrössert. Es ist hiernach die absolute Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns

$$= +0"148, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0"013.$$

Auf die Parallaxe von 61 Cygni, wie sie von *Bessel* aus seinen und *Schlüter's* Beobachtungen am hiesigen Heliometer berechnet ist, hat eine Unsicherheit in der Bestimmung der Aenderung der Messungen durch die Wärme einen viel geringern Einfluss, als auf die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns, wenn man diese letztere aus den Distanzen der Vergleichsterne selbst ableitet; dennoch halte ich dafür, dass auch für 61 Cygni, wegen der geringen Sicherheit mit welcher bisher jener Wärmeeinfluss ermittelt ist, derjenige Werth der Parallaxe den Vorzug verdient, den ich auf solche Art aus den Beobachtungen abgeleitet habe, dass die erwähnte Unsicherheit, so wie überhaupt jeder Fehler, welcher der Distanz proportional auf die Beobachtungen eingewirkt haben könnte, eliminirt ist. Demnach würde als die bis jetzt sicherste Bestimmung für die Parallaxe von 61 Cygni der Werth

$$0"360, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0"012$$

anzusehen sein. (S. Ueber *Bessel's* Bestimmung der Parallaxe von 61 Cygni, im Ergänzungsheft zu den Astronom. Nachrichten). Dieses ist die relative Parallaxe gegen die der Vergleichsterne. Da letztere Sterne von der 9^{ten} und 10^{ten} Grösse sind, so würde man sie noch um etwa 0"006 zu vergrössern haben, um die absolute Parallaxe zu erhalten.

Bei dieser Gelegenheit werde ich noch ein Paar Bemerkungen hinzufügen über die bei den Beobachtungen des Sterns 61 im Schwan und des *Argelander'schen* Sterns angewandten Methoden. Das von *Bessel* bei den Messungen des erstern Sterns angewandte Verfahren war folgendes. (S. Astr. Nachr. Bd. 16, Seite 75). „Die Mikrometerschraube der Objectiv-^Rhälfte I. wurde auf 60,000 gestellt und darauf die Entfernung beobachtet, wobei nur die Mikrometerschraube II. gedreht wurde, und gleich darauf eine zweite der Entfernung, die durch die vorher etwas zurückgedrehte Mikrometerschraube I. erlangt wurde. Beide Beobachtungen der Entfernungen wurden abgelesen und dann noch einige Male wiederholt. Dieses ist

die eine Hälfte der Beobachtungen, die andere Hälfte ist genau so wie die erste gemacht, mit dem einzigen Unterschiede, dass die Axe der Objectivhälfte II. auf der entgegengesetzten Seite der Axe von I. war.“ Nennen wir den Stern 61 Cygni C, die beiden damit verglichenen Sterne α und β , die Angabe der Mikrometerschraube II., wenn die Linie, welche die optischen Mittelpunkte beider Objectivhälften verbindet, senkrecht zu der Linie ist, längs welcher der optische Mittelpunkt der Objectivhälfte II. sich bewegt, für die beiden verschiedenen Lagen der Objectivhälfte I, x , x' , so sind die Grössen, welche bei einer Beobachtung von 61 Cygni der Reihe nach abgelesen werden, abgesehen von den Wiederholungen der Messungen und den wegen Refraction, Ungleichheiten der Schraube etc. anzubringenden Correctionen,

- 1) $C\alpha + x$
- 2) $C\alpha + x'$
- 3) $x' - C\alpha$
- 4) $x - C\alpha$
- 5) $C\beta + x$
- 6) $C\beta + x'$
- 7) $x' - C\beta$
- 8) $x - C\beta$.

Durch die Subtraction von (1) und (4) sowohl, als von (2) und (3) erhält man hieraus $C\alpha$, unabhängig von x und x' , und ebenso $C\beta$ durch die Subtractionen von (5) und (8), so wie von (6) und (7).

Schlüter ordnete seine Messungen auf folgende Weise an. Die Objectivhälfte I. stellte er auf 59,6 und maass darauf durch Verschiebung der Objectivhälfte II. die Distanzen Ab und Ac ; ähnliche Messungen führte er aus, während die Objectivhälfte I. auf 59,8; 60,0; 60,2 und 60,4 gestellt war. Darauf wiederholte er, bei denselben Stellungen der Objectivhälfte I., die Messungen in entgegengesetzter Lage der Axe der Objectivhälfte II. Herr Dr. *Wickmann* beobachtete auf ähnliche Weise; nur liess er bei allen Messungen die Objectivhälfte I. unverändert auf 60,000 stehen, und maass in der einen Lage von II. die Distanzen Ab , Ac , Aa , und darauf in der andern Lage von II. dieselben Distanzen. Betrachten wir der Einfachheit wegen nur die Messungen, welche in einer Lage der Objectivhälfte I. mit zwei Vergleichsternen b und c ausgeführt sind, und nennen wir wieder x den Coincidenzpunkt von II., so sind die Grössen welche der Reihe nach abgelesen werden

- 1) $Ab + x$
- 2) $Ac + x$
- 3) $x - Ac$
- 4) $x - Ab$.

Durch die Subtraction von (1) und (4) erhält man in diesem Falle Ab und durch die Subtraction von (2) und (3) Ac , beide unabhängig von x .

Man ersieht aus dieser Darstellung, dass sowohl bei 61 Cygni als beim *Argelander'schen* Stern die Fehler der aus den Einstellungen abgeleiteten beiden Distanzen, insofern sie aus den Fehlern der Einstellungen der Sterne und der Ableisungen der Mikrometerschraube bestehen, ganz unabhängig von einander sind. Die Fehler, welche die Reduction der Beobachtungen durch einen unrichtig angenommenen Werth des Thermometer Coefficienten einführt, wirken auch für beide Beobachtungsarten auf gleiche Weise auf die Distanzen. Nur wenn an demselben Beobachtungsabende, und unter sonst gleichen Umständen, derselben Verschiebung der Objectivhälfte II. nicht immer dieselbe Quantität der Umdrehungen der Mikrometerschraube entsprechen sollte, so würden dadurch Fehler entstehen, welche auf die Distanzen Ab und Ac , bei dem Messungsverfahren des *Argelander'schen* Sterns, in gleichem Sinne wirken, während aus dieser Ursache bei 61 Cygni zwei von einander unabhängige Fehler für die Distanzen $C\alpha$ und $C\beta$ entstehen. Dass Fehler von dieser letztern Beschaffenheit überhaupt nicht vorkommen sollten, darf wohl nicht behauptet werden, indess werden sie sehr geringe sein. Ihre Grösse würde sich übrigens, ohne Zweifel, mit der Beschaffenheit des Oels, also auch mit der Jahreszeit ändern, und dieses wäre dann noch ein Grund mehr, die absoluten Distanzen zu Parallaxenbestimmungen nicht anzuwenden.

Die von mir ausgesprochene Ansicht, dass von den beiden Werthen, welche Herr Dr. *Wickmann* für die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns gefunden hat, der kleinere Werth ($+0''135 \pm 0''013$ nach Herrn Dr. *Wickmann's*, $+0''141 \pm 0''013$ nach meiner Berechnung) der richtigere sei, findet noch eine Bestätigung in den Beobachtungen von Herrn *Otto Struve*. Letzterer beobachtete, wie schon zu Anfang dieses Aufsatzes erwähnt ist, mit Hülfe des Fadenmikrometers am grossen Refractor der Pulkowaer Sternwarte, die Unterschiede in Declination zwischen dem *Argelander'schen* Stern und zwei kleinen Sternen a und d . Der erste folgte $2'$ in Zeit auf A und war $\frac{1}{2}$ Minute südlicher, der andere ging dem Sterne A um $3'6''$ voran und war $2\frac{1}{2}$ Minuten nördlicher. Herr *Struve* wandte folgendes Beobachtungsverfahren an. Zuerst stellte er die parallelen Fäden des Mikrometers in die Richtung der täglichen Bewegung, während der Kopf der Mikrometerschraube nach Süden gerichtet war, stellte alsdann den unbeweglichen Faden auf den vorangehenden Stern, mittelst der Mikrometerschraube des Declinationskreises, und darauf den beweglichen Faden mittelst der Schraube des Fadenmikrometers

auf den nachfolgenden Stern. Bei der Messung der Declinations-Differenz $= \Delta d$, zwischen d und A wurde also der erste Faden auf d , der zweite auf A gestellt; bei der Messung der Declinations-Differenz, $= \Delta a$, zwischen A und a , der erste Faden auf A , der zweite auf a . Auf diese Art maass er 4 mal Δd und 4 mal Δa . Dann drehte er das Mikrometer um 180° und wiederholte die Messungen in umgekehrter Ordnung in gleicher Anzahl. Für jede Lage des Mikrometers bestimmte er den Nullpunkt, der zur Coincidenz der beiden Fäden gehörte. Bei der Einstellung des festen Fadens ist das ganze Fernrohr zu drehen und es findet dann fast immer, nachdem der Faden eingestellt worden, noch eine Fortbewegung des Fernrohrs statt, die eine Folge der Spannungen im Arme des Hebels ist, auf welche die Mikrometerschraube des Declinations-Kreises wirkt. Um den Einfluss dieser Spannungen zu vermeiden, stellte Herr *Otto Struve* den Faden nicht genau auf den Stern, sondern so, dass bei östlichen Stundenwinkeln der Stern einige Zehntel einer Secunde nördlich vom Faden blieb. Er wartete dann die Zeit ab, wenn durch die Aenderung der Refraction mit der Höhe, der Stern sich auf den Faden herabsenkte. Bei westlichen Stundenwinkeln stellte er den Faden so, dass der Stern ein wenig südlich vom Faden blieb und wartete gleichfalls die Zeit ab, wenn die Bissection erfolgte. Dieses Verfahren wurde, wie bemerkt, für den vorangehenden der beiden Sterne angewandt, deren Declinations-Unterschied beobachtet wurde. Für die Beurtheilung des Werthes dieser Beobachtungen ist die Bemerkung des Herrn *O. Struve* von Wichtigkeit, dass er die Gewohnheit gehabt habe, die erste gute durch Refraction hervorgebrachte Bissection zu beobachten, nicht die mittlere, d. h. diejenige, bei welcher die durch die Undulation des Bildes hervorgebrachten Sprünge auf beiden Seiten des Fadens einander gleich sind. (S. *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de Paris*, Tome XXX. p. 69). In Folge dieses Verfahrens sind nämlich seine Beobachtungen mit Fehlern von jährlicher Periode behaftet. Da der vorangehende Stern, der auf solche Art eingestellt wurde, jedesmal der nördlichere war, es mag nun die Declinations-Differenz zwischen d und A oder zwischen A und a beobachtet sein, so folgt, dass dadurch jede Declinations-Differenz östlich vom Meridian etwas zu klein, westlich ein wenig zu gross beobachtet ist. Auf den nachfolgenden Stern wurde, wie schon erwähnt, der bewegliche Faden eingestellt. *Struve* bewegte diesen Faden, indem er die Mikrometerschraube rechts herumdrehte, so weit, bis er die erste gute Bissection sah. Auf solche Art musste durch die Einstellung dieses beweglichen Fadens gleichfalls ein kleiner Fehler entstehen, der indess für die beiden verschiedenen Lagen des Mikrometers nach entgegengesetzten Seiten auf die

Declinations-Differenz einwirkte und folglich aus dem Mittel aller Einstellungen herausging.

Die Beobachtungen sind von Herrn *O. Struve* so angeordnet, dass an jedem Beobachtungstage die Declinations-Unterschiede Δd und Δa im Mittel sehr nahe für dasselbe Zeitmoment gelten. Man kann daher wohl annehmen, dass durch das erwähnte Beobachtungsverfahren an demselben Abende gleiche Fehler in Δd und Δa hervorgebracht sind. Im Laufe des Jahres werden diese Fehler, die wir mit x bezeichnen wollen, indess ihre Grösse verändert haben, sowohl weil die Höhe bei welcher die Sterne beobachtet wurden sich änderte, als auch, weil die Grösse der Undulationen der Sterne, bei gleichen Höhen, während eines Jahres nicht dieselbe bleibt.

Aus den Beobachtungen des Herrn *Otto Struve* geht hervor, dass das Fernrohr, während der Dauer der Durchgänge der drei Sterne d , A und a , seine Richtung im Allgemeinen etwas verändert hat. Die Grösse dieser Richtungsänderung, die bis auf etwa 1 Secunde in Declination für die Zwischenzeit von $5'6''$ der Durchgänge von d und a scheint gegangen zu sein, änderte sich ohne Zweifel mit der Temperatur und dem Stundenwinkel des Fernrohrs, also auch mit der Jahreszeit, und wird daher für die einzelnen Declinations-Differenzen Fehler erzeugt haben, die eben so gut von jährlicher Periode sind, wie x .

Nennen wir die scheinbare, mit Refraction behaftete, Declinations-Differenz zwischen d und A , Δd ; zwischen A und a , Δa , beide positiv genommen: die Rectascensions-Differenz zwischen d und A , t ; zwischen A und a , t' ; nehmen wir ferner an, die Veränderung der Richtung des Fernrohrs sei von der Art, dass dadurch die beobachtete Declination eines Sterns in der Zeit $t+t'$ um die Grösse γ abnimmt; so sind in Folge der beiden genannten Fehler-Ursachen, statt der Declinations-Differenzen Δd und Δa , die man ohne ihre Einwirkung würde beobachtet haben, gemessen worden

$$(\Delta d) = \Delta d + x + \frac{t}{t+t'} \cdot \gamma$$

$$(\Delta a) = \Delta a + x + \frac{t'}{t+t'} \cdot \gamma$$

Die beiden Grössen (Δd) und (Δa) lassen sich auf keine Weise so combiniren, dass das Resultat unabhängig von x und γ wird. Herr *O. Struve* verfuhr auf folgende Weise. Für jeden Beobachtungstag bildete er sich die Summe der beobachteten Δd und Δa , nachdem er sie wegen der Wirkung der Wärme auf die Messungen, so wie wegen Refraction, Aberration, Präcession und Nutation corrigirt hatte. Dadurch erhielt er, wenn diese corrigirten Werthe mit $\Delta'd$ und $\Delta'a$ bezeichnet werden, die Grösse

$$\Delta a d = \Delta'd + \Delta'a + 2x + \gamma \dots\dots\dots(16).$$

Dass x für Beobachtungen bei östlicher Lage des Fernrohrs einen negativen, bei westlicher einen positiven Werth hat, ist bereits bemerkt worden. *O. Struve* nimmt nun an, dass die Grösse dieses Fehlers, unabhängig vom Stundenwinkel, constant ist, und nur für die beiden Lagen des Fernrohrs verschiedene Zeichen hat. Er findet das Mittel aus 24 Werthen von Δab östlich vom Meridian $= 200''269$; aus 23 Beobachtungen westlich vom Meridian $= 200''610$. Der Unterschied $0''341$ zwischen beiden Werthen ist, unter jener Annahme, dem vierfachen Betrage von x gleich, demnach $x = 0''085$. Das Mittel aus jenen Mittelwerthen von Δab , nämlich $200''439 = c$, hält er für frei von dem Einflusse der mit x und y bezeichneten Fehler. Er addirt nun zu den Werthen von $\Delta'd$ und $\Delta'a$ der östlichen Lage des Fernrohrs $0''085$ und subtrahirt dieselbe Zahl von den Distanzen der westlichen Lage. Die Summe, $= (\Delta ad)$, der auf solche Art veränderten Distanzen, subtrahirt er von C und vertheilt den Unterschied auf $\Delta'd$ und $\Delta'a$ im Verhältniss der Rectascensions-Unterschiede zwischen d und A und zwischen A und a . Aus den auf diese Weise für x und y corrigirten Distanzen findet er, mittelst der Methode der kleinsten Quadrate, die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns, relativ zu der Parallaxe der Vergleichsterne,

$$= +0''034, \text{ mit dem wahrsch. Fehler } 0''029.$$

Die Annahme des Herrn *O. Struve*, dass die auf die vorhin angegebene Weise von ihm veränderten Beobachtungen frei von dem Einflusse der Grössen x und y sind, ist ohne Zweifel irrig: einmal weil die derselben zum Grunde liegende Voraussetzung, dass die Grösse x im Meridian nur das Zeichen wechselt, im Uebrigen aber, an derselben Seite des Meridians, für jeden Stundenwinkel und zu jeder Jahreszeit denselben Werth behält, unrichtig ist; dann aber auch noch, weil das von Herrn *Struve* zur Bestimmung von x angewandte Verfahren, diese Grösse, selbst wenn ihr Werth constant wäre, nicht unabhängig von dem Einflusse von y giebt. Denn letztere Grösse hat auf das arithmetische Mittel der Summen (16) für die östliche Lage des Fernrohrs nicht denselben Einfluss, als auf das Mittel derselben für die westliche Lage, weil die letztern Summen für eine andere Jahreszeit gelten als die erstern; der Unterschied beider Mittel, den Herr *Struve* $= 4x$ setzt, ist daher noch mit dem Einflusse von y behaftet.

Wegen dieser Einwirkung periodischer Fehler ist die Unsicherheit der von Herrn *Struve* gefundenen Parallaxe grösser, als der gegebene wahrscheinliche Fehler sie angiebt. Wie gross jene Einwirkung gewesen, lässt sich nur näherungsweise schätzen. Statt des wahren Werthes von $\pm x$, der für den einzelnen Beobachtungstag unbekannt ist, subtrahirt Herr *Struve* sowohl von $\Delta'd$ als von $\Delta'a$ die Grösse $\pm 0''085$; der

nachbleibende Fehler in $\Delta'd$ oder $\Delta'a$ ist also $= x - 0''085$. In die aus

$$\frac{t'}{t+t'} \Delta'd - \frac{t}{t+t'} \Delta'a$$

gebildete Bedingungsgleichung, die y nicht enthält, wird dadurch ein Fehler eingeführt von der Grösse $\frac{t'-t}{t'+t} (x - 0''085) = 0,22 (x - 0''085)$, da $t = 3'6''$, $t' = 2'0''$.

Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, dass x die Grösse von einer Secunde nicht erreicht hat. Der Einfluss von x auf eine *Struve'sche* Bedingungsgleichung wird also immer kleiner sein als $0''20$; folglich auf die von *Struve* gefundene Parallaxe kleiner als $0''20$, dividirt durch den grössten Werth, $= 0,68$, des Coefficienten von π in den Bedingungsgleichungen, mithin kleiner als $0''30$. Aus Herrn *Struve's* Beobachtungen geht demnach gleichfalls hervor, dass der grössere von Herrn Dr. *Wichmann* für die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns gefundene Werth, nämlich $0''72$, unrichtig ist. Diese Folgerung gewinnt dadurch noch erheblich an Gewicht, dass Herr *Struve* den Vergleichstern b , für welchen Herr Dr. *Wichmann* eine Parallaxe von mehr als einer Secunde will gefunden haben, nicht benutzt hat.

Ich sehe mich veranlasst auch über die Parallaxe, welche ich aus meinen Beobachtungen am Pulkowaer Verticalkreise für den *Argelander'schen* Stern gefunden habe, noch ein Paar Worte zu sagen, schon deshalb, weil in den Discussionen über die Parallaxe dieses Sterns, meiner Bestimmung mehrmals Erwähnung geschehen ist.

Eine ausführliche Beschreibung des Pulkowaer Verticalkreises und des von mir angewandten Beobachtungsverfahrens habe ich in meinen *Recherches sur la parallaxe des étoiles fixes*, p. 66 etc. gegeben. Für die Beurtheilung der Sicherheit der von mir gefundenen Parallaxe werden die wenigen folgenden Mittheilungen genügen.

Bei jeder Culmination wurde der Stern in beiden Lagen des Kreises (Kreis Ost und Kreis West) beobachtet. Die Veränderungen in dem Werthe eines Umgangs der Mikrometerschrauben an den Mikroskopen, die aus Veränderungen der Abstände der Mikroskope vom Kreise entstehen können, wurden dadurch unschädlich gemacht, dass ich mit jedem Mikroskop sowohl den vorhergehenden als den folgenden Strich des Kreises einstellte. Die Winkelabstände zwischen den benutzten Strichen, so wie die Fehler der Mikrometerschrauben wurden von mir bestimmt. Den Einfluss etwaiger periodischer Aenderungen der Biegungen des Fernrohrs und des Kreises machte ich dadurch unschädlich, dass ich Objectiv und Ocular öfter umsetzte. Es ist mehrfach bemerkt worden, dass die Niveaus an den Meridian-Instrumenten, in Folge ungleicher

Erwärmungen des Nord- und Süd-Endes sich verstellen. Meine Beobachtungen können indess aus dieser Ursache nicht fehlerhaft geworden sein, weil, auf meinen Vorschlag, die Niveaus an allen Hauptinstrumenten der Pulkowaer Sternwarte, also auch am Verticalkreise mit einer zweiten Glashülle umgeben wurden, so dass ein etwaiger Unterschied zwischen den Temperaturen des Saals nach Norden und Süden, das Niveau, wenn das Instrument um seine Verticalkreise 180° gedreht wurden, in den wenigen Minuten, die bis zur zweiten Einstellung des Sterns vergingen, nicht merklich kann verstellt haben. Ausserdem wurde die grösste Sorgfalt auf die Ausgleichung der Temperaturen innerhalb und ausserhalb des Beobachtungssaals verwandt. Ich glaube daher, dass von meiner Seite wohl alles mögliche geschehen ist, um die Beobachtungen frei von dem Einflusse periodischer Fehler zu erhalten. Es ist indess schon in der genannten Abhandlung von mir bemerkt worden, dass dennoch die reducirten Beobachtungen vielleicht mit kleinen periodischen Fehlern behaftet sind, die möglicher Weise aus unbekannten Gliedern der Refraction, die eine jährliche Periode haben könnten, hervorgegangen sind. Ich kann noch hinzufügen, dass bei Beobachtungen, die man in Folge des angewandten Beobachtungsverfahrens, für frei von allen Aenderungen halten sollte die im Instrumente vorgehen können, und die ausserdem unabhängig von der Refraction sind, sich dennoch kleine periodische Fehler gezeigt haben. Ich meine hier die Beobachtungen, welche Herr Staatsrath *Struve* am Passagen-Instrumente im ersten Vertical der Pulkowaer Sternwarte zur Bestimmung der Aberrations-Constante angestellt hat. Bei diesem Instrumente ist, wegen der Anbringung des Fernrohrs an das eine Ende der horizontalen Achse, der Collimationsfehler zwar beträchtlichen periodischen Aenderungen unterworfen, allein weil jedesmal in beiden Lagen des Instruments beobachtet wird, so sollten diese Fehler eliminirt sein. Dennoch hat sich gezeigt, dass die mit diesem Instrument angestellten Beobachtungen periodische Fehler enthalten, obschon diese sehr klein sind. Leitet man nämlich aus den Beobachtungen der 7 Sterne, die *Struve* in Bezug auf Aberration untersucht hat, neben der Aberration auch noch die jährlichen Parallaxen der Sterne ab, so erhält man für letztere lauter negative Werthe von ein Paar Hunderttheilen einer Secunde, während man bei der Helligkeit der beobachteten Sterne positive Werthe von einem noch etwas grössern Betrage hätte erwarten sollen. *)

*) Die Veranlassung zu den genannten periodischen Fehlern wird wohl hauptsächlich ausserhalb des Instruments gewesen sein. Die Parallaxen hängen nämlich vorzugsweise von Beobachtungen ab, die um Mitternacht und bei Tage,

Obgleich indess die Möglichkeit kleiner periodischer Fehler für meine Beobachtungen am Verticalkreise nicht geläugnet werden kann, so sind dennoch, wie ich auch in meinen Recherches etc. schon bemerkt habe, Gründe vorhanden, welche mich zu der Annahme berechtigten, dass ihr Einfluss auf die von mir gefundenen Parallaxen sehr geringe gewesen. Die aus denselben Beobachtungen abgeleitete Aberrations-Constante stimmt nämlich mit der *Struve'schen* Bestimmung fast vollkommen überein; ausserdem weichen auch meine für 61 Cygni und α Lyrae gefundenen Parallaxen von den Werthen welche *Bessel* und *Struve* aus Mikrometermessungen gefunden haben, nicht mehr ab, als nach den wahrscheinlichen Fehlern erwartet werden konnte. Es war daher anzunehmen, dass der von mir gefundene Werth für die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns, $+0''.226$, mit dem wahrsch. Fehler $0''.141$, nicht erheblich mehr unsicher sein würde, als sein wahrsch. Fehler angiebt. In der That weicht er auch von dem Werthe, der aus den hiesigen Heliometerbeobachtungen folgt und dem ich glaube die grösste Sicherheit beilegen zu können, nämlich $0''.141 \pm 0''.013$, noch nicht einmal um den Betrag seines wahrsch. Fehlers ab.

Herr Dr. *Wichmann* sucht in seiner neuesten Abhandlung zu beweisen, dass die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns, welche aus meinen Beobachtungen am Pulkowaer Verticalkreise folgt, mit dem grössern von ihm gefundenen Werthe $0''.72$ nicht im Widerspruche stehe. Dass meine Bestimmung, ihres beträchtlichen wahrscheinlichen Fehlers wegen, damit nicht geradezu unvereinbar sein würde, gebe ich zu; doch erlaube ich mir ein Paar Worte über die Argumente hinzuzufügen, die Herr Dr. *Wichmann* zur Begründung seiner Behauptung aufgestellt hat. Er hebt nämlich hervor, dass die Beobachtungen dieses Sterns, unter allen Beobachtungen die ich zur Untersuchung von Parallaxen angestellt habe, am ungünstigsten liegen, indem ich den Stern, seiner Lichtschwäche wegen, vorzüglich nur um die Zeit des einen Maximum der Parallaxe und des einen Maximum der Aberration

nicht weit vom Mittage, angestellt sind. Auf letztere könnte nun eine kleine Lateral-Refraction eingewirkt haben, die möglicherweise durch den Sonnenschein auf die Klappen des Ost-West-Durchschnitts erzeugt ist. Ich glaube daher auch, dass die *Struve'sche* Aberrations-Constante, die hauptsächlich von Beobachtungen abhängt, welche um 6 Uhr Morgens und um 6 Uhr Abends angestellt sind, wo die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf die Klappen sehr geringe und ausserdem nahezu gleich war, fast ganz frei von dem Einfluss jener kleinen periodischen Fehler sein wird. Nach dem Schlusse der *Struve'schen* Aberrations-Beobachtungen wurden erst die Jalousien aufgestellt, durch welche gegenwärtig die Sonnenstrahlen von dem Ost-West-Durchschnitte abgehalten werden.

beobachten konnte und dass die Parallaxe $= \gamma'''$ und die Correction der mittlern Declination etc. $= \xi'''$, in eine solche Abhängigkeit von einander treten, dass nicht beide zugleich genügend hätten bestimmt werden können. Diese Auseinandersetzung war jedoch für die Würdigung der Sicherheit meiner Parallaxe nicht erforderlich, da ich den wahrscheinlichen Fehler, natürlich mit Rücksicht auf die ungünstige Lage der Beobachtungen und die erwähnte Abhängigkeit der Grössen γ''' und ξ''' von einander, berechnet habe. Wenn also nicht nachgewiesen wird, dass die Annahme welche der Ableitung dieses wahrscheinlichen Fehlers zum Grunde liegt, nämlich dass man die Beobachtungsfehler als zufällige ansehen kann, unrichtig ist, ein Punct den Herr Dr. *Wichmann* nicht berührt, so giebt der wahrscheinliche Fehler die beste Vorstellung von der Genauigkeit der Parallaxe. Jede andere Art den Grad der Sicherheit aus den Finalgleichungen nachzuweisen, kann, wenn sie richtig durchgeführt wird, nur zu demselben Resultate führen.

Aus meiner im Vorhergehenden ausgesprochenen Ueberzeugung, dass derjenige Werth für die Parallaxe des *Argelander'schen* Sterns, welchen ich aus den hiesigen Heliometer-Beobachtungen abgeleitet habe, frei von dem Einflusse periodischer Fehler, also sicher ist, folgt, dass ich die viel grössere Parallaxe, welche Herr *Faye* gefunden hat, nicht für richtig halten kann. Welche Fehlerquellen auf die letztere Bestimmung eingewirkt haben mögen, dürfte wohl schwer nachzuweisen sein, da sie einem mit der Theorie der Instru-

mente so vertrauten Astronomen, wie Herrn *Faye*, haben unbekannt bleiben können. Dass die von *Struve* versuchte Erklärung, nämlich der Beobachter sei zu den Zeiten der entgegengesetzten Maxima der Parallaxe, dadurch, dass er wisse, in welchem Sinne die Parallaxe wirke, beim Beobachten befangen, für Herrn *Faye's* Beobachtungen keine Gültigkeit habe, erklärt Herr *Faye* ausdrücklich, und in der That möchten solche Beobachtungsfehler auch wohl nur bei wenigen Beobachtern vorkommen. Wenn das Instrument, ähnlich wie der Pulkowaer Refractor, in der Zeit von ein Paar Minuten merklichen Verstellungen unterworfen und wenn die Grösse dieser Verstellungen mit der Temperatur veränderlich war, so könnten dadurch allerdings periodische Fehler erzeugt sein, weil Herr *Faye* nur einen einzigen Vergleichstern benutzt hat.

Herr Dr. *Wichmann* macht auf die grosse Geschwindigkeit aufmerksam, mit welcher sich der *Argelander'sche* Stern bewegen müsste, wenn der kleinere von ihm gefundene Werth richtig wäre. Allein dieser Einwurf verliert wohl alles Gewicht, wenn man bedenkt, dass uns die Ursachen der Initial-Bewegungen der Fixsterne gänzlich unbekannt sind und daher eigentlich jede Bewegung gleich möglich ist, eine sehr schnelle so gut, wie eine langsame.

Zum Schlusse erlaube ich mir die beiden Parallaxenbestimmungen welche, nach meiner Ueberzeugung, mit der grössten Sicherheit aus den hiesigen Heliometer-Beobachtungen abgeleitet sind, hier zusammenzustellen. Es sind folgende:

Parallaxe von 61 Cygni, nach *Bessel* und *Schlüter*, $= +0''360$, mit dem wahrsch. Fehler $0''012$;
 Parallaxe d. *Argel. Sterns*, nach *Schlüter* u. *Wichmann*, $= +0,141$, „ „ „ „ $0,013$.

Dieses sind die Parallaxen der genannten Sterne, relativ zu denen der Vergleichsterne. Nach meinen Untersuchungen über die mittlern Parallaxen der Sterne würden zu dem erstern Werthe noch etwa $0''006$, zu dem zweiten $0''007$ hinzuzufügen sein, um die absoluten Parallaxen zu erhalten.

Ephemeride der Astraea für die Opposition 1853.

12 ^h m Berl. Zt.	α .	δ .	log. Δ	12 ^h m. Berl. Zt.	α .	δ .	log. Δ
Sept. 28	2 ^h 34 ^m 13 ^s 12	+7° 26' 28'' 2	0,243511	Octb. 8	2 ^h 28 ^m 24 ^s 22	+6° 31' 32'' 6	0,224087
29	33 44,54	7 21 19,4	0,241349	9	27 42,20	6 25 42,9	0,222443
30	33 14,49	7 16 5,3	0,239231	10	26 59,04	6 19 50,7	0,220860
Octb. 1	32 42,98	7 10 46,2	0,237159	11	26 14,79	6 13 56,4	0,219338
2	32 10,05	7 5 22,2	0,235135	12	25 29,48	6 8 0,4	0,217879
3	2 31 33,73	+6 59 53,7	0,233160	13	2 24 43,16	+6 2 3,0	0,216485
4	31 0,03	6 54 20,9	0,231237	14	23 55,88	5 56 4,5	0,215156
5	30 22,99	6 48 44,0	0,229366	15	23 7,70	5 50 5,3	0,213894
6	29 44,65	6 43 3,5	0,227550	16	22 18,65	5 44 5,8	0,212700
7	29 5,05	6 37 19,6	0,225790	17	21 28,80	5 38 6,3	0,211574