Für die Wertbestimmung von Asterol geben Hoffmann-La Roche & Co.¹⁾ folgende Methode an: Etwa 3 g Asterol löst man heiss in einem geräumigen Becherglase in 300 cc Wasser, setzt etwas Chlorammonium und ein gleiches Volumen frisches Schwefelammonium zu; man kocht nun in dem bedeckten Becherglase eine Stunde lang, fügt schliesslich noch etwas Schwefelammonium zu und filtriert heiss durch ein gewogenes Filter von etwa 9 cm Durchmesser. Das Quecksilbersulfid wäscht man zunächst mit schwefelwasserstoffhaltigem Wasser aus. Um geringe Mengen von Eisen und alkalischen Erden aus dem Niederschlage zu entfernen, wäscht man alsdann mit Salzsäure von 10 Prozent, die mit dem gleichen Volumen Schwefelwasserstoffwasser verdünnt ist, aus, hierauf mit reinem Wasser und schliesslich mit starkem Alkohol. Den Niederschlag trocknet man bei 100° und wägt.

Jodbestimmung in organischen Körpern. Über die Darstellung, Wertbestimmung und physiologische Wirkung von Jodeiweissverbindungen berichtet Karl Dieterich.²⁾

Der Verfasser hat Jodeiweiss- und Jodpeptonverbindungen dargestellt und eingehend beschrieben; die ersteren nennt er α -Eigone, die letzteren β -Eigone. Das Jod ist in diesen Körpern intramolekular gebunden und lässt sich nur schwer abspalten; selbst durch Eintragen in schmelzendes Kali und durch stundenlanges Glühen mit Natronkalk gelingt es nicht, das Jod vollständig an die Basen zu binden.

Zur Bestimmung des Jods in diesen Verbindungen verfährt man in folgender Weise: 0,2—0,5 g Substanz bringt man mit einem Überschuss von Silbernitrat und 2,0—2,5 cc Salpetersäure (spezifisches Gewicht 1,4) in ein Rohr und erhitzt 2—2½ Stunden lang auf etwa 300°. Da das Eiweiss fast immer chlorhaltig ist, so muss man hierauf Rücksicht nehmen; man filtriert deshalb das erhaltene Halogensilbergemisch durch eine Allihn'sche Röhre mit Asbestfüllung, wäscht aus, behandelt mit Alkohol und Aether und trocknet. Nach dem Wägen überschichtet man den Niederschlag mit Jodkaliumlösung von etwa 0,1 Prozent, lässt einige Minuten stehen, saugt ab und behandelt wie oben. Diese Operation hat den Zweck, das Chlorsilber in Jodsilber überzuführen. Aus der Gewichtszunahme kann man das Chlorsilber leicht berechnen.

¹⁾ Pharm. Zentral-Halle 42, 785.

²⁾ Pharm. Zeitung 1898, No. 51 u. 52; vom Verfasser eingesandt.

Über den Nachweis von Jod in Organopräparaten macht Seyda¹⁾ Mitteilung. Zur Isolierung des Jods im Lebertran verfährt man nach dem Verfasser in folgender Weise: Man mischt 20 g Lebertran in einer Nickelschale mit 40 g gepulvertem Ätznatron innig und erhitzt; wenn die erste, unter starker Aufblähung der Masse erfolgte Reaktion vorüber ist, bedeckt man mit einem Platindeckel; nach etwa achtstündigem Glühen ist die Reaktionsmasse pulverig und grau-weiss. Man löst nun die Masse in einem Becherglase in etwa 400 g Wasser, filtriert, behandelt das Filtrat heiss mit Kohlensäure, bis eine Probe, mit Baryumchloridlösung von 10 Prozent im Überschuss versetzt, nach dem Aufkochen ein neutrales Filtrat liefert. Die abgekühlte Flüssigkeit mischt man mit dem gleichen Volumen Alkohol von 96 Prozent, filtriert von dem ausgeschiedenen Natriumkarbonat ab und wäscht dreimal mit Alkohol von 50 Prozent nach. Das alkoholische Filtrat konzentriert man auf dem Wasserbade, dampft schliesslich in einer Platinschale zur Trockne und glüht, bis der Rückstand rein weiss erscheint. Den Glührückstand löst man nach dem Erkalten in Wasser, versetzt diese Lösung in einem Scheidetrichter mit etwa 5 cc einer stark verdünnten Lösung von Kaliumnitrit und etwa 10 cc Chloroform, schüttelt und übersättigt mit verdünnter Schwefelsäure; nach nochmaligem Mischen stellt man einige Stunden bei Seite. Die Chloroformschicht erscheint bei Gegenwart von Jod deutlich, wenn auch schwach violett gefärbt.

Über die Wertbestimmung von Spiritus Aetheris nitrosi geben Cowley und Catford²⁾ ein kolorimetrisches Verfahren an, das aber nach Angabe des Referenten der Pharm. Zentral-Halle (P. S.) wenig zuverlässig sein und nur annähernd richtige Resultate liefern soll. Die Methode besteht darin, dass man das mit Wasser verdünnte Präparat mit einer wässrigen Lösung von Metaphenylendiamin und verdünnter Schwefelsäure versetzt und die auftretende Braunfärbung (Bismarckbraun) mit der einer eingestellten und ebenso behandelten Lösung von Natriumnitrit vergleicht.

1) Zeitschrift f. öffentliche Chemie **3**; vom Verfasser eingesandt.

2) Pharm. Zentral-Halle **41**, 6.