DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinalwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Begründet von Dr. Paul Börner.

Dreizehnter Jahrgang.

Redacteur Sanitäts-Rath Dr. S. Guttman in Berlin W.

Verlag von Georg Thieme, Leipzig-Berlin.

I. Mittheilung über die Beri-Béri.

Von Dr. C. A. Pekelharing und Dr. C. Winkler in Utrecht.

In Folge eines Auftrages der Niederländischen Regierung haben wir uns bemüht, dem Wesen und der Ursache der Beri-Beri nachzuforschen. Unsere Untersuchungen haben wir angestellt theils in Batavia, theils in Atjeh, wo die Krankheit in viel stärkerem Maasse wie die Atjeh'schen Feinde Verheerungen unter unseren Truppen angerichtet hat.

Möglichst kurz wollen wir hier vorläufig über unsere Resultate Bericht erstatten.

Scheube hatte Recht, als er die Krankheit als eine multiple, degenerative Neuritis bezeichnete. Von Anämie ist dabei nicht die Rede. Blutkörperchen-Zählung und Bestimmung des Blutfarbstoffgehaltes beweisen es direkt. Es kann ein von Beri-Beri Befallener anämisch sein, braucht es aber auch in schwereren Fällen durchaus nicht zu sein.

Das multiple Nervenleiden ist ziemlich allseitig, Motorisches, sensibles, und vasomotorisches Nervensystem werden betroffen. Klinisch differiren die Symptome, je nachdem die Betheiligung des motorischen oder des vasomotorischen Nervensystems prävalirt; aber sei's, dass die atrophischen Paralysen — wie in dieser Epidemie — das Bild der Krankheit bestimmen, sei's, dass die Oedeme vorherrschen, es fehlen leichtere oder schwerere Anästhesien selten oder nie, und der Hydropiker (feuchte Beri-Beri) von heute kann in einigen Wochen der ausgetrocknete, abgemagerte Paralytiker (trockne Beri-Beri) sein.

A. Die Symptome des motorischen Apparates sind die folgenden:

1. Die Muskeln sind im Anfang geschwollen, sie fühlen sich brettartig an; oft imponiren umschriebene Verhärtungen als Tumoren des Muskels. Druck ist schmerzhaft. Diese schmerzhafteste Härte ist vorerst deutlich in den Wadenmuskeln, wo sie oft genug beschrieben ist, kommt aber in zahlreichen anderen Muskeln vor. In späteren Stadien der Krankheit, mit oder ohne vorhergegangene Schwellung, findet man die Muskeln der Extremitäten, später auch die der Arme, des Rumpfes, des Gesichts atrophisch. Ist ein mangelhaftes Gehen da, so wird man gewöhnlich Schwellung und Atrophie neben einander finden.

2. Während die mechanische Erregbarkeit der Nerven nur ausnahmsweise erhöht ist, gehört die erhöhte mechanische Erregbarkeit der geschwollenen oder atrophischen Muskeln zu den ganz oft vorkommenden Erscheinungen. Unter dem leichten, Zuckung auslösenden Hammerschlag bleibt der idiomuskuläre Wulst einige Zeit stehen. Dagegen sind fibrilläre Zuckungen seltener, fehlen aber nicht.

3. Die Reflexe, sowohl die oberflächlichen als die tiefen, fehlen in den letzten Stadien der Krankheit. In früheren Stadien kann das Kniephänomen (auch nach Jendrassik) fehlen, aber es kann da sein, ja es kann sehr gesteigert sein und sich mit Fussclonus combiniren. Der Cremaster-Reflex bleibt lange bestehen.

4. Am meisten charakteristisch sind aber die Störungen in den elektrischen Nerven-Muskel-Erscheinungen. Sie fehlen bei Beri-Beri nie. Schon im Anfang sind sie da. Wo von einer Störung beim Gehen Nichts zu sehen ist, wo sensible Störungen nur zweifelhaft nachweisbar sind, wo nur ein leichtes Oedem oder eine leichte Beschleunigung der Herzaction das Leiden verräth, sind sie ausgesprochen vorhanden.

Diese Aenderungen sind dreifacher Natur.

a) Einfache Herabsetzung¹⁾ der elektrischen Erregbarkeit von Nerv und Muskel für beide Stromesarten.

Beispiel. Ngasio, inländischer Soldat, war als B.-B.-Kranker aufgenommen. Leichtes Oedem auf der Crista tibiae soll vorhanden gewesen sein, besteht aber nicht mehr. Klagt über Herzklopfen. Er wird von den in dieser Hinsicht erfahrenen Spitalärzten für einen Simulanten gehalten.

Elektrische Untersuchung.

Inductionsstrom:

	L.	R.
N. peroneus	85	94
M. tibialis anticus	100 + 40	100 + 56.

Constanter Strom:

N. peroneus.

	L.	R.
18 El + 700 SE = 8 mA KaSz		14 E = 7 mA KaSz
22 El + 700 SE = 10 mA KaSz An Oz ¹		22 E = 13 mA KaSz ¹ An Oz
30 E + 20 mA + 550 SE KaSz ¹ An Oz ¹ An Sz		30 E = 20 mA + 550 SE KaSz ¹ An Oz An Sz

M. tibialis anticus.

22 E = 15 mA KaSz	24 E = 16 mA KaSz
20 E = 17 mA KaSz ¹ An Sz	30 E = 20 mA + 200 SE KaSz ¹ An Sz
30 E = 20 mA + 500 SE KaSz An Sz ¹	

W bei 10 mA nach 1 Minute.

> 2050 SE

< 2450 SE

Es mag sein, dass bei solchen Fällen eine etwas träge Zuckung auf ein Bestehen von Entartungsreaction hinweist, aber oft auch ist diese Zuckung nicht scharf als eine träge zu definiren. Es ist wahrscheinlich, dass diese Fälle in späteren Stadien in die sub c) genannten übergehen.

b) Partielle Entartungsreaction.

Beispiel. Major v. d. B..., europäischer Stabofficier, leidet seit Januar 1887 an Herzklopfen, hat dann und wann leichte Oedeme, die wieder schwinden. Auch Schmerz in den Waden.

Elektrische Untersuchung im April.

Inductionsstrom:

	L.	R.
N. peroneus	100 + 6	97
M. tibialis anticus	80	59

Constanter Strom:

N. peroneus.

	L.	R.
10 E + 400 SE = 8 mA KaSz		8 E + 50 SE = 3 1/2 mA KaSz
10 E = 10 mA KaSz An Sz		14 E = 16 mA KaSz ¹ An Oz ¹ An Sz
14 E = 15 mA KaSz An Sz ¹		

M. tibialis anticus.

8 El + 110 SE = 6 mA An Sz	8 E + 325 SE = 4 mA KaSz
10 El + 115 SE = 7 mA An Sz ¹ KaSz	14 E + 200 SE = 9 mA KaSz ¹ An Sz

Die Anodezuckung ist exquisit träge.

W wie oben

900

< 1150

Es wäre uns leicht, mehr typische Fälle dieser Form mitzutheilen, aber es dünkt uns die Mittheilung dieser Anfangsfälle besser.

¹⁾ Es stand uns ein absoluter Vertikal-Galvanometer (Hirschmann) zur Verfügung. Controle (Thomson's Quadrant-Elektrometer) zeigte zwar, dass dieser etwas zu hoch anwies. Dennoch behalten die Zahlen ihren relativen Werth. Wir besaßen weiter einen Inductions-Apparat nach Hirschmann. Das Uebereinanderschieben der beiden Rollen vergegenwärtigt einen Werth von 1—100 cm. Die weitere Einführung des Magnetkernes von 1 bis 120 cm stellt einen Werth vor von 100 + 1 bis 100 + 120. Der letzte bei übereinanderstehenden Rollen und eingeführtem Kern. Alle 14 Tage neue Leclancher-Elemente. Weiter verfügten wir über einen Rheostat bis zu 5000 SE. Die Zahlen sind genommen bei einer Elektrode von 10 qcm Oberfläche.

Sie stellen den Werth der elektrischen Untersuchung für die Diagnose der Beri-Beri ganz klar.

c) Complete Entartungsreaction.

Diese Gruppe umfasst vielleicht alle Fälle, wo deutliche Bewegungsstörungen in Scene treten.

Beispiel. Minem, inländisches Soldatenweib. Wegen Uterinleiden im Januar 1887 in's Spital aufgenommen. Mitte März die Anfangssymptome von B.-B. Am 26. April ist die Paralyse der Unterextremitäten, die Biegung des Knies ausgenommen, vollkommen. Sensibilitätsstörungen. Keine Oedeme. Atrophien der ganzen Bein- und Armmuskulatur. Paralyse der Handmuskeln. Parese von Diaphragma und Interkostalmuskeln etc.

Elektrische Untersuchung.

Induktionsstrom:

	L.	R.
N. peroneus	nicht erregbar	nicht erregbar
M. tibialis anticus	" "	" "

Constanter Strom:

N. peroneus.

30E = 18mA nicht erregbar.

M. tibialis anticus.

30E = 18mA nicht erregbar.

R.

14E + 2700SE = 1mA KaSz

14E + 2050SE = 1 $\frac{1}{4}$ mA KaSz₁ AnOZ

16E + 2050SE = 2mA KaDT AnDT₁ AnOZ

30E + 2050SE = 8mA KaDT AnDT₁ AnOZ¹ KaOZ

W wie oben.

exquisit träge
Zuckungen

5000SE

5000SE

Oder aber:

Beispiel. S., inländischer Soldat, ist am 12. August 1886 mit B.-B. in's Spital aufgenommen.

Die elektrische Untersuchung des atrophisch-paralytischen Mannes lehrt:

Induktionsstrom:

	L.	R.
N. peroneus	100 + 120 (schwach erregb.)	100 + 120 (nicht erregb.)
M. tibialis anticus	nicht erregb. (100 + 120)	nicht erregb. (100 + 120)

M. extens. hallucis

longus

M. extens. dig. comm.

longus

Constanter Strom:

N. peroneus

Im M. tibialis anticus, M. extens. hallucis longus und M. extens. dig. comm. longus werden beiderseits bei Stromstärken < 20mA nur durch die AnS sehr schwache und träge Zuckungen ausgelöst.

5. Die Reihenfolge, in welcher Nerven und Muskel nach einander befallen werden, ist die folgende. Constant gehört der Nervus peroneus mit den zugehörigen Dorsalflectoren des Fusses zu den am frühesten leidenden Nerven. In 90 Fällen ist klinisch, in 85 Fällen anatomisch das Leiden dieses Nerves stets dagewesen.

Das Wegfallen der Dorsalflexion des Fusses ist auch eins der Hauptmomente bei dem sogenannten typischen Beri-Beri-Gang.

Es folgen die Plantarfectoren des Fusses, die Strecker des Knies, die Adductoren des Schenkels nach. Die Beuger des Knies und die des Schenkels auf dem Becken bleiben relativ am längsten intact.

Es wird von dem schwächeren oder stärkeren Grade des Leidens dieser oder jener Muskelgruppen abhängen, wie sich der B.-B.-Gang gestalten wird.

Es folgen jetzt in aufsteigender Reihe die Bauchmuskel, M. intercostales, Strecker und Beuger der Hand und Finger und das Diaphragma. Paralyse vom Diaphragma, von den Intercostales, oder von Beiden kann jetzt schon den Tod herbeiführen, oder aber es rücken jetzt die Hirnnerven in Scene.

Der N. laryngeus inferior, N. vagi, und der N. laryngeus superior mit den adäquaten Stimmbandparesen (echte Paralysis postica als Todesursache sahen wir nicht), der N. facialis folgen, ja auch Paralysen der Augenmuskeln kommen oft vor.

Heilung bei dergleichen weit vorgeschrittenen Fällen sahen wir nicht.

B. Die sensiblen Symptome.

Bei weitem die Mehrzahl der befallenen Kranken klagen in den ersten Stadien der Krankheit über Paraesthesien, Ameisenkriechen. Ueber Schmerz wird oft geklagt, und er wird in die Muskeln und in die Beine, nicht in die Haut verlegt. Es sind dann oft viele Nerven sehr schmerzhaft bei Druck; vor allem der Nerv. cruralis und am Arme der N. radialis. Bald aber folgt die Abnahme verschiedener Hautsinnesfunctionen, die subjectiv als Taubheit der Glieder geäußert wird.

Der Tastsinn hat immer abgenommen. Oefter ist er für leise Pinselberührung ganz erloschen an einer umschriebenen Stelle, die sich über den Wadenmuskeln bis zur Achillessehne ausbreitet. Der Diameter der Tastkreise wird an dieser schon von Wernich gekannten Stelle sehr vergrößert gefunden.

Wärme- und Kältesinn können an dieser Stelle ganz aufgehoben sein.

Farado-elektrisches Gefühl kann daselbst vollkommen schwinden.

Schmerzgefühl bleibt ziemlich lange erhalten, schwindet am Ende auch. Anästhesia dolorosa kommt dort vor. Wo der Muskelsinn geprüft werden konnte, war er intact.

In schwereren Fällen folgt vollkommene Anästhesie und Analgesie der Unterextremitäten, und man beobachtet dann fast immer auch eine anästhetische Stelle um den Kleinfinger- und Daumenballen, die sich über die Beugefläche des Handgelenkes hin über den Handrücken ausbreitet. Die medialen Finger und die Fingerspitzen bleiben fühlend. Ein grosses gefühlloses Viereck über dem Bauch ist dann gewöhnlich auch vorhanden, während der Rücken frei bleibt.

Wir sahen den anästhetischen Fleck um die Lippen nie, aber zuverlässige Beobachter haben ihn wahrgenommen.

Schwere Bewegungsstörungen können mit leichten oder schweren sensiblen Störungen sich combiniren. Die sensiblen Störungen fehlen aber nie oder höchst selten.

C. Die vasomotorischen Symptome und die Symptome seitens des Herzens.

Es ist bekannt, dass Oedeme sich zu B.-B. oft gesellen, ja, sie können so sehr in den Vordergrund treten, dass sie das Krankheitsbild beherrschen. In der exquisit — in dieser Epidemie seltenen — hydropischen Form liegt der unförmlich geschwollene Kranke (wenigstens im Anfang stets ohne Eiweiss im Urin) mit Höhlenhydrops da.

Aber auch ohne dergleichen verräth oft ein gedunsenes, pastös geschwollenes Gesicht das Leiden, das übrigens als eine atrophische Paralyse verläuft. Am meisten charakteristisch ist ein leichtes Oedem um den höheren Abschnitt der Cristae tibiae. Diese Schwellung scheint mit dem eben genannten anästhetischen Fleck parallel zu gehen, und wir besitzen einige Photographien, wo die durch die Schwellung bedingte eigenthümliche Beinform sehr deutlich herauskommt. Das Bein hat die Form einer Birne, deren Stiel von den Knöcheln geformt wird.

Es geht nicht an, diese Oedeme als Stauungsödeme zu deuten, und wenn auch unsere Kenntnisse von den Vasomotoren bis jetzt nicht zur Erklärung genügen, so liegt es auf der Hand, denselben eine Rolle bei der Entstehung dieser Oedeme zu geben.

Ein Theil der später folgenden Haut- und Höhlenödeme ist aber wenigstens zum Theil vom Mitleiden des Herzens abhängig. Herzklopfen gehört zu den ersten Beri-Beri-Symptomen, eine leichte Beschleunigung des Herzschlages, 75—100 per Minute, die sich nach Bewegung bis auf 90—160 steigern kann, ist ein sehr früh bestehendes Symptom.

Eine leichte Vergrößerung der Herzdämpfung ist später oft nachweisbar, auch eine Verstärkung des diastolischen Pulmonaltones, und in mehr als der Hälfte der Fälle eine Verdoppelung des diastolischen Tones.

Post mortem findet man das rechte Herz stets hypertrophisch und dilatirt, oft gesellt sich Hypertrophie des linken Ventrikels dazu. Wo aber diese Hypertrophie und Dilatation des rechten Herzens klinisch nachweisbar ist, sind die Störungen der elektrischen Erregbarkeit in dem N. peroneus und dessen Muskel — es mag die Bewegungsstörung mehr oder weniger deutlich sein — schon lange da.

Dennoch ist jetzt der Kranke in grosser Gefahr. Viele, ja die Meisten, gehen dann an acuter Herzinsufficienz zu Grunde. Wir sahen in einer Stunde die Dämpfung formidabile Grenzen annehmen und den kurz vorher anscheinend gesunden Kranken erbrechen und unter Symptomen von Präcordialangst mit relativer Tricuspidalinsufficienz, pulsirenden Venen, Lungenödem etc. zu Grunde gehen.

Dergleichen Fälle hat man im Auge, wenn man von peracuter B.-B. spricht. Die elektrische Untersuchung hätte aber schon vor Wochen das Leiden verrathen können. Beri-Beri verläuft immer schleichend. Die schnellsten Fälle, die wir sahen, in sechs bis acht Wochen.

Bei solchen Herzen ist nun Hydrops pericardii und Hydrops in anderen serösen Höhlen oft anwesend, auch Eiweiss kann später in dem Urin vorkommen.

Was aber im Herzen leidet, das ist nicht das interstitielle Gewebe. Es kamen in unseren Beobachtungen mit einzelnen Ausnahmen nie multiple Zellenanhäufungen vor. Es sind hier wieder die Nerven und die Muskelzellen, die anatomisch krank gefunden werden. Wenden wir uns jetzt zu diesen anatomischen Veränderungen.

Untersucht man z. B. einen N. peroneus mit seinen Endästen in Osmiumsäure, so wird man meistens im Stande sein, alles demonstrieren zu können, was von Nervendegeneration, und vieles, was von Nervenregeneration bekannt ist. Einfache klumpige Degeneration wird man in den Muskelästen wohl noch stets vorfinden, dazwischen auch die rosenkranzförmigen degenerirten Fasern, mit

Kernvermehrung und den Buckeln, welche mit der eigenthümlichen schaumartigen Masse gefüllt sind, und worin der Axencylinder sich der Beobachtung entzieht. Mehr nach dem Centrum hin wird man (die schnell in 6—8 Wochen tödtenden Fälle ausgenommen) so ziemlich alle Bilder wiederfinden, die Gombault als „neurite periaxile“ beschrieben hat. Wir glauben diese letzteren Bilder als Regenerationszeichen ansehen zu müssen.

In nahezu allen, sei's Haut- oder Muskelnerven, kann man diese Degenerationsbilder auffinden. Je früher diese Nervendegeneration die N. phrenici oder N. intercostales befällt, desto früher tritt der Tod durch Athmungsparalyse ein.

Aber auch die feinen und stärkeren im Herzmuskel verlaufenden markhaltigen Nervenfasern werden oft in grosser Ausdehnung degenerirt gefunden, und diese Degeneration wird wohl mit in Betracht gezogen werden müssen bei der Deutung der stürmischen Herzsymptome.

Querschnitte durch die in Bichromat-Ammoniak gehärteten Nerven, nach Weigert's Hämatoxylin-Methode, mit Picrocarmin —, und mit Kernfärbstoffen behandelt, bestätigen die Resultate des Zerzupfens.

Bilder, wie sie z. B. von Oppenheim gezeichnet sind, sind sehr gewöhnlich, und es liegen uns Schnitte vor vom N. popliteus, wo 4—5 schwarze Punkte im gelben Nervenbündelquerschnitt alles ist, was an intacten Nervenfasern über geblieben ist. Ist die Läsion so weit vorgeschritten, so findet man auch leichte Verdickung der Gefässwandungen. Auch die eigenthümlichen knolligen Gebilde (wohl verschlossene Gefässe), die Oppenheim beschrieb, haben wir getroffen. Wo aber das Leiden nicht so weit vorgeschritten ist, ist von Entzündung, von Kernanhäufung um die Gefässe nicht die Rede. Das Leiden ist eine einfache Nervendegeneration.

Die vordere Rückenmarkswurzel und in nicht zu weit vorgeschrittenen Fällen auch die höheren Nervenstämme sind intact. In einigen sehr lang bestanden Fällen stiessen wir auf eine leichte rosenkranzförmige Schwellung einiger Axencylinder in den vorderen Wurzeln.

Die hinteren Wurzeln werden ebenso intact gefunden. Einmal fanden wir das Wurzelstück zwischen Ganglion intervertebrale und Rückenmark intact, während das Stück zwischen Ganglion und der Vereinigungsstelle mit der motorischen Wurzel stark atrophirt war. Das Ganglion war fast immer intact.

Einmal auch fanden wir in der fünften hinteren Lendenwurzel und einem Theile der ersten Sacralwurzel beiderseits einen totalen Schwund markhaltiger Nervenfasern. Das zugehörige Ganglion war unglücklicher Weise nicht conservirt. Im zugehörigen Rückenmark fand sich eine doppelte aufsteigende Degeneration, die ihren Platz auf verschiedenen Höhen wechselte, wie dies bei durchschnittenen hinteren Wurzeln bekannt ist, und spurenweise bis zu den Kernen des Fun. gracilis zu verfolgen war.

Es war dieser der einzige Fall, wo ein entschiedenes Rückenmarksleiden gefunden ist. Und doch sind 10 Rückenmark ganz genau untersucht.

Es ist wahr, dass, wie Fiebig angab, der Centralcanal sehr oft durch Zellen geschlossen ist, doch kommen auch Fälle vor, wo dies selbst in der Lendenschwellung nicht der Fall ist. Ebenso findet sich oft eine leichte Hyperämie der grauen Hörner. Amyloidkörperchen kommen gewöhnlich der Randzone entlang vor, und zuweilen dringen sie mit den hinteren Wurzeln eine kleine Strecke in das Rückenmark ein.

Mittelst Weigert's Methode gefärbt, findet man auch in weit vorgeschrittenen Fällen die eintretenden Wurzelfasern, so wie die Netze in den Hörnern, und die Plexus der Clarke'schen Säulen so vollkommen und schön, wie man es nur wünschen kann.

Auch an den grossen multipolären Nervenzellen sind in den schnell verlaufenden Fällen keine besonderen Aenderungen zu constatiren. Dort aber, wo das Leiden länger bestanden hat, haben wir zwischen gut erhaltenen Zellen der Lendenschwellung alle die Dinge constatiren können, deren pathologische Natur man sowohl angenommen als bestritten hat. Einmal Vacuolenbildung in 4 bis 5 Zellen in einem Präparat, dann Wandstellung der Kerne, oft vieles Pigment, und auch in gut gelungenen Carminpräparaten Atrophie der Zellen mit Verlust der Ausläufer. Aber zwischen diesen sind immer viele gut erhaltene Zellen aufgefunden.

Auf die in jüngster Zeit aufgeworfene Hypothese, ob multiple Neuritis vielleicht centraler Natur sein sollte, können wir des grossen Materials ungeachtet keine bestimmte Antwort geben. Wir selbst glauben, dass das fragliche oder doch jedenfalls geringfügige Mitleiden der grossen Zellen des Vorderhorns in vorgeschrittenen Krankheitsfällen von secundärer Art ist; es möchte auch das ausgebreitete Mitleiden von Gefühlsnerven Bedenken erregen, dass eine primäre Affection der grossen Nervenzellen des Vorderhorns ohne Weiteres vorliegt, und übrigens ist irgend ein Leiden des Rückenmarkes nach unseren Erfahrungen nicht anzunehmen.

Dass nun diese multiple Neuritis einen infectiösen Charakter haben würde, war a priori wahrscheinlich. Beri-Beri kommt in gewissen Küstengegenden epidemisch und endemisch vor, und auch an verschiedenen hochgelegenen Orten, dort aber niemals in grösserer Verbreitung, sondern nur in bestimmten Gebäuden, hauptsächlich Gefängnissen und Kasernen. Oft wird die Mannschaft von Schiffen, welche sich einige Zeit an einer Küste aufgehalten haben, wo Beri-Beri herrscht, von der Krankheit ergriffen, sodass man wohl annehmen muss, die Krankheitsursache habe vom Lande ihren Weg nach dem Schiffe gefunden. Ist doch die Lebensart und Ernährung der Mannschaft vor und nach dem Aufenthalt an der Küste dieselbe, und öfters breitet sich die Krankheit auf dem Schiffe noch immer aus, lange nachdem dasselbe die Küste verlassen hat.

Bekanntlich liegen dann auch schon Mittheilungen vor von Laçerda und von Ogata über Bacillen, welche sie aus dem Blute und aus Organen von Beri-Beri-Kranken haben züchten können, und mittelst welcher sie bei Thieren Lähmungserscheinungen, wie diese bei Beri-Beri beobachtet werden, hervorgerufen haben. Leider waren die Originalabhandlungen dieser Autoren uns bis jetzt nicht zugänglich. Einstweilen müssen wir uns also auf die Besprechung unserer eigenen Resultate beschränken.

Im Blute Beri-Beri-Kranker, welche noch lebten in der Umgebung wo die Krankheit herrschte, entnommen, haben wir immer Mikroorganismen gefunden, und zwar in verschiedener Form, Stäbchen und Mikrococcen. Letztere oft als Diplococcen, nicht selten aber auch ganz regellos im Gesichtsfelde verbreitet.

Die Stäbchen waren meistens kurz und dünn, weder die Länge noch die Dicke war constant. In demselben Präparate fanden sich oft Stäbchen von verschiedener Länge und Dicke, und dabei noch Mikrococcen neben einander vor. Bisweilen waren diese Mikroorganismen in grosser Menge im Blute zu finden, bisweilen aber auch nur in sehr geringer Zahl. Bei derselben Person fanden wir niemals mehrere Tage hinter einander eine grössere Menge. Wurde ein Kranker, dessen Blut gleich nach seiner Aufnahme in's Spital eine grosse Zahl Bacterien enthielt, nach ein paar Tagen wieder untersucht, dann wurden diese nunmehr sehr vermindert vorgefunden. Entfernung aus der Umgebung, wo die Krankheit herrscht, verursachte bald das Schwinden der Bacterien aus dem Blute. Bei verschiedenen Personen, bei welchen wir in Atjeh das Vorhandensein von Bacterien im Blute festgestellt hatten, konnten wir, nachdem sie einige Wochen in Batavia zugebracht hatten, keine Mikroorganismen mehr auffinden. Auch bei Kranken, welche noch heftige Krankheitserscheinungen darboten, fehlten sie, wenn sie wenigstens einige Wochen vorher evacuirt waren.

Die Anwesenheit dieser Organismen als eine Folge der Krankheit zu betrachten, schien nicht erlaubt. In Atjeh fanden sie sich im Blute von Personen, welche nur äusserst geringfügige oder selbst gar keine Krankheitssymptome zeigten. Das Vorkommen der Bacterien geht der Krankheit voraus, oder wird bisweilen nicht einmal von bemerkbaren Krankheitserscheinungen gefolgt. Dass bei Gesunden, welche nicht in einer Umgebung leben, wo Beri-Beri herrscht, diese Bacterien sich nicht im Blute vorfinden, davon haben wir uns in Batavia wiederholtlich überzeugen können.

In den Organen von Leichen von Beri-Beri-Kranken, welche kurz nach dem Tode untersucht wurden, haben wir nie mit Sicherheit Bacterien gefunden.

Die bacteriologische Untersuchung von Leichen bietet aber, wie leicht begreiflich, in den Tropen so viele Schwierigkeiten, dass wir dieselbe, als wir uns erst davon überzeugt hatten, dass von einer Anhäufung von Bacterien in irgend einem Organe oder Gewebe keine Rede war, beinahe ganz unterlassen haben.

Beim Züchten von Bacterien aus dem Blute von Beri-Beri-Kranken stiessen wir auf verschiedene Schwierigkeiten. Doch gelang es, in einer Anzahl von Fällen Culturen zu bekommen.

Die zuverlässigste Methode war, ein Reagensrohr mit Fleischwasser-Pepton-Gelatine mit einem Blutstropfen zu inficiren, und dann die Gallerte, während des Festwerdens, über die innere Oberfläche des Röhrchens auszubreiten. (Wenn die Gelatine nicht gekocht, sondern einige Male auf 80° erhitzt und dann schnell auf Eis abgekühlt wird, kann man eine Nährgelatine erhalten, welche bei 31° vollkommen fest bleibt.)

So wurden, wie es nach dem mikroskopischen Befunde nicht zu verwundern war, verschiedene Formen von Bacterien gezüchtet. Auf eine Beschreibung dieser verschiedenen Formen wollen wir hier aber nicht eingehen, viel weniger jetzt schon die Frage berühren, ob sie vielleicht verschiedene Wuchsformen derselben Art, oder aber wohlunterschiedene Species darstellen.

Hier erwähnen wir nur diejenige Form, die wir am häufigsten gefunden haben, einen Mikroccoccus, welcher auf Agar-Agar eine milchweisse, nahezu undurchscheinende Cultur bildet, mit glatter Oberfläche, welcher Gelatine langsam verflüssigt und dabei nur sehr wenig im Stichcanal wächst, welcher bei genügendem Sauerstoff-

zutritt in schwach alkalischer Bouillon gut wächst und dabei deren Reaction nicht nennenswerth ändert.

Mikroskopisch zeigen sie sich theilweise als Diplococcen, theilweise in unregelmässigen Gruppen, deren Zellen nicht alle genau gleich gross sind. Wahrscheinlich sind diese Zellen im Stande, eine Dauerform zu bilden, wiewohl es uns bis jetzt noch nicht gelungen ist, davon mikroskopisch irgend ein Zeichen aufzufinden.

Sie sind nämlich sehr widerstandsfähig gegen Eintrocknen. Mit Bouilloncultur imprägnirte Seidenfäden konnten Tage lang über Schwefelsäure getrocknet werden, ohne ihre Keimfähigkeit einzubüssen.

Diese Mikroccocci sind im Stande, bei Kaninchen und bei Hunden eine multiple Nervendegeneration hervorzurufen, und dürfen also wohl als Ursache der Beri-Beri betrachtet werden.

Von 7 Kaninchen und 4 Hunden, welche mit diesen Bakterien inficirt wurden, erkrankten 6 Kaninchen und 2 Hunde an Degeneration verschiedener Nerven, und zwar wurden auch hier in Uebereinstimmung mit der Beri-Beri beim Menschen in erster Linie die Nerven der hinteren Extremitäten betroffen. Hautödem fanden wir bei unseren Versuchsthiere in keinem Falle, wohl aber bisweilen geringes Oedem zwischen den Muskeln der Hinterpfoten und einen geringen Grad von Hydrops pericardii.

Ein Kaninchen, welches deutliche Parese der hinteren Extremitäten zeigte, starb an Lähmung der Athemmuskeln, ein zweites wurde unerwartet todt im Käfig gefunden. Bei den übrigen 4 war während des Lebens, ausser einiger Trägheit in den Bewegungen und Abmagerung, nichts Abnormes zu beobachten, während doch nach der Tödtung ausgebreitete Nervendegeneration gefunden wurde. Darüber braucht man sich aber nicht zu verwundern, weil man doch auch beim Menschen, bei dem die Beurtheilung etwaiger Bewegungsstörungen so viel leichter ist, bei Beri-Beri oft kaum irgend eine Gehstörung findet, ungeachtet bedeutender Degeneration von Nerven und Muskeln. Beide Hunde zeigten beim Leben deutliche Parese der Hinterpfoten.

Die Infection geschah gewöhnlich mittelst Injection von Bouilloncultur oder von in indifferenten Salzlösung zertheilten Agarculturen unter die Haut oder in die Bauchhöhle.

Die Einspritzungen wurden bei allen Fällen wiederholt gemacht, mit Zwischenräumen von einem oder einigen Tagen, bisweilen auch alltäglich.

Hat doch die Erfahrung beim Menschen gelehrt, dass Niemand an Beri-Beri erkrankt, wer nicht längere Zeit, gewöhnlich einige Wochen, dem schädlichen Einflusse ausgesetzt gewesen ist, und die bacteriologische Untersuchung des Blutes hatte schon die Vermuthung nahe gelegt, dass die darin lebenden Bakterien gegen den menschlichen Organismus einen schweren Kampf zu führen haben.

Gewiss wird auch der Effect einer einmaligen Infection mit diesen Bakterien studirt werden müssen — uns aber war es, weil sowohl unsere Zeit als die Zahl der Versuchsthiere, über welche wir verfügen konnten, beschränkt war, allererst geboten, der Lösung der principiellen Frage nachzustreben, ob diese Bakterien als Ursache der Beri-Beri betrachtet werden dürfen.

In der Bauchhöhle entstand in Folge der Injectionen höchstens eine leichte fibrinöse Peritonitis, unter der Haut aber riefen sie, bei Hunden sowohl wie bei Kaninchen oft Abscesse hervor. Dass aber die Eiterung nicht als Ursache der Nervenentartung betrachtet werden durfte, zeigte sich daraus, dass bei anderen Kaninchen, bei welchen durch die Injection anderer Bakterien unter die Haut ebenso multiple Abscesse hervorgerufen wurden, jene Entartung fehlte.

Ausserdem — und damit wird wohl jeder Zweifel aufgehoben sein — wurde multiple Nervendegeneration bei zwei Kaninchen dadurch verursacht, dass die Culturen der beschriebenen Mikroccocci nicht eingespritzt, sondern einfach täglich in den Käfig, worin die Thiere lebten, ausgegossen wurden.

Weiter könnte gezeigt werden, dass in Gebäuden, worin Beri-Beri entsteht, Bakterien vorkommen, welche diese Krankheit verursachen. Bei zwei Kaninchen wurde einige Male ein Gemenge von Bakterien aus der Luft einer Kaserne, wo Beri-Beri herrschte, in die Bauchhöhle eingespritzt, und bei beiden Thieren entwickelte sich darauf multiple Nervenentartung. Aus dem Blute dieser Thiere konnten wieder Mikroccocci cultivirt werden, welche den aus dem menschlichen Blute erhaltenen vollkommen gleich waren.

Indem wir es also für bewiesen halten, dass diese Mikroccocci als Ursache der Beri-Beri betrachtet werden müssen, ist damit keineswegs gesagt, dass es nicht noch andere Bakterien geben wird, welche den nämlichen schädlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit ausüben können.

Vielmehr halten wir es für wahrscheinlich, dass, ebenso wie Eiterung, auch multiple Nervendegeneration von verschiedenen Bakterien verursacht werden könne.

Das ist aber von untergeordneter Bedeutung für die Bekämpfung der Krankheit. Hauptsache ist, dass die Beri-Beri eine Infections-

krankheit ist, und dass man in der Desinfection der Gebäude, wo die Krankheit herrscht, das Hauptmittel zur Bekämpfung derselben suchen muss. Wahrscheinlich findet sich der Infectionsstoff in gewissen niedrigen Gegenden, so wie Atjeh, auch im Boden vor, und dann ist die Bekämpfung schwieriger. Dennoch hat auch in Atjeh die Krankheit bedeutend nachgelassen, sowohl an Intensität als an Extensität, seit man, schon bevor wir nach Indien kamen, angefangen hatte, dort alle Kasernen gründlich zu desinficiren, und die Desinfection monatlich im kleineren Maassstabe zu wiederholen.