tentierten Verfahren von *Keller* (Stuttgart) kann die alkalische Kocherlauge durch Zusatz von Kalk wieder verwendbar gemacht werden.

Literatur.

H. Keller, Wiederverwendbarmachen der zum Abkochen von Baumwolle und Baumwollwaren in der Baumwollbleiche benutzten alkalischen Flüssigkeiten. Chem. Zeitg. 1909, chem.-techn. Repert., S. 627, Wasser und Abwasser 1912/13, Bd. 6, S. 319, Nr. 429.

Besprechungen.

Einstein, Albert, und Marcel Großmann, Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1913. 38 S. Preis M. 1,20.

Die Frage nach dem Wesen der Gravitation hat zwei Jahrhunderte geschlafen. *Newton*, der das Gesetz der Gravitationswirkung festgestellt hatte, hat sich keineswegs damit beruhigt, sondern das Bedürfnis gefühlt, die merkwürdige, über den leeren Raum wirkende Attraktionskraft in ihrem Wesen näher zu ergründen. Aber die folgenden Generationen standen vor der gewaltigen Aufgabe, die Folgerungen des Gesetzes an der Fülle der astronomischen Erscheinungen zu prüfen; die Größe der hierzu nötigen Arbeit und die Freude über den Erfolg sättigten die Geister. Das Newtonsche Gesetz galt als letzte Erkenntnis, alle anderen Naturgesetze sollten darauf zurückgeführt werden; nur ganz selten fühlte ein Forscher den Trieb, das Gesetz selbst als etwas Merkwürdiges, der Erklärung Bedürftiges auf tiefere Grundlagen zu stellen.

Die neuere Physik hat es aufgegeben, alle Naturgesetze auf Attraktionskräfte Newtonscher Art zurückzuführen. Die Ideen der „Nahwirkung“, welche *Faraday* und *Maxwell* bei der Deutung der elektromagnetischen Vorgänge geleitet haben, haben sich so bewährt, daß eine unvermittelte Fernwirkung heute als fast abstrus erscheint. Ein Nahwirkungsgesetz bringt zum Ausdruck, daß nur unmittelbar benachbarte Stellen eines Körpers aufeinander wirken können; es hat die mathematische Form einer partiellen Differentialgleichung. Zweifellos befriedigt ein solches Gesetz den menschlichen Geist mehr, als die Vorstellung, daß eine Wirkung zeitlos den leeren Raum überspringen soll. Typische Nahwirkungsgesetze sind die elastischen Bewegungsgleichungen. Vor allem aber läßt sich die Gesamtheit unserer elektrodynamischen Erfahrungen in befriedigendster Weise durch Nahwirkungsgesetze darstellen.

Nur die Gravitation selbst fällt aus dem Rahmen der heutigen Anschauung heraus. Wohl läßt das Newtonsche Gesetz sich formal in ein Nahwirkungsgesetz umrechnen; schon *Maxwell* aber hat erkannt, daß die Deutung der Nahwirkungsforneln erhebliche Schwierigkeiten bietet, indem sich die Gravitationsenergie als negativ erweist, wenn man nicht dem von Gravitationskräften freien Raume eine gewaltige positive Energie zuschreiben will.

Der Drang nach Vereinheitlichung der Naturgesetze, welcher *A. Einsteins* ganzes Forschen kennzeichnet, hat ihn auf das Gravitationsproblem hingedrängt. Nachdem es ihm gelungen war, durch Aufstellung des sogenannten Relativitätsprinzips in die Elektrodynamik Ordnung und Einheit zu bringen, mußte es ihm unerträglich erscheinen, daß eine so universelle Naturkraft wie die Gravitation sich dem Gefüge der übrigen Gesetze entzog. Er hat dann in

Wetteifer mit anderen Forschern, unter denen vor allem *Abraham*, *Nordström* und *Mie* zu nennen sind, eine Theorie der Gravitation entwickelt, die an Kühnheit seine früheren Taten weit hinter sich läßt. Eine Skizze dieser Theorie, an deren mathematischer Ausgestaltung sich Herr *M. Großmann* beteiligt hat, liegt in einer bei B. G. Teubner erschienenen Broschüre vor.

Von dem Inhalte dieser Abhandlung dem Nichtfachmann ein Bild zu machen, ist außerordentlich schwer; ich muß mich mit wenigen Andeutungen begnügen.

Einsteins Ausgangspunkt ist eine ganz konkrete Tatsache, die ihrer Einfachheit wegen wenig beachtet, doch durch die genannten Beobachtungen (besonders von *B. Eötvös*) sichergestellt ist. Man kann sie so aussprechen: Träge Masse und schwere Masse sind proportional. Die träge Masse ist ein Maß für den Widerstand, den die Körper beschleunigenden Wirkungen entgegensetzen; die schwere Masse ist ein Maß für die Kraft, die die Körper an derselben Stelle des Gravitationsfeldes erfahren (ein Körper ist z. B. doppelt so schwer als der andere, wenn er, auf eine Federwage gelegt, diese doppelt so stark komprimiert als der andere). Nun weiß man: alle Körper fallen im Vakuum gleich schnell, ihre Beschleunigungen unter der Schwerkraft sind gleich. Daraus folgt, daß im selben Verhältnis, als ein Körper schwerer ist (eine größere schwere Masse hat), sein Trägheitswiderstand (seine träge Masse) zunimmt. *Einstein* bekennt seine Überzeugung, daß dieses Gesetz in aller Strenge erfüllt sei.

Wie kommt es nun aber, daß dieses einfache Gesetz sich nur mühsam, unter Aufbietung eines gewaltigen mathematischen Apparates, mit der Forderung einer Nahwirkungstheorie der Gravitation vereinigen läßt? Dies liegt an zwei Sätzen, die die moderne theoretische Physik als ihre fundamentalsten Erfolge betrachtet und an denen *Einstein* ebenfalls festhalten will. Der erste dieser Sätze lautet: Trägheit und Energie sind identisch; der zweite lautet: Energie ist ein relativer Begriff. Um den Inhalt dieser Behauptungen zu verdeutlichen, muß ich an gewisse Resultate der Relativitätstheorie anknüpfen. Die Betrachtung eines von elektromagnetischer Strahlung erfüllten Hohlraumes hat zuerst gelehrt, daß der elektromagnetischen Energie Trägheit zugeschrieben werden muß; man sieht nämlich leicht ein, daß die in dem Hohlraum befindliche Strahlung sich einer Beschleunigung desselben widersetzt, indem dabei der Strahlungsdruck auf die Hinterwand steigt, der auf die Vorderwand sich verringert. Die Verallgemeinerung dieses Umstandes, die durch das Relativitätsprinzip nahegelegt wurde, hat dazu geführt, Energie jeder Art Trägheit zuzuschreiben; und zwar ist die träge Masse numerisch gleich der durch das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit dividierten Energie. Die hierdurch gewonnene Vereinheitlichung der Begriffe und Erkenntnis neuer Zusammenhänge sind so groß, daß man an diesem Satze unbedingt festhalten wird. Der zweite Satz von der Relativität der Energie ist am besten zu verstehen, wenn man an die kinetische Energie einer bewegten Masse denkt; diese ist offenbar in dem Sinne relativ, daß ihr Wert von der Bewegung des Beobachters abhängt. Die kinetische Energie wird gemessen durch das Produkt der halben Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit; die Geschwindigkeit ist aber offenbar relativ, sie ist z. B. für einen mitbewegten Beobachter gleich Null. Das Relativitätsprinzip verlangt nun eine solche Relativität für jede Art von Energie; diese

ist keine absolute Größe, sondern sinkt zu einer Komponente einer übergeordneten physikalischen Größe (des Energie-Spannungstensors) herab.

Kombinieren wir nun diese beiden Sätze mit der Forderung, daß schwere und träge Masse übereinstimmen sollen, so folgt daraus sofort die Identität der schweren Masse mit der Energie und ihre Relativität. Jede Art Energie, auch elektromagnetische oder die Gravitationsenergie selbst, muß also schwer sein; ihr Wert aber ist nur relativ zu einem bestimmten Beobachter anzugeben. Hieraus erhellt, welche Schwierigkeiten der neuen Theorie entgegenstehen; die schwere Masse verliert gewissermaßen ihren substantiellen Charakter und verflüchtigt sich zu einem mathematischen Hilfsbegriffe.

Einstein hat erkannt, daß alle seine Forderungen sich nur aufrechterhalten lassen, wenn man die strenge Gültigkeit des Relativitätsprinzips in endlichen Räumen aufgibt; es gilt nur noch im unendlich kleinen (wobei aber, da als Längenmaß der vom Lichte in einer Sekunde zurückgelegte Weg anzusehen ist, noch ganz gewaltige astronomische Räume als physikalisch unendlich klein zu gelten haben). Hat man zwei verschiedene Raumstellen, so gilt in der unmittelbaren Umgebung einer jeden noch das Relativitätsprinzip, aber mit zwei verschiedenen Werten der Lichtgeschwindigkeit (die ja bekanntlich die Relativitäts-Transformationen charakterisiert). So ist also die Lichtgeschwindigkeit als räumlich veränderlich anzusehen. Einstein hat bereits in seiner ersten Arbeit über diesen Gegenstand den Schritt getan, die veränderliche Lichtgeschwindigkeit mit derjenigen Raumfunktion zu identifizieren, um die es sich hier handelt: dem Gravitationspotential. Man sieht, wie hier eine Vereinheitlichung und Verschmelzung von Größen scheinbar äußerst verschiedener Art mit großer Kühnheit vorgenommen wird. Die neue Theorie erlaubt einen so einfachen Ansatz (Lichtgeschwindigkeit = Gravitationspotential) nicht; es zeigt sich, daß die Gravitation bei Aufrechterhaltung aller der genannten Forderungen sich gar nicht aus dem Potential ableiten läßt, sondern daß dazu ein vierdimensionaler Tensor (mit 10 Komponenten) nötig ist. Dieses, in jedem Raumpunkte vorhandene Tensorgebilde ist das Gerüst der ganzen Theorie. Raum und Zeit im gewöhnlichen Sinne verschwinden ganz; sie sind nur definiert relativ zu dem Gravitationstensor, jeder Raum-Zeit-Punkt hat gewissermaßen sein eigenes Maß für Länge und Zeit je nach dem dort herrschenden Schwerfeld. Alle Gesetze der Physik haben nur eine relative Geltung bezüglich des Gravitationstensors. Die Aufstellung der Bewegungsgesetze der Materie gemäß diesen Ideen wird von Einstein mit großem Scharfsinn durchgeführt; das umgekehrte Problem, wie das Schwerfeld von der vorhandenen Materie abhängt, findet keine so befriedigende Lösung.

Es ist ganz unmöglich, an dieser Stelle eine Vorstellung von den äußerst komplizierten Gesetzen zu geben, die nach Einstein den Zusammenhang der Gravitation mit der Bewegung der Materie und der Elektrizität darstellen. Nur auf einen Punkt der Theorie will ich noch hinweisen. Bekanntlich erfordert das gewöhnliche Trägheitsgesetz, damit es überhaupt einen Sinn hat, die Angabe eines Bezugssystems; wie nun dieses Bezugssystem zu definieren sei, darüber hat es manchen Streit gegeben. Das Trägheitsgesetz enthält fraglos den Begriff der absoluten Beschleunigung, und dies ist von vielen als ein Mangel der Mechanik, die sonst nur relative Wirkungen kennt, empfunden wor-

den. Auch die neue relativistische Mechanik hat daran nichts geändert.

E. Mach hat darum in aller Bestimmtheit die Forderung gestellt, daß aus der Mechanik die absoluten Beschleunigungen zu verbannen seien; auch die Trägheit soll eine von der Gesamtheit der übrigen Körper bedingte Wirkung sein. Einsteins Theorie erfüllt nun, wie der Autor besonders hervorhebt, diese Forderung von Mach.

Einsteins Theorie ist neuerdings von Mie angegriffen worden, der selbst eine Gravitationstheorie aufgestellt hat. Ich kann auf diese Polemik hier nicht eingehen. Bezüglich der Mieschen Theorie will ich nur sagen, daß in dieser die strenge Proportionalität zwischen schwerer und träger Masse aufgegeben wird; die Forderung wird auf kleine Geschwindigkeiten beschränkt. Dafür gewinnt Mie den Vorteil, das Relativitätsprinzip in vollem Umfange aufrechtzuerhalten. Sehr bemerkenswert sind auch die Ansätze Nordströms.

Gibt es nun zwischen allen diesen Theorien eine experimentelle Entscheidung?

Leider liegen die Verhältnisse hierfür sehr wenig günstig; die Abweichungen der Theorien voneinander und von der klassischen Fernwirkungstheorie Newtons sind praktisch bedeutungslos. Nur eine Erscheinung gibt es, von der man eine Entscheidung erwarten könnte. Nach der Einsteinschen Theorie hängt nämlich, wie wir sahen, die Lichtgeschwindigkeit vom Gravitationspotential ab; nach Mie ist das nicht der Fall. Daher muß nach Einstein ein Lichtstrahl, der von einem Fixstern kommend nahe an der Sonne vorbeigeht, durch die gewaltige Gravitationswirkung eine Ablenkung erfahren. Einstein hofft, daß die nächste totale Sonnenfinsternis Gelegenheit geben wird, nach einer solchen Ablenkung zu suchen.

Auch wenn dieses Experimentum crucis fehlschlägt, sei es, daß die Ablenkung sich der Beobachtung entzieht, sei es, daß sie als sicher nicht vorhanden nachgewiesen wird, wird man Einsteins kühner Theorie die Bewunderung nicht versagen können. Die ungeheure Kraft der Abstraktion und Verallgemeinerung, die ihr Autor darin offenbart, können auf den Leser, der vor der Komplikation der Formeln nicht zurücksteht, ihre Wirkung nicht verfehlen. M. Born, Göttingen.

Allen, H. Stanley, *Photo-Electricity, the liberation of electrons by light, with Chapters on Fluorescence, Phosphorescence and photochemical Actions and Photography*. London, Longmans, Green and Co., 1913. Preis 7 sh. 6 p.

Dies Buch behandelt ein physikalisches Spezialproblem, nämlich die Abspaltung von Elektronen bei der Absorption des Lichtes und eine Reihe weiterer mit dieser Elektronenemission verknüpfter Fragen. Es ist im wesentlichen nach chronologischen Gesichtspunkten geschrieben und gibt eine im allgemeinen recht objektive Darstellung von der Entwicklung dieses Gebietes, dessen Literatur einen außerordentlich großen Umfang besitzt, so daß eine zusammenfassende Monographie von erheblichem Werte ist.

Die lichtelektrische Elektronenemission bietet in mancher Hinsicht auch für weitere Kreise ein Interesse: Sie liefert uns nach den Untersuchungen Elsters und Geitels ein neues photometrisches Meßverfahren, das sich in letzter Zeit mit Erfolg in die Praxis, z. B. in der Astronomie, einbürgert und vielleicht ist sie in Zukunft einmal zur Lösung des großen Problems berufen, die Energie des Sonnenlichtes direkt in elektrische Energie umzusetzen, ohne daß irgendwelche

mechanische Zwischenglieder erforderlich sind. Der Nutzeffekt beträgt allerdings heute selbst in den günstigsten Fällen nur einige Prozent, aber die Möglichkeit einer Steigung der Ausbeute ist durchaus nicht von der Hand zu weisen.

R. Pohl, Berlin.

Feldhaus, Franz M., Leonardo der Techniker und Erfinder. Jena, Eugen Diederichs, 1913. 8°. 166 S., 131 Abb. und 9 Tafeln im Text. Preis geh. M. 7,50, geb. M. 10,—.

Der Verfasser des vorliegenden Buches hat es sich bekanntlich zur Lebensaufgabe gemacht, die Geschichte der Technik zu pflegen. Eine große Anzahl Veröffentlichungen aus seiner Feder haben bereits erkennen lassen, daß er alle Eigenschaften in sich vereinigt, um diese Aufgabe nach Möglichkeit zu lösen.

In dem hier angezeigten Werk bietet er dem Leser eine Monographie von klassischer Wichtigkeit. *Leonardos* Universalität ist ja freilich jedem Deutschen wohl vertraut, aber doch mehr durch allgemeine biographische Schilderungen und nicht auf Grund eingehender Darstellungen der spezifisch technischen Gedankenwelt dieses Mannes, der in sich gleichsam den Grundstock aller gelehrten, künstlerischen und technischen Bildung seines Zeitalters vereinigte.

Feldhaus' Werk gibt uns in nicht ermüdendem Umfang einen Einblick in *Leonardos* technischen Gedankenkreis. Der *Künstler Leonardo* war wie keiner seiner Vorläufer besonders befähigt, seine technischen Entwürfe in die Weltsprache der Ingenieure, die Zeichnung, umzusetzen. So ist es in vielen Fällen zugleich ein künstlerischer Genuß, eine Auswahl der Entwürfe des Meisters der *Giaconda* hier vereinigt zu sehen.

Auch auf dem Sondergebiet der Technik ist *Leonardo* universell. Alle möglichen Fragen haben ihn beschäftigt: fortifikatorische und ballistische Probleme, Maschinen und Werkzeuge, feinmechanische und musikalische Instrumente, Uhren und chemische Apparate, Schwimmvorrichtungen und Taucheranzüge, Fallschirme und Flugmaschinen. Mit letzteren hat sich *Leonardo* recht eingehend beschäftigt; die hierauf bezüglichen Skizzen sind für unser Zeitalter von besonderem Interesse. Als geeignetes Modell für die Flügel empfiehlt er die der Fledermaus, als bewegende Kraft sollen die Beinmuskeln der Flieger dienen. Man erinnert sich unwillkürlich daran, daß auch *Benvenuto Cellini* den Bau der Fledermaus nachahmen wollte, um aus der Engelsburg zu entfliehen.

Es sei noch besonders hervorgehoben, daß der Verlag dem Buche eine besonders würdige Ausstattung in bezug auf Druck und Abbildungen gegeben hat.

F. Göpel, Charlottenburg.

Moritz, F., Les Moteurs thermiques dans leurs rapports avec la Thermodynamique. Paris, Gauthier-Villars, 1913. 297 S., 115 Abbildungen und 1 Tafel. Preis Frs. 13,—

Der Verfasser geht in seinem Werke von der Behandlung der beiden Hauptsätze der Thermodynamik aus und bespricht sodann die wärmetechnischen Grundlagen der Verbrennungsmaschinen, Kolbendampfmaschinen und Dampfturbinen. Er bemüht sich den Stoff derart zu verarbeiten, daß für das Verständnis des Werkes nur allgemeine physikalische Vorkenntnisse erforderlich sind.

Die ersten beiden Abschnitte befassen sich mit den Hauptsätzen der Thermodynamik und deren Anwendung auf die wichtigsten Zustandsänderungen der Gase und Dämpfe. Den Darlegungen liegt immer die Be-

trachtung umkehrbarer Vorgänge zugrunde, nur für diese sind die mitgeteilten Gleichungen und Folgerungen gültig. Auf Seite 16 steht: „Toutes les transformations que nous envisagerons dans cet ouvrage seront supposées réversibles.“ Demgegenüber muß betont werden, daß die Zustandsänderungen in den Dampfturbinen nichts weniger als umkehrbar sind! Ebenso wenig darf der Verbrennungsvorgang kurzerhand als umkehrbar bezeichnet werden! Bei der Behandlung des II. Hauptsatzes hätte die Rolle der Entropie als Kriterium für die Umkehrbarkeit eines Vorganges Erwähnung finden sollen.

Während die ersten beiden Abschnitte einer Ergänzung und Berichtigung bedürfen, bieten die folgenden Kapitel manches Interessante und Beachtenswerte. Das III. Kapitel befaßt sich mit den Verbrennungsmaschinen, wobei zunächst die „Explosion“ ohne und mit Vorverdichtung, dann das Gleichdruckverfahren und schließlich die sog. „atmosphärische“ Maschine behandelt wird. Dabei wird allerdings überall konstante spezifische Wärme angenommen. Der Vergleich zwischen Verbrennung bei konstantem Volumen und bei konstantem Druck wird auf etwas einseitiger Basis geführt und wäre in dieser Form besser unterblieben.

Im IV. Abschnitt (Kolbendampfmaschinen) wird zunächst der Idealvorgang nach *Rankine* im Arbeits- und im Wärmediagramm in klarer Weise besprochen, sodann werden die verschiedenen Verluste erörtert.

Das V. Kapitel hat die Strömung des Dampfes durch Düsen zum Gegenstand. Nach Aufstellung der Hauptgleichungen wird die Strömung mit und ohne Berücksichtigung der Reibungswiderstände besprochen. Die eigentümliche Rolle der „Schallgeschwindigkeit“ wird klar hervorgehoben.

Der VI. Abschnitt behandelt in ausführlicher Weise die Thermodynamik der Dampfturbinen — hauptsächlich im Anschlusse an die Arbeiten von *Stodola*, *Rateau* und *Lelong*. Der Verfasser erörtert die Arbeitsweise der wichtigeren Bauarten, wobei der Verlauf der Wirkungsgrade in graphischen Darstellungen klar veranschaulicht wird. Für die praktische Berechnung werden gut brauchbare Verfahren entwickelt, u. a. wird eine von *Parsons* herrührende Formel abgeleitet, die den Dampfverbrauch von Überdruckturbinen zu errechnen gestattet. Bei den Berechnungen wird stets das Temperatur-Entropie-Diagramm benutzt, das *Mollier*-Diagramm wird nur kurz erwähnt. Schade, daß der Verfasser nicht versucht hat, die wirkliche Arbeit im *p/v*-Diagramm darzustellen! Die Nichtumkehrbarkeit des Expansionsvorganges tritt nämlich dabei besonders deutlich hervor. Im übrigen kann gerade dieser Abschnitt, da er auch mehrere Zahlenbeispiele bringt, zum Studium bestens empfohlen werden.

Am Schlusse des Bandes werden noch einige Hilfsprobleme kurz behandelt: die Integration eines Differentials von zwei unabhängigen Variablen, die Schallgeschwindigkeit in Gasen und schließlich der Impulssatz.

Die Darstellung ist überall klar und anregend. Das Buch ist geeignet, den Leser mit den wichtigsten thermodynamischen Grundlagen der Kraftmaschinen vertraut zu machen.

G. Zerkowitz, Aachen.

Astronomische Mitteilungen.

Ein neuer Komet, der erste in diesem Jahre, ist am 29. März auf der Sternwarte Bothkamp bei Kiel von dem Astronomen und Leiter der Sternwarte