- 2) die verschiedene Löslichkeit dieses Salzes (0,121 Th. in 100 Th. Wasser von 16°) gegenüber der von Waage*) für leucinsaures Zink angegebenen (0,333 Th. in 100 Th. Wasser von 16°).

Und schliesslich die Schmelzpunktsdifferenz der freien Säuren. Es schmilzt die Isobutylhydroxyessigsäure bei 56°, die Leucinsäure dagegen nach Waage*) bei 73°. Nahe liegend aber ist die Identität der untersuchten Säure mit der von Erlenmeyer und Sigel**) und Ley***) aus Isovaleralaldehyd, Blausäure und rauchender Salzsäure dargestellten α -Hydroxyisobutyllessigsäure, $(\text{CH}_3)_2\text{CH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$, deren Schmelzpunkt von den genannten Forschern übereinstimmend bei 54 bis 55° angegeben wird.

13. Ueber Benzylchlormalonsäureester, Benzyltartronsäure und Phenylmilchsäure;

von M. Conrad.

Nach verschiedenen Beobachtungen sind chemische Verbindungen möglich, in welchen neben einem halogenen Element an einem und demselben Kohlenstoffatom auch noch ein Metallatom sich befindet.

Derartige Körper, wie das *Kaliummonobromnitroäthan*,

*) Diese Annalen **118**, 295.

) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft **7, 1109.

***) Daselbst **10**, 231.

das von V. Meyer*) beschrieben wurde, und die von F. Al-
lihn**) dargestellten gechlorten *Metallacetessigester*,

sind indessen sehr wenig beständig. Das Verhalten des ge-
chlorten Malonsäureesters in dieser Beziehung kennen zu lernen,
mußte für mich nach den in den vorherigen Abhandlungen
erwähnten Thatsachen von besonderem Interesse sein.

Beim Zusammenbringen des Monochlormalonsäureesters
mit einer alkoholischen Natriumäthylatlösung konnte entweder
das Chlor herausgenommen werden und eine durch folgende
Gleichung ausgedrückte Umsetzung stattfinden :

Oder es war die Möglichkeit vorhanden, daß die Haftenergie
des halogenen Elementes größer ist als die des Kernwasser-
stoffatoms und letzteres daher ebenso wie bei den mono-
alkylsubstituirten Malonsäureestern durch Natrium substituirt
wird :

Da aber eine solche Metallverbindung sehr leicht zur
Entstehung anderer complicirterer Verbindungen führen mußte
und in der That auch zur Bildung eines bereits in einer vor-
läufigen Mittheilung*) erwähnten eigenthümlichen, nur Kohlen-
stoff im Kern haltenden Esters Veranlassung gab, so wurde
vorerst, um die Existenz eines Natriumchlormalonsäureesters

*) Diese Annalen **171**, 49.

) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft **12, 1298.

***) Daselbst **13**, 2161.

nachzuweisen und dieselbe zugleich für neue Synthesen auszunutzen, in der nachfolgenden Weise verfahren.

Zu einer gut abgekühlten Lösung von 4,6 g Natrium in 70 g absolutem Alkohol wurden 38,8 g des bei 222° siedenden Chlormalonsäureesters gebracht und nach einigem Umschütteln, wobei eine Temperaturerhöhung um einige Grade zu beobachten war, zur klaren Lösung 26 g Benzylchlorür hinzugefügt. Nach kurzer Zeit trat Abscheidung von Chlornatrium ein, die Flüssigkeit erwärmte sich ziemlich stark und reagierte nach halbstündigem Kochen auf dem Wasserbad neutral. — Durch Wasserzusatz wurden aus der Reactionsmasse 40 g eines farblosen chlorhaltigen Oels abgeschieden, von dem 32 g zwischen 295 und 310° übergingen. Die Hauptmasse destillierte bei 305. Die Analyse der bei dieser Temperatur siedenden Flüssigkeit ergab :

0,2370 g Substanz lieferten 0,1364 H₂O und 0,5134 CO₂.

	Berechnet für C ₁₄ H ₁₇ ClO ₄	Gefunden
C	59,06	59,08
H	5,98	6,39.

Der *Benzylchlormalonsäureester*, $(C_2H_5OCO)_2C \begin{smallmatrix} \diagup Cl \\ \diagdown C_7H_7 \end{smallmatrix}$, stellt eine farblose, ähnlich wie Benzylmalonsäureester riechende Flüssigkeit dar, die in Wasser unlöslich, mit Weingeist und Aether leicht mischbar ist. Das spezifische Gewicht desselben ist 1,150 bei 19° gegen Wasser von 15°. Der Ester siedet bei 305°, jedoch unter theilweiser Zersetzung und Entwicklung von Salzsäure und Kohlensäure. Es empfiehlt sich daher denselben behufs Reindarstellung im Vacuum zu destilliren. Seine Dämpfe reizen die Augen zu Thränen.

Mit Berücksichtigung der theilweisen Zersetzung des Esters und der sonst bei seiner Darstellung nicht zu umgehenden Verluste scheint die Umsetzung zwischen Chlormalonsäure-

ester, Natriumäthylat und Benzylchlorür nur im Sinne folgender Gleichung vor sich gegangen zu sein :

Um den Ester zu verseifen und das Chloratom durch die Hydroxylgruppe zu ersetzen, wurde derselbe mit der ein-
halbfachen Menge des hierfür erforderlichen Kalihydrats zu-
sammengebracht und nachdem die Mischung sich von selbst
erwärmt hatte, die Reaction durch nur einige Minuten dauern-
des Erhitzen auf dem Wasserbad beendet. Das mit Salzsäure
neutralisirte Verseifungsproduct wurde, um etwa noch vor-
handenen unzersetzten Ester zu entfernen, mit Aether ausge-
schüttelt und alsdann durch weiteren Säurezusatz daraus eine
weiße krystallinische Substanz ausgeschieden, die sich leicht
in Alkohol, Aether und heissem Wasser löste und nach mehr-
maligem Umkrystallisiren einen constanten Schmelzpunkt bei
131° ergab. Hierdurch und durch die Analyse wurde dieselbe
als *Zimmtsäure* erkannt.

0,1779 g Substanz gaben 0,0840 H₂O und 0,4745 CO₂.

	Berechnet für C ₉ H ₈ O ₂	Gefunden
C	72,97	72,74
H	5,40	5,25.

Die von der Zimmtsäure abfiltrirte saure Lösung wurde
mit Ammoniak neutralisirt und mit Chlorbaryum versetzt, wo-
durch ein Niederschlag entstand, der mehrmals mit Wasser
ausgekocht wurde, um die letzten Reste von Zimmtsäure in
Form von zimmtsauerm Baryum in Lösung zu bringen. Das
gut ausgewaschene, in heissem Wasser unlösliche Baryumsalz

wurde mit Salzsäure versetzt und die hierdurch entstandene klare Lösung mehrmals mit Aether extrahirt.

Der nach dem Verdunsten des Aethers gebliebene feste Rückstand wurde aus Wasser und Alkohol wiederholt umkrystallisirt und schließlic in schönen, bei 143° schmelzenden Prismen erhalten.

0,1210 g der bei 100° getrockneten Substanz gaben 0,0520 H₂O und 0,2580 CO₂.

Hieraus berechnet sich die Formel C₁₀H₁₀O₅.

	Berechnet	Gefunden
C	57,14	57,02
H	4,76	4,77.

Die so gewonnene *Benzylhydroxymalonsäure* (*Benzyltartronsäure*), $\begin{matrix} \text{COOH} \\ \text{COOH} \end{matrix} > \text{C} < \begin{matrix} \text{OH} \\ \text{C}_7\text{H}_7 \end{matrix}$, als welche die analysirte Substanz nach der Art ihrer Entstehung angesprochen werden muß, krystallisirt in farblosen glasglänzenden Prismen, die in Wasser, Alkohol und Aether sich leicht lösen und bei 143° unter Zersetzung und Entwicklung von Kohlensäure schmelzen. Durch den Nachweis der Zimmtsäure einerseits, der Benzyltartronsäure andererseits, ist klar, daß der Benzylchlormalonsäureester durch Kalilauge nach zwei verschiedenen Richtungen Zersetzung erleidet :

In ähnlicher Weise verläuft auch die Verseifung des Benzylchlormalonsäureesters mit Barythydrat. Zu diesem Behufe wurde der Ester mit einer zur Bildung von Baryumcarbonat, Chlorbaryum und zimmtsaurem Salz hinlänglichen Quantität

Barytwasser in einem kupfernen Kessel am Rückflusskühler ungefähr 10 Stunden gekocht. Die Lösung wurde heifs filtrirt und der entstandene Niederschlag mit Wasser wiederholt ausgekocht, wobei sich nur wenig Salz löste, das beim Erkalten wieder schön krystallinisch sich ausschied und nichts anderes als zimmtsaurer Baryum war, aus dem durch Ansäuern mit Salzsäure die bei 131° schmelzende *Zimmtsäure* leicht rein erhalten werden konnte. Das auch in kochendem Wasser unlösliche Salz löste sich in verdünnter Salzsäure unter schwacher Entwicklung von Kohlensäure sehr leicht auf und diese Lösung gab an Aether eine schön krystallinische Säure ab, die sich durch ihren Schmelzpunkt und Abspaltung von Kohlensäure als *Benzyltartronsäure* erwies.

Es verlaufen also auch bei der Verseifung des Benzylchlormalonsäureesters mit Barythydrat zwei verschiedene Zersetzungserscheinungen neben einander; jedoch die Menge der Zimmtsäure, die schon bei der Verseifung mit Kalihydrat nur spärlich entsteht, ist hier eine noch geringere.

Zur näheren Charakterisirung der Benzyltartronsäure können noch folgende Angaben gemacht werden.

Das *Ammonsalz* dieser Säure giebt in wässriger Lösung mit *Chlorbaryum* einen weissen krystallinischen Niederschlag;

Chlorcalcium giebt in der Kälte erst auf Zusatz von Ammoniak eine Fällung;

Aluminiumsulfat, *Magnesium-* und *Mangansulfat*, *Kobaltnitrat*, *Eisenchlorid* und *Quecksilberchlorid* geben keine Niederschläge;

Kupfersulfat erzeugt einen hellgrünen flockigen Niederschlag;

Zinksulfat oder besser *Zinkacetat* ruft in concentrirten Lösungen schöne nadelförmige Krystallabscheidungen hervor;

Silbernitrat giebt einen weissen krystallinischen Niederschlag, der in heissem Wasser ziemlich leicht löslich ist;

Bleiacetat erzeugt mit der Lösung sowohl des Ammonsalzes als auch der freien Säure dicke weisse Flocken.

Wie alle Malonsäuren wird auch die Benzyltartronsäure beim Erhitzen auf 160 bis 180° zersetzt unter Entwicklung von Kohlensäure und Hinterlassung eines Syrups. Derselbe wurde mit in Wasser suspendirtem Baryumcarbonat so lange gekocht, bis die Flüssigkeit neutral reagirte.

Um etwaige Nebenproducte daraus zu entfernen, wurde die vom überschüssig zugesetzten kohlensauren Salz abfiltrirte Lösung mit Aether ausgeschüttelt und dann auf dem Wasserbad eingengt und so ein in Wasser leicht lösliches, in kugelförmigen Aggregaten krystallisirendes atlasglänzendes Salz erhalten, dessen Krystallwasser- und Metallgehalt zur Formel des *phenylmilchsauren Baryums* von der Zusammensetzung $(C_9H_9O_3)_2Ba + H_2O$ führte.

0,1245 g Substanz lufttrocken verloren bei 110° 0,0040 H_2O .

	Berechnet für $(C_9H_9O_3)_2Ba + H_2O$	Gefunden
H_2O	3,71	3,21.

0,1205 g des bei 110° getrockneten Salzes gaben 0,0604 $BaSO_4$.

	Berechnet für $(C_9H_9O_3)_2Ba$	Gefunden
Ba	29,33	29,47.

Die Baryumsalzlösung giebt mit Silbernitrat, Kupferacetat und Quecksilberchlorid keinen Niederschlag, Bleiacetat giebt eine im Ueberschufs des Fällungsmittels lösliche Ausscheidung.

Wird das mit Salzsäure angesäuerte Baryumsalz mit Aether extrahirt, so erhält man daraus nach dem Verdunsten des letzteren eine schöne krystallinische Substanz, die bei der Analyse für die Formel $C_9H_{10}O_3$ stimmende Werthe ergab.

0,1284 g Substanz lieferten 0,0710 H_2O und 0,2935 CO_2 .

	Berechnet für $C_9H_{10}O_3$	Gefunden
C	65,06	64,87
H	6,02	6,33.

Die so erhaltene *Phenylmilchsäure*, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{COOH}$, krystallisirt aus Wasser in großen dicken glänzenden Prismen, die bei 98° schmelzen, und ist entschieden identisch mit der von Erlenmeyer*) aus Phenyläthylaldehyd und Blausäure mit Salzsäure dargestellten Säure. Ihre Entstehung aus Benzyltartronsäure ist sehr leicht zu verstehen :

Nach dem Mitgetheilten dürfte die Reaction, die ursprünglich nur zum Zweck des Nachweises der Existenz eines *Natriumchlormalonsäureesters* ausgeführt wurde, auch als die einfachste und ergiebigste Darstellungsweise der *Benzyltartronsäure* und β -*Phenyl- α -hydroxypropionsäure* in Anwendung zu bringen sein. — Die bisher angestellten Versuche in analoger Weise aus Chlormalonsäureester durch Natriumäthylat und Alkylhalogenverbindungen die betreffenden Chloralkylmalonsäureester und daraus weiter die Alkyltartronsäuren und Alkylhydroxyessigsäuren darzustellen, waren nicht von Erfolg begleitet.

*) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft **13**, 303.