III. Ein neues *Dialypetalum* aus Madagascar.

Von Dr. A. Zahlbruckner.

(Originaldiagnose.)

***Dialypetalum compactum* A. Zahlbr., nov. spec.**

Herba elata, erecta, lactescens, in parte superiore parce et breviter ramosa; caule subterete, plus minus striato, viridescente, glaberrimo, nitidulo, fistuloso, medulla alba membranacea farcto; foliis alternantibus, suberectis, internodiis multum longioribus, breviter petiolatis — petiolo glabro, compresso — anguste oblongis, utrinque acutis, versus apicem caulis sensim minoribus, in margine tenuiter incrassato incurvuloque denticulata, dentibus sat crebris parvisque, obtusiusculis et calloso-glandulosis, lamina membranacea, plana, utrinque glaberrima, supra fusciscenti-viridescente, opaca, creberrime et minute punctulata, nervatura impressa, subtus pallidiore, viridi, nitida, epunctulata, costa crassiuscula, pallescente, nervis secundariis 11—13, tenuibus, sub angulo semirecto assurgentibus et ante marginem arcuatim connexis; racemis numerosis, terminalibus (et in ipso caule et in apicibus ramorum brevium parce foliosorum), multi- et densifloris, cylindricis, rectis, rachide subtereti, striatulo, glaberrimo, lactescente; bracteis subulatis, integris, glabris, pedicellis parum longioribus; pedicellis compressiusculis, basi subdecurrentibus, glabris, ebracteolatis, patentibus, plus minus curvatis vel fere rectis; calycis tubo turbinato, parvo, glabro, 10-nervo; lobis calycis 5, liberis, subaequalibus, anguste triangularibus, acutiusculis, integris, glabris, leviter excavatis; petalis circ. 3-plo brevioribus; lobis corollae liberis, aequalibus, flavescentibus, ligulatis, replicatis, apice acutis, integris, basi versus in margine minute pilosis, caeterum glabris, uninervis; filamentis a petalis liberis, apice solum connatis, linearibus, compressis, extus et imprimis ad margines pilis brevibus, albis, mollibus dense vestitis; tubo antherarum corollae exserto, brevi, glabro, coerulescente, antherarum 2 minoribus vertice brevissime setulosis, 3 majoribus nudis; stigmate incluso, globoso.

Petioli 4—6 mm longi; folia caulina 12—13 cm longi et 0,1—0,12 cm lati, folia superiora 2 cm longa et 6—7 mm lata; bracteae 3,5—4 mm longae et basi 0,5—0,7 mm latae; racemi 4—6 cm longi et 13—15 mm crassi; pedicelli ad 2 mm longi; lobi calycis 1—1,5 mm longi et basi 0,7—0,8 mm lati; lobi corollae 4—4,5 mm longi et ad 1 mm lati.

Madagascar: Tananarivo (Hildebrandt, no. 4095).

Von *Dialypetalum floribundum* Benth. durch die völlige Kahlheit der vegetativen Teile, durch die dichten, walzlichen Trauben, durch die kürzeren Kelchabschnitte und durch die zurückgeschlagenen Petalen verschieden und durch diese Merkmale leicht kenntlich.