Vereines (vom Vereinssekretär Koltz), aus der sich ergibt, dass der Verein sein vorzügliches Augenmerk auf Kryptogamen und Pflanzenfossilien richten will, da die Phanerogamenflora wenig mehr zu wünschen übrig lasse. 2. Eine Aufzählung der Phanerogamen, welche im Grossherzogthum seit der Veröffentlichung von Tinant's Flora von Luxemburg (1836) entdeckt worden sind. (Gleichfalls von Koltz.) 3. Einen Abdruck aus der „Bot. Zeit. 42. 1873 über *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. von Dr. P. Ascherson,“ da der Standort („in rupibus prope Befort“) dieses Zwergfarns im Gr. H. L. gelegen ist, und die seltene Pflanze neuerdings von Koltz an zwei Stellen aufgefunden wurde. Darauf folgt 4. nach brieflicher Mittheilung von Dr. Rossbach eine Abhandlung: „Ueber eine zweifelhafte, vielleicht neue *Saxifraga*,“ welche zur 7. Rotte (*Dactyloides*) Koch's gehörig, näher mit *S. caespitosa* L. (*decipiens* Ehrh.) und *S. sponhemica* Gm. (*confusa* Lej.), als mit *S. hypnoides* L. verwandt, aber doch auch von beiden ersteren deutlich verschieden sei. In ausführlichen Tabellen werden die Unterschiede hervorgehoben. Dem schliesst sich an 5. Stelle an ein „Catalogue des plantes vasculaires de la flore du Gr. D. de Luxembourg“ von Koltz, worauf 6. eine Notiz über die berühmte Linde von Schimpach folgt. Schliesslich ersucht der Verein um Beiträge an Material für die Sammlungen: ältere Herbarien, Publikationen, die sich auf L. beziehen, Pflanzen, welche in diesem Lande gefunden werden, die fossilen nicht ausgeschlossen, sind namentlich erwünscht. Dem schönen Unternehmen ist recht viel Theilnahme zu wünschen.

W.

Correspondenz.

Erlau in Ungarn, am 3. Dezember 1874.

Im Jahre 1869 brachte mir ein am hiesigen Gymnasium Studirender etliche Zweige des *Viscum album* mit der festen Behauptung, dass er selbes an Eichen um den Teich bei Felső Tárkány nächst Erlau gesammelt habe. Ich liess daher mehrere Exemplare sammeln und verschickte selbe an meine Korrespondenten, die Eiche als Substrat angehend. Als ich aber viel später irgendwo las, dass das *Viscum* auf Eichen nicht vorkommt, fasste ich einen Verdacht, begab mich auf den erwähnten Standort und fand das *Viscum*, nach Durchstreifen der ganzen nächsten Umgebung, nicht auf einer einzigen Eiche, sondern in Menge auf *Populus nigra* schmarotzend, überzeugt über die Richtigkeit der Behauptung, dass *Viscum* auf Eichen nicht vorkommt. Ich ersuche demzufolge jene Herren Botaniker, welche das *Viscum* von mir besitzen, auf der Etiquette statt: in quercubus ganz richtig: in Populo nigra zu setzen. — Auch Herr Dr. A. Kerner in seinen Vegetationsverhältnissen, Oesterr. bot. Ztschr. XX, 236, verleitet durch meinen Irrthum, gibt das *Viscum* bei Felső

Tárkany an auf Eichen vorkommend, welcher Fehler jedoch nicht ihm sondern mir zuzueignen ist. Ebenso auf meinem Irrthum beruht die Angabe der *Artemisia camphorata* Vill. auf dem Agárdi bei Erlau. (Kerner's Vegetationsverhältnisse Oest. bot. Z. XXI, 102.) — Ich fand dort zwischen Weingärten nächst einer Hütte einen ziemlich grossen Strauch und sammelte mehrere Aeste in der Blüthe, um solche an meine Freunde zu versenden. — Ich suchte seither jeden Sommer diese *Artemisia* in der ganzen Umgebung, jedoch ohne Erfolg, denn ich fand keine. Endlich auf den Gedanken verfallend, dass sie vielleicht dorthin verpflanzt wurde, stellte sich nach Anfragen bei dem Grundeigenthümer heraus, dass die Artemisie vor mehreren Jahren an jetzigen Standort aus einem Hausgarten versetzt wurde. Es kommt daher keine wildwachsende *Artemisia camphorata* Vill. bei Erlau vor, sondern nur kultivirt.

M. Vrábelyi.

Pola, am 9. Dezember 1874.

Ich habe gestern zum ersten Male *Anemone Hackelii* Pohl vom Originalstandorte zu Gesicht bekommen, und es freut mich, Ihnen nun berichten zu können, dass ich genau dieselbe Pflanze vor zwei Jahren bei Torda in Siebenbürgen gefunden habe. Auch an diesem Standorte kommen *A. Pulsatilla* und *A. patens* (und zwar gewöhnlich in gesonderten Heerden) vor. — In Fuss Flora Transilvaniae wird *A. Hackelii* zwar unter Nr. 41 angeführt, der Autor zitiert hierbei jedoch Schur und macht ausdrücklich die Bemerkungen: „absque loco natali“ und „e patria non vidi.“ — Nunmehr dürfte die Art für Siebenbürgen gesichert sein. Bei dieser Gelegenheit erwähne ich noch, dass ich im vorigen Jahre zwei für Siebenbürgen neue Pflanzen gefunden habe, nämlich *Trifolium incarnatum* L., welches ich in grossen Mengen an der Eisenbahn zwischen Bánffy-Hunyad und Egeres (nahe der Wasserscheide) antraf, und dann *Verbascum Wierzbickii* Heuff., welches am Bahndamme und auf Grasplätzen zwischen Bánffy-Hunyad und Malomszég vorkommt. Für die Flora Ost-Ungarns entdeckte ich ein bis dahin noch unbekanntes botanisches „Dorado“ in der Gegend längs der Eisenbahn zwischen Rév und Bucsa, nämlich da, wo die schnelle Körös die mächtigen Kalkfelsen des Rézgebirges in einem engen Défilé durchbricht. Von den vielen Seltenheiten, welche ich dort zu sammeln so glücklich war, erwähne ich nur *Asplenium lepidum* Presl (die Richtigkeit der Bestimmung wurde von Dr. Kuhn in Berlin konstatirt). — Dieses niedliche Farnkraut kommt in den feuchten Höhlen am Körösflusse bei Rév vor und hat sich auch bereits in einem der drei Bahntunnels anzusiedeln begonnen. — Der erwähnte Standort ist der zweite in Ungarn, nachdem die Angabe Rochel's (vergl. Neilr. Nachträge zur Aufzählung der in Ungarn und Slavonien beobachteten Gefässpflanzen, p. 2) durch Janka ebenfalls Bestätigung gefunden hat. — Zugleich ist aber der Standort bei Rév auch der nördlichste bisher beobachtete und vom nächsten bekannten im Banate über 300 Kilometer entfernt.

J. Freyn.