		Leverrier			Leverrier
$\log D^{(5,6)} = 9,41074.$	$D^{(5,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 0,25748$	$+0,25840$	$\log D^{(6,5)} = 0,028083$	$D^{(6,5)} = +(1+\mu^v). 1,06680$	$+1,07070$
$\log E^{(5,6)} = 0,180453$	$E^{(5,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 1,51514$	$+1,52011$	$\log E^{(6,5)} = 0,7977995$	$E^{(6,5)} = +(1+\mu^v). 6,27768$	$+6,29867$
$\log F^{(5,6)} = 0,157399$	$F^{(5,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 1,43681$	$+1,44167$	$\log F^{(6,5)} = 0,7747452$	$F^{(6,5)} = +(1+\mu^v). 5,95313$	$+5,97363$
$\log G^{(5,6)} = 9,668898.$	$G^{(5,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 0,46655$	$+0,46820$	$\log G^{(6,5)} = 0,286244$	$G^{(6,5)} = +(1+\mu^v). 1,93305$	$+1,94000$
$\lg(-H^{(5,6)}) = 9,61567.$	$H^{(5,6)} = -(1+\mu^{v_I}). 0,41274$	$-0,41417$	$\lg(-H^{(6,5)}) = 0,233013$	$H^{(6,5)} = -(1+\mu^v). 1,71007$	$-1,71615$
$\lg(-K^{(5,6)}) = 9,946286$	$K^{(5,6)} = -(1+\mu^{v_I}). 0,88366$	$-0,88666$	$\lg(-K^{(6,5)}) = 0,563632$	$K^{(6,5)} = -(1+\mu^v). 3,66127$	$-3,67394$
$\lg(-O^{(5,6)}) = 0,095506$	$O^{(5,6)} = -(1+\mu^{v_I}). 1,24597$	$-1,25025$	$\lg(-O^{(6,5)}) = 0,7128522$	$O^{(6,5)} = -(1+\mu^v). 5,16241$	$-5,18947$
$\log P^{(5,6)} = 9,757820.$	$P^{(5,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 0,57256$	$+0,57454$	$\log P^{(6,5)} = 0,375166$	$P^{(6,5)} = +(1+\mu^v). 2,37228$	$+2,38063$
$\log Q^{(5,6)} = 0,056205$	$Q^{(5,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 1,13816$	$+1,14189$	$\log Q^{(6,5)} = 0,6735514$	$Q^{(6,5)} = +(1+\mu^v). 4,71576$	$+4,73149$
$\lg(-R^{(5,6)}) = 9,904368.$	$R^{(5,6)} = -(1+\mu^{v_I}). 0,80236$	$-0,80505$	$\lg(-R^{(6,5)}) = 0,521714$	$R^{(6,5)} = -(1+\mu^v). 3,32441$	$-3,33575$
$\log T^{(5,6)} = 9,802400$	$T^{(5,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 0,63445$	$+0,63662$	$\log T^{(6,5)} = 0,419746$	$T^{(6,5)} = +(1+\mu^v). 2,62873$	$+2,63790$
<hr/>					
$\log D^{(5,7)} = 8,2340.$	$D^{(5,7)} = +(1+\mu^{v_{II}}). 0,01714$		$\log D^{(7,5)} = 8,6018.$	$D^{(7,5)} = +(1+\mu^v). 0,03997$	
$\log E^{(5,7)} = 9,44189.$	$E^{(5,7)} = +(1+\mu^{v_{II}}). 0,27662$		$\log E^{(7,5)} = 9,809681.$	$E^{(7,5)} = +(1+\mu^v). 0,64518$	
$\log F^{(5,7)} = 9,31169.$	$F^{(5,7)} = +(1+\mu^{v_{II}}). 0,20497$		$\log F^{(7,5)} = 9,679484.$	$F^{(7,5)} = +(1+\mu^v). 0,47896$	
$\log G^{(5,7)} = 8,5550.$	$G^{(5,7)} = +(1+\mu^{v_{II}}). 0,03589$		$\log G^{(7,5)} = 8,92278.$	$G^{(7,5)} = +(1+\mu^v). 0,08371$	
$\lg(-H^{(5,7)}) = 8,5934.$	$H^{(5,7)} = -(1+\mu^{v_{II}}). 0,03921$		$\lg(-H^{(7,5)}) = 8,96114.$	$H^{(7,5)} = -(1+\mu^v). 0,09144$	
$\lg(-K^{(5,7)}) = 9,02920.$	$K^{(5,7)} = -(1+\mu^{v_{II}}). 0,10695$		$\lg(-K^{(7,5)}) = 9,39699.$	$K^{(7,5)} = -(1+\mu^v). 0,24945$	
$\lg(-O^{(5,7)}) = 9,13819.$	$O^{(5,7)} = -(1+\mu^{v_{II}}). 0,13746$		$\lg(-O^{(7,5)}) = 9,50598.$	$O^{(7,5)} = -(1+\mu^v). 0,32061$	
$\log P^{(5,7)} = 8,77841.$	$P^{(5,7)} = +(1+\mu^{v_{II}}). 0,06004$		$\log P^{(7,5)} = 9,14620.$	$P^{(7,5)} = +(1+\mu^v). 0,14002$	
$\log Q^{(5,7)} = 9,32935.$	$Q^{(5,7)} = +(1+\mu^{v_{II}}). 0,21347$		$\log Q^{(7,5)} = 9,697138.$	$Q^{(7,5)} = +(1+\mu^v). 0,49790$	
$\lg(-R^{(5,7)}) = 9,09381.$	$R^{(5,7)} = -(1+\mu^{v_{II}}). 0,11468$		$\lg(-R^{(7,5)}) = 9,46360.$	$R^{(7,5)} = -(1+\mu^v). 0,29081$	
$\log T^{(5,7)} = 8,90465.$	$T^{(5,7)} = +(1+\mu^{v_{II}}). 0,08029$		$\log T^{(7,5)} = 9,27244.$	$T^{(7,5)} = +(1+\mu^v). 0,18726$	
<hr/>					
$\log D^{(6,7)} = 0,114259$	$D^{(6,7)} = +(1+\mu^{v_{III}}). 1,30095$		$\log D^{(7,6)} = 9,864703.$	$D^{(7,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 0,73232$	
$\log E^{(6,7)} = 0,620681$	$E^{(6,7)} = +(1+\mu^{v_{III}}). 4,17524$		$\log E^{(7,6)} = 0,371125$	$E^{(7,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 2,35031$	
$\log F^{(6,7)} = 0,6916467$	$F^{(6,7)} = +(1+\mu^{v_{III}}). 4,91639$		$\log F^{(7,6)} = 0,442090$	$F^{(7,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 2,76751$	
$\log G^{(6,7)} = 0,309276$	$G^{(6,7)} = +(1+\mu^{v_{III}}). 2,03834$		$\log G^{(7,6)} = 0,059720$	$G^{(7,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 1,14741$	
$\lg(-H^{(6,7)}) = 0,242603$	$H^{(6,7)} = -(1+\mu^{v_{III}}). 1,74825$		$\lg(-H^{(7,6)}) = 9,993047$	$H^{(7,6)} = -(1+\mu^{v_I}). 0,98412$	
$\lg(-K^{(6,7)}) = 0,478267$	$K^{(6,7)} = -(1+\mu^{v_{III}}). 3,00793$		$\lg(-K^{(7,6)}) = 0,228711$	$K^{(7,6)} = -(1+\mu^{v_I}). 1,69321$	
$\lg(-O^{(6,7)}) = 0,6675483$	$O^{(6,7)} = -(1+\mu^{v_{III}}). 4,65102$		$\lg(-O^{(7,6)}) = 0,417992$	$O^{(7,6)} = -(1+\mu^{v_I}). 2,61814$	
$\log P^{(6,7)} = 0,346421$	$P^{(6,7)} = +(1+\mu^{v_{III}}). 2,22035$		$\log P^{(7,6)} = 0,096865$	$P^{(7,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 1,24987$	
$\log Q^{(6,7)} = 0,499405$	$Q^{(6,7)} = +(1+\mu^{v_{III}}). 3,15795$		$\log Q^{(7,6)} = 0,249849$	$Q^{(7,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 1,77766$	
$\lg(-R^{(6,7)}) = 0,414663$	$R^{(6,7)} = -(1+\mu^{v_{III}}). 2,59814$		$\lg(-R^{(7,6)}) = 0,165107$	$R^{(7,6)} = -(1+\mu^{v_I}). 1,46254$	
$\log T^{(6,7)} = 0,365159$	$T^{(6,7)} = +(1+\mu^{v_{III}}). 2,31824$		$\log T^{(7,6)} = 0,115603$	$T^{(7,6)} = +(1+\mu^{v_I}). 1,30498$	

Hier tritt der Einfluss der Verbesserung, welche an $n, n', \dots a, a', \dots$ um $d\epsilon, d\epsilon', \dots$ willen anzubringen war, merklicher hervor, als bei den Coefficienten der Glieder der ersten Dimension, indem die Unterschiede zwischen den *Leverrier'schen* und unseren Werthen verhältnissmässig grösser erscheinen; doch das ist ganz in der Ordnung, denn die Ansicht der 11 Gleichungen am Schluss des § 6 lehrt, dass bei mehreren unter den Coefficienten $D^{(0,1)}, D^{(1,0)}, E^{(0,1)}, \dots$

das bedeutendste Glied, wenn man ϵ^8 in $\alpha^8 + 4\alpha^{10} + \dots$ auflöst, eine höhere Potenz von α enthält, als bei den Coefficienten $(0,1), (1,0), [0,1], [1,0]$ (wenn man die Gleichungen (2) und (3) § 1 in eine Reihe, nach den Potenzen von α geordnet, auflöst); die höheren Potenzen von α erleiden aber, wenn man a und a' um $d\epsilon$ und $d\epsilon'$ willen verbessert, eine verhältnissmässig grössere Aenderung als die niedrigeren Potenzen.

(Fortsetzung folgt.)

Elemente und Ephemeride des Cometen IV. 1863, berechnet von Herrn Obs. *Engelmann* in Leipzig.

Elemente.

$T = 1863 \text{ Dec. } 29,39535.$

$\pi = 183^\circ 28' 49,7''$
 $\Omega = 105 \quad 3 \quad 18,6$ } Scheinb. Aequin. Oct. 13

$i = 83 \quad 26 \quad 56,8$

$\log q = 0,116592.$

Bewegung: direct.

Mittlerer Ort (R—B):

$\Delta\lambda = -4,77$

$\Delta\beta = -0,2.$

Sie wurden gefunden aus den 3 Leipziger Beobachtungen:

Oct. 11 $14^h 15^m 11^s$ L.Zt. $\alpha = 9^h 46^m 45^s 22, \delta = +30^\circ 22' 7,8''$
 14 14 24 42 $9 \quad 56 \quad 7,58 \quad +31 \quad 24 \quad 0,9$
 15 12 33 58 $9 \quad 59 \quad 7,22 \quad +31 \quad 43 \quad 40,0$

Aus diesen Elementen ist folgende Ephemeride gerechnet;
sie gilt für 0^h mittl. Berl. Zt.:

1863	α	δ	$\log \Delta$	Hell.
Oct. 15	9 ^h 57 ^m 24 ^s	+31° 32' 4"	0,2835	1,00
16	10 0 41	31 53,8		
17	10 4 2	32 15,6		
18	10 7 28	32 37,7		
19	10 10 58	33 0,2	0,2645	1,12
20	10 14 33	33 23,1		
21	10 18 13	33 46,3		
22	10 21 58	34 9,8		
23	10 25 50	34 33,6	0,2451	1,25
24	10 29 47	34 57,7		
25	10 33 50	35 22,1		
26	10 38 0	35 46,7		
27	10 42 16	36 11,6	0,2258	1,39
28	10 46 38	36 36,7		
29	10 51 8	37 2,0		
30	10 55 45	37 27,4		
31	11 0 30	37 53,0	0,2067	1,55
Nov. 1	11 5 22	38 18,8		
2	11 10 23	38 44,6		

Leipzig, 1863 October 17.

1863	α	δ	$\log \Delta$	Hell.
Nov. 2	11 ^h 10 ^m 23 ^s	+38° 44' 6"		
3	11 15 32	39 10,4		
4	11 20 49	39 36,2	0,1883	1,72
5	11 26 15	40 1,8		
6	11 31 50	40 27,2		
7	11 37 34	40 52,4		
8	11 43 27	41 17,4	0,1709	1,90
9	11 49 30	41 42,1		
10	11 55 43	42 6,4		
11	12 2 5	42 30,2		
12	12 8 37	42 53,4	0,1556	2,09
13	12 15 20	43 15,8		
14	12 22 13	43 37,4		
15	12 29 15	43 58,2		
16	12 36 27	44 18,0	0,1404	2,27
17	12 43 48	44 36,7		
18	12 51 17	44 54,3		
19	12 58 55	45 10,7		
20	13 6 42	+45 25,7	0,1295	2,44

Von besonderem Interesse scheint danach der Comet
nicht werden zu wollen.

R. Engelmann.

Schreiben des Herrn Prof. *Bruhns*, Directors der Sternwarte in Leipzig, an den Herausgeber.

Vorgestern theilte der Liebhaber der Astronomie Herr Uhrmacher *Bäcker* in Nauen mir mit, dass er am 9. d. M. in 144° AR und +29° Decl. einen Nebel gefunden habe. Dieser Nebel ist ein neuer Comet und hier beobachtet:

mittl. Leipz. Zt.	α	δ
Oct. 11	14 ^h 15 ^m 11 ^s	9 ^h 46 ^m 45 ^s 22", +30° 22' 7" 8.

Leipzig, 1863 October 12.

Der Vergleichstern aus Bessel's Zone ist reducirt auf die Tab. red. angenommen: 1863 9^h 48^m 11^s 39", +30° 26' 11" 2. Die tägliche Bewegung des Cometen ist:

$$\text{in } \alpha == +1^{\circ} 0, \text{ in } \delta == +0^{\circ} 5.$$

Das Asehen ist das eines verwaschenen Nebels mit einiger nicht ganz centrischen Verdichtung.

C. Bruhns.

Beobachtung des Planeten (79) auf der Josephstädter Sternwarte. Von Herrn *Th. Oppolzer*.

Den von *Watson* in Ann-Arbor entdeckten Planeten habe ich am 6. October wie folgt beobachtet:

m. Josephst. Zt.	app. α	app. δ
Oct. 6	13 ^h 24 ^m 10 ^s	0 ^h 46 ^m 15 ^s 42 (9,204), +7° 16' 12" 9 (0,755)

Der Vergleichstern ist Weisse 0^h, 739, und sein scheinbarer Ort wurde angenommen:

$$0^{\text{h}} 43^{\text{m}} 22^{\text{s}} 93, +7^{\circ} 17' 23'' 7.$$

Die Beobachtung ist das Mittel aus 8 Vergleichungen. Der Planet ist 9,3 magn., viel heller also als 10 magn. Ueber die

Identität dieses Objectes mit dem in Ann-Arbor entdeckten Planeten kann kein Zweifel sein, denn ich habe am 5. Oct. um 9^h 3^h Uhr den Ort desselben in die Charte eingetragen:

$$0^{\text{h}} 47^{\text{m}} 7^{\text{s}}, +7^{\circ} 23' 7.$$

Letztere Position ist ganz roh, aber zeigt in der Bewegung eine genügende Uebereinstimmung mit den amerikanischen Beobachtungen.

Wien, 1863 Oct. 7.

Th. Oppolzer.