II. Hygienisches aus der Augenlinik.

Von
J. Hirschberg.

Zwei Thatsachen scheinen mir in unlösbarem Widerspruch mit einander zu stehen: nämlich einerseits die Gleichgültigkeit, mit welcher das finnige Schweinefleisch, sogar in gouvernementalen Erlassen, behandelt wird; und andererseits das häufige Vorkommen des *Cysticercus cellulosae* im Menschen, sowohl bei der klinischen als auch bei der anatomischen Untersuchung.

Schon Rudolphi giebt an, dass er in Berlin unter 250 jährlichen Obductionen 4—5mal *Cysticercus* zu finden gewohnt sei und Virchow hat eine ähnliche Häufigkeitsziffer constatiert. Leider aber gewinnt es den Anschein, dass bei uns der *Cysticercus cellulosae* an Frequenz zunimmt.

A. v. Graefe hat in 13 Jahren unter einer Anzahl von

circa 80,000 Augenkranken den Cysticercus in den tieferen Gebilden des Auges 80 und einige Male, also ungefähr unter 1000 Patienten 1 Mal beobachtet. Ich habe, nachdem mir schon im vorigen Jahr die ungewöhnliche Häufigkeit des intraocularen Cysticercus auffällig geworden, in den ersten 8 Monaten dieses Jahres unter 2100 neuen Patienten 5 Mal den Cysticercus im Augengrunde beobachtet, also 1 Mal auf ungefähr 420 Patienten, und zwar sind alle diese 5 Patienten dauernd in meiner Beobachtung geblieben, zwei von ihnen (durch Eucleatio bulbi) operirt. Alle 5 Fälle sind aus Berlin selber oder aus der Umgebung.

Die Zunahme der Häufigkeit des intraocularen Cysticercus hat auch schon kurz vor seinem Tode Ewers constatirt, welcher, bei einem kleineren Material als v. Graefe, neun Fälle gleichzeitig in Beobachtung hatte. Auch ist es Herrn Professor Lewin gelungen, von dem so seltenen Hautcysticercus in kurzer Zeit drei Fälle zu beobachten.

Somit können wir die zunehmende Frequenz des Cysticercus als wahrscheinlich ansehen. Da derselbe keineswegs ein gleichgültiger Gast des menschlichen Organismus ist, sondern z. B. im Augengrunde die Function des befallenen Organs fast regelmässig vernichtet; so müssen wir uns nach prophylactischen Maassregeln umsehen. Der Urquell des Uebels fliesst aus dem finnigen Schwein; wenn wir die Zahl der finnigen Schweine durch Ueberwachung herabsetzen, wird *Taenia solium* seltener werden, wird weniger Gelegenheit vorhanden sein, dass ihr Embryo in den menschlichen Organismus gelangt, sich zum Cysticercus auszubilden.