mit heissem Wasser zwei Mal ausziehen und die Colatur durch Kochen zum Extracte eindicken, wieder auflösen, abermals kochen und so zum dritten Male verfahren. Die Auflösung in Wasser hatte nun den eigenthümlichen Geruch der Senna eingebüsst, besass anfangs einen süsslichen brenzlichen, hintennach widrigen Geschmack. Ein Quantum der Auflösung, das einer Drachme Sennesblätter gleichkam, wurde um 8 Uhr Morgens eingenommen und bewirkte ohne Diätbeachtung um 11, 3, 7 Uhr und am andern Morgen um 7 Uhr Abführen.

Infus. sennae (aus $\frac{3}{4}$ *Fol. sennae*) wirkte bei verschiedenen Personen sehr verschieden, es verursachte von zwei bis sieben Ausleerungen.

Als Resultat dieser Versuche ergibt sich, dass:

- 1) die Wirkung der Senna in der Vereinigung ihrer Bestandtheile liegt;
- 2) die Extraction der *Fol. sennae* mit Alkohol zur Bereitung der *Spec. laxant. St. Germain* ohne Nutzen ist;
- 3) Wasser allein nur alles Wirksame aus den Sennesblättern ausziehen kann.

Ueber Tartarus stibiatu8;

von

F. W. Laux in Berlin.

Die Bereitungsweise des Brechweinsteins mittelst Antimonoxys, aus Algarothpulver dargestellt, und mit Chlorwasserstoffsäure behandeltem Weinstein, hat, abgesehen von den Vorzügen, die sie vor anderen Methoden auszeichnet, dennoch manche fatale Umstände im Gefolge, durch welche diese Arbeit zu einer allerdings etwas beschwerlichen und unangenehmen wird. Die grosse Menge Schwefelwasserstoffgas, welche sich bei Erzeugung des Antimonchlorids entwickelt, ebenso auch die den Arbeiter nicht minder belästigenden Dämpfe der zu verjagenden, überschüssigen Chlorwasserstoffsäure sind Uebelstände,

vor denen sich hinlänglich zu schützen nicht immer möglich sein dürfte, obgleich diese Arbeiten im Freien oder unter einem gut ziehenden Rauchfange vorgenommen werden können. Ausser diesen stellt sich aber auch noch bei dem Krystallisiren des Salzes ein anderer heraus, obwohl man denselben gleich von vornherein beseitigt zu haben glaubt; nämlich durch das Vorhandensein kleiner Mengen im Weinstein zurückgebliebener Kalkerde. Bei der Bereitung des obigen Salzes ist mir stets begegnet, dass die Krystalle, welche aus der zweiten und den nachfolgenden Krystallisationen hervorgingen, gelblich gefärbt erschienen und nicht ganz durchsichtig waren, daher durch Umkrystallisiren gereinigt werden mussten, wobei eine kleine Menge eines citronengelben, krystallinischen Pulvers zurückblieb. Dieser Umstand sprach für die Anwesenheit der weinsteinsäuren Kalkerde; die gelbe Färbung liess mich jedoch vermuthen, dass dieselbe noch andere Substanzen enthalten müsse und nahm ich bei einer neuen Arbeit Gelegenheit, dieses Pulver zu sammeln und einer Untersuchung zu unterwerfen.

Nachdem durch die erste Krystallisation der grösste Theil des Brechweinsteins in regelmässigen, reinen und durchsichtigen Krystallen gewonnen war, wurde die Lauge von Neuem abgedampft; die hierdurch erzeugten Krystalle hatten schon ein viel weniger schönes, reines Aussehen, sie wurden jedoch von der Lauge getrennt und diese weiter verdampft. Beim Erhitzen derselben schied sich obenerwähntes Pulver ab, von welchem das Flüssige abgegossen wurde und nachdem Ersteres so lange abgewaschen wurde, bis Schwefelwasserstoffgas keine Reaction in dem Waschwasser mehr zeigte, wurde es getrocknet und mit No. I. bezeichnet bei Seite gelegt. Die zunächst folgenden Krystalle waren wiederum gelblich gefärbt; wurden dieselben durch Erhitzen der Lauge im Wasserbade bei 40—50° R. in derselben wieder aufgelöst, so zeigte sich ebenfalls etwas ungelöstes gelbliches Pulver und aus der davon entfernten Lauge schossen nach dem Erkalten wieder reinere, schönere Krystalle an. Dieselben

Erscheinungen kehrten so oft wieder, als überhaupt noch Krystalle aus der abgedampften Lauge hervorgingen.

Das durch abermaliges Auflösen des Salzes der zweiten und folgenden Krystallisationen abgesonderte Pulver wurde mit dem hierbei schon vorher erhaltenen vereinigt und nachdem es ebenfalls vollständig ausgewaschen und getrocknet war, mit No. II. bezeichnet. Die Sonderung desselben geschah deshalb, um ermitteln zu können, ob die Zusammensetzung beider übereinstimmend oder wesentlich von einander abweichend sei. Ein Gelatiniren, welches bei Gegenwart von Kalkerde am Ende der Arbeit zuweilen vorkommen soll, habe ich hierbei nicht beobachtet; es ist vielleicht deshalb nicht eingetreten, weil der Kalkgehalt ein nur sehr geringer war.

Die qualitative Analyse der beiden Pulver gab folgendes Resultat an anorganischen Bestandtheilen: Antimon, Eisen und Kalkerde, gebunden an eine organische Säure, jedenfalls Weinsteinsäure; Kali war darin durchaus nicht aufzufinden.

Um nun zu erfahren, in welchem Verhältnisse die vorhandenen Substanzen zu einander standen, wurde eine quantitative Untersuchung angestellt, welcher ich jedoch keineswegs Ansprüche auf absolute Genauigkeit und Untrüglichkeit beilege. Die Abweichung der Kalkermengen kann wohl sicher als Beobachtungsfehler angesehen werden und nimmt man an, dass dieselbe als neutrale weinsteinsäure Kalkerde vorhanden war, so ergeben sich für die Weinsteinsäure in derselben die Zahlen = 46,27 und 47,44. Das Pulver wurde folgendermaassen zusammengesetzt gefunden:

No. I.	No. II.
Antimonoxyd = 1,43	Antimonoxyd = 1,43
Eisenoxyd = 5,83	Eisenoxyd = 6,83
Calciumoxyd = 19,83	Calciumoxyd = 20,33
Weinsteinsäure = 46,27	Weinsteinsäure = 47,44
Wasser = 25,06	Wasser = 25,69
<hr/> 93,42.	<hr/> 95,72.

Nimmt man ferner an, dass das Antimon- und Eisen-

oxyd ebenfalls an Weinsteinsäure gebunden waren, so reducirt der Verlust sich auf ein Minimum; derselbe mochte übrigens theilweise wohl davon herrühren, dass das Pulver nur bei sehr gelinder Wärme getrocknet worden war und deshalb leicht noch etwas Feuchtigkeit enthalten konnte.

Nachdem nun die Anwesenheit der Kalkerde unzweifelhaft festgestellt war, interessirte mich zunächst die Quelle derselben und sah ich mich veranlasst, genaue Versuche hierüber anzustellen. Zuerst wurde ein Pulver von gereinigtem Weinstein von der Feinheit, wie man es gewöhnlich zum medicinischen Gebrauche verwendet, mit der vorgeschriebenen Menge Chlorwasserstoffsäure und Wasser behandelt und nach dem vollständigen Auswaschen und Trocknen dasselbe auf Kalkerde geprüft; das gewonnene Resultat war jedoch ein ungünstiges, indem sich die Gegenwart jener noch immer darthun liess. Ein zweiter Versuch mit einem Weinsteinpulver, so fein dasselbe sich nur irgend durch Pulvern und Absieben darstellen lässt, fiel nicht viel günstiger aus; selbst ein dritter mit einem durch Schlämmen des vorigen erhaltenen Pulver gab kein vollkommen genügendes Resultat. Hieraus glaube ich den Schluss ziehen zu können, dass ein einmaliges Behandeln des Weinsteins mit dem zehnten Theile Chlorwasserstoffsäure in den meisten Fällen unzureichend zur gänzlichen Entfernung der Kalkerde und entweder eine grössere Menge jener Säure oder ein zweimaliges Ausziehen mit derselben zur vollständigen Erreichung des beabsichtigten Zweckes nöthig sein dürfte.

Die gegen mich ausgesprochene Vermuthung, ob die in obenerwähntem Pulver vorhandene Säure nicht etwa Traubensäure sei? gab mir Veranlassung zur weiteren Untersuchung nach dieser Seite hin. Leider führte dieselbe zu keinem bestimmten Resultate.

Zur Erreichung jenes Zieles schienen mir das Ammoniak- und das Kalkerdesalz am geeignetesten zu sein, suchte mir daher dieselben darzustellen. Die mit einigen Tropfen Salzsäure bewirkte Lösung des in Rede stehenden

Pulvers wurde dieserhalb, nachdem die metallischen Bestandtheile ausgeschieden waren, mit kohlensaurem Ammoniak versetzt, wodurch sich kohlen saure Kalkerde und eine Verbindung der fraglichen Säure mit Ammoniak erzeugen musste. Ein Theil der letztern wurde nun wieder mit Chlorcalciumlösung versetzt und dadurch das gewünschte Kalksalz hervorgebracht. Mit diesen beiden Salzen glaubte ich nun die Natur der Säure, nach Angabe der chemischen Lehrbücher, ermitteln zu können. Löst man zu diesem Zwecke das zu untersuchende Kalksalz in verdünnter Chlorwasserstoffsäure auf und versetzt die Lösung mit ein wenig kaustischem Ammoniak, so schlägt sich, enthielt das Salz Traubensäure, nach einigen Augenblicken traubensaure Kalkerde in Gestalt von einem weissen, undurchsichtigen, halbkrySTALLINISCHEN Pulver nieder; enthielt es aber Weinsteinsäure, so entsteht kein Niederschlag, wie wohl sich nach einigen Stunden der weinsteinsäure Kalk in durchsichtigen, bestimmbaren Krystallen an die Wände des Gefasses ansetzt. Ein anderes Unterscheidungszeichen hat man ferner darin, dass eine gesättigte Lösung von schwefelsaurer Kalkerde in Wasser, von Weinsteinsäure oder deren Salzen nicht gefällt wird, während die Traubensäure oder deren Salze nach einigen Augenblicken Niederschläge bewirken.

In beiden Versuchen nun erzeugten sich mit jenen Salzen nach kurzer Zeit geringe Niederschläge, welche Erscheinung mich vermuthen liess, dass ich es hier in der That mit Traubensäure zu thun habe.

Um mir jedoch völlige Gewissheit hieüber zu verschaffen, wurden Gegenversuche gemacht; zuerst mit einem gerade vorhandenen, weinsteinsäuren Salze, dem Kalisalze, und der daraus dargestellten weinsteinsäuren Kalkerde. Beide verhielten sich jedoch den Obigen ganz analog, weshalb ich annahm, dass hier ebenfalls Traubensäure vorhanden sein müsse. Es wurde daher ein anderweitiger Versuch angestellt, bei welchem ein richtiges Verhalten der angewendeten Substanzen vorausgesetzt werden durfte; ich bereitete nämlich aus der Weinsteinsäure selbst sowohl

das Ammoniak- als auch Kalkerdosalz, mit welchen ich dann beide erwähnten Proben ausführte. Aber auch hierbei musste ich auf einen günstigen Erfolg verzichten, denn es entstanden in beiden geringe Niederschläge; es bleibt mir daher nur die Annahme übrig, dass sowohl das angewandte weinsteinsäure Kali, als auch die Weinsteinsäure selbst nicht ganz frei von Traubensäure sein konnten.

Weitere Versuche mit dem gelblichen Pulver konnte ich, aus Mangel an Material, leider vorläufig nicht anstellen, hoffe jedoch später Zeit und Gelegenheit zu finden, auf diesen Gegenstand zurückzukommen und selbigen weiter zu verfolgen.

Einfluss der Phosphordünste auf Zinnamalgal;

von
Reinige.

Es war mir einige Zeit hindurch, wohl eine Woche lang, eine auffallende Erscheinung, auf einem Spiegeltische jeden Morgen neue Quecksilberkügelchen, im Ganzen nun etwa gegen 1 Scrupel davon vorzufinden, ohne mir Aufschluss darüber verschaffen zu können, bis mich der Zufall ganz unerwartet auf die wahrscheinliche Entstehung und Lösung des Räthsels führte, welche ich ohne vorerst weitere Versuche oder Proben darüber anzustellen, theils als mir neu erscheinend, theils auch als zu beachtende Warnung einfach hier mittheile. Es bestand lediglich darin, »dass ich seit ungefähr einem Vierteljahre nahe unter dem über dem Tische hängenden Spiegel eine Schachtel mit Phosphor-Streichhölzern zu stellen pflegte, die auf die Metallfolie des Spiegels eingewirkt haben müssen«. — Dass sich das Quecksilber durch irgend einen anderen Zufall bereits ungebunden schon früher in dem Spiegel befunden haben könne, ist nicht wohl anzunehmen, da derselbe bedeutende Transporte abgehalten hat, wobei es jedenfalls herausgefallen sein würde, da ferner gerade nur die Stelle der Folie, wo die