Beobachtung des Merkurs-Durchganges vom 4. November 1868. Von Herrn Dr. Th. Oppolzer.

Die Beobachtung des Merkurs-Durchganges konnte ich an meiner Sternwarte nicht anstellen, da mein grosser Refractor wegen einer Abänderung des mikrometrischen Apparates abgenommen ist. Auf der k. k. Sternwarte wurde mir jedoch bereitwilligst ein 4 zölliger Refractor von *Plössl* (Dialyt) zur Disposition gestellt, und ich war dadurch in die Lage versetzt das Phänomen so gut es bei der ungünstigen Witterung möglich war zu verfolgen. Die Zeitangaben beziehen sich alle auf den Meridian der k. k. Sternwarte.

Die Sonne war während der ganzen Zeit der Beobachtung durch vorbeiziehende Wolken gedeckt und ich konnte deshalb nur ein hinreichend helles Bild erhalten, wenn ich das Blendglas abnahm; die Beobachtung ist daher ohne Anwendung eines Blendglases erhalten und wurde durch die grosse Unruhe in den Bildern wesentlich erschwert. Die Hauptmomente die ich erhielt sind:

Austritt, innere Berührung $22^h 5^m 14^s.5$
 = äussere = $22^h 7^m 56^s.5$.

Beide Angaben sind auf mehr Secunden unsicher. Die Berechnung dieser Momente nach dem Berliner Jahrbuche ergab:

B — R

Austritt, innere Berührung $22^h 5^m 33^s.5$ — $19^s.0$ = äussere = $22^h 8^m 9^s.1$ — $12^s.6$

8 Secunden vor dem Brechen des Lichtfadens schien Mercur gleichsam den Sonnenrand etwas hinauszuschieben, so dass an der Stelle des Austrittes ein nach aussen convexer Lichtfaden den Mercur umschloss und dessen Verschwinden ich als den Moment der inneren Berührung notirte. 17 Secunden nach diesem Momente schienen sich noch beide Scheiben völlig zu tangiren, doch glaube ich, dass das Zerbrechen des Lichtfadens als der richtigste Moment anzusehen ist. Der Ausschnitt, den die Scheibe des Merkurs eine Minute vor der äusseren Berührung in der Sonnenscheibe bildete, schien nicht entsprechend einer runden Scheibe, sondern sehr merkbar conisch, und blieb so kleiner werdend bis zum Moment des Verschwindens.

Während noch Mercur auf der Sonnenscheibe sich projecirte, war um denselben ein circa $3''$ breiter gleichmässig grauer Saum bemerkbar, ob derselbe nicht aber eine optische Täuschung war, wage ich nicht zu entscheiden.

Wien, 1868 November 5. Dr. Th. Oppolzer.

Osservazioni di Cerere e Saffo fatte al Circolo Meridiano dell'Osservatorio di Padova, al tempo della loro opposizione.

(1) C e r e s .

1868	T. M. di Berlino.	α geocentrica.	O. — E.	δ geocentrica.	O. — E.
Agosto 15	$12^h 50^m 2^s.3$	$22^h 22^m 34^s.00$	— $1^s.58$	$-25^\circ 46' 42''.9$	— $6''.0$
21	$12^h 21^m 21^s.1$	$22^h 17^m 28^s.35$	— 1.60	$-26^\circ 22' 19''.7$	— 9.6
27	$11^h 52^m 35^s.8$	$22^h 12^m 17^s.63$	— 1.51	$-26^\circ 52' 41''.4$	— 8.7
30	$11^h 38^m 15^s.1$	$22^h 9^m 44^s.28$	— 1.57	$-27^\circ 5' 35''.8$	— 6.5
Settembre 1	$11^h 28^m 43^s.1$	$22^h 8^m 3^s.76$	— 1.56	$-27^\circ 13' 23''.2$	— 9.9
2	$11^h 23^m 57^s.5$	$22^h 7^m 14^s.01$	— 1.51	$-27^\circ 16' 55''.9$	— 7.1
3	$11^h 19^m 12^s.6$	$22^h 6^m 24^s.80$	— 1.64	$-27^\circ 20' 23''.4$	— 10.3
4	$11^h 14^m 28^s.1$	$22^h 5^m 36^s.15$	— 1.77	$-27^\circ 23' 36''.5$	— 10.5
5	$11^h 9^m 44^s.6$	$22^h 4^m 48^s.44$	— 1.49	$-27^\circ 26' 38''.5$	— 11.0

(81) S a p p h o .

Agosto 27	$12^h 16^m 7^s.3$	$22^h 35^m 53^s.02$	+ 10.05	+ $8^\circ 33' 23''.6$	— 52.7
30	$12^h 2^m 12^s.5$	$22^h 33^m 45^s.57$	+ 9.84	+ $8^\circ 11' 19''.0$	— 52.9
Settembre 1	$11^h 52^m 56^s.0$	$22^h 32^m 20^s.66$	+ 10.04	+ $7^\circ 54' 48''.2$	— 45.3
2	$11^h 48^m 18^s.1$	$22^h 31^m 38^s.57$	+ 10.30	+ $7^\circ 46' 12''.1$	— 47.0
3	$11^h 43^m 40^s.1$	$22^h 30^m 56^s.33$	+ 10.20	+ $7^\circ 37' 14''.2$	— 43.4
4	$11^h 39^m 2^s.3$	$22^h 30^m 14^s.38$	+ 10.05	+ $7^\circ 28' 9''.6$	— 49.1
8	$11^h 20^m 37^s.2$	$22^h 27^m 32^s.50$	+ 10.26	+ $6^\circ 49' 5''.7$	— 48.6
9	$11^h 16^m 2^s.4$	$22^h 26^m 53^s.40$	+ 10.00	+ $6^\circ 38' 39''.8$	— 41.5

Le colonne intestate O. — E. sono dedotte dal confronto delle posizioni osservate colle calcolate nelle Effemeridi di Berlino (Berliner Astronomisches Jahrbuch).

Padova, 1868 Novembre 5.

G. Lorenzoni,
Assistente.