Die Strahlensysteme des Mondes, von Herrn Hofrath Schwabe.

Die Strahlensysteme des Mondes sind eine so räthselhafte Erscheinung, dass zu ihrer Erklärung mehrere Hypothesen aufgestellt wurden. *Schröter* erklärte sie für niedrige Bergadern, und andere Astronomen halten sie für glasartige Laven der Mondvulkane. Beide Ansichten sind jedoch von *Mädler* gründlich widerlegt. *Arago* vermuthet, dass *Nasmyth* der Wahrheit näher kommt, indem er das Ansehen des Kraters *Tycho* und die divergirenden, von seinen Rändern ausgehenden Strahlen mit den sternförmigen Sprüngen vergleicht, die man häufig an Glasscheiben findet, wenn sie durch einen kleinen Stein oder durch eine Flintenkugel durchbohrt wurden. *Mädler* erklärt sie aus einer Veränderung des Bodens durch die Erhebung der Krater, von denen sie ausgehen, wodurch diese Stellen eine grössere Fähigkeit erlangten, das Sonnenlicht zu reflectiren. Aus folgenden Gründen kann ich mich auch dieser letzten Ansicht nicht unbedingt anschliessen. Bekanntlich nehmen die sogenannten Mondmeere und viele andere kleine Stellen, mit dem höhern Stande der Sonne über ihnen, an dunklerer Färbung zu, sind im Vollmonde am dunkelsten und blassen später wieder ab. Diese Veränderungen werden von *Mädler* aus einem Analogon mit unserer Vegetation hergeleitet. Diese Art der

Vegetation nehme ich auch zur Erklärung der Lichtstreifen in Anspruch. Es hält nicht schwer, mit guten Fernröhren bei geeigneter Beleuchtung und hinreichender Geduld sich zu überzeugen, dass zwischen den Lichtstreifen des *Tycho* äusserst zarte, parallele, hellgraue Linien in unzähliger Menge sichtbar werden, die früher nicht da waren und auch wieder früher, als die Lichtstreifen verschwinden. Sie zeigen sich am deutlichsten in der hellen Gegend, die von *Hipparchus*, *Albategnius*, *Werner*, *Aliacensis*, *Stöffler*, *Maurolycus*, *Gemma-Frisius*, *Piccolomini*, *Katharina* und *Abulfeda* umgeben ist, sowie bei *Regiomontanus*, *Hell*, *Gauricus*, *Wurzelbauer*, *Heinsius* und *Landgraf Wilhelm*. In den Meeren und andern dunkeln Stellen habe ich sie noch nie bemerkt. Diese Linien müssen, wenngleich sie äusserst fein sind, dennoch wegen ihrer ungeheuren Menge eine geringe Verdunkelung des Bodens verursachen. Hierdurch glaube ich mich überzeugt zu haben, dass die Lichtstreifen nur dadurch hervortreten, dass ihre Umgebung dunkler wird, sie selbst aber ihre ursprüngliche Helligkeit behalten. Es bleibt freilich immer noch unerklärlich, weswegen diese Art Vegetation in Linien auftritt.

Dessau 1859 Oct. 18.

S. H. Schwabe.

Mondsterne und Sternbedeckungen, beobachtet auf der Göttinger Sternwarte von Herrn A. Auwers.

	Stern	Scheinb. AR.	Fäden		Stern	Scheinb. AR.	Fäden
1858 Jan. 24	17 Tauri	3 ^h 36 ^m 28 ^s 03	5	1858 Febr. 19	Mond I.	2 ^h 34 ^m 28 ^s 25	6
	Mond I.	3 54 26,30	7		δ Arietis	3 3 31,16	7
26	136 Tauri	5 44 25,80	6		τ' Arietis	3 13 2,50	3
	139 Tauri	5 49 12,64	7	21	χ Tauri	4 13 57,65	7
	Mond I.	6 10 51,08	7		ν' Tauri	4 17 49,67	7
	τ Geminorum	7 2 7,92	7		Mond I.	4 38 22,63	7
	δ =	7 11 40,42	7		β Tauri	5 17 20,37	6
27	τ =	7 2 8,01	6		χ Aurigae	5 43 30,61	7
	δ =	7 11 40,46	7	23	k =	6 6 21,55	7
	Mond I.	7 19 39,54	7		48 =	6 19 28,16	3
	β Geminorum	7 36 39,28	6		Mond I.	6 52 39,96	7
28	β =	7 36 39,32	7		ι Geminorum	7 16 56,27	5
	φ =	7 44 50,32	7		ν =	7 27 12,36	7
	Mond I.	8 24 41,86	7	24	ι =	7 16 56,35	7
	60 Cancrī	8 48 12,05	7		ν =	7 27 12,23	7
	ν Cancrī	8 54 27,83	7		Mond I.	7 57 28,73	7
						22 *	