zu demonstriren, die nicht ihrer Krankheit halber von Interesse sind, sondern des Mittels wegen, das ich bei denselben angewandt habe. Es handelt sich nämlich um zwei Fälle von Kehlkopftuberculose, die ich mit Jodol behandelt habe, und die unter der topischen Application dieses erst neuerdings bekannt gewordenen Mittels geheilt sind. Ich möchte mich aber dabei sofort davor verwahren, als wenn ich die gegen diese Krankheit empfohlenen Mittel um ein neues unfehlbares vermehren wollte; im Gegentheil, auch bei dieser Therapie wird die Zahl der nicht geheilten und nicht gebesserten Kranken noch immer die Majorität bilden. Da aber in diesen wie noch in einer Reihe anderer Fälle der momentane Erfolg bei der methodischen localen Anwendung des Jodols ein nicht ungünstiger war, so glaube ich dasselbe um so eher zu weiterer Prüfung empfehlen zu können, als irgend ein weiterer Nachtheil mit diesem Medicament nicht verbunden ist. Denn weder hat das Jodol einen unangenehmen Geruch, wie etwa das Jodoform, mit dem es in der Art der Wirkung übereinstimmt, noch verdirbt es den Appetit, noch erregt es in den Dosen, in denen es local applicirt wird, irgend welche Störungen, die seinen Gebrauch contraindiciren könnten.

Das Jodol oder nach seiner chemischen Constitution Tetrajodpyrrol genannt, da es dem Pyrrol entstammt — einer bei der trockenen Destillation stickstoffhaltiger Substanzen entstehenden, dem Chloroform ähnlich riechenden Flüssigkeit — ist ein hellgelbliches etwas klebrig sich anführendes Pulver, ohne bemerkenswerthen Geruch und auch ohne Geschmack, das von den Herren Kalle & Co. in Biebrich, deren Güte ich das Präparat verdanke, vollkommen rein dargestellt wird und auch an der Luft keinen weiteren Veränderungen unterliegt. Die ersten Veröffentlichungen über dasselbe stammen von den Herren Vulpius und Wolff, welche auf der vorjährigen Naturforscherversammlung zu Strassburg über seine Darstellung u. s. w. berichtet haben. Therapeutisch wurde es zuerst von Mazzoni versucht, der seine Erfahrungen mit demselben bei syphilitischen und lupösen Geschwüren, sowie auch bei fungösen Gelenkkrankheiten schon im vergangenen Jahre mitgetheilt hat²⁾. Späterhin hat Schmidt³⁾ über seine Anwendung in der Chirurgie berichtet, und auch in der Augenheilkunde ist es schon einige Male versucht worden. Da das Präparat sehr reich an Jod ist, wenn es auch in seinem Gehalt an diesem wirksamen Princip dem Jodoform etwas nachsteht, so war es mir von besonderer Wichtigkeit, aus den Versuchen von Marcus zu ersehen, dass es bei den von mir gebrauchten Gaben, ca. 0,1—0,2, ein vollkommen unschädliches Mittel sei; Marcus hatte nämlich bei seinen Versuchen gefunden, dass bei Kaninchen selbst grosse Dosen 0,2—0,24, die direct in das Blut eingeführt wurden, gut und reactionslos vertragen werden. Noch grössere Gaben haben allerdings Temperaturabnahme und Eiweissausscheidung durch den Urin hervorgerufen, Symptome, die bei zunehmender Genesung des Thieres aber wieder verschwanden. Der Tod erfolgte bei sehr grossen Dosen unter Temperaturabnahme und allgemeinen Lähmungserscheinungen, wobei sich durch die Section, selbst bei nur eintägiger Vergiftung eine starke Verfettung der inneren Organe nachweisen liess. Bemerkenswerth wäre nur noch, dass Jod im Urin nach seiner Application auftritt, wie von Mazzoni zuerst berichtet worden; Marcus konnte dasselbe noch nach 5 Wochen in demselben auffinden. Das ist um so interessanter, als das Jodol im Wasser kaum löslich ist. In Alkohol löst es sich dagegen in dem dreifachen Maasse seines Gewichtes auf, während Aether das Pulver in annähernd dem gleichen Volumen aufnimmt. Ein Glycerinzusatz zu der alkoholischen Lösung ruft keine Veränderung in derselben hervor; Schmidt empfiehlt deshalb eine Lösung von 1 Theil Jodol in 16 Theilen Alkohol und 34 Theilen Glycerin, die jedoch für unsere Zwecke zu schwach ist.

Ich habe im Allgemeinen der Pulverform den Vorzug gegeben und habe das Jodol pure in den Kehlkopf eingeblasen, der sich gegen dasselbe absolut reizlos erwies. Die Kranken empfinden gar keinen Schmerz; auch wird kein Husten erregt, ausgenommen wenn etwas von dem Medicament in die Trachea geräth. Das Pulver bleibt eine Zeit lang ruhig auf der applicirten Stelle liegen, erzeugt dabei einen nur ganz geringen Aetzschorf und erst nach und nach wird es von dem Secret weggespült. Unangenehme Empfindungen wurden von keinem der bisher auf diese Weise behandelten 15 Kranken angegeben. Alle litten an Kehlkopftuberculose, und zwar befanden sich die verschiedensten Stadien derselben unter ihnen. Vier litten an tuberculösen Geschwüren der Interarytänoidfalte, fünf an tuberculösen Geschwüren der Stimm- und Taschenbänder, drei an Geschwüren des Processus vocalis, die übrigen an perichondritischen Processen der Aryknorpel und der Epiglottis mit starkem Oedem und oberflächlichen, sowie tiefen Ulcerationen dieser Theile. Dabei waren die Lungen in allen diesen Fällen mitbetheiligt, Lues bei allen vollkommen auszu-

²⁾ Berl. klin. Wochenschrift No. 43, 1885 u. Spallanzani XII. 1885.

³⁾ Berl. klin. Woch. No. 4, 1886.

IV. Ueber die Jodol-Behandlung der Larynx-tuberculose

Von

Dr. W. Lublinski¹⁾.

Gestatten Sie mir meine Herren, dass ich Ihre Aufmerksamkeit für wenige Minuten in Anspruch nehme, um Ihnen einige Patienten

¹⁾ cfr. Diese Wochenschrift 1886, No. 13.

²⁾ cfr. Diese Wochenschrift 1884, No. 16.

³⁾ Vortrag, gehalten und durch Krankenvorstellung erläutert im Verein für innere Medicin am 29. November 1886.

schliessen, bei fast allen im Geschwürsbelag Tuberkelbacillen nachzuweisen. Ich habe den meisten Kranken das Jodol täglich einmal in den Kehlkopf insufflirt, einige Fälle wurden allerdings nur zwei- bis dreimal in der Woche behandelt. Was nun die Wirkung dieser Therapie anbetrifft, so war dieselbe insofern eine befriedigende, als selbst in den ausgesprochensten Fällen die Geschwüre sich meist in kurzer Zeit zu reinigen begannen. Der schmierige eitrig-eitrige Belag verschwand nicht selten vollkommen, der Geschwürsgrund verbesserte sich, es schossen gesund aussehende Granulationen auf, die Schmerzen beim Schlucken liessen nach und die Patienten fühlten sich erleichtert. Namentlich war mir ein Kranker von besonderem Interesse, der mit starker ödematöser Schwellung der Epiglottis und der Aryknorpel, sowie mit ausgebreiteten Geschwüren auf denselben in meine Behandlung gekommen war. Der Geschwürsgrund reinigte sich, das Schluckweh liess nach und der Kranke war wieder im Stande, breiige Nahrung ohne Beschwerden zu sich zu nehmen. Bemerken möchte ich jedoch, dass man wohl auch mit Tannin und ebenso mit Borsäure, nicht minder mit der Milchsäure und den sonst bekannten Mitteln diesen Effect erzielen kann; was mich aber bei dem Jodol frappirte war die verhältnissmässig schnelle und häufige Erreichung dieses Resultats.

Gehe ich aber nunmehr zu der Frage über, ob man mit der Jodolbehandlung auch eine vollkommene Heilung der Kehlkopphypertrophie erzielen kann, so kann ich dieselbe nur dahin beantworten, dass zwei der von mir behandelten Fälle momentan geheilt sind; ob die Heilung eine dauernde sein wird, kann ich allerdings nicht entscheiden, das wird erst der weitere Verlauf zeigen. Jedenfalls glaubte ich Ihnen die beiden Kranken vorstellen zu müssen, von denen die eine eine tiefe Ulceration der Interarytänoidfalte, der andere eine kolbige Anschwellung und Ulceration des hinteren Drittels beider Stimmbänder hatte. Beide Patienten leiden ausserdem an Phth. pulmonum mit colliquativen Nachtschweissen und ab und zu auftretenden abendlichen Fieberbewegungen.

Die eine Kranke, Frä. N., 25 Jahre alt, kam vor 7 Wochen in meine Behandlung und hatte ausser linksseitiger Spitzenaffection ein tiefes Ulcus in der Interarytänoidfalte, das die Herren DDr. Levy, Fischer und noch einige andere Collegen gleichfalls constatiren konnten. Dabei bestand seit 4 1/2 Monaten complete Aphonie. Der Geschwürsgrund war mit schmierigem eitrigem Secret bedeckt; der übrige Kehlkopf war abgesehen von einer leichten Röthung und Schwellung der Stimmbänder normal. Ich behandelte die Patientin täglich local mit Einpulverungen von Jodol und hatte die Genugthuung, dass sich der Geschwürsgrund in 14 Tagen reinigte und in weiteren 3 1/2 Wochen Heilung der Ulceration eintrat, so dass die Patientin, wie Sie hören, mit klarer und lauter Stimme sprechen kann.

Der zweite Patient, Postbeamter B., 40 Jahre alt, kam vor fünf Wochen, ebenfalls vollständig leiser, in meine Behandlung. Ausser beiderseitiger Spitzeninfiltration und reichlichem bacillenhaltigen Sputum konnte ich bei demselben eine kolbige Anschwellung und Röthung des hinteren Drittels beider Stimmbänder mit Ulcerationen am freien Rande derselben constatiren. Die Interarytänoidfalte war verdickt. Die Geschwüre waren mit zähem eitrigbröckligem Secret bedeckt. Die vorher genannten Collegen hatten ebenfalls Gelegenheit den Kranken zu untersuchen. Ich behandelte auch diesen Kranken mit Jodol und konnte schon nach etwa 14 Tagen eine deutliche Reinigung der Geschwüre constatiren. Nach und nach granulirten dieselben, verkleinerten sich und sind jetzt vernarbt. Allerdings ist die kolbige Anschwellung noch nicht vollkommen verschwunden, aber der Patient ist jetzt wieder im Stande, laut und deutlich zu sprechen.

In den anderen von mir behandelten Fällen habe ich dieses günstige Resultat bisher allerdings nicht erreichen können. Wenn auch bei den meisten eine unverkennbare Besserung in dem Aussehen der Geschwüre eintrat, selbst einzelne derselben sich schlossen, und die Kranken sich subjectiv wohler befanden, einen solchen Effect wie bei den erwähnten Patienten habe ich bei diesen nicht erzielen können; vielleicht weil die Zeit der Behandlung eine noch zu kurze ist, vielleicht oder vielmehr wahrscheinlich deshalb, weil es ein untrügliches Mittel gegen diese deletäre Krankheit überhaupt nicht giebt. Tannin, Creosot, Jodoform, Borsäure und Milchsäure und noch manche andere Mittel sind empfohlen worden und sind nicht selten von Nutzen, da unter ihrer Einwirkung tuberculöse Kehlkopfgeschwüre unzweifelhaft heilen können. Auch mit dem Jodol wird es nicht anders sein. Da es ein gutes Antisepticum und auch in gewissem Sinne ein Anästheticum ist, keine unangenehme Nebenwirkungen entfaltet und von dem Organismus gut vertragen wird, so verdient es immerhin weitere Prüfung, die anzuregen ich mir hiermit gestattet habe.

Nebenbei möchte ich noch bemerken, dass das Jodol auch bei der Ozaena seine guten Dienste leistet, hauptsächlich dann, wenn es noch nicht zu vollkommener Atrophie der Schleimhaut und der sub-

mucösen Gewebe gekommen ist. In dem mit Hypertrophie des Gewebes einhergehenden ersten Stadium derselben, das von vielen Autoren — ich nenne von den neuesten nur Moldenhauer — noch immer und nach meinen an einem grossen Material gewonnenen Erfahrungen, sehr mit Unrecht bestritten wird, habe ich, wenn vorläufig auch erst in wenigen Fällen, Gelegenheit gehabt, mich von dem Nutzen des Jodols zu überzeugen. Nicht minder war das der Fall bei einigen an Rhinitis scrophulosa leidenden kleinen Patienten, bei denen die namentlich auf dem Septum sitzenden Ulcerationen sich in Bälde reinigten und auch vernarbt. —

Wahrscheinlich werden aber auch die lupösen und die syphilitischen Schleimhautleiden, gleich denen der äusseren Haut, sich als ein dankbares Object für die Jodolbehandlung erweisen.