d'épaisseur, très légèrement velus, d'un blanc argenté, brillant à l'intérieur.

Observations. — Cette plante est très voisine du *P. rosulatum* auquel elle sera peut-être rattachée dans l'avenir, lorsqu'on possédera des matériaux d'étude plus complets.

L'échantillon que nous avons examiné portait des feuilles très développées au moment de la floraison et ces organes sont beaucoup plus grands que ceux du *P. rosulatum*; l'une d'elles mesure $12\frac{1}{2}$ centimètres de long sur $4\frac{1}{2}$ centimètres de largeur, alors que les plus amples ne dépassent pas 5×2 dans le *P. rosulatum*; elles sont en outre nettement pétiolées au lieu d'être sessiles, glabres à la face inférieure avec quelques poils épars sur les nervures au lieu d'être revêtues d'un feutrage constitué par un épais tomentum.

La fleur présente également quelques caractères différentiels. Le calice est beaucoup plus court, ses divisions mesurant seulement 3 millimètres de longueur, alors qu'elles ont de 6 à 10 millimètres dans le *P. rosulatum*.

Madagascar: Bois, rochers, environs d'Itondroina. Octobre 1899. Perrier de la Bathie no. 968.

LXXI. J. H. Burkill, *Anguillicarpus*, genus novum *Cruciferarum*.

(Ex: Journ. a. Proc. Asiatic Soc. of Bengal N. S., III [1907], no. 8, p. 559—561.)

Anguillicarpus Burkill, l. c., p. 560.

Genus monotypicum, ex affinitate *Spirorhynchi* et *Boreavae* inter *Cruciferas*. Herba glabra. Stigma bilobum. Fructus indehiscens, elongatus. Embryo ad collum deflexus. Cotyledones incumbentes, fere plani. Characteres praecedentes sunt *Sisymbriinarum*. Inter *Sisymbriinas* distinguitur floribus melliferis, staminibus omnibus fertilibus, filamentis liberis, fructibus nec dehiscentibus nec articulatis nec planis, seminibus singulis elongatis.

Anguillicarpus Bulleri Burkill, l. c., p. 560, fig. 1—7.

Herba glabra, erecta, 25 cm alta, fere ex basi ramosa, ramulis aliquomodo intertextis; rami gradatim in racemos transeuntes. Folia inferiora anguste runcinato-pinnatisecta, longiora ad 4 cm longa, dentibus remotioribus subaequalibus acutis deflexis vel patulis saepius suboppositis subtriangularibus 2 mm longis; folia superiora linearia, margine subaequali. Racemi laxi: pedicelli 3—4 mm longi. Flores, ut videtur, lilacini. Sepala biformia, altera basi gibbosa, altera basi rotundata, 3 mm longa. Petala ligulata, apice subrotundata, pinnatinervia, 8 mm

longa. Stamina sex, longiora libera sepala paullulo superantia, breviora longiorum antheras vix attingentia. Pistillum staminibus brevibus aequilongum, post anthesim decurvum, ovulis geminis, superiori solum perfecto; stigma bilobum, flore expanso multo increscens; stylus anguste bialatus. Fructus dependens et uniovulatus et longipes, parte ovarii subovulari ad pedem 7—8 mm longum transformata, et enim longirostratus, rostro 10—12 mm longo ex stylo parteque ovarii supraovularia producto: fructu maturo pedicellus basi abruptus.

Habitat in Beluchia ad Kharan prope Quetta: sub numero 23193, Herb. R. E. P., collegit R. Hughes-Buller. Incolae „*Hushtirkah*“ vocant et pro pabulo ovino camelinoque ferunt.

Olim *Spirorhynchus* inter *Cruciferas* solus ob fructum singularem distetit; nunc *Anguillicarpo* addito genera duo coram hoc modo notata distant. Hoc fructu quadrialato longipedi et filamentis liberis et staminibus brevibus fertilibus discretum est: illud fructu brevipedi et staminibus longioribus per paria connexis.

LXXII. Vermischte neue Diagnosen.

196. *Ducrosia anethifolia* Boiss. var. **Jamiatli** J. H. Burkill in Journ. a. Proc. Asiatic Soc. Bengal N. S., III (1907), no. 8, p. 564.

A typo distinguitur fructibus late ovatis nec rotundatis. Habitat in Baluchia ad Hindubagh quo loco inter alias plantas pabulum camelis ovibusque praebet. Nomen *Khór-kundái*. Collegit R. Hughes-Buller sub numero 19884, Herb. R. E. P.

197. **Campanula Ortleppi** H. Léveillé in „Le Monde des Plantes“, X, no. 49 (1908), p. 5.

Les exemplaires de la *Campanula Ortleppi* à fin d'étude doivent être considérés ou comme un hybride de *Campanula glomerata* et de *C. cervicaria* ou comme une variété de *C. glomerata*, intermédiaire entre les deux espèces. Je serais plutôt porté à les considérer comme un résultat hybride, quoique je n'aie pu trouver d'une façon sûre des échantillons typiques du *C. glomerata* ni du *C. cervicaria*. Tous les échantillons présentent d'ailleurs ce caractère commun d'avoir des poils rudes. Les divisions du calice, lancéolées chez tous les échantillons sont fortement aiguës; les feuilles radicales sont plus ou moins arrondies ou cordiformes à la base comme chez le *C. glomerata*. Le style est à peine exsert dans presque toutes les fleurs des exemplaires recueillis en 1907; il est donc plus long que la corolle; toute la plante est couverte de poils rudes; la tige est courtement hispide. La plupart des feuilles inférieures de la tige sont atténuées en pétiole; la souche est plutôt épaisse, avec des racines fortes, presque napiformes, comme on peut le voir chez le *C. cervicaria* dans la petite Flore de Sturm. Les échantillons recueillis en 1907, rappellent aussi par leurs caractères végétatifs un *C. cervicaria*.