Pour le choix des poids à donner aux différentes équations, j'ai supposé que pour les observations comprises entre 1815 et 1852, l'erreur moyenne d'une observation était de 1 seconde, de 2 secondes pour les positions de 1750 et 1755 et de 6 secondes pour l'observations de *Flamsteed*. Le poids des équations du premier groupe étant 1, on aura respectivement $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{36}$ pour les poids des deux autres groupes.

En appliquant la méthode des moindres carrés aux quatorze équations de condition, on trouve les équations normales

$$\begin{aligned} 11,5.x - 219,75.m - 9107,25.n + 250,62 &= 0, \\ -219,75.x + 9836,25.m + 729644.n - 11497,34 &= 0, \\ -9107,25.x + 729644.m + 71941928.n - 871919,26 &= 0, \end{aligned}$$

et, par suite, les valeurs des inconnues

$$\begin{aligned} x &= -0''40, \text{ d'où } \Delta = 106^\circ 30' 58'' 53 \pm 0''23 \text{ au 1 janv. 1852} \\ m &= +1,068774 \pm 0,01504 \\ n &= +0,00122986 \pm 0''0001404. \end{aligned}$$

D'après ces nombres, la distance polaire de Sirius pour le 1^{er} janvier 1690 est $106^\circ 19' 17'' 89 \pm 4''42$ le catalogue de *Flamsteed* donne $106^\circ 19' 15''$

Différence $-2,89$

On n'avait pas employé dans le calcul la déclinaison absolue de *Flamsteed*, mais seulement le mouvement propre de Sirius, de 1690 à 1852, obtenu par la comparaison avec la déclinaison de β Grand Chien. Ce mouvement déduit des nouvelles valeurs de m et de n est de $205''42$, tandis que l'observation le fait de $207''51$; la différence n'est donc que de $+1''89$.

Les erreurs des autres positions se trouvent dans la 6^e colonne du tableau: l'erreur $-1''75$ qui est en face de la distance polaire donnée par *Lacaille* pour 1750, signifie que cette distance, ramenée en 1852, est plus forte que la position normale $106^\circ 30' 58'' 53$, de $1''75$, et ainsi des autres. En comparant à la formule les 20 distances polaires de Sirius déterminées à l'observatoire de Greenwich de 1836 à 1855, on remarque dans les signes des différences une certaine régularité qui semblerait indiquer l'existence de petites erreurs systématiques, je pense toutefois que la distance polaire déduite de la formule, sera exacte à moins d'une seconde, tant qu'on ne sortira pas des limites entre lesquelles sont com-

prises les observations modernes employées dans le calcul. Cette quantité est assez faible si l'on considère que Sirius est de toutes les étoiles la plus difficile à observer.

Il est établi par ce qui précède, que le mouvement propre M de Sirius en distance polaire, pendant la période de 162 ans comprise entre 1690 et 1852, peut être représenté par la formule

$$M = 1''068774.t - 0''001229856.t^2,$$

d'après cela le mouvement propre annuel μ sera

$$\mu = 1''068774 - 0''002459712.t;$$

dans ces expressions, les intervalles de temps t sont comptés à partir de 1852: t est négatif pour les époques antérieures à 1852 et positif pour les époques postérieures.

La dernière formule, donne pour le mouvement propre annuel de Sirius en distance polaire:

De 1690 à 1691	t	μ	μ	μ
1755	1756	$t = -96,5$	1,306	$\pm 0,03$
1815	1816	$t = -36,5$	1,159	$\pm 0,03$
1858	1859	$t = +6,5$	1,053	$\pm 0,02$

Ces variations sont considérables: aussi avaient-elles été signalées depuis longtemps: mais on n'en avait pas, que je sache, donné des valeurs numériques.

Quant à la distance polaire qu'on tire de ces formules pour une époque déterminée postérieure à 1852, son erreur probable est déjà de $\pm 0''57$ au bout de 30 années et de $\pm 4''42$ après 162 ans. Le calcul est fondé sur une formule d'interpolation, qui doit servir pour un temps limité, que les observations ultérieures feront seules connaître; mais pour les époques antérieures à 1852, le calcul peut suppléer au défaut d'observations.

Je rapporte, en terminant, les distances polaires moyennes de Sirius pour 1855, 1860, 1865, 1870 et 1875.

Années	Distance polaire moyenne au 1 janvier
1855	$106^\circ 31' 11'' 835$
1860	31 34,037
1865	31 56,271
1870	32 18,540
1875	32 40,841

Schreiben des Herrn Professor Gerling an den Herausgeber.

Die Sonnenfinsterniss vom 15. März d. J. begegnete auch hier sehr ungünstigen Umständen, indem der Anfang hinter dicken Wolken verloren gieng und auch das Ende nur mangelhaft beobachtet werden konnte, weil unmittelbar vorher

eine Wolke vortrat, die keine Zeit zu Entfernung der Blendgläser liess. Herr *Auth* beobachtete inzwischen doch das Ende mit einem Cometensucher ohne Blendglas.

Die grosse Fleckengruppe hatte Herr *Melde* (seit vori-

gem Herbst Assistent bei dem hiesigen Institut) am Vormittag nach dem Augenmaass sorgfältig gezeichnet. Seine Zeichnung stimmt mit der Abbildung, welche Sie in № 1134 gaben, so genau überein, dass über die Identität der einzelnen Punkte nicht wohl ein Zweifel gehegt werden kann.

Wir fanden	mittl. Zt.	
Eintritt eines kleinen isolirten Flecken	1 ^h 28 ^m 24 ^s 03	<i>Gerling</i>
Austritt des Flecken <i>a</i> Mitte	2 17 51,91	<i>Melde</i>
— <i>b</i> Rand I.	2 19 17,67	—
— <i>c</i> Mitte	2 21 26,32	—
— <i>d</i> —	2 22 43,11	—
— <i>e</i> ?	2 23 42,95	<i>Gerling</i>
— der letzten Spur der Flecken	2 23 51,92	<i>Melde</i>
Ende der Finsterniss	2 59 43,84	<i>Auth</i>

Ich benutze diese Gelegenheit um eine Sternbedeckung nachzutragen, welche ich damals Ihnen mitzutheilen versäumt hatte.

Eintritt von α Scorpii 1856 Juni 16 12^h 17^m 44^s 76 *Gerling*
 45,76 *Reidt*
 45,27 *Budérus*
 45,27 *Mauritius*

Wahrscheinlich ist Ihnen auch schon das Blatt des National Intelligencer vom 23. Febr. d. J. zugegangen, worin unser Freund *Gillis* eine vorläufige Nachricht von dem Resultat der Rechnungen giebt, welche Dr. *Gould* über seine

Bei der Mondfinsterniss vom 27. Februar d. J. erhielten wir folgende Momente:

	<i>Gerling</i>	<i>Melde</i>
Anfang vielleicht schon	9 ^h 44 ^m 43 ^s m. Z.	
entschieden eingetreten	9 45 37	
Eintritt Tycho Rand I.	10 0 50	
— Mitte		10 ^h 0 ^m 25 ^s
— Rand II.	10 3 2	10 3 9
Austritt — Rand II.	11 17 51	11 18 11
— Mitte		11 19 53
— Rand I.	11 20 40	11 21 28
Ende vielleicht schon	11 48 54	
entschieden ausgetreten	11 49 28	
Halbschatten ausgetreten	11 54 13	11 52 51

mit so verdienstlicher Aufopferung veranstalteten Parallaxen-Beobachtungen in Chile ausgeführt hat und deren Einzelheiten in dem, unter der Presse befindlichen, dritten Bande des grossen Berichts über die Expedition nach Chile, nächstens erscheinen werden. Für den Fall dass Sie diese Nachricht noch nicht erhalten hätten, setze ich die Hauptstelle derselben her:

„The result obtained by him for the sun's equatorial horizontal parallax is $8''4950$ or $0''0762$, less than the valor commonly adopted, and he concludes that we may assume with advantage $8''5000$.

Marburg 1858 April 26.

Gerling.

Beobachtungen der Sonnenfinsterniss 1858 März 15:

1) An der Wiener Sternwarte.

	mittl. Zt. Wien	Beobachter	Öfn. des Fernrohrs
Austritt	3 ^h 34 ^m 19 ^s .9	<i>Littrou</i>	72 ^m
	14,8	<i>Hornstein</i>	48
	20,8	<i>Oeltzen</i>	
	16,8	<i>Allé</i>	
	21,3	<i>Löwy</i>	36
	17,8	<i>Weiss</i>	

Beim Anfange der Erscheinung bedeckten häufig Wolken die Sonne, später wurde es immer heiterer, zu Ende der Finsterniss zeigte sich die Sonne völlig rein.

Wien 1858 April 28.

Littrom.

2) In Schwerin.

Die letzte Sonnenfinsterniss habe ich gemeinschaftlich mit den Herren Dr. *Hartwig* und Premierlieut. *von Quitzow* beobachtet. Die Sonne trat nur zuweilen auf kurze Zeit aus Wolken hervor, es sind daher nur die nebenstehenden Beobachtungen gelungen:

	m. Z. Schw.	Beob.
1) Grösster Kernfleck d. S., Eintritt Rand I.	1 ^b 31 ^m 35 ^s 9	v. Q.
2) — — — — — II.	1 32 28,8	v. Q.
3) Ende der Finsterniss	3 12 33,4	P.
4) — — —	3 12 33,6	H.