muthicus und letztere quadrinitras bi-muthicus nennen kann.

Ueber die gegenseitige Einwirkung verschiedener mit Schwefel-, Salpeter-, Essig- und Salz- Aether in Berührung gebrachter Körper;

von

Henry, dem Vater *).

Ueber die verschiedenen Aetherarten sind von den Chemikern viele Versuche angestellt, die sich aber meistens auf die Zusammensetzung und Bildung derselben beschränkten. Um die Veränderungen, welche die verschiedenen Aethere durch Einwirkung anderer Körper erleiden, hat Henry, der Vater, Schwefel-, Salpeter-, Essig- und Salz-Aether mit einfachen und zusammengesetzten, metallischen und nicht metallischen Körpern 4 bis 5 Jahre hindurch in ganz angefüllten Gläsern in Berührung gelassen.

Aus diesen Versuchen ergab sich

1) beim Schwefeläther, daß die leicht oxydirbaren Metalle und Dryde, welche sich mit Essigsäure verbinden, mehr oder weniger essigsaure Salze erzeugen. Der Aether bewirkte mit Lackmustrinctur versetzt, beim Abrauchen an der Luft, keine Röthung.

Gold, Silber, Quecksilber, Antimon, Wismuth, Kupfer, Arsenikdeutoxyd und Eisentritoxyd hatten keine Veränderung erlitten, der Aether aber röthete beim Abrauchen an der Luft die zugesetzte Lackmustrinctur.

Durch Eisenprotochlorür, welches schwer von dem Deuto- und Tritio-Chlorür zu trennen ist, war der Aether sehr

*) Journal de Pharmacie XIII. 118. M. Br.

sauer geworden und durch das Deuto-Chlorür gelb gefärbt. An den Wänden des Glases hatten sich kleine smaragdgrüne Krystalle, Rhomboeder und sechsseitige Prismen aus reinem Proto-Chlorür, gebildet. Mit Eisen-Protochlorür wurde Aether stark gelb und sehr sauer.

Braunsteinoxyd, Kalk und Kali bildeten Spuren von essigsauren Salzen, der Aether reagirte nicht sauer, hatte aber durch Kali einen nicht angenehmen und durch Kalk einen unangenehmen fauligen Geruch erhalten.

Der mit Phosphor und mit Schwefel in Berührung gewesene Aether reagirte sauer; und an den Wänden der Gefäße hatten sich Krystalle von beiden festen Körpern gebildet. 10 Grammen der Phosphorlösung enthielten 5 Grains Phosphor und 16 Grammen der Schwefellösung 4 Grains gelöst; übrigens hatte das Licht keine Einwirkung auf die Löslichkeit.

Durch Berührung mit Luft, wie auch mit Wasser, mit und ohne Einwirkung des Lichts, hatte sich im Schwefeläther Essigsäure gebildet. H. schließt aus diesen Resultaten, daß, da durch die Gegenwart der Essigsäure im Alkohol stets etwas Essigäther im Schwefeläther enthalten sey, der Essigäther durch die Einwirkung der Luft, des Wassers und anderer Körper zersetzt werde, wodurch sich Essigsäure bilde.

2) Salpeteräther. Dieser wurde durch Eisen, Kupfer und Eisen-Deutoxyd zersetzt, wobei sich Nitrats, Hyponitrite und wahrscheinlich auch essigsaure Salze bildeten, weil nach Thénard's Beobachtungen der mit Salpetersäure und Alkohol bereitete Salpeteräther stets etwas Essigäther enthält; Phosphor löste sich darin ganz auf, der Aether reagirte sauer und enthielt viel Phosphorsäure; Schwefel hatte zum

Theil Schwefelsäure gebildet, und war zum Theil in kleinen Nadeln krystallisirt.

3) Essigäther verhielt sich ähnlich wie der Schwefeläther. Antimon, Bismuth, Zinn und Kupfer waren nicht verändert; der Aether reagirte nur nach dem Abrauschen an der Luft sauer, auch das Eisentrioxyd und Arsenikoxyd zeigten keine Veränderung. Zink aber hatte essigsaures Zink, und Eisen etwas Oxyd gebildet. Durch Quecksilberdeutoxyd war der Aether, selbst ohne Einwirkung des Lichts, fast ganz zersetzt, reagirte sehr sauer und es hatte sich Proto- und Deuto-Acetat gebildet. Beim Eisendeutoxyde hatten sich auf der Oberfläche des Pulvers Krystalle von Eisen-Protoacetat abgesetzt und das Eisen-Protochlorür hatte den Aether stark gelb gefärbt. Dieser war sauer und hielt etwas von diesem Chlorür gelöst.

Bittererde, Kalk und Kali hatten essigsaure Verbindungen gebildet und der Aether reagirte nicht sauer. Phosphor und Schwefel hatten sich zum Theil aufgelöst und zum Theil in Krystallen abgesetzt. Mit Wasser in Berührung gebracht wurde der Aether sauer, eben so bei der Berührung mit Luft, behielt aber seine Reinheit in ganz angefüllten Gläsern. Dieses ähnliche Verhalten des Essigäthers wie beim Schwefeläther macht die oben angegebene Meinung über die Acetification des letztern sehr wahrscheinlich.

4) Salzäther. H. wird die mit diesem Aether angestellten Versuche wiederholen und die Resultate mittheilen. Schwefel und Phosphor werden merklich gelöst.