sicheres, genaues und leicht anzuwendendes Kennzeichen abgeben, um sogleich den diabetischen Zustand der Harnsecretion zu beurtheilen. Man wird den Anfang dieser Krankheit erkennen, ihre Eigenthümlichkeiten unterscheiden, sie in allen ihren Stadien verfolgen und augenblicklich die guten oder schlechten Wirkungen der Behandlung, welcher man die Kranken unterwirft, beurtheilen können.

(Journ. de pharm. T. XXVII. p. 100.)

Einiges über die Wirkung der Kohle bei der Vegetation;

von *E. Lucas.*

(Aus einem Briefe an J. L.)

Vor vier Jahren fand ich, nachdem ich durch eine Reise in die Tyroleralpen mir nähere Kenntniss der Verhältnisse verschafft hatte, die in der Natur das Keimen der Alpenpflanzen, nämlich der eigentlichen Hothalpenbewohner, begünstigen und bedingen, eine Methode des Säens auf, die sich als der Natur am nächsten kommend, bei vielen Alpenpflanzen, namentlich Gentianen, sehr bewährte. Ich machte diese Methode damals in der Weifensee Blumenzeitung bekannt, und erlaube mir hier nur eine kurze Notiz über das praktische Verfahren, welches ich nun auch bei anderen Samen wärmerer Regionen, die schwerkeimend sind, in Anwendung gebracht habe, zu erwähnen.

Sogenannte Samentöpfe (Töpfe, die flacher als tief sind,) füllte ich mit Buchenlauberde, der $\frac{1}{3}$ Kohle beige-
setzt worden war, bis etwas unter den Rand an, hierauf brachte ich eine Schicht Schnee $\frac{1}{2}$ Zoll dick und säete nun auf dieselbe die Samen, die ich sodann wieder mit Schnee

bedeckte und im warmen Glashause bei 10 — 12° R. einthauen liefs. Nach Verlauf von 2 Stunden, nachdem der Schnee gänzlich geschmolzen, wurden die sehr angeschwollenen Samen nach Mafsgabe ihrer Dicke mit derselben lockeren Erde überdeckt und in einem kleinen Kasten im Warmhause fortbehandelt. Die zu dieser Aussaat gewählten Samen waren, aufser einigen Alpenpflanzen, neuholländische Acacien, einige Cacteen, eine Anzahl neuholländischer und neuseeländischer Papilionaceen und mehrere Pflanzen anderer Familien. Es keimten schon nach zwei Tagen mehrere Acacien und sämtliche Cacteen, nach vier Tagen eine grofse Zahl der schmetterlingsblüthigen Pflanzen, *Zichia*, *Goodia*, *Platilobium*, *Pultinaca*, nach 6 — 8 Tagen *Heliotropium*, *Bixa*, *Solanum* u. a.

Ein Versuch belehrte mich ferner, dafs die Wirkung der thierischen Kohle (Knochenkohle) noch weit ausgezeichneter auf die Cultur sey, als die der vegetabilischen Kohle; es bewurzelten sich Blätter schneller und trieben schneller Augen, als die gleichartigen, in Pflanzenkohle behandelten.