XXX.

Besprechungen.

1.

Ein Beitrag zur Behandlung der Synovitis hyperplastica granulosa mittelst Carbolinjectionen. Von Dr. Joh. Schmidt. Greifswald 1875.

Als Erwiderung auf die in der Strassburger Dissertation von Knöry, sowie in der Bonner von Dietrich enthaltenen Veröffentlichungen über die Resultate der Carbolinjectionen bei „fungösen“ Gelenkentzündungen (Synov. hyperpl. granulosa) theilt Schmidt in seiner Dissertation unter dem obigen Titel sechs Fälle mit, bei welchen durchgehends gute Erfolge mit der genannten Behandlung erzielt wurden. Dieselben wurden zufällig zu gleicher Zeit in der Klinik behandelt.

In einer vorausgeschickten kritischen Besprechung der beiden genannten Dissertationen wendet sich Verf. gegen die ungünstige Beurtheilung, welche besonders in der Strassburger Dissertation den Carbolinjectionen zu Theil geworden ist. Er liefert in einer eingehenden Betrachtung der einzelnen Fälle den Nachweis, dass in diesen selber eine Berechtigung zu dem absprechenden Urtheile nicht gegeben ist. Denn einmal seien notorisch einige Besserungen und eine Heilung nach den Carbolinjectionen eingetreten, andererseits aber mehrere augenscheinlich ungeeignete Fälle (eiterige Gelenkentzündungen) der Injectionsbehandlung unterworfen worden. Auf die vorhandene Eiterung kann begreiflich die Injectionsbehandlung keinen Einfluss haben und hat Hueter selber keineswegs die eiterigen Gelenkentzündungen als geeignet für die Behandlung mit Carbolinjectionen angegeben. — Endlich macht Schmidt darauf aufmerksam, dass in einer Anzahl von Fällen die Injectionen eine Zeit lang (während der Ferien) in wenig zweckentsprechender Weise durch einen Gypsverband ersetzt worden seien. Die nach Entfernung des Verbandes beobachtete Verschlimmerung kann unmöglich den Carbolinjectionen zugeschrieben werden. Nach alledem ergibt sich aus den angeführten Fällen in Wirklichkeit nichts, was gegen die Carbolinjectionen spricht. — Aus den Bonner Versuchen mit Carbolinjectionen, welche übrigens nur bei 3 Patienten gemacht wurden, hat sich wenigstens das herausgestellt, dass die Injectionen keinen Schaden brachten. In einem Falle trat überdies eine Besserung ein.

Die 6 Fälle der Greifswalder Klinik betreffen zu dreien das Hüftgelenk, zu dreien das Kniegelenk. Von der ersten Gruppe litt der eine Patient, ein 16jähriger Junge zugleich an Lungencavernen. Gleichwohl wurde die Coxitis durch 3 Monate fortgesetzte Injectionen so erheblich gebessert, dass Patient entlassen werden konnte. Im zweiten Falle bei einem 11jährigen Jungen mit beträchtlicher Schwellung, Gehbehinderung, heftigen Schmerzen im rechten Hüftgelenk vermochte Patient nach 20 Injectionen wieder am Stocke umherzugehen. Der dritte Fall von Coxitis bei einem neunjährigen Mädchen mit gleichen Störungen wie der vorhergehende wurde nach dreimonatlicher Injectionsbehandlung vollkommen gehfähig und geheilt entlassen. — Von der zweiten Gruppe hatte der eine Patient, ein 23jähriger Knecht in Folge eines Traumas seit 5 Jahren eine chronische granulirende Gelenkentzündung acquirirt. Vollständige Bewegungslosigkeit, starke Schwellung und Schmerzen. Nach 2½ Monaten Heilung durch Carbolinjectionen. Der zweite Patient, ein 23jähriger Weber, mit einer alten granulösen Gelenkentzündung des rechten Knies, welche schon einmal zur Eiterung geführt hatte, wurde durch 7 Monate fortgesetzte Injectionen geheilt, so dass er wieder am Stocke gehen konnte. Der dritte Fall betraf ein vierjähriges Mädchen mit starker Synov. hyperpl. granul. des rechten Knies. Nach viermonatlicher Behandlung mit Carbolinjectionen (durch einen gefensternten Gypsverband) trat Heilung ein.

In allen diesen Fällen waren vorher anderweitig verschiedene Behandlungsweisen erfolglos versucht worden. — Die Carbolsäure wirkt wesentlich exacter und milder wie die Jodtinctur. Die Jodinjectionen sind nach Schmidt bei der Synov. hyperpl. granulosa zu verwerfen, dagegen die Carbolinjectionen vorzuziehen. Dieselben wirken nicht bloß anästhesirend, sondern auch entzündungswidrig.

Schmidt findet, dass weder auf der Strassburger noch auf der Bonner Klinik die passendsten Fälle zur Prüfung der intraarticulären Carbolinjection gewählt worden sind. Die Behandlung auf der Strassburger Klinik ist nicht mit der nöthigen Ausdauer und nicht mit der Berücksichtigung der Complicationen (bei osteomyelitschen Herden intraosseale Injectionen!) durchgeführt worden. Für nicht exsudative Gelenkentzündungen sind, wie die Greifswalder Fälle zeigen, die Carbolinjectionen von vorzüglichem Werthe; ob auch bei den exsudativen Formen, lässt sich zur Zeit noch nicht entscheiden.

Dr. Schüller.

2.

Untersuchungen über pathologische Bindegewebs- und Gefässneubildung. Von Dr. Ernst Ziegler. (Würzburg, Verlag der J. Staudinger'schen Buchhandlung 1876.)

Unsere bis jetzt gangbaren Anschauungen über die Histogenese neugebildeten Bindegewebes und neugebildeter Gefässe sind das Resultat vielfacher experimenteller Untersuchungen hauptsächlich in der Weise angelegt, dass Thieren Wunden angelegt und successive in den verschiedenen

Zeiträumen der Verheilung die neugebildeten Granulationen, oder die Narbe an feinen Schnitten untersucht wurden. Von der Ueberzeugung ausgehend, dass jedes neugebildete Bindegewebe sammt Gefässen vorzüglich ein Product aus den Gefässen ausgewanderter, farbloser Blutkörperchen sei, hat Verf. von einer Beobachtung Rindfleisch's, dass sich Wanderzellen häufig in den Poren eines in die Leibeshöhle von Thieren eingelegten Korkstückchens vorfinden, eine höchst sinnreiche Anwendung gemacht, um auf eine neue und mehr directe Weise die Umwandlung der Wanderzellen zu Bindegewebe und Gefässen beobachten zu können. Durch Zusammenkitzung zweier dünnen, kleinen Glasplättchen in äusserst geringer Entfernung von einander wurde ein durchsichtiger, capillarer Raum gebildet, derartige Plättchen Hunden unter die Haut gebracht, letztere über den Plättchen vernäht und dieselben verschiedene Zeit lang liegen gelassen. In diesen capillaren Raum wandern nach Verf. Angaben die farblosen Blutzellen ein und machen verschiedene gewebes- und gefässbildende Veränderungen durch, welche vom 25. bis 70. Tage untersucht den Hauptinhalt vorstehender Abhandlung bilden.

Die Wandlungen, welche zwischen den Glasplättchen an den farblosen Zellen vom 1. bis 25. Tage sich vollziehen, finden sich in einer früheren Arbeit¹⁾ des Verf., an welche die vorliegende sich eng anschliesst, eingehend beschrieben. Es hatte sich dort das auffallende Resultat ergeben, dass man neben unveränderten, farblosen Blutzellen grössere, einkernige, epitheloide und noch grössere mehrkernige Riesenzellen findet. Die Kerne beider Arten sind grösser als die der Wanderzellen, das Protoplasma stärker gekörnt. Später zwischen dem 30. und 50. Tage soll man in gelungenen Präparaten die farblosen Blutkörperchen als solche gar nicht mehr finden, sondern nur zellige Elemente, welche die Charaktere von epitheloiden und Riesenzellen an sich tragen.

Da es unmöglich ist, auf die Beschreibung der einzelnen Präparate, die Verf. in Begleitung von zahlreichen Abbildungen vorführt, näher einzugehen, so müssen wir uns begnügen unter Hinweis auf das Original die von dem Verf. aus den Präparaten gezogenen Schlüsse wiederzugeben.

„Bald nach ihrer Einwanderung in den capillaren Raum, der von Ernährungsflüssigkeit umspült ist, vergrössert sich ein Theil der Zellen auf Kosten der benachbarten, indem sie deren Protoplasma sich aneignen, werden sie körniger, und zeigen einen oder mehrere grosse bläschenförmige Kerne mit Kernkörperchen. Diese grossen Zellen sind anfangs rund, später nehmen sie verschiedene Formen an, die erstgebildeten werden keulen-, spindel- und sternförmig und schicken lange Fortsätze aus, die sich netzförmig mit einander verbinden. Zwischen diesen ersten Gewebsanlagen bilden sich immer neue grosse Zellen durch Wachstum einzelner kleiner. Nach einiger Zeit erscheinen Gefässe und zwar soweit erkennbar an Stelle des ursprünglichen Zellnetzes. Diese Gefässe vermehren sich wahrscheinlich durch Kanalisation der Zellsprossen, wenigstens findet man dieselben häufig mit den Gefässen in Verbindung oder sieht frei endende Sprossen an den Gefässwänden. Mittlerweile nimmt die Zahl der grossen ein- und

1) Experimentelle Untersuchungen über die Herkunft der Tuberkel Elemente mit besonderer Berücksichtigung der Histogenese der Riesenzellen.

mehrkernigen Zellen immer mehr zu, so dass sie dicht an einander zu liegen kommen, die kleinen nehmen immer mehr ab und verschwinden endlich ganz. Die grossen Zellen verbinden sich mit einander durch Fortsätze, während zwischen sie neue sich einschieben. Aus den dicht beisammen liegenden Zellen bildet sich alsdann homogene oder faserige Zwischensubstanz. Letztere entsteht einfach durch eine Differenzirung im Protoplasma der Zellen, am deutlichsten tritt dies innerhalb der sogenannten Riesenzellen hervor, bei welchen es durch diese Differenzirung secundär zu Bildung einkerniger durch Zwischensubstanz getrennter Zellen kommt.

Um aus dieser Art der Gewebsbildung auf die aus Granulationen sich entwickelnde schliessen zu können, mussten an normalen Granulationen Vergleiche angestellt werden. Ziegler untersuchte zu diesem Zwecke die Granulationen, welche an der Innenfläche der bindegewebigen Kapseln um die Plättchen herum sich gebildet hatten. Es gelang ihm an diesen besonders in den tieferen Schichten derselben nicht nur das Vorkommen grosser ein- und mehrkerniger Zellen, die stellenweise völlig die kleinen farblosen verdrängt hatten, sondern auch fast ganz dieselbe Art des Aufbaues von Bindegewebe und Gefässen aus denselben nachzuweisen. Auch hier werden die kleinen lymphatischen Rundzellen zu grösseren, runden, stern- und spindelförmigen „Bildungszellen“, aus welchen sich einerseits Gefässanlagen in Form solider sich unter einander und mit Gefässen verbindender Zellsprossen, welche später hohl werden, andererseits fibrilläres Bindegewebe durch Umwandlung des Zellprotoplasma in Fibrillen entwickeln. Bei letzterem Process wird ein grosser Theil des Protoplasmas aufgebraucht, der Rest persistirt als fixe Zelle; entsprechend diesen eingelagerten Zellen bleiben die Fibrillenbündel getrennt und entsteht so im Narbengewebe eine Reihe von Spalten als Gewebstückchen (Saftkanalsystem). Die aus den einzelnen Zellen und deren Sprossen hervorgegangenen Gefässe erhalten später eine adventitielle Umscheidung von Seiten der Zellen des Grundgewebes.

Das wesentlich neue und von vielen früheren Forschern abweichende Ergebniss, der auf diesem experimentellen Wege verfolgten Untersuchungen bezieht sich demnach auf die Wandlungen der Wanderzellen, welche dieselben eingehen um zu Bindegewebe einerseits, zu Gefässen andererseits verbraucht zu werden. Es sollen die Wanderzellen als solche nicht direct Bindegewebe und Gefässe bilden, sondern dieselben durchlaufen zuerst eine Durchgangsstufe dadurch, dass mehrere kleinere Zellen zu ein- oder mehrkernigen grösseren „Bildungszellen“ verschmelzen. Nur letztere sind das Material, aus welchem sich, falls die Umstände günstig sind, d. h. wenn eine rechtzeitige und ausgiebige Vascularisation eintritt, das Narbengewebe (Bindegewebe) aufbaut. Alle neu hinzukommenden Wanderzellen werden entweder zu Bildungszellen umgewandelt, oder kehren in die circulirenden Säfte zurück. Die Gefässneubildung ist in den Plättchenpräparaten und nach den sonstigen Untersuchungsobjecten Ziegler's vorherrschend durch Zellsprossen zu Stande gekommen; letztere, die theilweise von den die Gefässe constituirenden Zellen, theils von den die Gefässe umgebenden Bildungszellen ausgehen, verbinden sich untereinander und werden, indem dieselben hohl werden, zu Gefässen. Die Gefässbildung ist demnach eine intracelluläre. Obwohl der stricte Nachweis, dass die Zellsprossen

hohl werden, äusserst schwer gegeben werden kann, so hält Verf. diese Art der Gefässvermehrung dennoch besonders aus dem Umstande für die in Granulationen vorherrschende, weil sich derartige Sprossen vielfach mit Gefässen verbinden. Verf. schliesst jedoch auch eine intercelluläre Gefässbildung nicht ganz aus, wenn er auch die rein mechanische vom Blutdruck abhängige Ursache derselben nicht anerkennt.

Von ganz besonderem Interesse sind schliesslich Ziegler's Anschauungen über die sogenannten localen tuberculösen Entzündungen und über die anatomische Bedeutung der Tuberkel überhaupt. Es sind ja bekanntlich die fungösen (tuberculösen), von normalen Granulationen durch das besondere Aussehen der dieselben zusammensetzenden Granulationszellen und das Auftreten circumscripiter gefässloser Zellherde (Tuberkel) charakterisirt. Die Zellen fungöser Granulationen sind grösser, oft mehrkernig, stärker gekörnt, auch finden sich mehr rundliche und weniger verästelte Zellen, als in normalen Granulationen. Da nun Ziegler aus dem Nachweis, dass die grossen epithelioiden und Riesenzellen aus kleinen, farblosen Blutzellen entstehen, und dass nur aus den ersteren Bindegewebe und Gefässe sich bilden, dieselben, wo er sie antrifft, als die Bildungszellen zukünftigen Bindegewebes anspricht, so ist es nur eine Consequenz dieser Ansicht, wenn er auch in den grösseren, vielkernigen Zellen und Zellhaufen, wie dieselben sich in den fungösen Granulationen präsentiren, nichts Besonderes, nichts Specifisches sieht. Wie in normalen Granulationen die farblosen Blutzellen die Durchgangsstufe der grösseren epithelioiden Zellen durchlaufend sich zu Bindegewebe umwandeln, so haben auch die Zellen der fungösen Granulationen die Absicht zu Bindegewebe und Gefässen zu werden, allein diese Tendenz wird vereitelt durch eine ungenügende oder zu spät eintretende Vascularisation. Mag nun letztere in einer Hinfälligkeit der Bildungszellen selbst, oder einer localen oder allgemeinen Gewebs- oder Constitutionsanomalie begründet sein, genug, die Zellen bleiben auf einer gewissen Höhe ihrer Entwicklung stehen und gehen zum Theil zu Grunde. Die Besonderheit fungöser Granulationen und was denselben den Mangel einer tuberculösen Entzündung erst aufdrückt, die eigenthümliche Gruppierung der Bildungszellen zu gefässlosen, rundlichen Herden, erklärt sich aus ihrer Beziehung zu den Gefässen. Dieselben haben sich zwischen vascularisirten Theilen an gefässloser Stelle angehäuft, da ihre Ernährung hier am meisten gefährdet sein muss, werden sie auf einer bestimmten Entwicklungsstufe zu Grunde gehen müssen. Die rundliche Form der Zellhaufen entsteht aus dem Bestreben des umliegenden Gewebes den sich vergrössernden Herd auf ein möglichst kleines Volumen zusammenzudrängen. Eine etwas andere, jedoch ähnliche Bedeutung hat die Tuberkelentwicklung bei den secundären Formen, hier hängt die Knötchenbildung mit der localen Beschaffenheit des Reizes zusammen; es stellt das Knötchen den Gesamteffect der Reizung dar. In diesem kleinen Entzündungsherd verfolgen die zelligen Elemente den gewöhnlichen Entwicklungsgang, welcher jedoch auch hier wiederum durch den mangelnden Eintritt der Ernährung (Vascularisation) gehemmt wird, und zum schliesslichen Untergang, zur Verkäsung des Knötchens führt.

Die Auffassung der Tuberkel als solcher als nichts Specifisches, sondern als der eigenthümliche, histologisch ähnliche Ausdruck anomal ver-

laufender Entzündungen, deren Ursachen jedoch sehr differente sein können, ist gewiss eine äusserst berechtigte und der factischen Beobachtung völlig entsprechende. Sie muss vor allen Dingen Denjenigen willkommen sein, welche sich nicht nur mit den anatomischen Krankheitsproducten, wie dieselben sich am Sectionstische darstellen, sondern speciell auch mit den Krankheitserscheinungen am lebenden Organismus, deren Folge erstere sind, beschäftigen, da dieselbe die Kluft, welche durch die aus morphologischen Rücksichten entsprungene Auffassung der Tuberkel als etwas Besonderem sich zwischen der anatomischen und klinischen Anschauung zu bilden drohte, auszufüllen und die Brücke zu gegenseitigem Verständniss herzustellen geeignet erscheint.

Dr. J. Marcuse.

3.

Mittelbare Dilatation der Harnröhrenstricturen. Von Dr. Langlebert.
(Dilatation médiate des rétrécissements de l'urèthre. — Gazette des Hôpitaux. 1876. No. 16.)

Der Verfasser, welcher die Curmethoden der Urethralstenosen in der Absicht, fausses routes zu verhüten und die allen bisher üblichen derartigen Encheiresen anhaftenden grösseren und geringeren Schmerzen möglichst abzuschwächen, um eine neue bereichert hat, nennt dieselbe mittelbare Dilatation.

Was zunächst den dazu nöthigen Instrumentenapparat betrifft, so besteht derselbe 1) aus mehreren olivären Bougies von verschiedenen nach der Charrière'schen Filière gemessenen Dicke, durch welche soweit in ihrer ganzen Länge eine Spalte geht, dass nur das Vesicalende in einer Länge von 6—7 Cm. geschlossen bleibt, und 2) aus mehreren elfenbeinerneu bezüglich des Kalibers ebenso wie die eben erwähnten Instrumente beschaffenen Mandrins mit einer 2—3 Cm. langen Olive.

Anlangend die Ausführung dieses Dilatationsverfahrens, so wird nach Erforschung des Sitzes der fraglichen Kanalisationsstörung mittelst einer bougie exploratrice à boule in die Urethra eine dem Knopfe jener Explorationssonde entsprechend dicke Bougie mit nach oben gerichteter Spalte geführt und in dieselbe an ihrem freien Manubriumende sodann ein Mandrin gleicher Circumferenz dergestalt vorgeschoben, dass seine Olive gerade in die Verengung zu liegen kommt.

Die hierdurch erzielte, einen Millimeter betragende Erweiterung derselben lässt sich in dieser Sitzung mit den correspondirenden höheren Bougie- und Mandrin-Nummern noch verdoppeln und verdreifachen, um in einer folgenden Session auf gleiche Weise zu einer solchen endgültigen Lumenvergrösserung zu gelangen, wie sie das Gelingen der Cur erheischt.

Dr. Carl Pauli.

4.

Ueber den Nutzen der Sonde à demeure bei der Behandlung gewisser Harnröhrenstricturen. Von Prof. Dr. Dubui. (*De l'utilité de la sonde à demeure dans le traitement de certains rétrécissements de l'urèthre. — Gazette des Hôpitaux. 1876. Nr. 18.*)

Wie heute wohl von allen Seiten mit Recht zugestanden wird, ist die temporäre Dilatation die beste Curmethode der einfachen Harnröhrenverengerungen.

Erweisen sich dieselben jedoch sehr refractär, so plaidiren die meisten Chirurgen für die innere Urethrotomie, deren Vorzüge, da jene in Folge der verbesserten Instrumente und einer zweckentsprechenderen Nachbehandlung kaum noch Gefahren involvirt, auch der Verf. anerkennt.

Nichtsdestoweniger will er ihr die alte, so oft mit dem besten Erfolge geübte permanente Erweiterung vermittelt elastischer Bougies nicht allein gleichgesetzt, sondern auch unter Umständen vorgezogen wissen, eine Ansicht, welche er durch einen glücklich geheilten Fall zu beweisen sucht.

Derselbe war, abgesehen von seiner grossen Hartnäckigkeit — die Strictur hatte über 30 Jahre bestanden — dadurch ausgezeichnet, dass sich trotz retablirter Passage der Urethra die Harnblase wegen Verlustes ihrer Contractilität nicht vollständig bei der Miction entleerte, der Art, dass sogleich hiernach mit dem Katheter jedes Mal eine Menge von circa 70 Gramm Urin abgenommen werden konnte, und dass die auf diese Weise hervorgerufenen Uebelstände die tägliche künstliche Ableitung dieses Excrets dringend geboten.

Hier sei nun, bemerkt der Verf., ein Recurs an die diese Bedingung zugleich mit erfüllende Sonde à demeure, womit auch der zu dem erwähnten Falle mit hinzugezogene Ricord übereinstimmte, und wie die erzielten Curesultate bestens bestätigten, vielmehr indicirt gewesen, als die Urethrotomia interna, die nur allein die Kanalisationsstörung beseitige, nicht aber den dadurch gesetzten üblen Consequenzen Rechnung trage.

Dr. Carl Pauli.

5.

Chirurgie vor 100 Jahren. Historische Studie. Von Dr. Georg Fischer. Leipzig, Verlag von F. C. W. Vogel. 1876. 12 Mark.

Wenn der Verf. die Absicht hatte, Sinn und Interesse für die Vergangenheit, für die Geschichte der Chirurgie zu wecken, so konnte er wohl kaum eine bessere Form als die vorliegende dazu wählen, nämlich in Form einer Skizze uns den grossen Aufschwung, so zu sagen die glänzende Wiedergeburt der Chirurgie vor Augen zu führen und in anregender Weise jene Periode zu schildern, in der man zuerst anfang wissenschaftlich Chirurgie zu treiben. Wir können in der That mit dem Verf. nur bedauern, und von mancher Seite ist dieser Mangel ja auch hervorgehoben worden, dass die Geschichte der Wissenschaften, also z. B. auch der Chirurgie, so sehr vernachlässigt wird. Wenn man bedenkt, wie ge-

wöhnlich der Student eine ganze Reihe von Namen bedeutender und unbedeutender Chirurgen zu behalten angehalten wird, und froh und stolz ist, wenn er eine grosse Anzahl von Chirurgen als Erfinder von Methoden, Instrumenten oder deren Modificationen hinzählen kann, dabei aber kaum weiss, wann die betreffenden Erfinder gelebt haben, und welche Bedeutung und Stellung ihnen zukommt, so wird man kaum begreifen, zu welchem Zwecke eigentlich das Gedächtniss mit alle den Namen belastet wird, und mit Recht hat schon Billroth darauf hingewiesen, dass alle Vorlesungen eigentlich von historischem Geiste durchdrungen sein sollten. Nur auf solche Weise wird auch der Student die Bedeutung einer Methode und seines Erfinders nach dem Zeitalter, in dem er lebte, bemessen können. Um speciell nun das Interesse für Entwicklung und Geschichte der Chirurgie bei dem Praktiker zu wecken, für den Verf. eigentlich schreibt, hat letzterer wohl gethan, die sonst so beliebten Noten und Commentare des Textes ganz wegzulassen, um die Lectüre des Werkes um so angenehmer und nicht ermüdend zu machen.

Wenn nun der Verf. den Werth des Geschichtsstudiums hauptsächlich in dem Umstande sieht, dass am Beispiel hervorragender Männer und zumal an deren grosser Arbeitskraft der sinkende Muth des Praktikers neu belebt werde, so glauben wir, hat der Praktiker doch noch andere Vortheile durch dasselbe. Denn zunächst werden ihm durch das Studium der Geschichte die Ziele und die Fortschritte moderner Chirurgie klar vor die Augen treten und er wird neue Lust gewinnen, für dieselben und in ihrem Sinne zu wirken und zu arbeiten. Ferner wird er finden, dass Vieles längst ausgesprochen oder erfunden ist, was Andere später als eigene Waare auf den Markt bringen, und die Geschichte zeigt ihm die Vorläufer grosser Entdeckungen, von denen bekanntlich keine unvorbereitet ist. Durch die Erkenntniss, dass die Lehren, die für den Augenblick von Jedermann angenommen werden, oft nach wenigen Jahren wieder verworfen werden, wird er selber vorsichtig und wird prüfenden Sinnes das Neue auffassen, um selber sich durch Beobachtung und Erfahrung ein Urtheil darüber zu bilden.

Die Epoche vor 100 Jahren ist entschieden für die Entwicklung der Chirurgie von grossem Interesse. Wenn auch speciell in Deutschland diese Kinderjahre der Chirurgie nicht viel Bedeutendes aufzuweisen haben und die Leistungen deutscher Forscher etwas erblassen neben denen der Nachbarvölker, so ist es doch höchst fesselnd gerade in jener Zeit, wo Deutschland seine tiefsten Denker, seine besten Dichter und Musiker zur Welt brachte, den Aufschwung wahrzunehmen, der sich auf anderen Gebieten darthut, wenn auch hier die Früchte erst später reifen sollten. Zum Theil hing es ja auch von der politischen Stellung Deutschlands ab, dass seine wissenschaftlichen Leistungen wenig Beachtung fanden und dass die deutschen Forscher damals speciell Alles, was vom Auslande kam, höher schätzten, als eigene Leistungen. Später allerdings konnten sie dadurch um so glänzender das Ausland wiederum überholen. Freilich gab es auch damals innerhalb der deutschen Chirurgie kein eigentliches Genie. Wir finden viele Männer vor von grossem Scharfsinn und bedeutendem Fleisse, aber es war Keiner da, der eine neue Bahn, eine neue Methode den Uebrigen zu weisen im Stande gewesen wäre.

Die Anordnung des Buches ist eine sehr zweckmässige. Nachdem eine Schilderung der Zeit mit der Stellung der Aerzte vor 100 Jahren gegeben ist, werden die Vertreter der Hauptschulen, sowie die bedeutendsten Chirurgen der Deutschen, Franzosen und Engländer in fesselnder Weise charakterisirt und besprochen. Die ersten Capitel, welche über das Verhältniss von Doctor und Barbier, über Marktschreier, Schwindler und Quacksalber uns berichten, enthalten Manches, was uns nur gar zu sehr noch an unseren heutigen Zustand erinnert. Die Charlatanerie blüht in unserem Zeitalter noch ebenso üppig, wie vor 100 Jahren, man braucht nur den Annoncentheil irgend einer beliebigen Zeitung in der Hinsicht durchzumustern, Schwindel und Marktschreierei ist wie früher, nur unter anderer Form und anderem Gewande, vorhanden, so dass man sich in der That fragen kann, ob der Schwindel und die Quacksalberei als ein untilgbares Uebel anzusehen sind. Dieselben vollständig zu verbannen, wird wohl schwer halten, aber als bestes Mittel, sie in engere Grenzen zu weisen, muss das allmählich wachsende Vertrauen des Publikums zum Arzte angesehen werden. Dahin muss jeder Praktiker nach Kräften wirken, vor Allem muss er auch zu dem Zwecke die Collegialität als wesentlichsten Factor zur Erreichung des Zweckes fördern; auch in dieser Beziehung wird der praktische Arzt in den betreffenden Capiteln manchen Wink und manche Mahnung finden.

Es folgt die Geschichte des chirurgischen Standes mit einer Fülle interessanter Einzelheiten. Wenn man bedenkt, dass bereits vor 100 Jahren Pringle den Werth der frischen Luft und Ventilation in Hospitälern lehrte, Brochlesby zuerst die Baracken und Graf Stair den ersten Vertrag mit dem Feinde zum Schutze der Verwundeten abschloss, so wundert man sich, dass dieses Alles nicht schon längst Gemeingut der Völker geworden ist. — Die bedeutendste Entwicklung der Chirurgie fand im vorigen Jahrhundert in Frankreich und England statt. In Deutschland waren die Fortschritte theils aus bereits vorher angeführten Gründen geringer, zum Theil auch wohl aus dem Grunde, weil den deutschen Chirurgen Beobachtungsmaterial absolut fehlte, und zwar wegen der mangelhaften und unzureichenden Einrichtung der Spitäler, deren sich auch nur wenige Orte zu erfreuen hatten (die meisten deutschen Universitäten besaßen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts noch keine Spitäler), und ferner wegen des grossen Mangels an Leichen. Soll doch noch A. G. Richter in Göttingen die Amputationen an grossen Rüben gezeigt haben.

Nach einem kurzen Ueberblick über deutsche Medicin, über die Periode der Systeme folgt die Geschichte der chirurgischen Wissenschaft in sieben Capiteln. Auch hier ist eine reiche Fülle des Interessanten.

Wir wollen nicht darauf eingehen, ob nach unserer Ansicht der eine oder andere Chirurg zu viel oder zu wenig hervorgehoben ist, diese oder jene Methode mehr hätte berücksichtigt werden können, im Grossen und Ganzen ist die Skizze des betreffenden Zeitalters als höchst gelungen zu bezeichnen und frisch und lebendig geschrieben. So können wir das Buch jedem Arzte auf das Beste empfehlen. Er wird selbst nach schwerer und ermüdender Tagesarbeit dasselbe sicher noch mit Vergnügen lesen.

Dr. Sonnenburg.