Unterchlorigsaure Magnesia nebst freier Magnesia als Antidot bei Phosphorvergiftungen;

von

A. Bechert in Polzin.

Der Phosphor ist ein anerkannt tödtliches Gift und hat in den letzten zehn Jahren als Vertilgungsmittel von Ratten u. s. w., so wie zur Anfertigung von Zündwaaren jeder Art eine so ausgedehnte Anwendung gefunden, dass es gewiss wünschenswerth ist, im Besitze eines Gegenmittels zu sein, welches bei vorkommenden Vergiftungsfällen die verlangte Wirkung thut.

In den mir bekannten toxikologischen Werken findet man kein ausreichendes Antidot bei Phosphorvergiftungen angegeben; die Autoren rathen in der Regel eine dynamische Behandlung der Vergifteten an, von der wir, wie die Erfahrung vielfach gelehrt hat, wissen, dass sie nicht ausreicht, während Dr. Friedr. Meurer*) in neuerer Zeit auf experimentellem Wege nachgewiesen hat, dass die von Orfila empfohlene *Magnesia usta* nicht im Stande ist, die vergiftende Wirkung des Phosphors aufzuheben, eine Behauptung, die schon Duflos**) früher ausgesprochen hat. Derselbe Chemiker schlägt eine Mischung aus 1 Th. *Magnesia usta* und 8 Th. *Liquor Chlori****), also unterchlorigsaure mit freier Magnesia als Antidot bei Phosphorvergiftungen vor, deren man in keinem andern Werke erwähnt findet. Ich nahm daher Veranlassung, die Zuverlässigkeit dieses Gegenmittel näher zu prüfen, zu welchem Zwecke mit zwei Kaninchen gleichen Alters, gleichen Geschlechts und seit 14 Tagen gleichmässig gefüttert, wie folgt experimentirt wurde.

I. Dem ersten Kaninchen wurde 1 Gran granulirter Phosphor, mit Mehlteig in Pillenform gebracht, durch die Speiseröhre applicirt; es starb nach 8 Stunden.

*) Vereinte deutsche Zeitschrift für Toxikologie u. gerichtl. Chemie.

**) Dr. Ad. Duflos, die wichtigst. Lebensbedürf. etc. 2. Aufl. p. 245.

***). Ebendasselbst.

H. Dieselbe Menge Phosphors wurde dem zweiten Kaninchen in derselben Art gegeben, eine Viertelstunde später mit dem Beibringen des gedachten Antidots *) — halbstündlich $\frac{1}{2}$ Drachme — begonnen und bis zum Verbrauch der in der Anmerkung angegebenen Menge fortgefahren. Das Thier zeigte durchaus keine Vergiftungssymptome, blieb munter und legte dieselbe Fresslust an den Tag, wie sonst.

Die günstigen Resultate dieser Versuche veranlassten mich, bei Hrn Duflos anzufragen, ob das gedachte Antidot von ihm selbst oder einem andern Chemiker angerathen, und ob mit demselben bereits experimentirt sei. Herr Duflos theilte mir mit, dass er allerdings dies Gegenmittel bei Phosphorvergiftungen empfohlen, aber noch nicht Gelegenheit gehabt habe, dasselbe zu prüfen. In Folge dieser Antwort und bei der Wichtigkeit des Gegenstandes ging ich sogleich an weitere Versuche mit 6 andern Kaninchen von einem Wurf. Dieselben wurden 6 Wochen hindurch gleichmässig gefüttert, wodurch ein ziemlich gleiches Gewicht der einzelnen Thiere erreicht ward — Differenz höchstens 5 Drachmen. — Die letzten 6 Stunden vor Beginn der Versuche wurde den Thieren kein Futter, sondern nur Wasser im Ueberfluss gereicht.

1) Einem Kaninchen wurde 1 Gran Phosphor in derselben Art, wie unter I beigebracht; es starb nach 8 Stunden 20 Minuten.

2) Mit dem zweiten Kaninchen wurde ganz wie unter II. verfahren und dasselbe Resultat erhalten.

3) Dem dritten Kaninchen reichte man 1 Gran Phosphor, in der nöthigen Menge Mohnöls gelöst; nach 2 Stunden 10 Minuten zeigten sich die ersten auffallenden Vergiftungssymptome, 30 Minuten später trat der Tod ein.

4) Dem vierten Kaninchen wurde 1 Gran Phosphor in derselben Form wie unter 3) gegeben und mit der Anwendung des Gegenmittels wie unter II verfahren; das

*) *Magnesia usta* $\frac{1}{2}$ Drachme, *Liquor Chlori* $\frac{1}{2}$ Unze, *Aqua destill.* $3\frac{1}{2}$ Drachme werden mit einander gemischt und vor der Anwendung gut umgeschüttelt.

Thier starb nicht, zeigte auch keine sonderlichen Störungen im Gemeinbefinden.

5) Mit dem fünften Kaninchen wurde wie in 2) experimentirt und dasselbe Resultat erhalten.

6) Mit dem sechsten Kaninchen sollte der Versuch 4) controlirt werden, musste aber eingetretener Hindernisse wegen aufgegeben werden.

Mit dem Kaninchen 4) wurde 7 Stunden, mit dem 3) 15 Stunden nach dem Tode die Section vorgenommen. Die Ergebnisse waren bei beiden Thieren ein und dieselben und sind von Hrn. Dr. Hartwich, z. Z. Oberarzt im 4. Uhlahnenregimente, in Folgendem zusammengestellt.

»Bei der Eröffnung der Bauchhöhle starker Phosphorgeruch, nach dem Eröffnen des Magens Aufsteigen von Phosphordämpfen. Aeusserlich an den Eingeweiden der Bauchhöhle nirgends Abnormitäten sichtbar. Der Magen gefüllt mit festweichem Heu; im übrigen Theile des Darmcanals bis zum Anus ein dickflüssiger, sonst dem Ansehen nach nicht vom normalen abweichender Inhalt. Am Fundus und besonders am Pylorus des Magens mehrere stark geröthete Stellen, Blutextravasaten ähnlich, die jedoch die Muskelhaut kaum zu durchsetzen schienen. Die Schleimhaut des Magens und die einiger Zolle des obern Theiles des Dünndarmes bei der leichtesten Berührung von der Muskelhaut ablösbar und zerfallend. Leber, Nieren, Milz u. s. w. anscheinend nicht abweichend. Bei beiden Kaninchen im untern Lappen der rechten Lunge eine etwa Silbergroschen grosse und dem Pleuraüberzuge dicht anliegende, hellroth gefärbte Stelle, welche auf der entsprechenden Pleuraoberfläche keine Ausschwitzung zeigte, wie denn überhaupt die Lungenpleura mit der Rippenpleura nirgends verwachsen war. An zwei andern Stellen der Lungen zeigten sich ähnliche, nur viel kleinere Flecken. Einige Bläschen von halber Stecknadelkopfsgrösse zeigten sich in der Mitte der rothen Flecke, dicht unter der Pleura. Beim Aufblasen der Lungen erscheinen sie an diesen abweichend gefärbten Stellen wie überall durchaus wegsam, indem sie sich ganz gleichmässig ausdehnten. Beim Ein-

schneiden wurde aus den rothen Stellen einige Tropfen Blut ergossen, eine Verdichtung der Lungensubstanz liess sich nirgends bemerken. Das Herz schlaff, der rechte Ventrikel mit Blut gefüllt, der linke leer. In den Gefässen war das Blut überall dickflüssig, schwärzlich.

Die Versuche I., 1) und 3) haben gezeigt, dass 1 Gran Phosphor hinreicht, ein Kaninchen tödlich zu vergiften, und zwar weit schneller im aufgelösten Zustande, als in Substanz, während die Versuche II., 2), 4) und 5) beweisen, dass die unterchlorigsaurer Magnesia neben freier Magnesia — bald nach dem Phosphor gegeben — im Stande ist, die vergiftende Kraft desselben vollständig aufzuheben. Sowohl die unterchlorigsaurer Magnesia, als auch die säurefreie rangiren zu den antiphlogistischen Mitteln, welche im Stande sein könnten, eine Entzündung des Magens und der übrigen Verdauungswerkzeuge im lebenden thierischen Organismus zu beseitigen, welche bei ihrem ungestörten Fortgange den Tod herbeigeführt haben würde. Diese Magnesiamischung ist mithin ein chemisches Gegenmittel bei Phosphorvergiftungen, welches, da die säurefreie Magnesia keine befriedigenden Resultate liefert, nicht dadurch wirkt, dass es mit dem Gifte unschädliche schwerlösliche Verbindungen liefert, sondern dadurch, dass es zersetzend und neutralisirend auftritt.

Suchen wir nun nach einer Verbindung des Phosphors, welche sich unter allen Fällen im Magen des lebenden Organismus mit Leichtigkeit bilden und durch unterchlorige Säure zersetzt werden kann, so finden wir bald das Phosphorwasserstoffgas. Bei dem geringen Sauerstoffvorrathe im Magen oxydirt sich der Phosphor nämlich nicht direct zu Phosphorsäure, sondern zunächst zu phosphoriger Säure, deren Hydrat die Quelle des reinsten Phosphorwasserstoffgases ist. Die Elemente des letzteren werden durch die unterchlorige Säure zu unschädlichen Verbindungen — Phosphorsäure und Wasser — oxydirt, während sich Chlormagnesium bildet und die Phosphorsäure, so wie die noch unzersetzte phosphorige Säure, durch die vorhandene freie Magnesia gebunden werden. Das

folgende Schema kann den Vorgang versinnlichen: 3MgO , H^3P , $4(\text{MgO} + \text{ClO}) = 3\text{MgO} + \text{PO}^5$, 3HO , 4MgCl .

Nach dem hier Gesagten können wir wohl mit Bestimmtheit annehmen, dass die vergiftende Kraft des Phosphors in einer Blutzeretzung durch das Phosphorwasserstoffgas, und nicht in einer Entzündung, durch Anätzung und Corrosion der Magen- und Darmhaut entstanden, besteht; eine Ansicht, die schon von Mehreren geäußert ist und in dem mitgetheilten Sectionsbefunde keinen Widerspruch findet. Ich wünsche, dass die Resultate meiner Versuche zu weiteren Untersuchungen anregen mögen.

Anmerkung. Wir haben nicht verabsäumen wollen, diese wünschenswerthe Nachfolge durch schnelle Mittheilung der wichtigen Erfahrung des Hrn. Verf. recht bald zu veranlassen.

Die Red.

Untersuchung verschiedener Brennmateriellen;

von

W. Baer, d. Z. zu Halle a. d. Saale.

Fünfte Reihe *).

Wassergehalt.

Beim Trocknen der verschiedenen Substanzen, die im Luftbade einer Temperatur von $+110^\circ\text{C}$. ausgesetzt wurden, bis kein Gewichtsverlust mehr statt fand, ergaben sich folgende Resultate:

	I. Braunkohlen:	Grm.		Wasser.	
				Grm.	Proc.
1.	Rauensche in Stücken	1,759	verloren	0,680	= 38,66
		2,440	"	0,630	= 25,82†)
2.	Von Frankfurt a. d. Oder	0,890	"	0,143	= 16,07
		1,016	"	0,156	= 15,35

*) Fortsetzung zu Bd. 66, p. 267 dieses Archivs.

†) Die grosse Differenz dieser beiden Wasserbestimmungen hat darin seinen Grund, dass die zweite 8 Wochen später ausgeführt wurde, als die erste. Während dieser Zeit war die Kohle zwar an einem feuchten Orte aufbewahrt worden, aber dennoch hatte sie einen beträchtlichen Theil ihres Wassers abgegeben. Der Wassergehalt der frisch geförderten Kohle — dieser sowohl, wie auch der folgenden Braunkohlen — ist weit beträchtlicher, aber die klei-