Mittlere Oerter der Vergleichsterne.

*	α 1900.0	δ 1900.0	Autorität
1	$2^h 49^m 18^s.76$	$+17^\circ 19' 43''.8$	AG. Berlin A. 783
2	$2\ 49\ 23.40$	$+20\ 23\ 36.9$	AG. Berlin B. 855
3	$2\ 49\ 43.46$	$+26\ 28\ 23.7$	AG. Cambr. 1512

2. Beobachtungen über die Grösse und Helligkeit des Cometen.

D ist der scheinbare Durchmesser des Cometen, C die Schweiflänge, wobei, wenn zwei Zahlen gegeben sind, die erste die deutlich sichtbare Partie, die zweite die Länge bedeutet, bis zu welcher die schwächere Partie des Schweifes

bei klarer Luft noch einigermaassen sicher verfolgt werden konnte; h ist die Helligkeit des Kerns oder der kernähnlichen Lichtverdichtung im 6-zöll. Refractor, H der Helligkeitseindruck des ganzen Cometen im kleinen Sucherfernrohr.

1900	M. Z.	D	C	h	H	1900	M. Z.	D	C	h	H
Juli	25	$13\frac{1}{4}^h$	—	30'	—	6 $\frac{1}{2}^m$	Aug.	30	9 ^h	—	$9\frac{1}{2}^m$ 8 ^m .3
	26	$14\frac{1}{4}$	2'—3'	> 10	—	6.8		31	9	1'	$9\frac{1}{2}$ 8.5
	27	14	3	15—60	8 ^m	6 $\frac{1}{2}$	Sept.	3	$11\frac{1}{4}$	—	10 8.7
	28	$14\frac{1}{4}$	3	8—30	9	7		14	8	—	10 9.2
	31	$14\frac{1}{2}$	3	> 8	8	6.6		15	$8\frac{3}{4}$	—	— 9.2
Aug.	1	$10\frac{1}{2}$	—	Schweifspur recht hell	—	6.7		16	8	—	— 9.3
	6	$14\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	30	9	6 $\frac{1}{2}$		17	8	—	$9\frac{1}{2}$ 9.2
	7	14	> 2	10—30	9	6.4		19	$9\frac{3}{4}$	—	10 9.5
	9	$14\frac{1}{4}$	—	(CC)	—	7		22	$10\frac{1}{4}$	—	— 9.5
	11	$13\frac{1}{2}$	—	8 (CC)	9	7.2		23	8	—	— 9.5
	16	$9\frac{1}{2}$	2	10—30	$9\frac{1}{2}$	7.2		25	$8\frac{3}{4}$	—	— 9.7
	17	$9\frac{1}{2}$	2	10—30	$9\frac{1}{2}$	7.4		27	$7\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$	10.11 9.5
	19	$9\frac{1}{4}$	—	5—15	$9\frac{1}{4}$	7.7		30	9	$1\frac{1}{2}$	— 10
	20	$9\frac{1}{2}$	—	8—15	9	7.5	Oct.	1	$11\frac{1}{4}$	—	— $10\frac{1}{4}$
	21	9	2	10—20	9	7.8		2	$11\frac{1}{4}$	—	— 10
	22	9	$1\frac{1}{2}$	5—15	$9\frac{1}{4}$	7.9		4	$14\frac{1}{4}$	—	— $10\frac{1}{2}$
	23	$9\frac{3}{4}$	—	> 10	$9\frac{1}{2}$	7.8		13	8	—	— $10\frac{3}{4}$
	25	$10\frac{3}{4}$	—	—	—	8.0		16	9	—	— $10\frac{2}{8}$
	26	$12\frac{1}{2}$	—	5—12	$9\frac{1}{2}$	8.2		24	9	—	— $11\frac{3}{4}$
	27	9	—	5—15	$9\frac{3}{4}$	8.2		28	$7\frac{1}{2}$	—	— $11\frac{3}{4}$

Wien, 1900 December 10.

J. Holetschek.

Periodische Veränderungen im Spectrum der Nova Persei.

Von dem interessanten Spectrum der Nova Persei habe ich eine Reihe photographischer Aufnahmen mit meinem $10\frac{1}{4}$ Reflector, theils mit einem 10-zölligen Objectivprisma theils mit einem Quarzspectrographen angefertigt. Bis heute kam ich nicht dazu, das interessante Material zu bearbeiten, eine eigenthümliche periodische Veränderung hat mich aber veranlasst, die folgende vorläufige Mittheilung zu veröffentlichen.

Mir ist zuerst eine plötzliche Veränderung des Spectrums am 6. April aufgefallen. Ich habe mehrere, mit dem Objectivprisma gemachten Aufnahmen vom 31. März und 6. April verglichen und bemerkt, dass das continuirliche Spectrum am 6. April bedeutend schwächer geworden ist und auf dem schwachen Grunde die auffallend starken und breiten hellen Linien besonders contrastreich auftraten. Die Schwächung des continuirlichen Spectrums habe ich der Lichtabnahme der Nova zugeschrieben, auffallend war aber, dass statt der hellen Wasserstofflinie $H\zeta$ ($\lambda = 3889$) eine sehr starke, breite, helle Linie sichtbar war, welche ich oft

in den planetarischen Nebeln gefunden habe, (λ circa 3860). Diese Linie hatte die grösste Helligkeit, so dass sie entschieden heller war als $H\gamma$, was ich aus mit stehendem Uhrwerk aufgenommenen Spectren ganz sicher constatirte.

Am 8. April (Objectivprisma) habe ich wieder das alte Spectrum, mit starkem continuirlichen Grunde, erhalten und statt der dicken Nebellinie war wieder $H\zeta$ sichtbar.

Die Helligkeit hat bedeutend zugenommen, die Aufnahme am 31. März mit zwei Minuten Exposition war mit derjenigen vom 6. April mit 10 Minuten gleich, und die Aufnahme vom 8. April mit zwei Minuten war bedeutend intensiver als die eben genannten.

Ich habe immer 10 bis 12 Aufnahmen gemacht von 1 bis 30 Minuten Exposition, so dass ein Vergleich leicht ausführbar ist.

Da bei der geringen Dispersion des Objectivprismas die Wasserstofflinie $H\zeta$ ($\lambda = 3889$) und die Nebellinie ($\lambda = 3860$) sehr nahe zusammen fallen, habe ich die späteren Aufnahmen

mit meinem Quarspectrographen gemacht und gleichzeitig das Wasserstoffspectrum mitphotographirt.

Auf diesem Wege ist es mir gelungen, die vermuthete periodische Veränderung ganz sicher zu constatiren.

Am 11. April habe ich zwei Aufnahmen gemacht (20 Minuten und eine Stunde), welche derjenigen vom 6. April ähnlich sind, recht matter continuirlicher Grund, sehr starke Linien, welche beim Wasserstoff alle nach dem rothen Ende verschoben sind. Nebellinie entschieden auf der violetten Seite der künstlichen $H\zeta$ -Linie, keine Coincidenz mit derselben, ausserdem eine kräftige ultraviolette Linie (gegen $\lambda = 342$) und eine schwächere (gegen $\lambda = 339$), zusammen 15 bis 16 helle Linien.

Am 15. April (30 Minuten) sehr schwaches Bild wegen Wolken, ähnlich wie am 11. April.

18. April. Zwei Aufnahmen (15 Min., 45 Min.). Das continuirliche Spectrum ist sehr stark, $H\zeta$ deutlich sichtbar, keine Spuren von der Nebel- und der ultravioletten Linie, wie am 31. März und 8. April. Das Aussehen des Spectrums ist so abweichend von demjenigen am 11. April, dass ich auf den ersten Blick an eine Verwechselung der Nova mit einem gewöhnlichen Stern glaubte, bis ich die hellen Wasserstofflinien mit einer Lupe deutlich gesehen hatte.

21. April. Wieder das Spectrum vom 11. April.

22. April. Ebenso, beide schöne kräftige Aufnahmen.

25. April. Aehnliche, sehr schwache Aufnahme, ultraviolette Linie (342) deutlich sichtbar.

27. April. Zwei Aufnahmen (20 Min., eine Stunde). Starkes continuirliches Spectrum, von welchem die hellen Wasserstofflinien kaum abstechen. Nebellinie scheint im Uebergangsstadium zu sein, ultraviolette Linien unsichtbar.

28. April. (20 Min.). Schwaches continuirliches Spectrum, ultraviolette Linien unsichtbar.

29. April. (25 Min.). Vollständig wie am 11. und 21. bis 22. April, ultraviolette Linie sehr deutlich, continuirliches Spectrum sehr matt, Nebellinie die hellste.

Aus diesen ganz flüchtigen Beschreibungen ist zu ersehen, dass ich zwei verschiedene Spectra — bei einem das continuirliche, bei dem anderen das Gasspectrum überwiegend — beobachtet habe, welche periodisch wiederkehren.

Das continuirliche Spectrum habe ich sehr deutlich am 31. März, 8., 18., 27. April und das Gasspectrum am 6., 11., 21., 22., 25., 29. April beobachtet. Es scheint, dass das continuirliche Spectrum eine Periode von circa 9 Tagen hat und der Stern längere Zeit in dem Zustande verweilt, welcher dem Gasspectrum entspricht. Leider verhinderte das ungünstige Wetter besser ausreichendes Material zu sammeln, und jetzt bei dem tiefen Stand der Sterne ist wenig Hoffnung vorhanden, die Perioden weiter verfolgen zu können.

Herény, Astrophysikalisches Observatorium, 1901 Mai 1.

Eugen v. Gothard.

Beobachtungen des Cometen 1901 a.

(Telegramm von Herrn P. Baracchi, Director der Sternwarte in Melbourne).

Beob.	1901	RA. app.	PD. app.	
Melbourne	April 27.355 Gr. m. t.	15° 13'	88° 23'	uncertain
»	30.850 »	46 15	90 42	»
Tebbutt	Mai 2.8380 »	53 47 37.5	90 35 29"	
»	4.8426 »	60 38 0	90 8 12	
»	5.8572 »	63 46 25.5	89 48 52	

Die Melbournier Beobachtung vom 27. April steht in Widerspruch mit den Ortsbestimmungen am Cap und ist wohl zu verwerfen.

Die in London erscheinende »Daily Mail« enthält folgende, mir von dem Hamburger Vertreter derselben freundlichst mitgetheilte Notiz über den Schweif des Cometen:

»A telegram has been received in London from the observatory at Mauritius stating that a photograph of the new comet has been secured. Three distinct tails are visible, the length of the longest being 15 degrees, or thirty times the diameter of the moon. The comet was travelling north-west.«

Kr.

Berichtigung zu AG. Leipzig II Zone +5° bis +10°. Bei dem Stern Nr. 6191 ist für die Declination statt: 6° 47' 12.6 zu setzen: 6° 48' 12.6. B. Peter.

Inhalt zu Nr. 3713. I. v. Benko. Mikrometer-Beobachtungen. 257. — I. v. Benko. Beobachtungen von Sternbedeckungen durch den Mond 1899-1900. 261. — I. v. Benko. Beobachtung der Sonnenfinsterniss am 28. Mai 1900. 263. — I. v. Benko. Beobachtung der Saturnbedeckung am 13. Juni 1900. 265. — L. Weinek. Zur Leonidenerscheinung 1900. 265. — J. Pidoux. Positions de petites Planètes. 267. — J. Holetschek. Beobachtungen des Cometen 1900 II. 267. — E. v. Gothard. Periodische Veränderungen im Spectrum der Nova Persei. 269. — Beobachtungen des Cometen 1901 a. 271. — Berichtigung. 271.