IV. Specielle analytische Methoden.

1. Auf Lebensmittel, Handel, Industrie, Agricultur und Pharmacie bezügliche.

Von

W. Lenz.

Wasseranalyse.*) Zur Bestimmung der organischen Substanz im Trinkwasser haben W. Dittmar und H. Robinson**) die Frankland'sche***) Methode dahin vereinfacht, dass sie die Bestimmung des Kohlenstoff- und Stickstoffgehaltes der organischen Substanz durch zwei gesonderte Verbrennungen des von Nitraten und Carbonaten befreiten Abdampfungsrückstandes gewichtsanalytisch resp. colorimetrisch bewirken. Die Methode schliesst sich der Frankland'schen eng an, und kann, da letztere in Deutschland fast nie zur Anwendung kommt, bezüglich der Einzelheiten †) hier nur auf das Original verwiesen werden.

Auch Edmund J. Mills††) hat die Wasseranalyse und besonders die Frankland'sche Methode zur Bestimmung der organischen Substanz bearbeitet. Er empfiehlt zur Verdampfung der Wassers Schälchen von möglichst geringem Durchmesser (etwa 3 inches = 7,6 cm) zu verwenden, da mit der Grösse der Schalen die wahrscheinlichen Fehler der Bestimmung beträchtlich wachsen. Um Wasser in kürzester Zeit in kleinster Schale verdunsten zu können, hat Mills einen eigenen Apparat construiert, bezüglich dessen hier ebenfalls nur auf das Original Bezug genommen werden kann.

*) Vergl. diese Zeitschrift **1**, 106; **2**, 422; **4**, 459; **5**, 11, 23, 58; **7**, 351, 353; **8**, 91, 330; **9**, 157; **11**, 16, 102, 136, 313, 333; **12**, 377, 378, 427; **13**, 79; **14**, 17, 22, 89, 130; **15**, 230, 353, 425, 478; **16**, 359, 461, 465, 500; **17**, 247, 276, 301, 372, 387, 434, 461; **18**, 117, 156, 195, 359, 535, 558, 614, 615; **19**, 101, 205, 259.

) Chem. News **36, 26; von den Verfassern eingesandt.

***) Diese Zeitschrift **8**, 485.

†) Vergl. hierzu auch R. Fresenius, Anleitung zur quantitativen Analyse, 6. Aufl. Bd. 2 S. 165.

††) „On potable waters“ Journal of the chemical society February 1878; vom Verfasser eingesandt.

In einer sehr langen und ausführlichen Abhandlung hat C. Meymott Tidy*) die Methoden zur Bestimmung organischer Verunreinigungen im Trinkwasser besprochen. Nach ihm liefert die Methode von Wanklyn, Chapman und Smith**) besonders schwankende Resultate. Die Frankland'sche Verbrennungs-Methode gab unter Vermeidung aller Fehlerquellen bei wiederholten Analysen desselben Wassers constante Resultate. Verfasser schlägt zur allgemeinen Anwendung eine Methode vor, welche auf Bestimmung der Oxydirbarkeit des Wassers durch übermangansaures Kali bei gewöhnlicher Temperatur beruht; dieselbe soll sehr genaue und constantere Resultate geben, als die übliche Oxydation in erhitzter saurer Lösung. Zur Ausführung sind erforderlich 1) Verdünnte Schwefelsäure (1 Schwefelsäure 3 Wasser). 2) Kaliumpermanganatlösung, 2 grains (0,1296 g) in 1000 septems $= \frac{1}{10}$ gallon (454,3458 cc). 20 septems (9,0869 cc) derselben oder 0,04 grains (0,002592 g) Kaliumpermanganat enthalten 0,010 (0,0006480 g) verfügbaren Sauerstoff. 3) Wässrige Jodkaliumlösung (1:10). 4) Eine Lösung von unterschwefligsaurem Natron, 4,5 grains (0,2916 g) in 1000 septems (454,3458 cc) Wasser. 5) Stärkelösung, 10 grains (0,6480 g) Stärke werden mit 100 septems (45,43 cc) kochenden Wassers angerieben und filtrirt. Die filtrirte Flüssigkeit wird dann gekocht und nach 24 stündigem Stehen die klare Lösung abgehoben.

Zur Ausführung der Bestimmung werden in zwei ungefähr 600 cc fassende Kolben je 500 septems (227,17 cc) des zu untersuchenden Wassers, 20 septems (9,09 cc) verdünnte Schwefelsäure und 20 septems Permanganatlösung abgemessen, sowie genau notirt, zu welcher Zeit letztere zugefügt wurde.

Nach Verlauf einer Stunde wird im ersten, nach 3 Stunden im zweiten Kolben der Ueberschuss an Permanganat mit Hilfe der Jodkalium- und der Natriumhyposulfitlösung zurücktitrirt. Sollte die rothe Färbung der Flüssigkeit schon vor dem Zurücktitriren verschwunden sein, so muss der Versuch mit gesteigerten Mengen Permanganat wiederholt werden. Zur Messung des Permanganat-Ueberschusses wird der Flüssigkeit eine genügende Menge Jodkaliumlösung zugegeben, und das nach der Gleichung: $\text{KO}, \text{Mn}_2\text{O}_7 + 5 \text{KJ} + 8 (\text{HO}, \text{SO}_3) = 2 (\text{MnO}, \text{SO}_3) + 6 (\text{KO}, \text{SO}_3) + 5 \text{J} + 8 \text{HO}$ frei werdende Jod mit unterschwefligsaurem Natron (und Stärkelösung als Indicator) wie gewöhnlich zurücktitrirt.

*) Journal of the chemical society No. 194, 46.

**) Diese Zeitschrift 8, 487.

Der Wirkungswerth des veränderlichen unterschwefligsauren Natrons wird gleichzeitig durch einen nach obiger Vorschrift, aber mit destillirtem Wasser angestellten Versuch ermittelt.

Auf eine längere interessante Abhandlung »Ueber den Nachweis der organischen Substanzen in Wasser« von F. Tiemann und C. Preusse*) kann hier nur aufmerksam gemacht werden, da dieselbe neue analytische Methoden nicht bringt.

F. Reuter**) weist darauf hin, dass die Richtigkeit der hydrotimetrischen Wasseranalyse***) von der Zusammensetzung des Wassers abzuhängen scheint. Bei Untersuchung des Wassers der Luxemburger Wasserleitung fand Verfasser hydrotimetrisch nur 80 % des thatsächlich vorhandenen Kalkes, während in anderen Fällen die hydrotimetrisch erhaltenen Zahlen mit den Resultaten der gewöhnlichen Analyse gut stimmten.

Ueber Untersuchung der Weizenmehle. †) Einen Maassstab zur Beurtheilung der Backfähigkeit des Mehles erhält man nach F. Kick ††) durch Bestimmung des Klebergehaltes sowie derjenigen Wassermenge, welche zur Teigbildung erforderlich ist. Um beide Proben zu vereinigen, macht man aus 25 g Mehl den Teig, wägt und erfährt so die Menge des erforderlich gewesen Wassers. Die Teigkugel wird nun zur Bestimmung des Klebers unter Wasser mit der nöthigen Vorsicht über einem Siebe ausgeknetet. Die erhaltenen Teiggewichte werden um so höher sein, je trockner die Mehle und je kleberreicher sie sind. Ein 3—4 stündiges Erwärmen des Mehles auf höchstens 70° C. verändert dasselbe nicht, während bei längerer Einwirkung höherer Temperatur der Kleber eine mehr oder minder durchgreifende Zersetzung erleidet, welche sowohl die Ausbeute als die Qualität des eventuell zu erhaltenden Klebers vermindert.

Bestimmung von Stärkemehl in Würsten. †††) H. Frickhinger§) macht darauf aufmerksam, dass bei der quantitativen Bestimmung des

*) Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch. z. Berlin **12**, 1906.

**) „Observations sur l'hydrotimetrie“; vom Verfasser eingesandt.

***) Vergl. diese Zeitschrift **8**, 330; **9**, 157.

†) Vergl. hierzu diese Zeitschrift **6**, 277; **10**, 365; **11**, 338.

††) Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Agricultur-Chemie **21**, 536.

†††) Vergl. diese Zeitschrift **19**, 233.

§) Archiv d. Pharm. **215**, 235.