V.

Zur Pathologie der sogenannten Otosklerose.

Von

Prof. Dr. J. Habermann in Graz.

(Mit 10 Abbildungen im Text und Tafel II—VII.)

Das Krankheitsbild der sogenannten Otosklerose ist seit einer Reihe von Jahren unausgesetzt Gegenstand otologischer Forschungen und trotzdem noch so unklar und verschwommen, daß weitere Untersuchungen darüber immer noch notwendig sind. Meine eigenen Untersuchungen über diesen Gegenstand, die bis zum Jahre 1891¹⁾ zurückreichen und zerstreut teils in meiner pathologischen Anatomie in Schwartzes Handbuch, teils auf mehreren Otologentagen in Kürze mitgeteilt wurden, sollen im nachfolgenden im Zusammenhang ausführlich als Beitrag zur Kenntnis dieser Krankheit zur Darstellung kommen. Wenn ich dies bisher immer verschob, so war dies dadurch begründet, daß ich immer noch von neuem Untersuchungsmaterial weitere Aufklärung erwartete.

Fall I.

Der erste Fall dieser Erkrankung, den ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, ist in meiner zweiten Abhandlung „Über Nervenatrophie im inneren Ohr²⁾“ als letzter Fall beschrieben worden mit der Diagnose: Abgelaufene Mittelohrentzündung und geheilte Otitis in der Umgebung der Steigbügelbasis. Ankylosis des Stapes und Nervenatrophie in der Schnecke beiderseits. Da diese Mitteilung nur wenig bekannt wurde, will ich das wichtigste daraus hier mit einigen Ergänzungen kurz anführen, die ich heute nach neuerlicher Durchsicht der Präparate dieses Falles noch anfügen muß.

1) Zeitschr. f. Heilkunde. 1891. Bd. XII. S. 381.

2) Ebenda. S. 357.

C. Adalbert, 63jähriger Tagelöhner aus G., war schon seit 20 Jahren hochgradig schwerhörig, so daß er nur lauteste Sprache in der Nähe des Ohres noch verstand. Über die Ursache seines Ohrenleidens ist leider nichts bekannt, er lag nur kurze Zeit mit Ikterus und chronischer Nephritis in der Klinik des Prof. v. Jaksch in Prag und starb dort am 10. April 1890.

Das Sektionsprotokoll, das ich ausführlich mitteilte, ergibt für die Erklärung der Knochenkrankung im Schläfenbein keine Anhaltspunkte.

Im rechten Ohre fand ich bei der Untersuchung eine große Narbe im Trommelfell mit einem zapfenartigen Einschluß von Epidermis, die Auskleidung des Mittelohres ohne wesentliche Veränderung, und in der vorderen Umgebung des ovalen Fensters, sowie in der äußeren Wand der Nische des runden Fensters je einen Herd chronischer Ostitis der Pars petrosa, der, wie folgt, beschrieben wurde. „In der Umgebung der Fußplatte des Steigbügels, und zwar etwas unterhalb des Fazialiskanals von dem ovalen Fenster beginnend, nach unten bis zur oberen Grenze des Ligamentum spirale des Endteils der basalen Schneckenwindung, und nach hinten und oben bis zum äußeren Rande der Macula acustica utriculi reichend, war der Knochen auffällig pathologisch verändert. Es unterschied sich dieser Teil des Knochens auffällig von dem normalen, und war die Grenze zwischen beiden meist ziemlich scharf gezogen. Der veränderte Knochen nahm die Farben Hämatoxilin und Karmin viel stärker an als der gesunde. Im erkrankten Knochen waren die Haversischen Kanäle bedeutend erweitert, und ebenso die dieselben durchziehenden Gefäße. An manchen Stellen fanden sich auch in einer Reihe nebeneinander geordnet Osteoblasten ähnliche Zellen dem Knochen anliegend. Der Knochen selbst zeigte einen sehr unregelmäßigen Bau, die Knochenkörperchen waren oft ganz unregelmäßig durcheinander gelagert, stellenweise schienen sie auch an Zahl vermehrt zu sein, und ähnelte der Knochen an manchen Stellen mehr einem verkalkten Knorpel. Etwas über dem Steigbügel fand sich eine größere Lücke mitten im Knochen, die nur mit Bindegewebe ausgefüllt war. Ähnliche Lücken fanden sich auch unmittelbar unter der tieferen Schicht der Schleimhaut in der Nische des ovalen Fensters, und zwar sowohl über dem Steigbügel, ausgebreiteter aber noch unterhalb desselben, und zeigte dort der Knochen solche mit Bindegewebe ausgefüllte Lücken bis unter die Periostschicht des Labyrinths. Der Steigbügel selbst zeigte keinen Defekt an seiner Basis, im Gegenteil fanden daselbst mehrfache ausgedehnte Verkalkungen, die von der Labyrinthwand herüber zur Steigbügelbasis gingen und so eine partielle Ankylose seiner Gelenkverbindung bedingten. Neben dieser umschriebenen Ankylose durch Verkalkung fand sich noch Kalkeinlagerung in dem Knorpelbelag des Gelenks und des Zwischenbandes. Nur an der hinteren unteren Peripherie des Stapes war Gelenk und angrenzender Knochen normal. Daß auch die an den pathologisch veränderten Knochen angrenzenden Gewebe mit an dem Erkrankungsprozeß teilgenommen hatten, war einerseits durch eine starke, bindegewebige Verdickung der angrenzenden Periostschicht der Schleimhaut der Paukenhöhle zu erweisen, andererseits durch eine ähnliche Verdickung des an den otitischen Herd grenzenden Endostes des Vorhofs, das reichliche Spindelzellen und stellenweise auch Kalkeinlagerungen aufwies.

Im linken Ohr war das Trommelfell dünn und atrophisch und ohne Narbe. Die Mittelohrauskleidung und die Veränderungen im Knochen gleich wie im rechten Ohr, nur mit dem Unterschiede, daß die Erkrankung an der äußeren Wand der runden Fensternische fehlte, und an der ovalen sich über dessen hinteren Umfang hinaus noch eine Strecke weit im Knochen fortsetzte bis an den Nervendurchtritt zur äußeren Ampulle. Auch hatte die Erkrankung direkt auf den hinteren Teil der Steigbügelbasis übergreifen und zu einer knöchernen Ankylose geführt. In der vorderen Hälfte der Steigbügelnische fand sich eine größere Menge fibrösen Bindegewebes, das den vorderen Schenkel umhüllte.

Zu der Beschreibung der Knochenveränderungen in diesem Falle muß ich heute, nachdem ich diese alten Präparate noch einmal

durchstudiert habe, nachtragen, daß die Veränderungen, die die Erkrankung im Knochen setzte, einen verschiedenen Charakter zeigten. So fanden sich an der vorderen Peripherie des ovalen Fensters beiderseits neben einer deutlichen Sklerosierung des Knochens (Fig. 1 auf Taf. II. III), die auch stellenweise stärkere Kalkablagerung zeigte, gegen die Paukenhöhle zu Partien, in denen der Knochen mehr poröses Gefüge hatte und von weiteren Gefäßräumen und fettmarkhaltigen Kanälen durchzogen war, während an der vorderen und inneren Grenze des Erkrankungs-herdes im Knochen sowie auch an der hinteren Peripherie der ovalen Fensternische (Fig. 2 auf Taf. II. III) die Erkrankung einen frischeren Charakter aufwies. Der Knochen färbte sich hier stärker mit Eosin, seine Zellen waren größer, und war dieser mehr osteoide Knochen von zahlreichen Gefäßkanälen durchzogen, die neben weiten Gefäßen zahlreiche größere Zellen und auch einzelne Riesenzellen (Osteoklasten) enthielten. Nach diesem Befund muß ich den bei der damaligen Mitteilung dieses Falles gebrauchten Ausdruck „geheilte“ Otitis dahin richtigstellen, daß dies nur für einen großen Teil des Krankheitsherdes gilt, der Prozeß aber in der Peripherie des Herdes noch im Fortschreiten begriffen war.

Als Ursache für diese symmetrische Erkrankung des Knochens beider Ohren habe ich damals die eitrige Mittelohrentzündung angeführt, die bei dem Mann wenigstens rechts sicher vorausgegangen war und angenommen oder vermutet, daß beide Ohren aus derselben Ursache vielleicht infolge einer anderen akuten Erkrankung oder infolge von Typhus von diesem Leiden befallen wurden. Die hochgradige Schwerhörigkeit hatte schon mindestens 20 Jahre vor dem Tode gedauert, und ebensolang dürften also auch die Veränderungen an den Fenstern bestanden haben.

Fall II.

Magdalena N., 61jährige ledige Bedienerin, wurde am 28. Mai 1891 moribund auf die II. medizinische Abteilung aufgenommen. Nach der mit ihrer Tochter aufgenommenen Anamnese litt die Kranke schon seit ca. 15 Jahren an höhergradiger, zunehmender Schwerhörigkeit und starken subjektiven Geräuschen in den Ohren. Anfangs sollen auch Schmerzen zeitweise in den Ohren vorhanden gewesen sein und auch Schwindel und Kopfweh. Nie aber wurde ein Ausfluß aus den Ohren beobachtet. Seit 10 Jahren etwa war die Kranke nahezu ganz taub, sie verstand ihre Tochter nur noch, wenn sie ihr laut ins rechte Ohr hinein schrie. Auf dem linken Ohr, das immer schlechter war als das rechte, verstand sie auch ihre Tochter nicht mehr. Der Schwindel und die Schmerzen haben mit dem Eintreten der nahezu vollständigen Taubheit aufgehört, das Sausen und Kleschen (?) in den Ohren bestand aber mit Unterbrechungen fort. Sie war sonst stets gesund, nur

litt sie öfters an Zahnschmerzen und an Kopfwch. Die Ursache ihres Ohrenleidens soll Überanstrengung sein, indem sie vor etwa 30 Jahren ihre schwer kranken Eltern durch 3 Jahre pflegte. Sie soll damals oft sehr über Schwerk im Kopfe geklagt haben. Eine Untersuchung der Ohren konnte während des Lebens nicht mehr vorgenommen werden, da die Kranke hoch fieberte und nicht mehr bei Besinnung war. Die Sektion der am 28. Mai 1891 Verstorbenen ergab:

Körper mittelgroß, stark abgemagert, von starkem Knochenbau. Schädeldach gehörig groß, länglich oval, symmetrisch, ziemlich dick und kompakt. Die Gefäßfurchen an der Innenfläche seicht. Die harte Hirnhaut gespannt, glatt, blutreich. Der große Sichelblutleiter enthält wenig locker geronnenes Blut. Die weichen Hirnhäute an der Konvexität glatt, über den Gefäßen leicht getrübt, und die Gefäße überall reichlich mit Blut gefüllt. Die weiße Hirnsubstanz weich, von teigiger Konsistenz, sehr feucht, von zahlreichen größeren und kleineren Blutpunkten durchsetzt. In den Ventrikeln eine große Menge seröser Flüssigkeit, durch welche sie erweitert sind. Die Plexus zart, wenig Blut enthaltend. Die zentralen Ganglien des Großhirns blutreich. Kleinhirn von ähnlicher Beschaffenheit wie das Großhirn, auch in allen Teilen feucht und blutreich. Weiße Hirnhaut an der Basis von gewöhnlicher Beschaffenheit. Die Blutleiter gefüllt mit flüssigen dunklen Blutgerinnseln. Unterhautzellgewebe fettreich, Muskulatur dünn, rostbraun. In den Jugularvenen flüssiges Blut. Brustdrüsengewebe spärlich, grobkörnig. Rippenknorpel vollständig verknöchert.

Das Herz schräg gelagert, gehörig groß, fettreich, enthält Gerinnsel; die Höhlen gehörig weit und ihre Wandungen entsprechend dick, rostbraun; die Klappen durchwegs gut geformt. Intima der Aorta nur stellenweise von Kalkeinlagerungen durchsetzt.

Die linke Lunge an der Spitze durch Bindegewebe fixiert, groß, im Oberlappen zumeist lufthaltig, nur in der Spitze eine kleine narbige Einziehung und von einzelnen derben fibrösen, pigmentierten Knoten durchsetzt, sonst durchfeuchtet und blutreich. Der Unterlappen allenthalben lufthaltig, blutreicher und stärker durchtränkt als der Oberlappen. In den Bronchien überall zäher Schleim. Die rechte Lunge an der Spitze bindegewebig fixiert, ähnlich beschaffen wie die linke. Der Oberlappen von einem größeren derben, pigmentierten, und mit kalkigen Einlagerungen versehenen Knoten durchsetzt. Mittel- und Unterlappen wie links. Der Magen ungewöhnlich stark ausgedehnt. Der Nabelring hochgradig erweitert und durch ihn das Peritoneum zu einem Bruchsack ausgestülpt, in welchem das ganze große Netz bis zu seiner Insertion, die ganze Pars pylorica und das Anfangsstück des Duodenums vorgelagert sind. Ersteres ist im Bruchsack fixiert, letztere frei und an ihren freien Enden vom Rand des Nabelringes eingeschnürt. Die Milz ist sehr klein, die Kapsel nur leicht verdickt, das Gewebe weich und brüchig, die Pulpa spärlich. Die linke Niere mittelgroß, ihre Kapsel zart, leicht ablösbar, das Gewebe fest und blutreich. Die rechte Niere etwas blutreicher als die linke. Die Serosa an der großen Kurvatur des Magens injiziert, zeigt zahlreiche Ekchymosen, in ihm eine trübe, blutig gefärbte Flüssigkeit. An der hinteren Magenwand zwei übereinander gelagerte Geschwüre, von denen das obere etwas spaltförmig, 1,5 cm lang ist, das untere etwas kleiner und rundlich geformt ist. Die Ränder weich und der Grund mit kaffeesatzartiger Masse belegt. Die Schleimhaut sonst zeigt Stauung, Ekchymosierung und Wulstung. Die Schleimhaut des Dick- und Dünndarmes injiziert, mit wenig Inhalt gefüllt. Das S. romanum und Rektum voll gefüllt mit Skybalis. Die Leber mäßig groß, ihre Oberfläche glatt, ihr Peritonealüberzug leicht verdickt. Am Durchschnitt ist das Gewebe teigig weich, stark bluthaltig, dunkelrot gefärbt. Die Gallenblase mäßig groß und mit dicker, schwarzbrauner Galle erfüllt. Die Blasenwand verdickt, kontrahiert, in derselben fast kein Inhalt. Genitalien normal.

Die pathologisch-anatomische Diagnose lautete: *Hernia umbilicalis incarcerata. Tuberculosis obsoleta pulmonum.*

Die Untersuchung der Gehörorgane, die mir überlassen wurden, ergab an den Nerven im inneren Gehörgang und den Trommelfellen nichts Beson-

deres. Der Knochen war nicht sklerotisch und verhältnismäßig leicht zu durchsägen. Bei Luftdruckvermehrung im äußeren Gehörgang zeigte ein in den oberen Bogengang eingekittetes Manometer keine Bewegung des Flüssigkeitstropfens. Die Schleimhaut der Paukenhöhle und des Antrums anscheinend nicht verändert, die Steigbügel im ovalen Fenster unbeweglich. Die größeren Gefäße am Promontorium stark mit Blut gefüllt. Die äußeren Teile des Schläfenbeins werden in Sublimat, die inneren in Müllerscher Flüssigkeit gehärtet, entkalkt und histologisch untersucht.

Mikroskopischer Befund.

Rechtes Gehörorgan.

Inneres Ohr. In der Schnecke reichliches Pigment zwischen den Nerven und Ganglienzellen, längs der *Lamina spiralis*, in der *Stria vascularis* und freies Pigment liegt auch in größerer Menge der *Stria vascularis* auf. Im Endteil der basalen Windung findet sich eine ausgebreitete Hämorrhagie in dem *Ligamentum spirale*. Im rückläufigen Teil der basalen Windung sind die Ganglienzellen auffällig an Zahl vermindert. Ein großer Teil der Paukentreppe ist in der untersten Windung mit neugebildetem endostalem Knochen ausgefüllt und der Überrest von einem Netz dünnen, fadenförmigen Bindegewebes durchzogen. Der neugebildete Knochen grenzt in größerer Ausdehnung an einen chronisch entzündeten Knochenherd des Felsenteils und ist da in gleicher Weise wie dieser pathologisch verändert. An der Vorhofswand ist die periostale Auskleidung größtenteils verkalkt und sind dazwischen und darauf große Mengen von Pigment eingelagert, ebenso findet sich auch viel Pigment in den *Cristae* und den angrenzenden Teilen des oberen und äußeren Bogenganges, unterhalb des Epithels und zwischen den Nerven. Die Knochenkrankung reicht bis zum Nervendurchtritt des *Ramus vestibularis* zur *Macula utriculi* heran, umgreift aber diesen nicht. In den häutigen Bogengängen ist die innere Wand meist glatt und finden sich nur im äußeren Teil des äußeren Bogengangs einzelne Erhebungen (Papillen). Die Vorhofswasserleitung ist frei, die Vene neben ihr stark erweitert und mit Blut gefüllt, die Schneckenwasserleitung an ihrer Mündung in die Schnecke offen, dann weiter in dem erkrankten Knochen nicht aufzufinden, im innersten Teil aber wieder deutlich zu sehen. Auch die Vene des *Ductus venosus* habe ich nicht finden können.

Mittelohr. Von der Eustachischen Röhre war nur ein Teil der knöchernen Tuba noch am Präparate. An der unteren Wand war ihre Auskleidung hochgradig verdickt durch Vermehrung des submukösen und periostalen Bindegewebes, und fanden sich an der Oberfläche mehrere zottenförmige Auswüchse. Die Oberfläche des Knochens häufig uneben, wie angeknagte, größere Gefäßkanäle führen in große Lücken im Knochen mit ähnlicher Oberfläche, die mit fibrösem Bindegewebe ausgefüllt sind. An vielen Stellen zeigt sich die Wand dieser zahlreichen Lücken im Knochen stark verkalkt, wie aus der starken Färbbarkeit mit Hämatoxylin zu ersehen ist.

Das Trommelfell war im allgemeinen dünn und nur in seiner Schleimhautschicht, die aus faserigem Bindegewebe ohne deutliche Kerne bestand, stellenweise etwas verdickt. In der Paukenhöhle war die Schleimhaut am Promontorium etwas dicker und enthielt ziemlich reichliche Spindelzellen und stellenweise auch Bildungszellen, die sich durch erweiterte Gefäßkanäle auch in den Knochen hinein verfolgen ließen. Besonders verdickt war die Schleimhaut in der unteren Hälfte des Promontoriums. Hier fand sich eine dicke periostale Schicht aus sklerotischem Bindegewebe, das nur spärliche, lange Spindelelemente enthielt, und lag dieser Schicht die verdickte eigentliche Schleimhaut mit deutlichen Zeichen chronischer Entzündung auf. Die Nische des runden Fensters war in ihrem vorderen Teil zum Teil durch Exostosen des erkrankten Knochens, zum Teil durch fibröses Bindegewebe abgeschlossen, in ihrem hinteren Teil aber frei. Doch findet sich hier noch immer an der inneren Seite der Fenstermembran der schon oben erwähnte neugebildete Knochen, der die Paukentreppe zum großen Teil ausfüllt. Er bildet schließlich eine immer dünner werdende Knochenplatte,

die an Schnitten durch den hintersten Teil des Fensters nur noch in der Mitte der Membran erhalten ist. Dieser Knochen steht auch in direkter Verbindung mit dem erkrankten Knochen im Promontorium. Die Membran des runden Fensters selbst ist nicht verdickt und sonst normal.

Im ovalen Fenster war der vorderste Teil gleichfalls durch Hyperostose des erkrankten Knochens verengt, und dieser Teil der Basis von dem erkrankten Knochen ganz umschlossen, der hier noch in Form einer flachen Exostose in den Vorhof hineinragte. Ein unregelmäßiger verkalkter Klumpen ohne deutliche Knochenzellen lag, von verdicktem Bindegewebe umsäumt, hier in dem erkrankten Knochen. Weiter nach hinten zeigte sich dann die Basis deutlich erhalten, aber besonders an der unteren Seite bis weit nach hinten in fester knöcherner Verbindung mit dem umgebenden kranken Knochen, und reichte die Entzündung auch in den vorderen Teil der Steigbügelbasis hinein. Nur der hinterste Teil der Steigbügelbasis und seine Umgebung erwiesen sich frei von Erkrankung. Die Steigbügelschenkel waren dünn, ebenso wie das Köpfchen, der Knochen rarefiziert, und die Gelenkfläche war nicht erhalten. An den Gelenkflächen des Hammers und Amboßes war der Knorpelbelag größtenteils verkalkt.

Im Antrum und Warzenfortsatz war die Schleimhaut ebenso wie auch im hintersten Teil der Paukenhöhle und im Aditus in gleicher Weise verändert und verdickt, wie es von der Paukenhöhle oben angegeben wurde. Stellenweise Zeichen chronischer Entzündung und Verdickung mit Spindel- und Bildungszellen, insbesondere auch in den erweiterten Gefäßkanälen des angrenzenden Knochens, und häufig in letzterem auch Lücken, die mit Bindegewebe ausgefüllt waren.

Knochen. Im vordersten untersten Teil des Felsenteils finden sich hochgradig erweiterte Markräume mit Fettmark gefüllt, und zwischen ihnen mit verdickter Schleimhaut ausgekleidete pneumatische Zellen und einzelne ganz mit Bindegewebe ausgefüllte zellige Räume im Knochen. Über diesen und im Anschluß daran zeigt der Knochen sich bis hinauf zur vorderen unteren Peripherie der Schnecke und der unteren vorderen und oberen Wand des inneren Gehörgangs reichend, auffällig pathologisch verändert. Er ist ganz von größeren Gefäßkanälen durchzogen, stellenweise auch gegen den Rand zu sklerotisch und zeigt in der Wand des inneren Gehörgangs mehrere größere Höhlen, die mit einem zellenreichen Bindegewebe teilweise ausgefüllt sind und mit dem an dieser Stelle gleichfalls erkrankten, verdickten und zellenreichen Periost des inneren Gehörgangs direkt zusammenhängen. In diesen zelligen Räumen sowohl, wie auch sonst im inneren Gehörgang erscheint der Knochen an der Oberfläche uneben, wie angenagt (Howshipsche Lakunen). Hier ist auch damit in Zusammenhang die Umrandung des Canalis ganglionaris und der Knochen der Lamina spiralis der basalen Windung stark verkalkt, wie an der starken Färbung mit Hämatoxylin zu erkennen ist. Der Entzündungsherd im Knochen reicht dann weiter bis zum Periost der basalen Schneckenwindung, deren unteren nach vorne laufenden Teil sie von unten, innen und zum Teil auch von außen her umgreift, und er reicht hier meist direkt bis an die periostale Auskleidung, bezw. das Ligamentum spirale (Fig. 3 auf Taf. II. III.). In einem großen Teil der basalen Windung ist es im Anschluß an die Entzündung im Knochen auch zu Bindegewebs- und Knochenneubildung gekommen, welche den Endteil der Paukentreppe bis zur Membran des runden Fensters größtenteils ausfüllt. Dieser neugebildete periostale Knochen ist jedoch von unten, von dem chronischen Entzündungsherd im Knochen der Pars petrosa, später wieder zum Teil rarefiziert worden, und finden sich in seinem hinteren Teil frische entzündliche Veränderungen, wie in dem angrenzenden Knochen. Nach hinten reicht der Herd bis zum runden Fenster, in dessen vorderem Teil sowohl am Promontorium als auch von der inneren Wand her der erkrankte Knochen Exostosen bildet, während im hintersten Teil des runden Fensters der Knochen nahezu normal wird. Nur die Gefäßkanäle des Knochens enthalten noch reichlicher proliferiertes Bindegewebe und sind von Knochenstäben jüngerer Bildung umgeben.

Ein zweiter Herd veränderten Knochens findet sich über dem ersten

an der inneren Wand der Paukenhöhle. Er reicht nach vorne bis zur Gegend der Spitzenwindung der Schnecke und liegt hier zwischen Schleimhaut und Schneckenperiost, von oben nach unten ist er ca. 4, dann 5 mm hoch und reicht nach oben bis zum Facialiskanal, nach unten bis zur Mitte des Promontoriums. Er grenzt nach innen erst an die Spitze, dann an die mittlere Windung und weiter nach hinten an den Vorhof, umgreift dann die Steigbügelbasis zum großen Teil, reicht bis zum Nervendurchtritt des Utriculus durch den Knochen, dessen Bündel im vorderen äußeren Teil noch umgriffen werden, und endet dann im hinteren Teil des ovalen Fensters, ohne dessen hintersten Rand zu erreichen. Beide diese Krankheitsherde im Knochen sind im Promontorium nur durch einen erweiterten Gefäßkanal miteinander verbunden, dessen Wand stark verkalkt erscheint, sind im übrigen aber durch eine Schicht gesunden Knochens in der Mitte der Promontoriums voneinander getrennt.

Endlich findet sich zwischen Facialis und äußerem Bogengang noch ein dritter kleiner Herd stark veränderten Knochens. Er ist sklerotisch, von nur mäßig weiten Gefäßkanälen durchzogen, in deren Umgebung der Knochen sich stark mit Karmin und Eosin färbt. Außerdem zeigt auch der übrige Teil der Pars petrosa und des Warzenfortsatzes deutliche Veränderungen. So sind an vielen Stellen die Gefäßkanäle obliteriert, und finden sich am Knochen überall um größere Reste mit Hämatoxylin stark gefärbten Knochens herum neugebildete jüngere Schichten, die sich durch andere lamelläre Schichtung und hellere rote Färbung scharf von den früher erwähnten abgrenzen lassen. Auch größere Knochenkörperchen mit nur wenig Ausläufern und oft noch deutlichen Zellen unterscheiden diesen Knochen von dem älteren.

Der histologische Charakter der pathologisch veränderten Knochenpartien ist an verschiedenen Stellen verschieden. So finden sich gewöhnlich in den Randzonen des erkrankten Knochens Partien, die deutlich das Bild der Knochensklerose zeigen. Der Knochen erscheint dunkler mit Hämatoxylin gefärbt, seine Gefäßkanäle sind bis auf einzelne kleinere obliteriert durch schichtweise Anlagerung neuen Knochens an ihrer Wand und öfter auch durch Ablagerung von Kalkmassen in den Resten des früheren Lumens. Markräume enthält dieser Teil des Knochens nicht, die Knochenkörperchen liegen dicht gedrängt, zeigen zahlreiche zackige Ausläufer und sind manchmal auch an ihrer inneren Wand stark blau oder schwarz mit Hämatoxylin gefärbt als Zeichen einer stärkeren Kalkablagerung. An diesen sklerotischen Knochen schließt sich stellenweise ein ähnlich veränderter an, der aber eine geringere Kalkablagerung und außerdem noch zahlreiche erweiterte Gefäßkanäle enthält. An anderen Stellen der Erkrankungsherde und zwar gleichfalls an der äußeren Grenze des Herdes insbesondere entsprechend der inneren Wand der Paukenhöhle ist der Knochen wieder in anderer Weise verändert. Der Knochen zeigt lamelläre Struktur, Mangel der sonst vorhandenen Knorpelzellennester, färbt sich schwach bläulich mit Hämatoxylin, ähnlich, wenn auch nicht ganz gleich wie der normale Knochen. Seine Knochenkörperchen sind stellenweise noch größer, zeigen weniger Ausläufer und deutlich gefärbte Knochenzellen. Durchzogen ist dieser Knochen von größeren Räumen, die nur spärliches Bindegewebe und einzelne Fettzellen enthalten. Stellenweise finden sich in letzterem Knochen Partien, die eine mehr rötliche Farbe zeigen und nach innen zu übergehen in mit Eosin stark rot gefärbte Partien, in denen die Entzündung noch andauert. Hier zeigt der Knochen sich hochgradig porös, ist nach allen Richtungen hin von hochgradig erweiterten Gefäßkanälen durchzogen, zwischen denen nur schmale Brücken osteoiden Gewebes sich finden. Dieses zeigt nirgends lamelläre Struktur, seine Zellen sind bedeutend größer, haben weniger Ausläufer. In den weiten Gefäßkanälen dieser Partien liegen neben den erweiterten Gefäßen lange spindelförmige Zellen und auch größere runde Zellen mit großem Kern und finden sich letztere oft auch schon in den kleinsten Saftkanälen des Knochens, die vom kranken Knochen her in den angrenzenden gesunden hineinziehen. Sie gleichen ganz den Osteoklasten, die gewöhnlich einzeln an der Wand der größeren Gefäße führenden Räume liegen. Da wo sie am Knochen anliegen,

findet sich meist ein abgerundeter lichter Hof, der sie halbkreisförmig umgibt. Welche Rolle dabei die nächst angrenzenden Zellen des gesunden Knochens spielen, läßt sich nicht eruieren, da der gesunde Knochen bis an die scharfe Grenze des erkrankten heran meist keine Veränderung aufwies.

Über die Lage dieser frisch erkrankten Knochenpartien im Verhältnis zu der der anderen kann im allgemeinen nur gesagt werden, daß sie mehr nach innen, entfernter von der Paukenhöhle im Knochen liegen; so fand sich frische Knochenerkrankung an der vorderen unteren Begrenzung der Schnecke, ebenso auch entsprechend der Spitze der Schnecke und an der hinteren und inneren Grenze des Erkrankungsherdes des ovalen Fensters. Auch in der Nische des ovalen und im vorderen Teil des runden Fensters zeigt die Erkrankung ausnahmsweise einen verhältnismäßig frischen Charakter und reichen hier die schmalen osteoiden Knochenbälkchen, die sich verhältnismäßig schwach mit Eosin färben, bis an die starkverdickte, kernarme, faserige Periostschicht der Mittellohrauskleidung heran.

Linkes Gehörorgan.

Inneres Ohr. Die Nervenzellen in der Schnecke, besonders in den oberen Windungen sind nicht so zahlreiche wie unter normalen Verhältnissen. Der Pigmentreichtum ist etwas geringer als rechts. In der basalen Windung ein Gefäß in der Prominentia spiralis ungewöhnlich weit. Die Lamina spiralis und die Umrandung des Ganglienkanals der basalen Windung stark verkalkt, in der Paukentreppe dieser Windung neugebildeter Knochen und Bindegewebe in großer Ausdehnung. Der Ductus venosus der Schnecke frei, die Wasserleitung in ihrem inneren Teil gleichfalls, im äußeren aber in dem erkrankten Knochen nicht nachzuweisen. Der Vorhof und die Bogengänge zeigen das gleiche Verhalten wie rechts.

Tuba Eustachii. In dem knorpeligen Teile war das Epithel schön erhalten und unter demselben stellenweise längliche Streifen der Schleimhaut infiltriert und entzündet, und zwar sind vorwiegend epitheloide und Spindelzellen eingelagert. In der knöchernen Tuba war die Auskleidung meist verdickt, stellenweise wieder dünner und enthielt nur an wenigen Stellen einzelne Zellen. Der angrenzende Knochen zeigt unregelmäßig ausgezackte Lücken, die mit einem derben, faserigen Bindegewebe ausgefüllt sind. Die Peripherie des Knochens in diesen Lücken ist gewöhnlich stark kalkhaltig und färbt sich mit Hämatoxylin dunkelblau. In der Nähe der Paukenhöhle finden sich in den Markräumen der Umgebung der Tuba reichliche Blutaustritte, in einzelnen mit Bindegewebe ausgefüllten Knochenstücken größere Mengen Kalk im Knochen angehäuft und außerdem einige osteophytenartige zackige Vorsprünge des Knochens in der Tuba.

Das Trommelfell ist ungewöhnlich dünn und färbt sich auch schlecht, so daß Formelemente daran schwer zu unterscheiden sind. In der Schleimhautschicht, deren Submucosa durch fibröses Bindegewebe gebildet wird, liegen, entsprechend dem unteren Trommelfellrande, zystenartige Hohlräume. Ähnliche Räume in großer Zahl finden sich in der Schleimhautbekleidung des Hammers und Amboß entsprechend der Gelenkverbindung. An ihrer Innenfläche läßt sich kein Epithel nachweisen, das Bindegewebe der Submucosa ist in größerer Ausdehnung verkalkt. Im Hammer findet sich nach innen vom kurzen Fortsatz ein größerer mit faserigem Bindegewebe ausgefüllter Raum. Die Körper des Hammers und Ambosses enthalten zahlreiche, mit Fettmark und erweiterten Gefäßen erfüllte Markräume. Der Gelenkknorpel ist zum Teil verkalkt. Im Amboßkörper finden sich in den Gefäßkanälen und im Knochen stellenweise unregelmäßige Kalkmassen.

Paukenhöhle und Fenster. Die Schleimhaut der Paukenhöhle ist fast überall pathologisch verändert. Sie zeigt sich besonders in ihrer tieferen Schicht, und insbesondere stark wieder über dem erkrankten Knochen verdickt, selbst kallös, enthält über den Stellen frischerer Knochenerkrankung zahlreiche zellige Elemente, Spindelzellenzüge, und folgt auf diese Schicht oft unmittelbar das gut entwickelte Epithel, an anderer Stelle wieder eine Submucosa mit weiteren Gefäßen, Spindel- und Bildungszellen. Besonders stark verdickt ist die Schleimhaut im vorderen Teil der Nische des runden

Fensters, deren innere Hälfte ganz mit Bindegewebe verschlossen ist, und etwas weniger noch im ovalen Fenster. In letzterem finden sich verhältnismäßig noch frische, entzündliche Veränderungen.

Der Steigbügel ist in seiner Verbindung mit dem ovalen Fenster ankylosiert und zwar zum Teil durch eine mehr oder weniger breite neugebildete Knochenspanne, die vom erkrankten Knochen der Umgebung sich in die Basis hineinzieht, zum Teil auch nur durch eine Verkalkung des Ringbandes. Die Basis selbst ist durch die Erkrankung des Knochens hochgradig rarefiziert und an einer Stelle im hinteren Teil sogar ganz defekt, sodaß daselbst die dünne Schleimhaut unmittelbar dem periostalen Überzug der inneren Wand des Vorhofs aufliegt. Letzterer ist gleich wie der darunterliegende Knorpelbelag, von dem er sich nicht mehr trennen läßt, verkalkt. Im vorderen Teil des ovalen Fensters ragt der erkrankte Knochen in Form einer Exostose in den Vorhof hinein.

Das runde Fenster ist im vorderen Teil nach der Paukenhöhle zu frei, doch liegt hier von innen her der Membran neugebildeter Knochen an, der die Paukentreppe hier größtenteils ausfüllt, weiter nach hinten hört dieser Knochen nach und nach auf und erstreckt sich da die Erkrankung des Knochens um den Steigbügel, dessen Basis in gleicher Weise erkrankt ist, wie der angrenzende Knochen im Promontorium nach abwärts bis zum runden Fenster (Fig. 6 auf Tafel IV. V), das sie nach hinten zu umgreift und auch durch kleine Exostosen von der Seite her verengt. Hier liegt auch der Membran des runden Fensters außen faseriges Bindegewebe auf und füllt den hinteren Teil der Fensternische aus. Im vorderen inneren Teil der Nische liegt in einem mehr lockeren Bindegewebe reichlich Pigment eingelagert.

Antrum und Warzenzellen. Die Schleimhaut ist gleich beschaffen wie in der Paukenhöhle, nur etwas dünner und nur in einzelnen pneumatischen Zellen etwas verdickt. Der Knochen darunter zeigt häufig Lakunenbildung, an anderen Stellen größere Lücken, die mit Bindegewebe ausgefüllt sind, und häufig finden sich auch Zeichen von Knochenneubildung, schöne Säume neugebildeten Knochens in den ans Antrum grenzenden Gefäßkanälen des Knochens.

Knochen. Der Knochen des Felsenteils zeigt mehrere Herde von Erkrankung, die mit geringen Abweichungen eine ähnliche Ausdehnung wie im rechten Schläfenbein haben. Im vorderen Teil der Pars petrosa liegen auch links zahlreiche, stark erweiterte Mark- und einzelne große pneumatische Zellen, und sind letztere bis auf eine schmale Lichtung mit Bindegewebe ausgefüllt. An diese letzteren, die mit der Paukenhöhle zusammenhängen, schließt sich nach oben unmittelbar der erkrankte Knochen an, umgreift den inneren Gehörgang an seiner vorderen Peripherie und bildet in ihm eine größere Exostose, die an den Nerven anliegt, und größere, zum Teil mit Bindegewebe ausgefüllte Lücken, die mit dem inneren Gehörgang zusammenhängen (Fig. 4 auf Tafel II. III). In grösserer Ausdehnung grenzt dieser Herd an den untersten Teil der Paukentreppe und steht hier in Verbindung mit dem diese ausfüllenden Knochen und Bindegewebe. Nach hinten reicht er nur bis etwas vor die äußere Mündung der Schneckenwasserleitung, in deren Umgebung der Knochen noch gesund ist. Nur der Knochen, der die Paukentreppe teilweise ausfüllt, reicht noch etwas weiter nach hinten als der otitische Herd. Der zweite Herd in der Umgebung des Steigbügels reicht links noch weiter nach vorn bis zur knöchernen Tuba, und grenzt nach innen an die obere und mittlere Schneckenwindung, nach außen unmittelbar an die periostale Schicht der Auskleidung der Paukenhöhle (Fig. 4, 5 u. 6 auf Tafel IV. V). Weiter nach hinten reicht er sowohl ober- als unterhalb des vom inneren Gehörgang her zur Paukenhöhle ziehenden Facialkanals weit nach innen, unterhalb bis nahe zum inneren Gehörgang und bildet im Kanal selbst eine kleine Exostose. Nach hinten reicht dieser Herd außerordentlich weit, bis hinter die Gegend der Ampulle des äußeren Bogengangs, indem er hier den ganzen Knochen zwischen Facialkanal und äußerer Wand der Ampulle und des Bogenganges umfaßt. In einer Breite von 5 mm von oben nach unten sitzt dieser Herd im Knochen der inneren, oberen Paukenhöhlenwand zwischen Periost und Schnecke, Vorhof und äußerer Ampulle, er umzieht den Steigbügel an seiner Basis, ebenso die äußeren Teile des

Nervenzweiges zum Utriculus und äußeren Bogengang bei ihrem Durchtritt durch den Knochen. Im hinteren Teil durchsetzt er das ganze Promontorium bis zum untersten Ende und reicht hier bis zur Knochenausfüllung der Paukentreppe, indem er auch den hinteren Umfang der runden Fensternische umgreift, während im vorderen der Knochen gesund ist. Die Basis des Steigbügels ist ganz in gleicher Weise erkrankt und bildet stellenweise mit dem Labyrinthknochen eine zusammenhängende Masse, nur am oberen und unteren Rand sind stellenweise noch Reste vom Ringband nachzuweisen. Beide Krankheitsherde im Knochen hängen direkt eigentlich nicht zusammen, jedoch finden sich in dem sonst gesunden Knochen in der unteren Hälfte des vorderen Teils des Promontoriums erweiterte Gefäßkanäle mit Säumen von neugebildetem Knochen. Auch vom Periost und von den erwähnten Zellen im vorderen unteren Teil der Pars petrosa ziehen weite Kanäle mit weiten Gefäßen in den erkrankten Knochen hinein.

Abgesehen von diesen beiden großen Herden zeigt auch der Knochen noch an anderen Stellen, insbesondere in den oberflächlichen subperiostalen Schichten, dünne Lagen osteoiden oder neuen Knochengewebes, besonders in der Umgebung der häufig erweiterten Gefäßkanäle, auch ist die Knochenoberfläche stellenweise usuriert, mit unregelmäßigen Buchten versehen.

Die histologische Struktur des erkrankten Knochens der linken Seite entspricht ganz der im rechten Schläfenbein. Ebenso ist auch die Verteilung der Knochenpartien mit abgelaufener und der mit noch bestehender Otitis links im ganzen die gleiche wie rechts, so daß ich die nähere Beschreibung hier unterlassen kann.

Wenn wir zum Schluß die in beiden Schläfenbeinen gefundenen Veränderungen nochmals überblicken, und zwar sowohl die in der Auskleidung der Mittelohrräume sowie auch die im Knochen, so können wir nur zu dem Schlusse kommen, daß es sich hier um die Folgen einer Entzündung handle, die zwar in der Mittelohrauskleidung und teilweise auch im Knochen schon größtenteils abgelaufen ist, stellenweise aber im Knochen noch andauerte oder neuerdings sich verschlimmert hatte. Nach der Krankengeschichte müssen wir annehmen, daß sie etwa 30 Jahre vor dem Tode der Kranken mit starkem Sausen, zeitweise stechenden Schmerzen und Schwerhörigkeit begann. Dieser Entzündungsprozeß griff dann an verschiedenen Stellen auch auf den Knochen über und zwar vorne von den unteren pneumatischen Zellen aus auf die vordere Begrenzung der Schnecke und des inneren Gehörgangs und weiter auch von den Fensternischen aus auf die nächstliegenden Knochenpartien über, in denen er zu einer chronisch verlaufenden Otitis und Osteomyelitis führte. Auffällig ist dabei, daß auch ein großer Teil des Endteils der Paukentreppe mit neugebildeter Knochenmasse und Bindegewebe ausgefüllt wurde, und ließ sich an den Präparaten nicht mehr entscheiden, ob dies durch Übergreifen der Entzündung von den beschriebenen ersten Knochenherden her geschah, oder dadurch, daß mit Beginn des Leidens eine heftigere Mittelohrentzündung durch die runde Fenstermembran auch auf den Endteil der

Paukentreppe übergriff und hier zu einer endostalen Knochenneubildung und Bindegewebsbildung führte. Gegen letzteres würde der Umstand sprechen, daß dieser Knochen in der Paukentreppe nur in beschränkter Ausdehnung an die Membran des runden Fensters grenzte und erst weiter nach vorne seine größte Ausdehnung erreichte. Die ausgedehnte Veränderung in der Auskleidung des Mittelohrs sowie in den übrigen an das Mittelohr grenzenden Knochenpartien des Schläfenbeins spricht für eine, wenigstens anfangs vorhandene, ausgebreitete Entzündung in der Auskleidung der Mittelohrräume.

Fall III.

Alois St., 58jähriger Einleger, ist seit seiner Militärzeit schwerhörig, und verschlimmerte sich das Gehör bei ihm von Jahr zu Jahr. Er hatte niemals Schmerzen in den Ohren und litt nie an Schwindel. Doch hatte er öfters beiderseits das Gefühl von Verlegtsein der Ohren und rechts auch manchmal „Klingen“ und „Glockenläuten“. Er litt häufig an starkem Schnupfen.

Die Untersuchung der Ohren ergab rechts das Trommelfell etwas stärker eingezogen und leicht milchig getrübt, den Lichtkegel hell. Links war das Trommelfell stark eingezogen und milchig getrübt, der Lichtkegel matt. Die Untersuchung der Nase und des Rachens wurde bei dem schwer Kranken, der auf der I. medizinischen Abteilung lag, nicht vorgenommen.

Die Hörprüfung ergab:

$$\begin{array}{rcl}
 & W & ^1) \\
 R. & < L. & \\
 & \frac{U}{U_s} & \\
 \oplus \left(\frac{U_s}{U_w} \right) \oplus & & \\
 1,0 \text{ St } 0,50 & & \\
 0,02 \text{ Fl } \oplus & & \\
 7'' c_w 6'' & & \\
 - R - & & \\
 4'' c \oplus & & \\
 - 20'' c^4 - 25'' & & \\
 *) - c^7 H *) - c^7 & &
 \end{array}$$

*) Die untere Grenze wurde nicht bestimmt, c^8 wurde nicht mehr gehört.

Der Kranke starb am 7. August 1891 und ergab die Sektion, die am 8. September im pathologisch-anatomischen Institute vorgenommen wurde: Gut genährtes, kräftiges Individuum. Ödem der unteren Extremitäten. Kompaktes Schädeldach mit Pacchionischen Gruben. Starkes Piaödem, viel Flüssigkeit in den Ventrikeln, deren Ependym zart ist. Die Gefäße an der Hirnbasis rigid, die Hirnsubstanz vermindert, stark durchfeuchtet, mäßig blutreich, die Rinde schmal. Freie Flüssigkeit im Perikard und in der Pleura. Herz sehr groß, der Muskel brüchig, blaß und gelblich gefleckt. Die linke Höhle ebenfalls weit, ihre Wand dick. Die Aortenklappen, sowie die des rechten Herzens zart, die Tricuspidalis an den freien Rändern verdickt, die Sehnenfäden retrahiert und dick. Die Lungen durchwegs lufthaltig, blutreich

1) W = Weber'scher Versuch. U = Uhr, U_s = Uhr an der Schläfe, U_w = Uhr am Warzenfortsatz. St = Stimme, Fl = Flüsterstimme. c_w = kleine Lucae'sche Stimmgabel am Warzenfortsatz (normal 16 Sekunden). R = Rinne'scher Versuch (normal + 36''). c = dieselbe Gabel direkt nach Anschlag vor das Ohr gehalten, normale Hördauer 56''. c^4 normal 42''. H = Hörfeld für sämtliche Gabeln in Luftleitung.

und stark durchfeuchtet, an den Basen komprimiert. Bronchialschleimhaut dunkelgerötet. Die Milz groß und induriert. Die linke Niere größer, ihre Kapsel adhären, die Oberfläche zart, granuliert. Die Pyramidenzeichnung deutlich, das Gewebe derb, bräunlich-gelb. Die rechte Niere sehr klein mit tiefen Infarktmarken, Zysten und granulierter Oberfläche versehen. Pigmentflecken am Peritoneum. Die Magenschleimhaut geschwollen und gefaltet, über den Falten stärker gerötet, ekchymosiert. Im Darm dieselben Stauungserscheinungen. Die Leber in Form der Stauungsmuskatnußleber verändert. Die Schleimhaut der Blase zart und blaß, das Genitale gewöhnlich, die Aorta atheromatös.

Diagnose: Hypertrophia et dilatatio cordis totius praecipue cordis dextrum degeneratione adiposa. Insufficiencia valvularum tricuspidalium. Venostasis et hydrops universalis. Atrophia renis p. infarctus. Atheromatosis aortae. Induratio.

Bei der Sektion wurden die beiden Paukenhöhlen und die oberen Bogengänge geöffnet und die Schläfenbeine herausgenommen und in Müller-scher Flüssigkeit aufgehoben. Vorher wurde auch von dem mäßigen schleimigen Inhalt der Paukenhöhlen Kulturen angelegt. Die der linken Paukenhöhle blieben steril, die der rechten wiesen Aspergillus glaucus auf (und zwar 4 Kolonien auf die Röhre). Bei der weiteren Sektion der Schläfenbeine fand ich den Knochen um das Antrum und im Warzenfortsatz stark pneumatisch, die Steigbügel unbeweglich und die runden Fenster mit Bindegewebe verwachsen. Die Präparate wurden dann entkalkt, in Zelloidin eingebettet, der histologischen Untersuchung unterzogen.

Mikroskopischer Befund.

Rechtes Gehörorgan. Im inneren Gehörgang zeigt der Knochen im Fundus Auflagerung neuen Knochens in dünner Schicht und ist stark kalkhaltig, da er sich mit Hämatoxylin sehr dunkel färbt. Die Nerven zeigen keine besondere Veränderung. Mäßige Blutaustritte im Fundus des inneren Gehörgangs.

In der Schnecke sind die Ganglienzellen, insbesondere in der basalen Windung, an Zahl sehr vermindert, und ebenso sind die Nervenbündel in der Lamina spiralis ossea sehr schwächlich. Im Vorhof und den Bogengängen nichts Besonderes.

Mittelohr. In der knorpeligen Tuba die Submucosa derbfaserig, mit wenig Zellen. Am Isthmus findet sich eine Anomalie (Bild 1), in dem nach außen und oben vom Endteil des Knorpels sich eine sackförmige Ausbuchtung der knöchernen Tuba findet, so daß die obere Wand der knorpeligen nicht unmittelbar in die obere Wand der knöchernen Tuba übergeht, sondern letztere mehrere Millimeter über der ersteren, also höher liegt. Die knöcherne Tuba zeigt in ihrer Wand vorspringende Knochenbalken, zwischen denen sich tiefere Ausbuchtungen finden. Einige angrenzende größere Zellen sind mit faserigem Bindegewebe mit Spindelzellen ausgefüllt.

In der Paukenhöhle ist die Auskleidung im allgemeinen etwas dicker und von mehr faseriger Struktur mit wenigen zelligen Elementen, das Epithel ist gut erhalten. Stellenweise sind Kalkkrümel in die Schleimhaut eingelagert. Stärker verdickt ist die Auskleidung insbesondere, wo sie an den erkrankten Knochen grenzt und in den beiden Fensternischen.

Von den Fensternischen ist die des ovalen Fensters von vorne her durch Zunahme des Umfangs des erkrankten Knochens etwas verengt, und hat der erkrankte Knochen den vordersten Teil der Steigbügelbasis ganz umwachsen. Auf diesen Knochen liegt dann ein stark verdicktes fibröses Bindegewebe auf, in das der mediale Teil des vorderen Steigbügel-schenkels eingeschlossen ist. In der Mitte und im hinteren Teil der Nische besteht keine Verengung, da hier sowohl oben, als auch unten die oberflächlichen Knochenschichten der Nischenwand durch die Erkrankung vollständig bis auf einzelne kleine in Bindegewebe eingebettete Reste verloren gegangen und durch faseriges Bindegewebe ersetzt sind. Am unteren hinteren Umfang der Nische ist auch der Knochen in größerer Ausdehnung bis nahe zur Vorhofwand usuriert und durch Bindegewebe ersetzt.

Die Basis ist im vordersten Teil etwas nach außen fixiert und bilden Knorpel und Ringband eine verkalkte Masse, an die sich der kranke Knochen anschließt. Weiter nach hinten besteht dann bloß Verkalkung des Knorpelbelags und ist nur hinten oben wieder der verkalkte Knorpelbelag der Basis mit dem erkrankten Knochen der Nischenwand fest verwachsen. Die Basis selbst besteht im vorderen Teil aus sklerotischem Knochen, im hinteren Teil ist außer einer wechselnd starken Verkalkung des Knorpels keine auffällige Veränderung. Die Nische des runden Fensters ist im vorderen Teil durch eine Exostose eingenommen, die, je weiter nach hinten, um so weniger weit von der erkrankten medialen Wand des Promontoriums, von der sie ausgeht, nach innen reicht, so daß auch immer mehr von der Membrana tympani

Fig. 1. Fall III. Schnitt durch den Isthmus tubae und Tensor tympani. Vergr. 7.

secundaria nachweisbar ist. Die Nische ist im hinteren Teil vollständig frei.

Das Trommelfell ist nur in seiner Schleimhautschicht mäßig verdickt und ist in dieser, sowie in der Zirkulärfaserschicht reichlich Pigment in Körnern eingelagert. Die Gehörknöchelchen zeigen Kalkablagerung in den Gelenknorpel zwischen Hammer und Amboß sowohl wie auch zwischen diesem und dem Steigbügel. Der Warzenfortsatz ist hochgradig pneumatisch und seine Schleimhaut im Aditus und Antrum mäßig verdickt, in den Zellen nicht wesentlich verändert.

Die kleinen Arterien im Faciakanal, im Promontorium und im inneren Gehörgang zeigen umschriebene Verdickungen der Intima durch Endarteriitis und die im inneren Gehörgang auch Verdickung der Adventitia, die aus sklerotischem, kernarmen Bindegewebe besteht.

Knochen. In der Pars petrosa fanden sich drei umschriebene Er-

krankungsherde. Der erste und kleinste lag im inneren Gehörgang an seiner unteren Peripherie, einige Millimeter vom Grund des Gehörgangs nach innen, unmittelbar unter der verdickten Duraauskleidung, unter der die Knochenoberfläche etwas defekt war und sich statt des Knochens Bindegewebe vorfand. Es erstreckte sich zungenförmig nach unten und bestand durchwegs aus sklerotischem Knochen mit unregelmäßig gelagerten Knochenkörperchen und spärlichen etwas erweiterten Gefäßkanälen, die ein faseriges, zellarmes Bindegewebe enthalten, und an welche sich die größtenteils obliterierten und verkalkten Gefäßkanäle des umgebenden, gleichfalls sklerotischen Knochens anschließen. Übrigens zeigt der Knochen hier in großer Ausdehnung um diesen Herd sowohl in der Peripherie des inneren Gehörgangs und auch weit nach unten Sklerose. Seine Gefäßkanäle sind

Fig. 2. Schnitt durch den hinteren Teil der Schnecke. Fall III. Rechtes Ohr. Vorderes Ende des ostitischen Herdes, der vom ovalen Fenster ausgeht. Vergr. 7.

durchwegs stark mit Hämatoxylin gefärbt und lassen weder ein Lumen noch Gefäße nachweisen. Nach vorne unten grenzt dieser Knochen an einen großen und weiten pneumatischen Raum, der sich von der Paukenhöhle her tief in den Knochen hinein erstreckt.

Ein zweiter Herd, der sich wesentlich um das ovale Fenster herum ausdehnt, reicht mit seiner Spitze nach vorne bis zur mittleren Windung der Schnecke, an deren Peripherie unmittelbar am Ligamentum spirale er endet (Fig. 2). Er wird nach hinten etwas breiter, und umfaßt den Raum zwischen Facialis nach oben, rundem Säckchen nach innen und Paukenhöhle nach außen und reicht nach hinten bis zum ovalen Fenster, dessen Peripherie er umgreift, am unteren Rand aber schon vor dem hinteren Rand der Fensternische endet, während er am oberen Rand noch im Knochen bis zur Ampulle des äußeren Bogengangs sich erstreckt. Auch dieser Erkrankungs-

herd zeigt mit wenig Ausnahmen durchwegs alte abgelaufene Veränderungen. Er ist von weiten Gefäßkanälen durchzogen, in denen nur spärliches Bindegewebe mit Fettzellen eingelagert ist. In der Peripherie des Herdes findet sich manchmal Sklerose des Knochens und unterscheidet sich der erkrankte Knochen durchwegs durch seine Struktur und stark rötlich-blaue Färbung (Hämatoxylin-Eosin) als umgebildeter neuer Knochen von dem angrenzenden alten. Frische entzündliche Veränderungen fanden sich nur am vorderen und am hinteren Ende dieses Erkrankungsherdes und an letzterer Stelle sowohl unterhalb als auch oberhalb der ovalen Fensternische. Hier bestand der neugebildete Knochen nur aus osteoidem Gewebe mit Osteoblastenlagen, durchzogen von größeren Gefäßkanälen mit erweiterten Gefäßen und größeren Bildungszellen. Auch Riesenzellen, Osteoklasten, waren hier an der Grenze des gesunden Knochens nachzuweisen.

Fig. 3. Schnitt durch die beiden Fenster, den N. facialis, die Macula acust. utriculi und den Endteil der Schnecke. Vergr. 15.

Ein dritter Herd findet sich in der Umgebung des runden Fensters (Fig. 3). Er erstreckt sich nach vorne bis zur Gegend der äußeren Mündung der Schneckenwasserleitung, ohne jedoch hier bis an das Endost der Schnecke heranzureichen, umgreift dann, breiter werdend, den vorderen Rand der runden Fensternische, indem er dann weiter, insbesondere von der Innenseite des Promontoriums her, nach innen und oben als Exostose in die Paukentreppe vorragt. Dieser Herd reicht nur an der äußeren Peripherie der runden Fensternische, also im Promontorium, weiter nach hinten, und findet sich hier im hintersten Teil der Nische auch eine Verbindung mit dem beschriebenen zweiten Herd am ovalen Fenster, in dem beide durch einen erweiterten Gefäßkanal mit pathologisch veränderten Knochen in seiner Wandung zusammenhängen. Dieser dritte Herd unterscheidet sich dadurch wesentlich

von den früheren, daß er fast durchgehends frische ostitische Veränderungen aufweist, und sich nur stellenweise an der Peripherie Sklerose des Knochens vorfindet. Die zellenreichen Gefäßräume dieses Knochens grenzen oft direkt an den gesunden.

Der Knochen des Schläfebeins überhaupt zeigt fast durchgehends pathologische Veränderungen. Die zelligen Räume, die sich in der Pars petrosa ober- und unterhalb der eigentlichen Labyrinthkapsel im Knochen gewöhnlich vorfinden, sind durch Anlage neuen Knochens von innen her sehr reduziert und ist dieser neue Knochen nur noch durch seine stärkere Färbung mit Eosin und seine verschiedene Schichtung von dem alten zu unterscheiden. Auch sind die Gefäßkanäle des Knochens in der Pars petrosa in ihrer inneren Wand meist mehr oder weniger verkalkt, und oft ganz verödet. Ebenso fanden sich auch im äußeren Teil des Schläfebeins, so in der Umgebung der Tuba und der Glaserischen Spalte, höhergradige Veränderungen. In letzterer insbesondere starke Kalkablagerung an ihrer knöchernen Begrenzung und die zelligen Räume in der Umgebung der knöchernen Tuba ganz mit fibrösem Bindegewebe ausgefüllt, der umgebende Knochen sklerotisch.

Verhältnismäßig wenig verändert ist der Knochen im Warzenfortsatz. Nur um die Bogengänge herum finden sich sklerotische Partien im Knochen, während die hinteren Teile des Warzenfortsatzes durchgehends pneumatisch sind, ohne besondere Veränderungen.

Linkes Gehörorgan.

Im inneren Ohr die gleichen Veränderungen wie rechts.

Mittelohr: In der Tuba Eustachii, die sonst ähnlich beschaffen ist wie rechts, findet sich auch die gleiche Anomalie, nur noch deutlicher ausgeprägt. Es reicht hier der Endteil der knöchernen Tuba in seiner oberen Hälfte noch etwas weiter über den Isthmus hinweg nach vorne.

Die Auskleidung der Paukenhöhle ist im allgemeinen etwas verdickt und sind stellenweise Kalkkrümel in sie eingelagert. Auch findet sich in der Innenschicht des Trommelfells ziemlich reichliches Pigment. Die Nische des ovalen Fensters ist im vorderen Teil durch eine ziemlich dicke Exostose des Knochens und weiter nach unten und hinten durch fibröses Bindegewebe ausgefüllt. Im hinteren Teil ist die Auskleidung stark verdickt, zum Teil ist hier auch im Zusammenhang damit fibröses Bindegewebe an Stelle des usurierten Knochens getreten und schließt dieses noch mehrere Knochenreste ein, an denen nur starke Verkalkung, aber keine deutliche Knochenstruktur mehr nachweisbar ist. Auch am vorderen unteren Rand zeigt die ausfüllende Bindegewebsmasse sich in einer größeren Partie stark verkalkt. Die Schenkel des Steigbügels sind durch bindegewebige Verwachsung mit der Wand der Nische fixiert, insbesondere stark der hintere Schenkel, der vordere zum Teil in die Exostose eingeschlossen. Die Basis des Steigbügels ist in ihrem vorderen oberen Teil aus ihrer Verbindung mit der Labyrinthwand stark nach außen luxiert und im vordersten Teil durch den neugebildeten Knochen, der auch die Hälfte der Steigbügelbasis ersetzt hat, weiter hinten oben durch festes Bindegewebe mit der angrenzenden Nischenwand verwachsen. Die Knorpelbeläge der Gelenkflächen und das Ringband sind daselbst stark verkalkt, und läßt sich die Verkalkung im Ringband im oberen Fensterrand noch etwa bis gegen die Mitte nach hinten verfolgen, wo die Gelenkverbindung wieder normale Verhältnisse zeigt. Im hintersten obersten Teil der Fensternische greift die Erkrankung des Knochens der Umgebung neuerdings auf die Basis des Steigbügels über, die hier wieder fest knöchern mit der Umgebung verbunden ist. Die Nische des runden Fensters ist im vorderen Teil durch eine größere Exostose des Promontoriums und eine kleinere von der medialen Wand aus bedeutend verengt, und der übrigbleibende Rand der Nische durch lockeres Bindegewebe ausgefüllt. Im hinteren Teil ist die Nische frei, nur etwas enger durch die Exostose des Promontoriums, die jedoch, je weiter nach hinten, um so kleiner wird, und ist hier auch die Membran des runden Fensters durch diese Exostose beträchtlich verschmälert. Der Knochen der

großen Gehörknöchelchen ist sklerotisch und zeigt reichlich Kalkablagerung, letzteres auch der Knorpel des kurzen Fortsatzes und der an den Knochen anstoßende Teil des Gelenksknorpels des Hammer und Ambosses.

Der Warzenfortsatz stark pneumatisch so wie rechts, und finden sich in ihm auch große pneumatische Zellen am hinteren Umfang der Vorhofswasserleitung. Die Schleimhaut in den Zellen etwas verdickt, einzelne kleinere Zellen im vorderen Teil ganz mit Bindegewebe ausgefüllt.

Die arteriellen Gefäße von gleicher Beschaffenheit wie rechts.

Der Knochen der Pars petrosa zeigt die gleichen drei Erkrankungsherde wie rechts. Der erste Herd im inneren Gehörgang (Fig. 7 auf Tafel IV. V) liegt etwas näher der Schnecke und reicht noch in den Knochen der eigentlichen Labyrinthkapsel hinein. Er besteht aus stark verkalkten Knochen mit erweiterten Gefäßkanälen ohne frische entzündliche Veränderungen, und steht durch eine Partie sklerotischen Knochens unterhalb mit den hier weit nach innen und oben reichenden zelligen Räumen unterhalb der Schnecke in Verbindung. Der zweite Herd entspricht in seiner Ausdehnung nahezu ganz dem der rechten Seite. Er reicht nach vorne bis zum hinteren oberen Rand der mittleren Schneckenwindung, doch ist der Herd vorn bedeutend schmaler als rechts, und erreichen hingegen die frischen ostitischen Veränderungen im Vergleich zu den alten eine größere Ausdehnung, indem links nicht bloß das vordere und hintere Ende des Herdes, sondern auch die ganze innere Zone desselben, sowie die vordere und hintere Peripherie der ovalen Fensternische sich frisch erkrankt zeigen und an diesen Stellen überall die Erkrankung noch gegen das Gesunde zu fortschreitet (Fig. 8 auf Taf. IV. V). Der dritte Herd im runden Fenster ist an seiner vorderen Peripherie etwas breiter als rechts, ragt in Form einer spongiosen Exostose in die Paukentreppe hinein, und beschränkt sich dann auf die mediale Seite des Promontoriums, um hier an der hinteren Wand der Nische zu enden. Er zeigt im vorderen Teil frische Ostitis, an der äußeren und inneren Peripherie Sklerose des Knochens und im hinteren Ende nur mehr sklerotischen Knochen mit wenig erweiterten Gefäßkanälen. Auf der linken Seite fehlt die Gefäßverbindung innerhalb des Promontoriums zwischen dem zweiten und dritten Herd. Für den übrigen Knochen gilt dasselbe, was von der rechten Seite gesagt wurde.

Überblicken wir zum Schluß noch einmal die pathologischen Veränderungen in beiden Schläfenbeinen, die im großen und ganzen einander ziemlich gleichen, so müssen wir aus der diffusen Veränderung der Mittelohrauskleidung, aus der Kalkablagerung in dieselbe, aus der Ausfüllung einzelner an die Paukenhöhle, Tuba und den Aditus angrenzender Zellen mit Bindegewebe, sowie auch aus den diffusen Veränderungen des Knochens den Schluß ziehen, daß es sich hier um die Folgen einer vorausgegangenen Entzündung im Mittelohr handle, die von der Tuba her sich bis in den Warzenfortsatz erstreckte, und nur den hintersten Teil des Warzenfortsatzes verhältnismäßig wenig in Mitleidenschaft zog. Die umschriebenen Erkrankungsherde im Knochen der Pars petrosa können nur als Folge des Übergreifens dieser Entzündung und Fortdauer derselben in diesen Knochenherden angesehen werden. Zweifellos geht dies insbesondere aus dem Befunde in dem Herd um den Steigbügel der rechten Seite hervor, in welchem deutlich das Fortschreiten der Ostitis

vom vorderen Teil der Nische nach vorne, bis zur Peripherie der Schnecke, und nach hinten, bis zur Crista des äußeren Bogengangs, deutlich nachzuweisen war. Zweifel bezüglich der Entstehung dieser Herde durch Übergreifen der Entzündung von der Paukenhöhlenauskleidung her auf den Knochen, könnten nur betreffs der ersterwähnten Herde an der Wand des inneren Gehörgangs laut werden. Da jedoch der Knochen zwischen diesen Herden und den ausgedehnten, mit der Paukenhöhle zusammenhängenden, pneumatischen Räumen an der vorderen unteren Peripherie der Schnecke gleichfalls pathologisch verändert, sklerotisch ist, ist das Übergreifen der Entzündung von diesen zelligen Räumen her bis zur knöchernen Wand des Gehörgangs gleichfalls möglich, wenn ich auch nach dem histologischen Bilde es für wahrscheinlicher halten muß, daß dieser Herd seinen Ausgang vom Periost des inneren Gehörgangs nahm.

Daß diese Herde alle zu gleicher Zeit im Beginn der Erkrankung schon entstanden sind, ist nicht sicher mehr nachzuweisen, wenigstens für die Herde in den Fensternischen scheint es näher zu liegen, daß auch spätere Nachschübe der Entzündung noch erfolgten. Der Befund im ovalen Fenster spricht auch für einen länger dauernden, oberflächlichen Ulzerationsprozeß an dieser Stelle.

Nach der Anamnese begann das Ohrenleiden etwa 30 Jahre vor dem Tode des Kranken und verschlimmerte sich von da an immer mehr. Die Erklärung für diese Zunahme der Schwerhörigkeit findet sich deutlich in den Veränderungen der Fensternischen, insbesondere am Steigbügel und seiner Gelenkverbindung, an der sich beiderseits im vorderen Teil abgelaufene, alte Veränderungen, zurückreichend wahrscheinlich bis zum Beginn der Ohrenerkrankung, vorfanden, während der hintere Teil frische ostifische Veränderungen, die auch auf die Basis übergriffen und zur knöchernen Ankylose führten, zeigten. Erst durch diese letzteren, die eine vollständige Unbeweglichkeit der beiden Steigbügelplatten bedingen mußten, dürften die hochgradige Schwerhörigkeit, wie sie bei der Hörprüfung vor dem Tode des Kranken konstatiert wurde, hervorgerufen worden sein.

Wichtig wird diese Beobachtung noch dadurch, daß trotz der Ankylose der Steigbügel der Kranke die Stimme rechts noch 1 m und links $\frac{1}{2}$ m weit verstand, rechts auch noch Flüsterstimme auf 2 cm weit hörte, und war die Erhaltung dieses Hörrestes wohl nur dem Umstand zuzuschreiben, daß ein größerer Teil der Membran des runden Fensters noch funktionsfähig war. Der Fall

bildet so ein Gegenstück zu einem früher von mir in diesem Archiv¹⁾ mitgeteilten, bei dem bei vollständigem Verschuß beider runden Fenster auf einer Seite, wo der Steigbügel noch beweglich war, eine noch beträchtlichere Hörschärfe gefunden wurde.

Fall IV.

Georg Sch., 27 Jahre alt, wurde am 2. Juli 1893 bewußtlos auf die Nervenklinik gebracht und starb daselbst schon den nächsten Tag. Bezüglich seiner Krankheit konnte nur erhoben werden, daß er einen Tag vorher ein spastische Parese der linken oberen Extremität bekam, die sich abends wieder etwas besserte, weshalb jedoch allgemeine Krämpfe und Bewußtlosigkeit sich einstellten, worauf er den nächsten Tag ins Krankenhaus gebracht wurde. Auch wurde mitgeteilt, daß er am rechten Auge und linken Ohre leidend war und wegen seines Augenleidens vor einigen Tagen eine größere Menge Jodkali eingenommen hat. Er soll schon früher am rechten Auge öfter etwas geschiebt haben, welches Leiden in den letzten Wochen stärker auftrat. Den Befund bei der Aufnahme auf die Nervenklinik kann ich übergehen, da er zu seinem Ohrenleiden in keiner direkten Beziehung steht, und will nur anführen, daß eine Hörprüfung nicht mehr aufgenommen werden konnte, daß aber der Kranke nach der Meinung der Ärzte, die ihn behandelten, gut gehört haben soll.

Die Sektion wurde am 5. Juli im pathologisch-anatomischen Institute vorgenommen und lautete die pathologisch anatomische Diagnose:

Arteritis arteriarum carotidum int. Thrombosis A. carotid. int. sin. progressi. Encephalitis multiplex. haemisphaerae sin. Cystis post necrosim thromboticam haemissph. dextrae. Meningitis dispersa. Compressio cerebri. Pneumonia lobularis praec. lat. dextr.

Da links ein Ohrenleiden dagewesen sein soll, wurde mir von Hofrat Eppinger das linke Schläfebein zur weiteren Untersuchung übergeben. Bei der Sektion des Schläfebeins fand ich die Pars petrosa verhältnismäßig klein, den inneren Gehörgang abnorm weit und betrug seine Lichtung am inneren Ende gemessen 9 mm in der Breite und 8 mm in der Höhe. Das Trommelfell war weißlich verdickt und zeigte eine große Öffnung nach hinten unten, die auch in den hinteren oberen und vorderen unteren Quadranten hineinreichte. Der Knochen des Schläfebeins war stark sklerotisch, das Antrum mastoideum sehr klein und fanden sich neben dem Antrum nur wenige Zellen im Warzenfortsatz. Die Schleimhaut der Paukenhöhle erschien stark verdickt und geschwollen und waren die Fenesternischen dadurch ganz verdeckt, ebenso wie auch die großen Gehörknöchelchen.

Histologischer Befund.

Inneres Ohr. Die Erweiterung des Lumens des inneren Gehörgangs erstreckte sich nach außen bis zum Grund und war hier der sonst ziemlich dicke Knochen zwischen Ganglienkanal und innerem Gehörgang stark geschwunden, so daß der innere Gehörgang bis nahe an den Ganglienkanal der mittleren Windung der Schnecke reichte. Die Lichtung des inneren Gehörgangs betrug im Grund desselben immer noch 7 mm. Ebenso waren auch die Kanäle für den Vorhofs- und Gesichtsnerv, letzterer nahe bis zum Eintritt in die Paukenhöhle, sehr erweitert. Die periostale Auskleidung des inneren Gehörgangs war verdickt und enthielt zahlreiche spindelezellige Elemente. Die Nerven waren verhältnismäßig dünn und in ihrer Scheide reichlich Blut ergossen. Zwischen den Bündeln des Vorhofsnerven, besonders stark zwischen denen des Astes zur hinteren Ampulle, waren zahlreiche Rundzellen und auch Leukozyten eingelagert. Andeutungen davon fanden sich auch zwischen den Bündeln des Schneckenervens und des Gesichtsnerven. In der Schnecke fiel zunächst ziemlich reichliches Pigment ins Auge, das reichlich in der Spindel der Stria vascularis und der

1) Dieses Archiv. Bd. LIII. S. 61.

Lamina spiralis der mittleren und oberen Windung, weniger reichlich im Endost und dem *Ligamentum spirale* vorhanden ist. Auf der *Lamina spiralis ossea* finden sich an einzelnen Stellen auch noch frische Blutaustritte. Die Teile der Schnecke, besonders auch das Cortische Organ, sind alle sehr gut erhalten, nur zeigen sie sich im allgemeinen etwas zarter und weniger massig entwickelt als sonst. Die Nervenbündel sind im Endteil der basalen Windung auffällig schmaler und ebenso ist auch hier und im Ganglienkanal etwas mehr Bindegewebe um den Nerven und das Ganglion nachzuweisen. Die Schneckenwasserleitung ist ähnlich wie der innere Gehörgang stark erweitert, besonders in ihrer inneren Hälfte, deutlich aber auch noch in ihrem äußeren Teil. Im Vorhof und in den Bogengängen finden sich außer ziemlich reichlichen und zahlreichen Blutergüssen im perilymphatischen Teil keine besonderen pathologischen Veränderungen.

Mittelohr. In der Tuba Eustachii zeigt die Schleimhaut stärkere Entwicklung der Falten und finden sich dichte kleinere und größere Herde entzündlicher Infiltration. Vom Trommelfell sind nur wenig Schnitte für die Untersuchung brauchbar. In diesen zeigt sich eine starke Randknickung, eine größere Narbe am Rande der Membran und eine starke Auflockerung und entzündliche Infiltration der Schleimhautschicht. In der Paukenhöhle ist die Auskleidung hochgradig entzündlich infiltriert und geschwollen und zwar gleichmäßig längs der ganzen inneren Wand, nur in der Gegend der Fensternischen und an der unteren Wand sind die Verhältnisse etwas anders, indem hier die tieferen Räume mit einem lockeren Bindegewebe ausgefüllt sind und nur die oberflächlichen Schichten der Schleimhaut oder auch nur einzelne breite oder mehr rundliche Herde dicht mit Rundzellen infiltriert erscheinen. In gleicher Weise infiltriert sind auch einzelne Zapfen oder leistenartige Erhebungen an der unteren Wand. Das Epithel ist größtenteils erhalten und nur an einzelnen Stellen dichtester Infiltration nicht mehr nachzuweisen. Die Nische des ovalen Fensters ist mit lockerem Bindegewebe ausgefüllt, das von größeren gequollenen Zellen, einzelnen Rundzellen und Leukozyten durchsetzt erscheint. Zwischen den Schenkeln des Steigbügels ist ein größerer zystischer Raum erhalten. Die Schenkel des Steigbügels sind sehr schlank, färben sich sehr stark mit Hämatoxylin, und ist die Knochenstruktur an ihnen nicht mehr nachzuweisen. Sehr unregelmäßige Verhältnisse finden sich auch an der Basis des Steigbügels, deren Knochen größtenteils geschwunden ist, während das Ringband reichlich Spindelzellen aufweist, stellenweise auch verkalkt ist. Am vorderen und oberen Rand grenzt das Ringband unmittelbar an den erkrankten Knochen und ist hier auch der vordere Steigbügelschenkel an seinem innersten Teil fest mit dem erkrankten Knochen verwachsen.

Das runde Fenster ist im vordersten Teil durch Hyperostose der Knochenwände verengt und hat der hyperostotische Knochen den gleichen Bau wie am Promontorium. Der übrig bleibende Teil der vorderen Hälfte der runden Fensternische ist durch ein dichtes Bindegewebe, in dem einzelne zystenartige Räume eingeschlossen sind, ausgefüllt. Die hintere Hälfte der Nische ist frei und nur ihre Schleimhautauskleidung, gleich wie die der Paukenhöhle, stark entzündlich infiltriert, ebenso wie auch die *Membrana tympani secundaria* an ihrer äußeren Fläche. Der *Sinus tympani* zeigt nur ein kleines Lumen und ist sonst mit einem dichten Fasergewebe ausgefüllt, das in den oberflächlichen Lagen stellenweise etwas entzündlich infiltriert erscheint. Die Auskleidung des *Antrum mastoideum* ist gleich beschaffen wie die der Paukenhöhle.

Der Knochen. Der Felsen teil ist im allgemeinen etwas kleiner, und sind, wie schon oben erwähnt, die mit der Schädelhöhle zusammenhängenden Kanäle, und zwar der innere Gehörgang und die Schneckenwasserleitung, hochgradig erweitert, letzterer bis nahe zur Einmündung in die Schnecke. Der Knochen zeigt allenthalben ausgesprochen sklerotisches Gefüge, sehr wenig zellige Räume und eine starke Färbbarkeit mit Hämatoxylin, eine geringere mit Eosin, was auf einen vermehrten Kalkgehalt schließen lassen dürfte. Der Warzenteil zeigt nur einzelne kleine Zellen unterhalb des Antrums und ist ebenso wie auch der Schuppenteil,

soweit letzterer untersucht wurde, sklerotisch mit nur wenigen kleinen, mit lockerem Bindegewebe und weiten Gefäßen erfüllten zelligen Räumen.

Besonders hochgradig verändert erweist sich der Knochen an der inneren Wand der Paukenhöhle. Hier fanden sich überall unter der periostalen Schicht der Schleimhaut kurze und weite Kanäle im Knochen, in denen sich nur meist sehr spärliches oder gar kein Bindegewebe mehr nachweisen ließ. Der dazwischen liegende oberflächliche Knochen färbte sich ungemein stark mit Hämatoxylin, besonders im vorderen Teil der Paukenhöhle bis zu den Fensternischen. Außer diesen, jedenfalls schon älteren Veränderungen des Knochens, fand sich in der vorderen Umrandung des Steigbügels noch ein frischer otitischer Erkrankungsherd an der gleichen Stelle wie in den früher beschriebenen Fällen (Fig. 4). Er erstreckte sich vom

Fig. 4. Schnitt durch das Promontorium, die Lamina spiralis der basalen Windung und einen Teil des runden Säckchens von Fall IV. Vergr. 20.

ovalen Fenster im Promontorium nach vorne und endete hier zwischen der hintersten Grenze der mittleren Windung und dem Endteil der basalen Windung der Schnecke. Nach außen reicht er größtenteils bis an das Periost, nach innen bis an die endostale Auskleidung des Sacculus rotundus, während er nach oben vom Facialkanal nur noch durch eine schmale gesunde Knochenschicht getrennt war. Nach hinten zu umgriff er das ovale Fenster, und endete die Erkrankung am unteren Rande schon vor der Mitte der Nische, während sie am oberen erst nahe vor dem hinteren Nischenrand aufhörte. Es ist dieser Erkrankungsherd histologisch gleich beschaffen wie in den früher erwähnten Fällen; es ist der ganze Knochen, soweit er krank, durchsetzt von größeren, teils rundlichen, teils mehr länglichen Räumen, in denen sich neben stark erweiterten Gefäßen Granulationszellen, stellenweise auch große vielkernige Osteoklasten und noch häufiger an den Wänden

Osteoblastenlagen finden. An Stelle des Knochens ist überall ein bloß osteoides Gewebe getreten, in dem nur an einzelnen Stellen zentral gelegene, noch längliche Reste alten Knochens sich vorfinden; sie zeigen, mit Hämatoxylingefärbt, eine undeutliche Struktur, keine deutlichen Knochenkörperchen.

In einzelnen der gefäßführenden Zwischenräume in der nächsten Umgebung der Gefäße fanden sich auch einzelne Zellen mit stark gefärbtem Kern nach Art der Lymphozyten eingelagert. Am Rand des Herdes ist der erkrankte Knochen scharf gegen den gesunden abgegrenzt und kommt es vor, daß auch ein Gefäßraum mit einem Teil seiner Wand direkt an den gesunden Knochen angrenzt. Hier zeigen sich die Knochenkörperchen stellenweise im gesunden Knochen insofern verändert, als sie in ihrem Lumen etwas erweitert sind und die Knochenzelle in ihnen deutlich zu sehen ist. Es macht dies ganz den Eindruck, als ob es sich bei der Erkrankung des Knochens nicht bloß um eine Resorption des alten Knochens durch Osteoklasten und Anbildung neuen Knochens durch Osteoblasten handle, sondern um einen Umbau des alten Knochens, bei dem die Zellen des alten Knochens gleichfalls eine aktive Rolle zu haben scheinen. — Über den ganzen otitischen Herd muß noch gesagt werden, daß die Erkrankung in seiner ganzen Ausdehnung verhältnismäßig frisch ist und daß sich nirgends sklerotische Partien, noch auch solche, die mit Markgewebe oder älterem Bindegewebe erfüllte Kanäle aufweisen, vorfinden. Am zahlreichsten und deshalb auch am frischesten ist die Erkrankung an der vorderen Peripherie des Herdes und am hinteren Teil in der Umrandung des Steigbügels, wo auch schon ein Teil der Steigbügelbasis und des Ringbandes von ihr ergriffen ist, so daß eine knöcherne Ankylose bei längerer Dauer des Prozesses sicher zu erwarten war.

In diesem Fall fanden sich im Schläfenbein pathologische Veränderungen von sehr verschiedener Dauer und Art. Die abnorme Kleinheit des Schläfenbeins und der durchweg stark sklerotische Knochen desselben in Verbindung mit der hochgradigen Erweiterung des inneren Gehörgangs, eines großen Teils des Fallopiischen Kanals, dürften schon in einer sehr frühen Lebensperiode entstanden sein, und der Kranke in dieser Zeit wahrscheinlich an Hydrocephalus und wahrscheinlich auch an Rachitis gelitten haben. Wann die chronische eitrige Mittelohrentzündung, die zur Perforation des Trommelfells und zu den beschriebenen Veränderungen in der Schleimhaut und den oberflächlichen Knochen-schichten der inneren Wand der Paukenhöhle geführt hat, auftrat, läßt sich heute, da Angaben darüber fehlen, nicht bestimmen. Endlich kommt dazu als dritte Veränderung der frische otitische Herd in der Umgebung des ovalen Fensters, über dessen Entstehung gleichfalls verschiedene Meinungen herrschen könnten. Ihn als Folge der eitrigen Mittelohrentzündung anzusehen, erscheint mir nach dem ganzen übrigen Befund nicht sehr wahrscheinlich und habe ich schon bei der Demonstration der Präparate dieses Falls am 7. Deutschen Otologentag in Würzburg der Vermutung Ausdruck gegeben, daß es sich um eine Erkrankung des Knochens infolge von Syphilis handeln dürfte,

zumal sichere Zeichen von Syphilis auch sonst bei dem Kranken sowohl durch die Anamnese, als auch durch die Sektion nachgewiesen wurden.

Auch auf einen Fall von Schwabach¹⁾ konnte ich mich in Würzburg berufen, bei dem gleichfalls Zeichen überstandener Syphilis vorhanden waren, wenngleich Schwabach selbst seinem Fall nicht diese Deutung zu geben scheint.

Fall V.

Ch. Magdalena, 34jährige Arbeiterfrau aus Graz, wurde am 4. Januar 1896, nachdem die Geburtstätigkeit vor etwa 48 Stunden eingesetzt hatte und die Kranke von der Hebamme schon des öfteren untersucht worden war, fiebernd (38,2^o) mit Querlage, Nabelschnurvorfal und lebendem Kind auf die geburtshilfliche Klinik gebracht. Nach Wendung und Extraktion am Fuße war die Patientin bis zum 4. Tage fieberfrei, worauf die Symptome typischer puerperaler Septikämie einsetzten, welcher die Kranke am 8. Tage der Erkrankung oder am 11. Tage nach der Entbindung erlag. Die Kranke war auch hochgradig schwerhörig, weiß jedoch nicht genau anzugeben, wenn die Schwerhörigkeit zuerst begann. Während der vorhergegangenen Schwangerschaften (I. 1893, II. 1894) verschlimmerte sich die Schwerhörigkeit. Eine Hörprüfung wurde nicht vorgenommen, und konnte ich nachträglich nur feststellen, daß man laut auf sie schreien mußte, wenn sie verstehen sollte. Ihr Mann, den ich nachträglich wegen eines Ohrenleidens seiner Frau befragen ließ, war mißtrauisch und verweigerte jede Auskunft, er gab an, er wisse gar nichts von einem Ohrenleiden seiner Frau.

Die Sektion, die am 15. Januar 1896 im pathologisch-anatomischen Institute vorgenommen wurde, ergab:

Körper klein, schwächlich, Bauchdecken stark aufgetrieben. Hirnsubstanz weich, zäh, ziemlich blutreich, Ventrikel mäßig weit. Kleinhirn wie Großhirn. Unterhautzellgewebe fettlos. Herz klein, Höhlen eng, Herzmuskel braun, brüchig, Klappen gehörig geformt. Linke Lunge groß. Pleura zart, Oberlappen lufthaltig blaß, von sehr viel schaumiger Flüssigkeit überströmend, Unterlappen von konfluierenden hepatisierten Herden durchsetzt. Bronchien gerötet, mit zähem Schleim bedeckt. Die rechte Lunge ist ebenfalls groß, im Pleurasack viel eitrig-fibrinösen Exsudats; Gewebe im Oberlappen lufthaltig, ödematös, der Unterlappen atelektatisch. Halsorgane bieten nichts Abnormes. Zwerchfell sehr hochstehend. Peritoneum mit Eitermassen bedeckt, ebenso die Darmschlingen, welche auch untereinander verklebt sind. Milz groß, Kapsel zart, Gewebe graubraun, pulpareich. Beide Nieren groß, sehr brüchig, fettglänzend und blaß. Im Magen reichlicher Inhalt, Schleimhaut längsgewulstet, rötlichgrau gefärbt. Im Darmkanal nur wenig Inhalt. Die Schleimhaut ist stellenweise gerötet und gequollen. Leber groß, sehr schwer, härtlich, brüchig, gelblich gefärbt. In der Blase wenig trüber Harn, Schleimhaut etwas gerötet. Uterus sehr groß. Innenfläche von schmutziggelber Masse bedeckt. Der Placentaransatz nekrotisch zerfallen. Gewebe des Uterus sehr morsch und brüchig, die Lymphgefäße mit Eiter erfüllt. Die Ovarien sind stark vergrößert, Gewebe feuchtglänzend, grau. In denselben finden sich einzelne linsengroße Herde, eingedickten Eiter enthaltend.

Diagnosis: Peritonitis purulenta, Pneumonia lobular. Atelectas. pulm. dextr. Pleuritis dextr. Metrolymphagit. Endometritis. Oophoritis ascendens, Sepsis puerperalis.

Im rechten Schläfenbein, das ich zur Untersuchung erhielt, fand ich die Epidermis im äußeren Gehörgang in einem großen Klumpen abgelöst (das Präparat lag zuvor schon in Müllerscher Flüssigkeit), in der Paukenhöhle und im Antrum schleimiges Sekret. Der Knochen war beim Sägen sehr

1) Zeitschr. f. Ohrenheilk. XXXI. S. 122.

hart, das Antrum verhältnismäßig klein, und hinter demselben nur wenige pneumatische Zellen zu finden. Beim Trennen des Schuppenteils vom Felsenfell wurde leider das Trommelfell zerrissen und blieb der größte Teil davon am inneren Teil, und nur der vordere kleinere am äußeren. Die Schleimhaut um die Gehörknöchelchen, im Antrum und in der Paukenhöhle, soweit von letzterer zu übersehen ist, scheint sehr verdickt zu sein. Durch die Wirkung der Müllerschen Flüssigkeit ist die Erkenntnis der Beschaffenheit der Schleimhaut erschwert.

Das Präparat wird nach Entkalkung in Salpetersäurelösung der mikroskopischen Untersuchung unterzogen.

Mikroskopischer Befund.

Innerer Gehörgang. Von den Nerven fehlt der größte Teil des R. cochleae und ein großer Teil des Vorhofsnerven an dem Präparate. In den erhaltenen Teilen fand sich hochgradige venöse Hyperämie und größere Blutaustritte zwischen den äußeren Nervenscheiden, kleine punktförmige auch zwischen den Nervenbündeln.

Schnecke. Starke venöse Hyperämie und im Periost der Vorhofstreppe ziemlich reichliches Pigment. Im rückläufigen Teil der basalen Windung fehlt in einer größeren Strecke das Ganglion spirale, die dazu gehörigen Nerven und entsprechend auch das Cortische Organ, während Stria vascularis, Prominentia spiralis, und die Reißnersche Membran erhalten sind. In der Lamina spiralis findet sich nur Pigment, spärliches Bindegewebe und einige Fettkörnchenkugeln, im Rosenthalschen Kanal reichliches Bindegewebe nur an einer Stelle, im übrigen auch nur spärliches Bindegewebe und einzelne Fettkörnchenkugeln. Das Cortische Organ fehlt noch auf eine weitere Strecke als das Spiralganglion, da es auch da noch fehlt, wo noch einzelne Ganglienzellen nachweisbar sind. Im untersten Teil der Schnecke ist das Cortische Organ wieder schön erhalten, im Ganglienkanal aber auch hier eine Verminderung der Nervenzellen und eine Zunahme des Bindegewebes.

Im Vorhof und den Bogengängen nichts Pathologisches nachzuweisen.

Eustachische Röhre. Die Schleimhaut der knorpeligen Tuba ist mäßig verdickt, und findet sich stellenweise eine dichtere Anhäufung von Rundzellen und stellenweise auch zahlreiche Bildungs- und Spindelzellen.

Die Paukenhöhle (Fig. 5) ist zum größten Teil ausgefüllt mit dichten Bindegewebe mit spärlichen Spindelzellen und reichlicher, homogener Zwischensubstanz, und hängt dieses Bindegewebe unmittelbar mit der Bekleidung der inneren Wand, die gleichfalls hochgradig verdickt ist, in ihrer Struktur aber deutlich von dem ersteren zu scheiden ist, zusammen. Sie enthält zahlreiche Gefäße, auch reichlich Zellen, insbesondere Spindelzellen und einzelne längliche, mit Zylinderepithel ausgekleidete zystenartige Spalten, die größer und zahlreicher in dem Bindegewebe sind, das die Nischen der Fenster erfüllt. Sie sind erfüllt mit Schleim und schleimig degenerierten Zellen. Noch größer und zahlreicher sind die Zysten entlang der unteren Wand und oft derart angeordnet, daß eine größere Anzahl, nur durch dünne Zwischenwände von einander getrennt, beisammenliegt. Die Lichtung der hinteren Hälfte der Paukenhöhle ist so bis auf die erwähnten zystenartigen Räume verloren gegangen. Etwas anders verhält sich die vordere Hälfte. Das Trommelfell ist hier in der Mitte mit der inneren Wand verwachsen und schließt so den vorderen unteren Teil der Paukenhöhle ab, in welchem die Schleimhaut jedoch gleichfalls ziemlich bedeutend durch Zunahme des Bindegewebes verdickt ist, und finden sich auch hier darin zahlreiche zystenartige, am Querschnitt runde Räume, die besonders in der unteren inneren Wand der Paukenhöhle fast die ganze Schleimhaut durchsetzen. Das Trommelfell zeigt im vorderen oberen Quadranten eine größere Narbe, es fehlt hier die Eigenschicht und grenzt die Cutischicht unmittelbar an das Bindegewebe, das die Paukenhöhle erfüllt.

Von den Gehörknöchelchen ist der absteigende Amboßschenkel und der Steigbügel von Bindegewebe umwachsen und der Hammergriff durch

Bindegewebe mit dem Promontorium verbunden. In den Gelenken zwischen Hammer und Amboß und zwischen Amboß und Steigbügel ist der Knorpelbelag verkalkt, besonders stark am Steigbügel. In einigen Markräumen des Amboßkörpers sind größere Massen Kalk eingelagert. Der hintere Steigbügelschenkel ist erhalten, aber durch Bindegewebe mit der hinteren Nischenwand verwachsen, der vordere nur in Resten vorhanden. Die inneren zwei Drittel des vordern sind bis auf wenige kalkhaltige Reste, in denen keine Knochenkörperchen mehr zu erkennen sind, zerstört, von einer dicken Bindegewebsschicht umgeben und in einer von der Nische ausgehenden Exostose ganz eingeschlossen.

Das Antrum ist durch bindegewebige Scheidewände in eine Anzahl von kleineren Räumen zerlegt, die sämtlich mit Schleim oder auch zum Teil

Fig. 5. Schnitt durch die mit Bindegewebe ausgefüllte Paukenhöhle, den Hammergriff und die Fenesternischen, den Sacculus ovalis und die Crista des hinteren Bogengangs. Vergr. 8.

mit schleimig gequollenen Epithelien ausgefüllt sind. Die Schleimhautauskleidung des Antrums sowohl, wie auch der umgrenzenden pneumatischen Zellen, ja selbst auch der entfernteren war hochgradig durch neugebildetes Bindegewebe verdickt, und fanden sich in einzelnen Zellen des angrenzenden Knochens Osteoblasten und helle, mit Eosin gefärbte Säume neugebildeten Knochens.

Der Knochen war in mehrfacher Art pathologisch verändert. Einmal fand sich ein ungewöhnlicher Hochstand des Bulbus der Jugularvene und war dadurch der knöcherne Boden der Paukenhöhle in eine dünne Platte verwandelt, die stellenweise im Knochen größere Lücken zeigte (Fig. 5). Weiter hatte der Bulbus auch einen Teil der Pars petrosa zum Schwinden gebracht und reichte bis zum unteren Rand des Promontoriums, nach hinten bis zur Ampulle

des hinteren Bogengangs empor, die nur durch eine papierdünne Knochenschicht noch von dem Bulbus getrennt war. Außerdem fand sich eine ziemlich hochgradige Hyperostose des Promontoriums, die unmittelbar am Ringband des Steigbügels begann und sich allmählich an Umfang zunehmend bis zum unteren Rand erstreckte. An letzterem bildete sie noch einen weiteren Auswuchs (Osteophyten) nach unten, der zum Teil von außen und vorne her den Zugang zur Nische des runden Fensters verlegte. Der neugebildete Knochen war periostaler Knochen und zeigte in seiner Mitte, ungefähr in der Höhe des runden Fensters eine Lücke, die mit faserigem, spindelzellenreichem Bindegewebe ausgefüllt war. Nach innen zu wurde durch diese Hyperostose, sowie auch durch eine gleiche an der inneren Wand die Nische des runden Fensters sehr verengt und der übrige schmale Rest derselben war, wie schon oben erwähnt, durch Bindegewebe ausgefüllt. Eine solche Verengung der Fensternische durch Hyperostose des Knochens ist übrigens nicht selten zu beobachten und auch schon früher von mir beschrieben. Der neugebildete Knochen unterscheidet sich sonst in seiner Struktur kaum von dem übrigen periostalen der Labyrinthkapsel, nur färbt er sich noch etwas stärker mit Eosin.

Eine hochgradige Erkrankung des Knochens fand sich weiter in der Nische des ovalen Fensters. In Zusammenhang mit einem Herd chronischer Entzündung im Knochen zeigten sich hier an der Oberfläche mehrere größere breitausitzende Exostosen, von denen eine nach außen und unten vom unteren Rand der Steigbügelbasis, eine zweite an der gleichen Seite oberhalb des Steigbügels und eine dritte endlich vom unteren äußeren Rand des knöchernen Facialkanals sich entwickelt hatte. Der Erkrankungsherd im Knochen sitzt entsprechend dem vorderen Ende der Steigbügelbasis und hat unten eine Breite von 4–5 mm, umgreift die Steigbügelbasis an ihrem vorderen Drittel und erstreckt sich von der Paukenhöhle aus zur periostalen Auskleidung des Vorhofs, bezw. des Endteils der basalen Schneckenwindung. Die Steigbügelbasis ist nur im vordersten Teil knöchern ankylosiert, weiterhin aber ist das Gelenk frei und finden sich nur in der Nische oben und unten die Exostosen, die weiter nach hinten immer kleiner werden, und weiter nach außen zu liegen kommen. Der erkrankte Knochen selbst zeigt hochgradig erweiterte Gefäßkanäle mit weiten Gefäßen durchzogen, in deren Umgebung zahlreiche Bildungszellen, an einzelnen Stellen auch große Riesenzellen mit mehreren Kernen, Osteoklasten und stellenweise auch Osteoblasten lagen. Der Knochen in der nächsten Umgebung der Kanäle bestand häufig nur aus osteoidem Gewebe, das besonders inmitten des Krankheitsherdes ganz an Stelle des verschwundenen Knochens getreten war. Der erkrankte Knochen ist vom gesunden überall scharf abgegrenzt, und ziehen am Promontorium noch einzelne erweiterte Gefäßkanäle nach abwärts, die an ihrer Peripherie mit Osteoblastenlagen und osteoiden Säumen bekleidet sind. Am oberen Rande des Krankheitsherdes finden sich unregelmäßige rundliche Buchten des erkrankten Knochens in den gesunden hinein, und an der vorderen Grenze des Herdes, an der hinteren Peripherie der oberen Schneckenwindung, findet sich reichlich Kalk in unregelmäßigen Massen an Stelle des erhaltenen alten Knochens.

Der Knochen in der Umgebung des Trommelfells und im Gehörgang war wenig verändert, an der Peripherie der knöchernen Tuba und im hinteren unteren Teil des Felsenteils war er hochgradig osteoporetisch mit weiten Markräumen. Im hinteren Teil des Schuppenteils, gegen das Antrum zu und an der oberen Wand der Paukenhöhle fanden sich größere Lücken im Knochen, die mit einem zellenreichen, entzündeten Bindegewebe ausgefüllt waren. An der Peripherie derselben schöne Osteoblasten und neugebildete Knochenlagen.

Da aus der Anamnese über das Ohrenleiden der Kranken nichts Genaueres bekannt ist, sind wir bei der Beurteilung auf den anatomischen Befund ganz angewiesen. Danach handelt es

sich um eine längerdauernde Mittelohrentzündung, die zu Durchbruch und später Narbenbildung des Trommelfells, Ausfüllung der Paukenhöhle, und zum Teil auch des Antrums mit Bindegewebe und stellenweise auch zu einer Erkrankung der oberflächlichen Knochenpartien geführt hatte. Bemerkenswert war insbesondere der größere Entzündungsherd im Knochen der vorderen Peripherie des ovalen Fensters, der, von dieser ausgehend,

Fig. 6. Schnitt durch die Fenster. Vorderes Ende des ostitischen Herdes, der von der runden Fensternische ausgeht. Vergr. 15.

sich bis zur Wand des Vorhofs und der basalen Schneckenwindung erstreckt (Fig. 6) und auch zu einer knöchernen Ankylose im vorderen Drittel der Steigbügelbasis geführt hatte. Dieser Entzündungsherd zeigt in der Peripherie des ovalen Fensters verhältnismäßig ältere, und je weiter nach vorne, um so frischere ostitische Veränderungen, so daß daran kaum gezweifelt werden kann, daß er vom vorderen Teil der ovalen Fensternische seinen Ausgang nahm, und von hier aus sich allmählich immer weiter nach vorne, bis zur Umgebung des Vorhofs, fortsetzte. Im ganzen konnte aber der ostitische Herd noch von keiner langen Dauer

gewesen sein, da die Veränderungen alle noch verhältnismäßig jüngerer Natur waren.

Hervorzuheben sind auch die Ausfüllung der Paukenhöhle¹⁾ und der Fensternischen mit Bindegewebe, und die zahlreichen zystischen Räume in Paukenhöhle und Antrum, die, mit Zylinder-epithel ausgekleidet, als Überbleibsel der ursprünglichen Pauken- und Warzenhöhle anzusehen sind, weiter die hochgradige Verdünnung des Paukenhöhlenbodens und des Knochens der unteren Wand des hinteren Bogengangs durch Hochstand des Bulbus der Vena jugularis, und endlich die Veränderungen in dem Endteil der basalen Schneckenwindung. Die Erklärung für den Schwund der Ganglienzellen und die Zunahme des Bindegewebes im Rosenthalschen Kanal dürfte wohl am leichtesten in der Annahme gefunden werden, daß die ausgedehnte Entzündung in der Paukenhöhle auch auf den Endteil der basalen Windung übergriffen hat.

Fall VI.

Marie M., 76jährige Witwe, wurde am 20. Dezember 1895 auf der medizinischen Klinik, an der sie wegen eines Magenkarzinoms in Behandlung war, untersucht. Sie gab an, schon seit 20 Jahren an Taubheit zu leiden, doch kann über die Ursache nichts Genaueres von der Kranken angegeben werden. Auch wegen anderer Ohrsymptome konnte von ihr, da sie auch nicht schreiben und lesen kann, nichts herausgebracht werden.

Die Trommelfelle waren von mehr weißlicher Farbe und stärker eingezogen, mit stärkerer Randtrübung und Randknickung. Das linke Trommelfell war mehr milchig-weiß. Die Schleimhaut der Nase blaßrot, die rechte untere Muschel etwas atrophisch, massenhafte Schleimsekretion. Die hintere Rachenwand zeigte zahlreiche Granula, und auch im Nasenrachenraum fanden sich reichliche Schleimmassen. Die Hörprüfung ergab für alle Prüfungsmittel, Uhr, Stimme und sämtliche Stimmgabeln ein negatives Resultat auf beiden Ohren, mit der einzigen Ausnahme, daß links die tiefen Stimmgabeln c^1 — c^3 in Knochenleitung noch gehört werden. Die tiefen und großen Stimmgabeln C , C_1 und C_2 wurden in Knochenleitung leider nicht geprüft, in Luftleitung aber nicht gehört.

Die Kranke starb an den Folgen ihres Magenkarzinoms am 2. Febr. 1896 und wurde die Sektion am 3. Febr. im pathologisch-anatomischen Institute vorgenommen.

Sektions-Protokoll vom 3. Febr. 1896.

Körper klein, schwächlich gebaut, abgemagert. Unterleib stark aufgetrieben, grünlich verfärbt. Schädeldach groß, rundlich oval, kompakt. Hirnhäute blutreich, Pia stark verdickt, schlaff, Hirnsubstanz weich, brüchig, Corticalis verschmälert. Marksubstanz von leicht abstreifbaren Blutpunkten durchsetzt. Ventrikel erweitert, mit klarem Serum erfüllt. Kleinhirn brüchiger als das Großhirn, Gefäße an der Basis stark rigid. Pons und Medulla fest und zäh. Im basalen Sinus dunkles geronnenes Blut. Unterhautzellgewebe fettlos. Herz klein, schräg gelagert, kontrahiert, Höhlen eng, Herz-

1) Eine Obliteration der Paukenhöhle mit Bindegewebe, die übrigens auch schon von Tröltsch beschrieben wurde (d. A. Bd. VI. S. 73), habe ich schon wiederholt beobachtet und auch in Schwarzes Handbuch, Bd. I, S. 253, Fig. 8 abgebildet, so daß die Ansicht Hölzels (Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XLIII. S. 176), daß darüber nichts in der Literatur ist, nicht richtig sein kann.

fleisch brüchig, rotbraun. Klappen gehörig geformt. Beide Lungen groß, leicht, Pleura zart, Oberlappen lufthaltig, an den Rändern blaß und rarefiziert, am Schnitt von schaumiger Flüssigkeit überströmend, die Unterlappen von hepatisierten Herden durchsetzt. In den Bronchien zäher Schleim, Schleimhaut stark gerötet. Schleimhaut des Pharynx livid verfärbt, die des Ösophagus und der Trachea blaß und glatt. Schilddrüse vergrößert. Milz klein, Kapsel gerunzelt, Gewebe rotbraun, Pulpa spärlich. Beide Nieren klein. Oberfläche glatt, Gewebe rotbraun, fest, zäh. Der Magen sehr weit, mit flüssigem Speisebrei gefüllt, Schleimhaut im Fundus ekchymosiert, glatt, die Pylorusgegend ist eingenommen und sein Gewebe ganz aufgegangen in einem ca. faustgroßen Tumor, der aus weichem, blassem, gallertartigem Gewebe besteht und den Pylorus so verengt, daß derselbe kaum für die kleine Fingerspitze durchgängig erscheint. Das große Netz ist übersät mit größeren und kleineren, aus gallertartigem Gewebe bestehenden Knoten, ebenso die Unterfläche des Zwerchfells. — Die übrigen Organe zeigen nichts Abnormes.

Diagnosis: Carcinoma gelatinos. partis pylorici cum metast. in oment. maj. et diaphragma. Marasmus.

Die Schläfenbeine, die mir Hofrat Eppinger zur Untersuchung überließ, zeigten folgenden Befund:

Rechtes Ohr. Die Schleimhaut der Tuba und der vorderen und unteren Hälfte des Trommelfells verdickt. Das Hammer-Amboßgelenk beweglich. Die Nische des runden Fensters ganz verwachsen, die des ovalen Fensters teilweise von unten her. Die Steigbügelschenkel sind sehr dünn. Der Warzenfortsatz hochgradig pneumatisch, und reichen die pneumatischen Zellen weit nach hinten über den Bereich des Sulcus sigmoideus hinaus. Auch ist der Bulbus venae jugularis stark ausgedehnt,]

Linkes Ohr. Das Trommelfell verdickt, weißgrau, am Amboß etwas durchscheinend. Die Schleimhaut der Paukenhöhle an der inneren Wand verdickt, die Nische des runden Fensters größtenteils verwachsen, die des ovalen von unten her verengt und der vordere Schenkel des Steigbügels mit dem unteren Rand der verdickten Nischenwand verwachsen. Die Steigbügelschenkel sehr dünn, und ist die Nische oberhalb der Schenkel frei. Der Warzenfortsatz hochgradig pneumatisch und anscheinend nicht pathologisch verändert.

Die Präparate werden wie gewöhnlich nach Fixierung in Müllerscher Flüssigkeit in 5 proz. Salpetersäurelösung entkalkt und mikroskopisch untersucht.

Mikroskopischer Befund.

Rechtes Gehörorgan.]

Inneres Ohr. Von den Nerven im inneren Gehörgang finden sich nur Reste vom Präparat, die übrigen sind bei der Herausnahme des Gehirns aus der Schädelhöhle abgerissen worden. Diese Reste zeigen außer stärkerem Bluterguß in die Scheide keine pathologischen Veränderungen.

In der Schnecke sind die Nerven und Ganglienzellen in den oberen Windungen gut erhalten, in der basalen Windung an Zahl bedeutend vermindert, und ist daselbst auch die Umgebung des Ganglienkanals stark verkalkt und im Kanal selbst das Bindegewebe vermehrt. Auch die beiden Blätter der Spirallamelle der basalen Windung sind in eine Kalkmasse umgewandelt, in der keine Knochenstruktur mehr zu erkennen ist, und ist dabei auch der Zwischenraum zwischen beiden sehr verengt. Der Cortische Bogen zeigt keine wesentlichen Veränderungen, seine Zellen sind nur in der basalen Windung weniger gut erhalten. Die periostale Auskleidung der Treppen und der äußere Teil des Ligamentum spirale sind da, wo sie an den erkrankten Knochen angrenzen, mehr oder weniger hochgradig verdickt, letzteres insbesondere in den oberen Windungen stellenweise in eine dicke Schicht stark mit Eosin färbbares sklerotisches Bindegewebe umgewandelt. In der Umgebung des Venenkanals in der basalen Windung, sowie auch der zelligen Räume in der Schneckenwindung ist der Knochen sehr stark kalkhaltig, und erstreckt sich die gleiche Veränderung auch von unten her bis in die Zwischenwand

der unteren und mittleren Windung. Die Schneckenwasserleitung ist im äußeren Teil, an ihrer Mündung in die Schnecke, verengt, und weiter nach innen zu ganz verschlossen; es finden sich daselbst innerhalb des erkrankten Knochens nur Reste von Bindegewebe und einzelne Körper von phosphorsaurem Kalk als Reste des früheren Kanals. Das mediale Ende des Kanals ist wieder erhalten. Im unteren Endteil der Paukentreppe ragt der erkrankte Knochen in Form einer abgerundeten Exostose in die Schnecke herein, und ist hier auch die Basalmembran an einer umschriebenen Stelle vom Spiralband abgerissen (nachträglich erst am Präparat).

Im Vorhof und in den Bogengängen finden sich trotz der hochgradigen Veränderungen ihrer knöchernen Wände keine pathologischen Veränderungen. Die Wände in den Bogengängen zeigen einzelne kleine Prominenz des erkrankten Knochens, die in das Lumen vorragen, die endostale Auskleidung ist stellenweise etwas zellenreicher und dicker.

Mittleres Ohr. Die Auskleidung der knöchernen Tuba (die knorpelige fehlte am Präparate) zeigt auch in ihrer oberflächlichen Schicht ein sklerotisches Aussehen. In der Paukenhöhle besteht die Auskleidung aus fibrösem Bindegewebe mit reichlicher Zwischensubstanz und wenigen Kernen, und nur stellenweise finden sich auch reichlichere Spindelzellen eingelagert. An einzelnen Stellen erreicht diese Verdickung der Auskleidung einen höheren Grad, so besonders in den Fensternischen, die, so weit sie nicht schon durch die Exostosen des erkrankten Knochens verengt sind, durch fibröses Bindegewebe verschlossen sind. Nur im hinteren oberen Teil der Nische des ovalen Fensters ist noch ein Teil des Lumen, trotz der Verdickung der Auskleidung und bindegewebiger Adhäsionen, erhalten geblieben.

Das Trommelfell ist im allgemeinen etwas verdickt, besonders stark am vorderen Rande, und ist seine Schleimhautschicht gleich beschaffen wie die Auskleidung der Paukenhöhle. Auch die Cutisschicht besteht nur aus einer dünnen Schicht fibrösen Bindegewebes, während die Eigenschicht keine Veränderung erkennen läßt. Besonders hochgradige Verdickung der Auskleidung findet sich unmittelbar über dem Trommelfell an der äußeren Seite des Kuppelraums. Hier ist auch die Knochenwand uneben, buchtig, mit spitz vorstehenden Knochenteilen, zwischen die sich überall die verdickte Auskleidung hinein erstreckt.

Von den Gehörknöchelchen zeigen Hammer und Amboß ähnliche Veränderungen wie der angrenzende Knochen der äußeren Wand der Paukenhöhle, erweiterte Markräume und Gefäßkanäle, Knochenneubildung und Kalkeinlagerung in die Gelenkverbindung, letztere auch ins Amboßsteigbügelgelenk. Der Steigbügel hat nach außen sehr schlanke Schenkel, im inneren Teil ist der vordere fest mit der Nischenwand verwachsen, der hintere zum Teil. Letzterer zeigt außerdem Auflagerung einer dicken Schicht stark verkalkten periostalen Knochens. Die Basis ist im vorderen Teil von außen her durch eine gleiche Hyperostose, wie der hintere Schenkel, verdickt. Im Inneren zeigt der Knochen Zeichen chronischer Entzündung, Ausfüllung des hier vorhandenen Markraums mit jungem Bindegewebe. Der hintere Teil der Basis ist mit dem umgebenden Knochen in fester Verbindung (knöcherne Ankylose), vom Ringknorpel nichts mehr zu erkennen, und zeigt die gleichen pathologischen Veränderungen wie der Knochen des Felsentells. Der Steigbügel ist mit dem vorderen Teil seiner Basis aus seiner Verbindung luxiert und zwar um die Dicke seiner Basis nach außen und dort knöchern mit der erkrankten Knochenwand verwachsen. Seine Schenkel mit dem Köpfchen sind stark nach unten geneigt, in fibröses Bindegewebe eingeschlossen und mit der Wand verwachsen. Die größeren Gefäße längs des Tensor tympani und N. petrosus zeigen deutliche Verdickung der Intima durch Endarteritis.

Im Warzenfortsatz zeigt die Schleimhaut ein mehr lockeres Gefüge als in der Paukenhöhle und ist, soweit die Erkrankung des Knochens reicht, auch dicker und sind in ihr zahlreiche Spindelzellen eingelagert. Einzelne kleine Zellen sind ganz mit lockerem Bindegewebe ausgefüllt.

Knochen: Der Knochen ist in großer Ausdehnung erkrankt gewesen und zum Teil noch erkrankt. Im allgemeinen kann man sagen, daß er, in-

soweit er an die Paukenhöhle grenzt, in größerer oder geringerer Breite pathologische Veränderungen aufweist, und daß auch der größte Teil der die Bogengänge umgebenden Knochenpartien erkrankt ist. Im vorderen Teil der Paukenhöhle reicht die Erkrankung des Knochens an der inneren Wand etwa 4 mm weit in den Knochen hinein, umgreift einzelne Windungen der Schnecke und geht bis zur vorderen Peripherie des inneren Gehörgangs, der in großer Ausdehnung miterkrankt ist. Weiter nach hinten findet sie ihre innere Grenze an der Peripherie des Sacculus und Utriculus, deren Nervendurchtrittsstellen zum Teil ebenfalls von erkranktem Knochen umgeben sind. Am tiefsten geht die Erkrankung in der Gegend der Bogengänge (Fig. 9 auf Taf. VI. VII), indem sie hier auch den Knochen in der Umgebung der Vorhofwasserleitung und auch einen Teil der Umgebung der Bogengänge ergriffen hat. Weiterhin ist der ganze Knochen des Paukenhöhlenbodens, ein großer Teil der knöchernen Umrandung des Bulbus der Jugularvene, ebenso auch die Umgebung der knöchernen Tuba und der Hallerschen Spalte und die zunächst an die Paukenhöhle grenzenden Partien des äußeren Gehörgangs in gleicher Weise pathologisch verändert. Über die obere Wand der Paukenhöhle und den äußeren Teil des Warzenfortsatzes kann ich keine Angaben machen, da diese nicht histologisch untersucht wurden.

Trotz dieser anscheinend diffusen Erkrankung finden sich hier bei genauerer Untersuchung auch dieselben Herde im Knochen wie in den übrigen Fällen, nur daß sie wegen ihrer großen Ausdehnung vielfach miteinander verschmelzen. Der Herd im inneren Gehörgang zeigt auch den Knochen in einer größeren Ausdehnung usuriert und liegt in der Höhle, deren Grund unregelmäßig zerfressen aussieht, wenig faseriges Bindegewebe. Die angrenzenden Knochenpartien zeigen etwas größere Gefäßkanäle, und sonst durchwegs sklerotische Beschaffenheit mit starker Kalkablagerung. Neu sind hier ein größerer Herd, der an der inneren Wand des Aditus breit beginnt und den äußeren Bogengang von außen her umgreift, und ein zweiter tiefer unten in der Gegend des Sinus tympani, der nach innen den hinteren Bogengang umgreift und die ganzen Knochen dieser Partie bis an die äußere Wand der Vorhofwasserleitung umfaßt und erst an der oberen Peripherie der Felsenbeinpyramide sein Ende findet. In dieser obersten Partie erweist sich auch die Erkrankung am frischesten. Auffällig ist hier auch die Erkrankung des ganzen Paukenhöhlenbodens. Der Knochen zeigt auch hier eine starke blaugelbe (Hämatoxylin-Eosin) Färbung, ist anscheinend im ganzen dicker, mit Verdickung des Bindegewebes in den zelligen Räumen, und finden sich in diesen, sowie in den Markräumen, meist Osteoblastenlagen auf der hellroten inneren Knochenwand. Neben älteren Knochen mit deutlicher lamellärer Schichtung und dunkelblauer Färbung finden sich mehr blaurote mit weniger deutlicher Schichtung und stärkerem Hervortreten der Knochenkörperchen, und oberflächlich um die Knochenränder ganz licht gefärbte Schichten mit Osteoblastenlagen.

Linkes Gehörorgan.

Im inneren Gehörgang sind auch hier zwischen den Nerven reichliche Blutaustritte und ist die periostale Auskleidung, da wo sie an den erkrankten Knochen grenzt, verdickt und mit zahlreichen Spindelzellen durchsetzt. In der Schnecke (Fig. 10 auf Taf. VI. VII) ist der Nervenapparat schön erhalten und das Endost im Endteil der basalen Windung stark verkalkt. Auch ragt ins Lumen der Paukentreppe, ebenso wie auch in die Spitzenwindung, der kranke Knochen in Form einer Exostose herein. Die Schneckenwasserleitung ist teilweise durch fibröses Bindegewebe, das überdies noch verkalkt ist, unterbrochen. Von der Spitze der Schnecke sowohl wie auch von den Seiten her ist die Erkrankung des Knochens bis in die Schneckenwindung vorgedrungen, und ist außerdem der Knochen in der Umgebung der markhaltigen Räume der Schneckenwindung stark verkalkt. Das Ligamentum spirale ist angrenzend an den kranken Knochen wie im rechten Ohr sehr verdickt.

Im Vorhof und den Bogengängen das gleiche Verhalten wie rechts; bemerkenswert war hier noch eine Veränderung des an das Antrum grenzenden äußeren Teiles des äußeren Bogengangs, der hier durch das Herein-

rücken der erkrankten Knochenwände eine mehr spitz zulaufende Form erhielt.

Mittleres Ohr. Die Schleimhautauskleidung des Mittelohres ist gleich beschaffen wie rechts. Etwas abweichend verhalten sich die Fenestrischen (Fig. 11 u. 12 auf Taf. VI. VII). Die Auskleidung in der Nische des ovalen Fensters ist beträchtlich verdickt, das Lumen der Nische jedoch sonst ziemlich frei. Der hintere Schenkel des Steigbügels, dessen Knochen stark verkalkt ist und keine Knochenstruktur mehr aufweist, ist in größerer Ausdehnung mit der Nischenwand durch faseriges Bindegewebe verwachsen, während der vordere Schenkel mit dem entsprechenden Teil der Basis etwas nach außen luxiert und hier gleichfalls mit der Nischenwand fest verwachsen erscheint. Der Knorpelbelag der Steigbügelbasis ist im größten Teil der Peripherie erhalten, wenn auch zum Teil verkalkt, und ebenso verhält sich auch der größte Teil des Ringbandes, während der Knorpelbelag der Nischenwand meist verloren gegangen ist, indem der erkrankte Knochen mehr oder weniger an die Steigbügelbasis heranreicht. Nur im hinteren oberen Teil ist eine vollständige knöcherne Verwachsung der Basis mit dem Knochen der Pars petrosa erfolgt. Dabei ist die Basis im mittleren und hinteren Teil sehr dünn, besteht vorwiegend nur aus der Knorpelbelagschicht, der innen die dünne verkalkte Bindegewebsschicht, und außen eine dünne Schicht verkalkten strukturlosen Gewebes anliegt.

Die Nische des runden Fensters ist im vorderen Teil durch Exostosen des erkrankten Knochens etwas verengt und das Lumen durch faseriges Bindegewebe, zwischen dem nur kleine, mit Epithel ausgekleidete Räume erhalten geblieben sind, vollständig ausgefüllt. Im vordersten inneren Teil ist dieses Gewebe etwas locker und zeigt weitere Maschenräume. Der hinterste Teil der Nische ist vollständig knöchern verschlossen. Hammer und Amboss zeigen sich fast gar nicht verändert in diesem Ohr.

Der Knochen ist auch links in der Umgebung der Mittelohrräume in gleicher Weise erkrankt wie rechts. Um die Tuba herum ist der Knochen hochgradig osteoporotisch, mit zahlreichen Markräumen und größeren Gefäßkanälen durchsetzt, die an ihrer Peripherie Räume osteoiden Gewebes zeigen. Auch ganz mit Bindegewebe ausgefüllte Räume, deren Rand oft zackig und unregelmäßig ist, finden sich hier. Unterhalb der Schnecke und des Vorhofs finden sich große pneumatische Räume, deren Schleimhautauskleidung verdickt und mit zahlreichen Spindelzellen durchsetzt ist, und in deren Umgebung gleichwie in der ganzen Peripherie der Paukenhöhle, ebenso wie in der rechten Seite der Knochen tief hinein erkrankt sich zeigt (Fig. 10—12 auf Taf. VI. VII). Im Aditus und Antrum finden sich gleichfalls einzelne umschriebene ostitische Herde an der Knochenoberfläche, ebenso aber auch tiefere in der Umgebung des oberen und hinteren Bogengangs, die anscheinend isoliert sind, in Wirklichkeit aber hängen die oberen mit den erkrankten Markräumen der oberen Fläche der Pyramide, die um den hinteren Bogengang aber mit den hier besonders stark entwickelten zelligen Räumen im unteren Teil der hinteren Fläche der Pyramide zusammen. Im inneren Gehörgang ist eine größere Lücke (Fig. 10 auf Taf. VI. VII) in der knöchernen Wand, etwas größer als rechts, mit ganz unebenem zackigen Grund, und ist darüber die periostale Auskleidung zerstört. Im Grund der Lücke liegt etwas faseriges Bindegewebe auf dem stark erkrankten Knochen, der von größeren Gefäßkanälen, die mit spindelzellenreichem faserigem Bindegewebe ausgefüllt sind, durchzogen und weiterhin von einem vollständig sklerotischem Knochen begrenzt wird. In einzelnen größeren Gefäßen, so in der Arterie der Fossa subarcuata, findet sich eine deutliche Verdickung der Intima durch Endarteriitis.

Übersicht. Das wichtigste an diesem Falle, wodurch er sich von den übrigen bisher untersuchten Fällen unterscheidet, ist die große Ausdehnung, in der der Knochen in der ganzen Um-

gebung des Mittelohrs sich krank erweist, wenn auch die Erkrankung nicht überall gleich tief, vom Mittelohr her gerechnet, in den Knochen vorgedrungen ist. Bemerkenswert ist ferner, daß nicht bloß das gleiche Aussehen des kranken Knochens, sondern auch noch ein weiterer Umstand dafür spricht, daß es sich auch in diesem Fall um eine gleichartige Erkrankung des Knochens, wie in den früher beschriebenen Fällen, handle. Es läßt sich nämlich bei genauer Durchsicht der Präparate nachweisen, daß auch hier die Erkrankung von denselben Stellen, wie in den früher beschriebenen Fällen, ihren Ausgang nahm und sich verbreitete, nur sind hier die Herde bei ihrer größeren Ausdehnung miteinander verschmolzen und waren auch die übrigen Wände der Paukenhöhle, des Antrums und der Tuba in gleicher Weise erkrankt. Die Erkrankung des Knochens zeigte auch in diesem Fall an verschiedenen Stellen ein geändertes histologisches Bild. So fanden sich auch hier, besonders am Rande, ganz sklerotische Partien neben anderen, in denen der Knochen stark erweiterte Gefäßräume zeigte, die also nach Siebenmann als spongiosiert bezeichnet werden könnten, und waren neben diesen Partien, in denen die Erkrankung schon seit Jahren zum Abschluß gekommen war, an anderen Stellen wieder deutliche Zeichen einer noch frischen, im Fortschreiten begriffenen Erkrankung nachweisbar. Die Verteilung der frisch erkrankten Partien und der schon alten abgelaufenen Veränderungen stimmte mit den Angaben, die ich in den früheren Fällen machte, im wesentlichen überein. Etwas verändert ist das Krankheitsbild an der unteren Wand der Paukenhöhle und in der Umrandung des Bulbus der Vena jugularis von der des übrigen Felsenteils, und gleicht hier mehr dem, wie wir es bei den eitrigen Mittelohrentzündungen gleichfalls sehen können. Es dürfte diese Verschiedenheit möglicherweise nur in der verschiedenen Struktur dieser Knochen begründet sein und weniger in einer anderen Krankheitsursache.

Über die Dauer des Leidens können wir nach den Angaben der Kranken, daß sie schon seit etwa 20 Jahren taub war, annehmen, daß auch die Erkrankung des Knochens, die wir wegen der Veränderungen, die sie an den Fensternischen herbeiführte, als Ursache der Taubheit ansehen müssen, zu mindestens schon ebenso lange, wenn nicht schon etwas länger gedauert haben mußte.

Von den Veränderungen wäre noch besonders die Luxation

des Steigbügels nach außen zu erwähnen, die dadurch zustande kam, daß durch die Entzündung die Verbindung der Basis des Steigbügels mit dem Knochen zerstört, bezw. in ein lockeres, junges Bindegewebe umgewandelt wurde, so daß der Steigbügel, dem Zug seines Muskels folgend, nach außen rückte, und hier wieder fest mit der Nischenwand verwuchs.

Die vollständige Taubheit der Kranken auf dem rechten Ohre, und die nahezu vollständige auf dem linken findet ihre Erklärung nicht bloß in den verhältnismäßig nur geringen pathologischen Veränderungen des Labyrinths, sondern kann, wie ich auch schon in anderen Fällen nachgewiesen habe, auf den Verschluß der Fenestrischen und Fixierung des Steigbügels zurückgeführt werden. Welche Bedeutung für das Gehör der beiderseitige Verschluß der Schneckenwasserleitung hatte, kann bei der großen Anzahl anderer wichtiger Störungen, die sich vorfanden, in diesem Falle nicht entschieden werden. Es scheint, daß die Verbindung der Perilymphe mit dem Subarachnoidealraum durch den inneren Gehörgang einen teilweisen Ersatz der Schneckenwasserleitung bieten kann. Warum im linken Ohre die tiefen Stimmgabeln c^1 , c^2 , c^3 (mit den tieferen wurde leider nicht geprüft) in Knochenleitung vom Warzenfortsatz aus noch gehört wurden, könnte meines Erachtens dadurch erklärt werden, daß links nicht nur das Ringband des Steigbügels noch in größeren Partien erhalten war, sondern auch dadurch, daß die Basis des Steigbügels auf eine größere Strecke weit nicht aus Knochen, sondern aus einer dünnen Knorpelschicht bestand, auf die nach außen sofort die Auskleidung des Mittelohrs folgte.

Ob die Kranke in früheren Jahren auch an Schwindel litt, konnte leider, da sie taub war und auch nicht lesen konnte, von ihr nicht erfahren werden, es wäre aber immerhin nicht unwahrscheinlich, daß auch bei ihr, wie in einem früheren Fall, in welchem die Knochenkrankung bis an den Durchtritt des Ramus vestibularis heranreichte und diesen umfaßte, Schwindel zeitweise vorhanden war.

Fall VII.

Marie B., 28jährige Hausbesitzerstochter, litt schon seit ihrer Kindheit an Epilepsie und heftigen Aufregungszuständen, die insbesondere zur Zeit der Menses auftraten. In ihrem Heimatschein ist sie als Idiotin bezeichnet. Sie sprach nur wenige Worte, doch soll ihr Gehör nach der Ansicht der Ärzte, die sie im Krankenhaus behandelten, gut gewesen sein. Sie entband vor 3 Wochen ein gesundes Kind und starb in einem epileptischen Anfall,

an denen sie in den letzten Wochen sehr häufig litt, und infolge deren sie auch vor dem Tode öfters tagelang bewußtlos war.

Sektion am 13. April 1899 in Prof. Eppingers pathol.-anatom. Institute:

Körper klein, rachitisch gebaut, mager. Hautdecken erdfahl, über der unteren Hälfte des Bauches gerunzelt, von streifigen Furchen durchsetzt. Mammaryen und Linea alba stark pigmentiert, Pericranium von einzelnen streng umschriebenen, frischen, fleckigen Blutaustretungen durchsetzt.

Pia an der Hirnbasis äußerst blutreich, die Gefäße zartwandig. Schädel eher klein, länglich oval, dick, am Stirnbein bis 12 mm, durchwegs auffallend kompakt. Die Dura der Glastafel fest adhärierend, etwas dicker und blutblutreich. Im oberen Sichelblutleiter flüssiges, dunkles Blut. Die Pia der Konvexität wenig verdickt, recht gespannt, im allgemeinen blutreich, wobei die Piaenen, namentlich linkerseits, auffallend und prall gefüllt erscheinen. Gehirn 1080 g schwer.

Die Substanz des Gehirns ist von harter, aber brüchiger Konsistenz und einem auffallend feuchten Glanz. Corticalis verbreitert, dunkelgrau-violett gefärbt. Ventrikel vorne ein wenig weiter, in der Mitte und rückwärts eng. In dem Basalsinus flüssiges dunkles Blut.

Unterhautzellgewebe fettreich, Muskulatur dick und sehr dunkel. In den Jugularvenen flüssiges dunkles Blut.

Beide Lungen fixiert, mäßig ausgedehnt, Reste der Thymus als zwei lappige, locker gekernt, blutreiche, bis zur Basis des Herzbeutels herabreichende Organe erhalten. Im Herzbeutel wenig klare Flüssigkeit, Herz schräg, gehörig groß, über der Spitze ein oberflächlicher Sehnenfleck. In der Herzhöhle rechts Faserstoffgerinnsel, links solches und spärliches Blutgerinnsel. Muskulatur des linken Herzens ein wenig dicker. Beiderseits ist das Herzfleisch quer gerunzelt, dunkel und licht gefleckt, am Schnitte homogen, die Klappen durchwegs zart und gehörig geformt.

Linke Lunge klein, ziemlich schwer, durchwegs lufthaltig, auffallend blutreich und nur mäßig durchfeuchtet. In der Mitte der hinteren Portion der Unterlappen härter, brüchig, am Schnitte gleichmäßig granuliert, dunkelrotbraun gefärbt, Saft entleerend. Solcher auch in den Bronchien. Schleimhaut intensiv dunkel gefärbt.

Rechte Lunge etwas kleiner, leichter, lufthaltig, mäßig durchfeuchtet, in den Bronchien zäher Schleim. Schleimhaut des Pharynx dunkel gefärbt, die des Ösophagus gallig pigmentiert. Larynx und Trachea blaß. Schilddrüse mäßig groß, Aorta zartwandig, 3,9 cm im Umfang über dem Zwerchfell messend.

Lage der Unterleibseingeweide gehörig, Peritoneum ziemlich fetthaltig, Milz etwas größer, hart, brüchig, dunkelbraun gefärbt, Pulpa reichlich.

Linke Nebenniere gehörig, linke Niere mäßig groß, Kapsel zart, leicht ablösbar, Oberfläche glatt. Gewebe härter, brüchig, graubraun. Becken- und Kelchschleimbäute blaß. Rechte Niere etwas blässer, sonst wie die linke, desgleichen die Nebenniere.

Der Magen enthält gallig gefärbte Flüssigkeit, Schleimhaut gehörig dick, zart gefaltet, gallig imbibiert. Im Darmkanal gewöhnlicher Inhalt, Wandung mäßig dick, Schleimhaut hie und da violett gefleckt. Die des Dünndarmes dünn, glatt, gleichmäßig lichtgrauviolett gefärbt. Pankreas von gehöriger Beschaffenheit.

Leber nur mäßig groß, Gewebe hart, brüchig, dunkelbraun gefärbt und zart gelblich gefleckt. In der Gallenblase schwärzliche, dunkle, flüssige Galle.

In der Harnblase trüber, lichtgelber Harn, Schleimhaut gehörig. Vagina recht lang und weit, ihre Schleimhaut derb, dunkelbläulichviolett gefärbt. — Uterus größer, puerperalmalakisch. Placentarest in Form eines 1 cm hohen Plaques anliegend der Vorderwand. Ovarien groß und follikelreich, ohne einen wahren gelben Körper. Tuben beiderseits frei.

Schleimhaut des Rektums stärker dunkel gerötet.

Diagnose: Hyperaemia cerebri et mening. Pneumonia sinistra. Uterus p. partum.

Die Untersuchung der Gehörorgane, die von mir vorgenommen wurde, ergab die Trommelfelle verdickt und von weißlicher Farbe.

In der rechten Paukenhöhle fanden sich bindegewebige Adhäsionen um den Steigbügel von der Basis bis zum Hals, und schien die Nische des runden Fensters durch Bindegewebe vollständig verlegt zu sein. Von der Mitte des Promontoriums zieht eine vorspringende Knochenleiste nach abwärts und eine von ihr abzweigend nach vorn unten.

Das linke Ohr war ähnlich beschaffen und fanden sich auch hier Bänder um den Steigbügel und die Nische des runden Fensters durch Bindegewebe verlegt.

Mikroskopischer Befund.

Rechtes Ohr. Im Grund des inneren Gehörgangs reichliche Blutaustritte zwischen den Nervenbündeln. Im Akustikus einzelne kleine Herde veränderter Nervenfasern. Sie erscheinen in diesen Herden stark und diffus gefärbt, ihre Konturen sind unendlich oder gar nicht zu erkennen, keine Corpora amylacea. Da alle Reaktionerscheinungen fehlen, dürfte es sich nur um postmortale Veränderungen handeln.

In der Schnecke haben die Weichteile in den oberen Windungen etwas durch die Fäulnis gelitten, während die unteren Windungen gut erhalten sind. Es finden sich keine pathologischen Veränderungen.

In den Bogengängen ist im oberen Teil des hinteren und im äußeren Teil des äußeren Bogengangs die knöcherne Wand unregelmäßig ausgebuchtet.

Vom Mittelohr zeigt die Tuba Eustachii im knorpeligen Teil, der unterste Abschnitt fehlte am Präparat, eine aus faserigem Bindegewebe bestehende Auskleidung, zwischen deren oberen Lagen nur spärliche Züge von länglich-ovalen und spindelförmigen Kernen sich fanden, während Drüsen vollständig fehlten. Im knöchernen Teil zeigt die Auskleidung eine analoge Beschaffenheit.

In der Paukenhöhle ist die Schleimhaut an verschiedenen Stellen sehr verschieden beschaffen. Während sie am Promontorium stellenweise so dünn ist, daß zwischen Knochen und Epithel eine submuköse und periostale Schicht gar nicht mehr zu unterscheiden ist, ist sie im oberen Teil der inneren Wand von nahezu normaler Beschaffenheit, an dem unteren Teil der inneren Wand und an der unteren Wand dagegen mäßig geschwollen, ziemlich stark entzündlich infiltriert, ihre Gefäße stark erweitert, das Epithel schön erhalten und liegt der Oberfläche an den entzündeten Stellen eine Masse auf, die näher der Oberfläche aus parallelfaserigen, etwas darüber aber aus mehr netzförmigen, mit Eiterzellen durchsetzten Fibrinfäden besteht.

Am Trommelfell und den Gehörknöchelchen ist der Schleimhautüberzug mäßig verdickt und sklerotisch, besonders gegen den Rand zu. Von den beiden großen Gehörknöchelchen ist der Hammer stark sklerotisch, ebenso auch der vordere Teil und der lange Schenkel des Amboß, und zeigen die Gefäßkanäle neben stark erweiterten und gefüllten Gefäßen eine unregelmäßig bucklige Oberfläche.

In den Fensternischen findet sich die gleiche fibrinöse Entzündung der Schleimhaut, und liegt ein reichliches, fibrinöses eitriges Exsudat der Schleimhaut besonders in der Nische des runden Fensters und den unterhalb angrenzenden buchtigen und zelligen Räumen des Knochens auf. Die Nische des runden Fensters wird überdies noch durch eine breite, bindegewebige Membran von der Paukenhöhle in ihrem äußeren Teil abgeschlossen. In der Nische des ovalen Fensters sind gleichfalls bindegewebige, festere Adhäsionen zwischen den Steigbügelschenkeln und der unteren Nischenwand, dem Promontorium und dem über der Nische verlaufenden Facialkanal ausgespannt. Der Steigbügel selbst zeigt an seiner Basis vorne außen eine mäßige Hyperostose.

Im Aditus und im Warzenfortsatz ist die Schleimhautauskleidung nicht merklich verändert, jedoch sind einzelne der angrenzenden zelligen Räume

des Knochens mit Bindegewebe ausgefüllt und an ihrem inneren Rande von schmalen Osteblastenlagen und rotgefärbten osteoiden Knochensäumen begrenzt.

Der Knochen der Pars petrosa zeigt eine mäßige Hyperostose entsprechend der inneren Wand der Paukenhöhle, die sich bis zu den Fenstern nach hinten zieht und durch die stärkere Färbung mit Hämatoxylin deutlich abhebt. Frischere entzündliche Veränderungen finden sich in den an die Paukenhöhle grenzenden pneumatischen Zellen sowohl ober- als auch unterhalb der eigentlichen Labyrinthkapsel. Ihre Schleimhautauskleidung ist ganz gleich verändert, wie in dem angrenzenden Teil der Paukenhöhle, und findet sich in den unteren Zellen auch der gleiche fibrinös-eitrige Be-

Fig. 7. Schnitt durch die Fenster. Fall VII. Rechtes Ohr. Otitischer Herd in der runden Fensternische. Vergr. 15.

lag. Einzelne kleinere, zellige Räume zeigen überhaupt kein Lumen, sondern sind ganz mit jungem Bindegewebe mit erweiterten Gefäßen ausgefüllt, während sich an ihrer knöchernen Wand Osteblasten finden. Unter der erkrankten Schleimhaut sind die Gefäßkanäle im Knochen erweitert, ebenso auch die sie durchziehenden Gefäße, neben denen sich zahlreiche Bildungszellen vorfinden. Die Begrenzung bilden gleichfalls Osteblasten und mit Eosin stark färbbare neugebildete Knochensäume.

Ein größerer Erkrankungsherd im Knochen findet sich nur in der äußeren Wand der Nische des runden Fensters (Fig. 7). Hier ist der Knochen, im Anschluß an die fibrinöse Entzündung in der Schleimhaut, jedoch durch die verdickte Periostschicht davon getrennt, längs der ganzen Wand erkrankt und erstreckt sich die Erkrankung noch über

den Bereich des runden Fenster hinaus inmitten des Knochens weiter nach hinten gegen den Warzenfortsatz. Der erkrankte Knochen ist sowohl durch seine Struktur wie auch seine verschiedenen Reaktionen gegen die gebrauchten Farben scharf vom gesunden abgegrenzt. Er zeigt jedoch nicht überall das gleiche Verhalten. Im vordersten Teil finden sich nur mäßig erweiterte Gefäßkanäle mit wenig zelligem Inhalt, umgeben von einem durch Hämatoxylin-Eosin überaus stark und dunkelblau gefärbten, also stark kalkhaltigem Knochen, während im hinteren größeren Teil der Erkrankungsherd eine mehr rötlichblaue Färbung zeigt. Der Knochen ist hier allenthalben von stark erweiterten Gefäßkanälen durchzogen, in denen erweiterte Gefäße und zahlreichere größere Zellen gelagert sind. Die Zellen des Knochens zeigen hier eine mehr rundliche Form, un-

Fig. 8. Schnitt durch den vordersten Teil des ovalen Fensters des linken Ohrs. Die häutigen Teile des Vorhofs sind in dem Schnitt beim Schneiden teilweise verloren gegangen. Vergr. 15.

deutlichen Kern und eine hellere Zone in ihrer Umgebung. Es handelt sich also um ein osteoides Gewebe, das schon zu verkalken beginnt.

Die zahlreichen, schönes Fettmark enthaltenden Räume im spongiösen Knochen oberhalb der Schnecke und des Vorhofs sind ebenso wie die weiter nach innen gelegenen Zellen unterhalb vollständig frei von jeder pathologischen Veränderung.

An der hinteren Wand der Paukenhöhle, noch mehr aber an der äußeren und oberen Wand des Kuppelraumes sind starke Veränderungen im Knochen nachzuweisen. Besonders im vorderen Teil des Kuppelraums sind die an die Paukenhöhle grenzenden zelligen Räume ganz mit dichtem, faserigem Bindegewebe ausgefüllt und nur durch schmale Knochenspannen voneinander ge-

trennt. Auch letztere bestehen größtenteils nur aus osteoidem Gewebe, das an der Peripherie mit Lagen von Osteoblasten belegt ist. In den oberen, an die Dura grenzenden Schichten zeigt sich der Knochen nur wenig mehr verändert, und sind nur in einzelnen zelligen Räumen erweiterte Gefäße, osteoide Säume und reichlicherer zelliger Inhalt nachzuweisen. Geringe Veränderungen des Knochens finden sich auch in der Glaserschen Spalte, sowie in dem Knochen der Tuba Eustachii, ebenso auch endlich im Warzenfortsatz. Während hier im Bereich der Bogengänge der Knochen eine sklerotische Struktur zeigt und das Lumen der Bogengänge durch Buchten und kleine Knochenvorsprünge an der inneren Fläche sehr unregelmäßig begrenzt ist, also Veränderungen aufweist, die schon älterer Natur sind, finden sich im hinteren Teil des Warzenfortsatzes in der knöchernen Begrenzung der zelligen Räume

Fig. 9. Schnitt durch das vordere Drittel des ovalen Fensters. Linkes Ohr.
Vergr. 15.

außer einer stärkeren Hyperämie mit Erweiterung der Gefäßkanäle auch osteoide Säume mit Osteoblasten an den knöchernen Wänden.

Linkes Ohr.

Im inneren Gehörgang sind die zerfallenen Nervenbündel weniger zahlreich und auch kleiner als rechts, die Hämorrhagien aber in gleicher Weise vorhanden. Die Teile der Schnecke sind gut erhalten und zeigen keine Abweichung, die des Vorhofs und der Bogengänge sind gleich beschaffen wie rechts.

Mittelohr. In der Tuba Eustachii ist die Auskleidung im knorpeligen Teil gleich wie rechts, im knöchernen Teil ist sie zellenreicher und sind die Gefäße stark mit Blut gefüllt. Von der Auskleidung ziehen breite

Bindegewebszüge in die angrenzenden Knochenräume, die auch zum Teil mit Bindegewebe ausgefüllt und von pathologisch verändertem Knochen umgeben sind. Die Innenschicht des Trommelfells ist verdickt und besteht aus sklerotischem Bindegewebe, die Schleimhautbekleidung der beiden großen Gehörknöchelchen ist stellenweise mäßig entzündlich infiltriert und angrenzend an diese erkrankten Schleimhautpartien finden sich im Hammer größere Räume, die erfüllt sind mit proliferiertem Bindegewebe und erweiterten Gefäßen, und begrenzt sind von neugebildeten osteoiden Säumen und Osteoblastenlagen. Der kurze Fortsatz zeigt teilweise Verkalkung seines Knorpelbelags. Der Amboss ist mit Ausnahme einer stärkeren Füllung seiner Knochengefäße nicht pathologisch verändert. In der Paukenhöhle findet

Fig. 10. Schnitt durch das ovale Fenster in der hinteren Hälfte. Linkes Ohr. Vergr. 15.

sich ebenso wie im rechten Ohre stellenweise fibrinöse Entzündung der Schleimhaut, und ist diese besonders in der Gegend der Fensterhöhlen und am Boden der Paukenhöhle deutlich nachweisbar. Die Schwellung und Infiltration der Schleimhaut erreicht dabei keinen besonders hohen Grad, doch finden sich unter dem fibrinösen Exsudat, besonders in den Fensterhöhlen, bandförmige Adhäsionen, die reichlich Spindelzellen enthalten, ebenso wie auch die tieferen Schichten der entzündeten Schleimhaut. Die gleiche fibrinöse Entzündung findet sich auch in den an die Paukenhöhle grenzenden zelligen, mit Schleimhaut ausgekleideten Räumen unterhalb der Schnecke und des Vorhofes, während einige kleinere dieser Zellen ganz mit spindelzellenreichem Bindegewebe ausgefüllt sind. Auch bloß mit Schleim gefüllte Zellen finden sich. Der Sinus tympani ist ganz mit Bindegewebe ausgefüllt und zeigen seine Wände eine frische Hyperostose des Knochens, die vorn

nur an einem Teil, hinten aber in der ganzen Peripherie des Sinus sich findet, auch frische Säume osteoider Substanz und Osteoblastenlagen sind vorhanden.

Die Schleimhaut im Aditus und im Antrum ist etwas verdickt und sind auch einzelne Zellen des Warzenfortsatzes teilweise mit Bindegewebe ausgefüllt.

Der Knochen zeigt im linken Ohre im allgemeinen die gleichen pathologischen Veränderungen wie rechts, doch besteht ein wesentlicher Unterschied beider Ohren darin, daß sich links an der äußeren Wand der runden Fensternische keine Veränderung vorfand, dafür aber ein größerer otitischer Herd in der vorderen Begrenzung der ovalen Fensternische. Es erstreckt sich dieser zwischen Periost der Paukenhöhle und Endost des runden Säckchens, also den ganzen Knochen von innen nach außen durchsetzend, nach vorne, wo er bald und zwar entsprechend der Ebene des Durchtritts des Facialiskanals durch den Knochen sein Ende erreicht. Nach hinten geht er nur an der oberen Peripherie der runden Fensternische im Knochen bis zur Nervenausbreitung des Utriculus, wird hier immer schmaler und kleiner, tritt mehr an die Oberfläche der hinteren oberen Peripherie der runden Fensternische, wo er eine kleine Exostose bildet und noch vor dem hinteren Ende der ovalen Fensternische endet (Fig. 8—10). Histologisch besteht dieser Erkrankungsherd im Knochen fast durchwegs aus osteoidem Gewebe, in dem zentral stellenweise sich noch Reste alten Knochens vorfinden, und das von weiteren und engeren Kanälen durchzogen wird. Letztere enthalten weite Gefäße, ein zartes fibrilläres Netzwerk und größere Zellen nach Art der Bildungszellen, stellenweise auch lange spindelförmige Zellen und einzelne Rundzellen. Am Rande enthalten diese Kanäle leichte osteoide Knochensäume und meist Lagen von Osteoblasten, doch finden sich an einzelnen Stellen auch größere mehrkernige Osteoklasten, besonders an der Grenze des gesunden Knochens.

Überblicken wir die pathologischen Veränderungen der beiden Schläfenbeine dieses Falles, so finden wir neben einer frischen fibrinösen Mittelohrentzündung leichteren Grades auch Zeichen einer vorausgegangenen Entzündung, so die Verdickung der Schleimhaut durch faseriges Bindegewebe, in der Paukenhöhle sowohl, wie in den angrenzenden zelligen Räumen des Knochens, von denen mehrere ganz mit fibrösem Bindegewebe ausgefüllt waren. Auch der Knochen war in verschiedener Weise verändert.

Im Sektionsbefund wird eine ausgebreitete Hyperostose der Schädelknochen, die am Stirnbein eine Dicke von 12 mm erreicht hatte, erwähnt, und ebenso zeigte auch der Knochen der Pars petrosa, und zwar besonders in der Umgebung der Bogengänge, einen mehr sklerotischen Charakter. Daneben fanden sich aber auch frischere entzündliche Veränderungen, teils in einzelnen otitischen Herden in den Fensternischen, teils in einer mehr oberflächlichen Erkrankung in dem äußeren Teil des Kuppelraums. Außerdem fand sich eine periostale Hyperostose an der inneren Wand und eine Sklerose des Knochens unterhalb des runden Fensters im linken Ohre. Während die erstgenannten Veränderungen des Knochens, ebenso wie die Hyperostose des

Schädels älterer Natur waren, sind die letzteren, die vorwiegend die Paukenhöhle und den Knochen betrafen, jedenfalls erst Wochen oder Monate alt, und auf einen frischeren entzündlichen Vorgang zurückzuführen, der wohl während der Schwangerschaft aufgetreten sein dürfte. Ich muß es jedoch unentschieden lassen, ob alle diese Veränderungen auch der gleichen Ursache ihre Entstehung zu verdanken haben.

Übersicht.

In den mitgeteilten Untersuchungen handelte es sich um 12 Schläfenbeine von 7 Kranken, in denen in allen dieselbe Knochenerkrankung nachzuweisen war. Bei 5 Kranken fand ich die Erkrankung in gleicher Weise auf beiden Seiten, bei zweien habe ich nur 1 Schläfenbein zur Untersuchung bekommen, und kann daher über das andere Ohr keine Angaben machen. 3 von den Untersuchten gehörten dem männlichen, 4 dem weiblichen Geschlecht an. Ihr Alter war beim Tode 27, 28, 34, 58, 61, 63 und 76 Jahre. Die Zeit der Erkrankung fiel aber besonders bei den älteren schon viel früher, und soweit dies aus den Krankengeschichten, deren Angaben gerade in dieser Beziehung nicht immer vollständig verläßlich sind, hervorgeht, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit behaupten, daß die Erkrankung bei allen zwischen dem 20. und 40., höchstens aber 50. Lebensjahr auftrat. Es stimmen diese Angaben vollständig mit denen von E. Hartmann¹⁾, nach denen bei 22 aus der Literatur gesammelten Fällen die Entstehung der Krankheit ins 20.—50. Lebensjahr fiel. Unter diesen begann sie bei den meisten, bei 8 zwischen 30 und 40, und bei 5 zwischen 20 und 30 Jahren, und rechne ich dazu die von mir untersuchten 7 Fälle, so kann ich sagen, unter 29 Kranken begann die Krankheit bei 9 zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, während bei meinen übrigen 3 Kranken das Leiden vor oder nach dem 40. Lebensjahr seinen Anfang nahm. Da die genauere Feststellung des Beginns gerade bei diesen älteren nicht möglich ist, und man erfahrungsgemäß immer richtiger auf eine längere als kürzere Dauer der Erkrankung schließen kann, so wird man nicht fehl gehen mit der Behauptung, daß bei den meisten die Zeit der Erkrankung in das 20. bis 40. Lebensjahr fällt. Von späteren Fällen war einer von Siebenmann²⁾

1) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXXIII. S. 103.

2) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXXVI. S. 291.

64 Jahre alt und viele Jahre vorher erkrankt, und von zwei neuen Fällen von Scheibe¹⁾ war der eine 27 Jahre alt und der andere betraf ein taubstumm, 8½ Jahre altes Kind, und würde also nur letzterer Fall, auf den ich noch zu sprechen komme, eine Abweichung von der obigen Regel bilden.

Charakteristisch für die Erkrankung ist ihr Auftreten in eigentümlichen, scharf umschriebenen Herden, die einzeln, meist aber in der Zahl von zweien oder dreien, selten mehr in kleinerer oder größerer Ausdehnung, das Schläfenbein durchsetzen. Ihr Entstehen läßt sich besonders an ganz frischen Fällen, in denen sie auch in geringerer Zahl vorkommen, verfolgen; so fand sich unter meinen Fällen in Fall IV und V, sowie im rechten und linken Ohr von Fall VII und im linken Ohr von Fall I nur je ein Erkrankungsherd im Knochen, der viermal an der vorderen Peripherie der ovalen Fensternische und einmal in der äußeren Peripherie der runden Fensternische seinen Sitz hatte. Je zwei solcher Herde fanden sich im rechten Ohr von Fall I, je drei in den beiden Ohren von Fall II und III, indem hier zu den Herden in den Fensternischen noch ein dritter an der vorderen Peripherie des inneren Gehörgangs und der Schnecke dazukam, während in Fall VI, bei dem die Erkrankung im Ohr die größte Ausdehnung erreichte, bis zu fünf und sechs otitische Erkrankungsherde nachzuweisen waren. In diesem Fall flossen auch die Herde mehrfach zusammen, doch ließ auch hier die genaue Untersuchung, insbesondere die Verfolgung des Verlaufs der Erkrankung im Knochen im Zusammenhang mit den andern beobachteten Fällen dieselbe herdförmige Ausbreitung nachweisen. Ein gleich hochgradiger Fall wurde auch von Siebenmann²⁾ mitgeteilt, in dem er in beiden Schläfebeinen je sechs Herde, die fast sämtlich voneinander isoliert waren, nachweisen konnte.

Die Erkrankung im Knochen trat in allen Fällen, und damit stimmen auch die in der Literatur vorhandenen, immer an denselben Stellen auf, und verbreitete sich erst von da aus in bestimmten Richtungen weiter im Schläfebein. Wie ich schon auf dem Otologentag in Breslau³⁾ erwähnte, scheint es mir, daß die Erkrankung im Knochen zunächst dort beginnt, wo größere oder kleinere Gefäße vom Periost her in den Knochen eintreten, und

1) Verhandl. d. deutschen otolog. Gesellsch. 1901. S. 175.

2) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXXIV. S. 356.

3) Verhandl. d. deutschen otolog. Gesellsch. 1901. S. 182.

daß sie sich auch weiter längs dieser Gefäße im Knochen verbreitet. Zu dieser Anschauung kam ich nicht bloß durch die Betrachtung von Krankheitsfällen, in denen die Erkrankung nur einen sehr umschriebenen Sitz hatte, sondern ich überzeugte mich auch an Injektionspräparaten des Schläfebeins.

Die Erkrankung erreichte an der Oberfläche des Knochens meist nur eine sehr geringe Ausdehnung, indem das Periost eine umschriebene Verdickung zeigte und die Gefäßkanäle, die in den Knochen führten, erweitert waren. Nur ausnahmsweise, so stets bei den Krankheitsherden im inneren Gehörgang und deutlich im Fall II und III auch in der ovalen Fensternische, war der Knochen von der Oberfläche her usuriert, uneben, mit zackigen Vorsprüngen und im inneren Gehörgang mit spärlichem fibrösen Gewebe bedeckt, während die usurierten Stellen in der Paukenhöhle mit einem dicken, fibrösen Bindegewebe ausgefüllt waren. Im Gegensatz zu den geringen Veränderungen an der Oberfläche stand gewöhnlich die große Ausdehnung der Erkrankung in der Tiefe des Knochens und umfaßte diese in mehreren Fällen die ganze Knochenpartie zwischen der endostalen Auskleidung des Vorhofs und der Schnecke einerseits, und dem Periost der Paukenhöhle andererseits. Bei geringerer Ausdehnung des Prozesses beobachtete ich auch einige Male ein zungenförmiges Vordringen inmitten der äußeren Schneckenwand nach vorne. Dabei fanden sich die ältesten Veränderungen im Knochen meist am Ausgangspunkte des Herdes, also an der vorderen Peripherie der ovalen und an der äußeren der runden Fensternische, während die frischesten Veränderungen des Knochens meist an der inneren Peripherie des Herdes, also nahe dem Endost des Labyrinths oder an seiner vorderen oder hinteren Peripherie sich zeigten. So wäre insbesondere bei dem Herd in der ovalen Fensternische zu erwähnen, daß dieser meist vorwiegend in der Richtung nach vorn sich ausbreitete und erst später auch nach hinten die ovale Fensternische umfaßte. Dabei reichte er gewöhnlich an ihrer oberen Peripherie weiter nach hinten als an der unteren. Auch nahmen hier das Ringband und die Basis des Steigbügels ebenso wie am runden Fenster die Membran erst dadurch sekundär am Krankheitsprozesse teil, daß die Erkrankung von der Labyrinthkapsel her auf sie übergriff.

Im Fall II fand sich insofern eine Ausnahme, als sich sowohl in der runden als auch in der ovalen Fensternische ganz frische Veränderungen des Knochens unmittelbar unter dem Periost vor-

fanden, und läßt sich diese Ausnahme wohl nur dadurch erklären, daß es sich hier um eine neuerliche Erkrankung in derselben Knochenpartie, um ein Rezidiv handelte, wenn wir nicht annehmen wollen, daß die Erkrankung in diesem Fall weiter vorne am Promontorium begann, was erst weitere Untersuchungen bestätigen müßten.

Die Anordnung sowohl wie auch die Ausdehnung der einzelnen ostitischen Herde ließ auf beiden Seiten eine gewisse Übereinstimmung erkennen, was sich wohl gleichfalls nur dadurch erklären läßt, daß die Krankheit auf dem Weg der Gefäße in den Knochen eindrang und sich in ihr verbreitete. Die Krankheit betraf meist nur die Kapsel des Labyrinths, fast nie das eigentliche häutige Labyrinth; von letzterem war meist nur das Endost etwas verdickt oder auch verkalkt, wenn die Erkrankung bis an dasselbe heranreichte. Nur bei hochgradiger Erkrankung waren einmal auch das Ligamentum spirale an seiner äußeren oberen Peripherie stark verdickt, und einige Male auch die knöcherne Umrandung des Spiralganglions sowie die Lamina spiralis der basalen Windung stark verkalkt, und nur im Fall VI auch die Zwischenwände der Schneckenwindung mit an der Ostitis beteiligt. Wiederholt konnte ich auch beobachten, daß der erkrankte Knochen in Form von Exostosen in die Räume des Labyrinths hineinragte; so waren im Fall II beiderseits Exostosen an der vorderen oberen Peripherie des Steigbügels, im Fall III eine Exostose am ovalen, und links eine große Exostose am runden Fenster, hineinragend in die Paukentreppe. Im Fall VI endlich fand sich eine Verengerung der Schneckenräume in der Spitze und in der Basis, sowie auch des Innenraumes einzelner Bogengänge durch den hyperostotischen kranken Knochen. Da der Knochen der ganzen inneren Wand in diesem Fall eine Massenzunahme zeigte, war auch das Lumen der Paukenhöhle dadurch enger geworden. Ganz ausnahmsweise kam im Fall II im Endteil der Paukentreppe neugebildeter vom Endost ausgehender Knochen vor, der durch den ostitischen Prozeß in der Schneckenkapsel zum Teil wieder rarefiziert wurde. War dieser Befund der Knochen auf der Basis desselben Prozesses entstanden, wie die Ostitis in der Schneckenkapsel, so mußte dies schon im Anfang der Erkrankung, die zu der Zeit vielleicht heftiger war, geschehen sein.

Die histologischen Veränderungen, die der erkrankte Knochen zeigte, waren an verschiedenen Stellen sehr verschieden und häufig alle Stadien der Ostitis nebeneinander zu finden. Im

wesentlichen müssen wir alte abgelaufene Veränderungen und frische unterscheiden. Letztere fanden sich allein im Fall IV und VII, sonst waren in allen Fällen auch alte Veränderungen da. Die frischen Veränderungen zeigen, wie auch Katz¹⁾ schon erwähnte, große Ähnlichkeit mit dem Bilde der Ostitis vasculosa Volkmanns. Es wird der harte Knochen der Felsenbeinpyramide von neugebildeten Gefäßkanälen durchzogen, die dadurch entstehen, daß der alte Knochen durch die neuen, in denselben eindringenden Gefäße zum Einschmelzen gebracht wird. Wie dies geschah, ließ sich leider an den verhältnismäßig dicken Knochenschnitten nicht immer mit voller Sicherheit feststellen. In den kleinen Räumen, die durch den Krankheitsprozeß im Knochen gebildet wurden, fanden sich gewöhnlich nur ein erweitertes Kapillargefäß mit großen Endothelien, um dasselbe einzelne Fibrillen und größere Bildungszellen und sporadisch auch einzelne Leukozyten und manchmal auch Lymphozyten. Am Rand dieser Räume hat der Knochen ein verschiedenes Aussehen, nur selten fanden sich, wie auch Siebenmann²⁾ dies erwähnt, große mehrkernige Osteoklasten und Lakunenbildung. Sie kamen nur vereinzelt, in einzelnen Fällen in größerer, in anderen in geringerer Anzahl vor, so daß für die Auflösung des gesunden Knochens hier noch andere Faktoren in Betracht kommen dürften. Die Auflösung des Knochens durch hineinwachsende Kapillaren wurde in neuerer Zeit durch J. Schaffer³⁾ in ein helleres Licht gesetzt und die Möglichkeit, daß aus den Zellen der Kapillarwand direkt sich Osteoklasten bilden können, nachgewiesen; wahrscheinlich, daß ein ähnlicher Vorgang bei der Knochenresorption in den beschriebenen Fällen mitwirkte. Mehrmals sah ich auch, wie schon oben erwähnt, einzelne Zellen des sonst noch gesunden Knochens am Rande des Erkrankungsherdess sich vergrößern und um sich einen lichtereren Hof bilden, und auch zwischen diesen Zellen ein kleines Kanälchen auftreten als erstes Zeichen der Erkrankung. Es ist dieser Vorgang der Vaskularisation des Knochens von Rindfleisch als Kanalikulation beschrieben und, wie ich hier gleich erwähnen will, von Soloweitschik⁴⁾ auch bei syphilitischer Ostitis der Schädelknochen beobachtet worden. Es scheint nach diesem, daß die Knochenkörperchen nicht die ganz passive Rolle

1) Dieses Archiv. Bd. LIII. S. 68.

2) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXXIV.

3) Kölliker, Gewebelehre. Bd. III. S. 673.

4) Virchows Archiv. Bd. XLVIII.

spielen, die ihnen häufig zugeschrieben wird, sondern, wie meine Präparate zeigen, auch aktiv an dem Prozesse teilnehmen. Eine neuere Arbeit von Kurpjuweit¹⁾ läßt dies gleichfalls wahrscheinlich erscheinen.

Mit der Bildung der den Knochen durchziehenden Kanäle ist der Auflösungsprozeß meist zu Ende, und kommt es dann zu Neubildung von Knochen und Rückbildung der Gefäßkanäle. Die Größe dieser Kanäle, unter Umständen sind es auch größere Räume, hängt sehr von der Intensität der zugrunde liegenden Krankheitsursache ab, wodurch die Einschmelzung des Knochens manchmal eine sehr beschränkte, manchmal auch eine ausgedehntere wird. Die Knochenneubildung erfolgt durch Osteoblasten, die oft in Reihen den einzelnen Knochenrändern anliegen, oft aber auch unregelmäßig und langsamer, so daß dadurch auch die Lage der Knochenzellen im neugebildeten Knochen eine ganz unregelmäßige wird. Ich habe schon oben die Vermutung ausgesprochen, daß ausnahmsweise auch die alten Knochenzellen dabei eine Rolle spielen dürften, indem nach Größerwerden derselben und teilweiser Auflösung des Knochens in ihrer Umgebung sofort wieder eine Anbildung und Ablagerung von Kalksalzen erfolgt. Durch die Knochenneubildung werden entweder die entstandenen Kanäle und Räume ganz zum Schwinden kommen und so ein vollständig sklerotischer Knochen gebildet werden, oder aber, wie dies meistens der Fall ist, es bleiben die Räume im Knochen bestehen und wird ihr Inhalt in ein spärliches Fettmark umgewandelt, oder aber er verschwindet ganz bis auf ein spärliches Bindegewebe am Rand, so daß die Räume fast leer sind. Der Knochen in ihrer Umgebung, der anfangs noch mehr osteoide Beschaffenheit hatte, sich mit Eosin stärker färbte, wird immer kalkreicher, unterscheidet sich aber immer noch deutlich vom normalen Knochen. Seine Zellen sind meist größer, unregelmäßig gelagert, und ist auch meist keine deutliche lamelläre Struktur nachweisbar.

Ursache. Das wichtigste bei dieser Erkrankung des Knochens ist die Ursache, der ihr Entstehen zuzuschreiben ist, und darüber sind heute die Meinungen der Autoren noch sehr geteilt und werden meist nur Vermutungen vorgebracht, die teils auf klinische, teils auch auf pathologisch-anatomische Befunde gestützt sind. Katz²⁾ hat bei der Mitteilung seiner ersten Beobachtung an eine rheumatische Erkrankung an der Steigbügel-

1) Virchows Archiv. Bd. 163. S. 287.

2) Deutsche med. Wochenschr. 1890. Nr. 40.

Vorhofsverbindung gedacht, während ich ¹⁾ bei meiner ersten Beobachtung, weil sich auch eine Narbe im Trommelfell fand, einen Folgezustand einer Mittelohrentzündung vermutete, die, wenn sie im Verlauf einer schweren akuten Infektionskrankheit, Typhus usw., aufträte, einen schwereren Verlauf nehmen und leicht auch auf den Knochen übergreifen könne. Nach Untersuchung von 4 weiteren Schläfebeinen zweier Fälle habe ich ²⁾ dann in der pathologischen Anatomie in Schwartzes Handbuch zuerst diese Erkrankung des Knochens als Ursache der knöchernen Ankylose des Steigbügels beschrieben und betont, daß auch die von Toynbee, Voltolini, Schwartze, Moos und Tröltzsch beschriebenen knöchernen Steigbügelankylosen dieselbe Knochenerkrankung zur Ursache gehabt haben dürften. Dort habe ich auch schon angegeben, daß ich dieselben Veränderungen im Knochen auch nach eitriger Mittelohrentzündung beobachtet habe. Politzer ³⁾, der daraufhin seine Präparate von Steigbügelankylose histologisch untersuchte und auch dieselbe Knochenerkrankung fand, konnte trotz der größeren Anzahl der von ihm untersuchten Fälle eine bestimmte Ursache auch nicht nachweisen und spricht von hereditärer Anlage, Puerperium, Syphilis und Gicht und in der neuesten Auflage seines Lehrbuches auch von Ozaena als Ursache. Er akzeptiert auch die Ansicht von Walb, daß die Entwicklung dieser Krankheit auch durch Anämie, Gemütsaffekte und Nervosität begünstigt werde. Bei Kindern bis zum 15. Jahr soll sie auf Heredität, Rachitis und Skrophulose zurückzuführen sein.

Gradenigo ⁴⁾ hält diese Erkrankung für eine Äußerung der Syphilis heredit. tarda und rechnet sie im Sinne Fourniers zu den parasymphilitischen Affektionen. Einen eigenen Standpunkt vertritt Siebenmann ⁵⁾. Nach ihm geht der Prozeß, den er als Spongiosierung der Labyrinthkapsel bezeichnet, von der Grenze zwischen der endochondral gebildeten primären Labyrinthkapsel und dem sekundär vom Periost aus angelagerten Bindegewebsknochen aus und möchte er diese Spongiosierung nicht ohne weiteres mit dem Namen einer Ostitis belegen, sondern sie eher als die letzte Phase eines Wachstums betrachten, welche

1) Zeitschr. f. Heilk. 1891. Bd. XII. S. 381.

2) Schwartzes Handbuch. 1892. Bd. I. S. 248 u. 258.

3) Politzer, Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXV. S. 309. Lehrbuch, IV. Aufl. S. 263 und Beleuchtungsbilder des Trommelfells. 1896. S. 79.

4) Archiv. ital. di otologia. Bd. II. S. 478.

5) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXXIV. S. 356. XIII. internat. Kongreß in Paris. 1900.

normalerweise im Felsenbein nicht vorkommt, dagegen in anderen Knochen, wenn auch in etwas anderer Form und zu anderer Zeit, die Regel bildet. Ich kann diese Anschauung Siebenmanns, die in genauerer Begründung in seinen Ausführungen nachgelesen werden muß, nicht für richtig halten und glaube, daß Siebenmann nur dadurch zu dieser Ansicht kam, daß er erst nur Fälle zur Untersuchung bekam, in denen die Krankheit eine sehr große Ausdehnung erreicht hatte. Bezold¹⁾ und Scheibe²⁾, die schon 1893 und später noch über derartige Fälle Mitteilung machten, sprechen nur davon, daß die Krankheit vom Periost der Paukenhöhle ausgehe. Schwabach³⁾ hat in seiner Arbeit über Erkrankung des Gehörorgans bei Leukämie einen Fall (XIII) beschrieben, bei dem neben durch Leukämie hervorgerufenen Veränderungen ein otitischer Herd in der Schneckenkapsel sich fand, bezüglich dessen er es unentschieden ließ, ob er auf die Syphilis, an der die Kranke gelitten hatte, zurückzuführen sei oder nicht. Endlich hat neuerdings Katz⁴⁾ einen Fall veröffentlicht und dabei sich auch über die Ätiologie dieser Krankheit des weiteren geäußert. Er schreibt dem dabei öfter vorkommenden Mittelohrprozeß nur ein begünstigendes Moment zu und sieht ihn nur als Gelegenheitsursache an, wie ich⁵⁾ dies auch in meinem ersten Fall getan, und wie ich auch jetzt dieser Ansicht von Katz beipflichten muß. Das Hauptgewicht für die Entstehung der Knochenerkrankung legte er auf konstitutionelle resp. auf dyskrasische Leiden des Körpers, zu welchen er hauptsächlich rechnet: 1. die rheumatisch-gichtische Anlage, 2. die skrophulöse, 3. die syphilitische, 4. ungenannte Altersveränderungen und 5. die neuroparalytische und trophoneuritische Anlage. Die letztere hält er neben der rheumatisch-gichtischen für die wichtigste.

Durch die Untersuchung weiterer Fälle von Sklerose, insbesondere auch durch den Vergleich der Befunde bei Sklerose mit denen bei akuter und chronischer eitriger Mittelohrentzündung bin ich immer mehr zu der Überzeugung gekommen, daß es sich bei der beschriebenen Knochenerkrankung um eine ganz spezifische Erkrankungsform handeln müsse, als deren Ursache ich die Syphilis ansehen möchte. Zur Begründung dieser An-

1) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXIV und XXVI.

2) Verhandl. d. otolog. Gesellsch. 1901. S. 175.

3) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXXI. S. 122 u. 145.

4) Dieses Archiv. Bd. LIII. S. 75.

5) Zeitschr. f. Heilk. Bd. XII. 1891. S. 381.

sicht will ich folgende Momente besonders hervorheben: 1. Bei zweien der bisher histologisch untersuchten Fälle, und zwar dem Fall von Schwabach¹⁾ und meinem Fall Nr. IV²⁾ ist Syphilis bestimmt nachgewiesen worden, ebenso auch in zwei bloß makroskopisch untersuchten, gleichartigen Fällen, einen von Voltolini³⁾ und einen von Downie⁴⁾, während in einem Fall von Schwartz⁵⁾ Syphilis sehr wahrscheinlich die Ursache der Erkrankung war. Es ist also unter den ca. 30 Fällen von Sklerose 4 mal sicher, 1 mal nahezu sicher Lues als Ursache nachgewiesen worden. Auch bei den übrigen Fällen ist Lues, wenn auch nicht nachgewiesen, so doch auch nicht mit Sicherheit auszuschließen. So begann in meinen Fällen bei Fall II das Leiden während der Dienstzeit beim Militär, und sind gerade da die Infektionen mit Lues nichts Seltenes, bei Fall VII handelte es sich, wie ich nachträglich erheben konnte, um eine Bedienstete in einem kleinen Gasthause in einer etwas verrufenen Gasse, bei Fall III um eine ledige Bedienerin, die aber eine Tochter hatte, und nur bei Fall IV um eine Frau, die schon mehrere Kinder hatte. Leider konnte ich in diesem Fall, da ihr Mann jede Auskunft über das Ohrenleiden seiner Frau verweigerte, und auch in Fall I und V keine weiteren Erhebungen machen.

Ein 2. Moment, das für Syphilis spricht, ist der häufige Beginn der Krankheit zwischen dem 20. und 40.—50. Lebensjahre, also in einer Altersperiode, in der auch die Syphilis am häufigsten erworben wird, während andere Erkrankungen gerade in dieser Periode seltener auftreten. Die Fälle von Bezold, in dem die Erkrankung schon im 17. Jahre, und Scheibe, in dem sie bei einem 8 $\frac{1}{2}$ jährigen Kinde schon begann, sprechen auch nicht gegen Lues, die eben bei Bezolds Falle etwas früher erworben und im Fall Scheibes hereditär sein konnte.

3. Spricht für Syphilis auch der histologische Befund im erkrankten Knochen. Ich fand in meinen Präparaten eine chronisch verlaufende Otitis, die meist vom Periost aus auf dem Wege der Gefäße auf den Knochen übergreift und sich unter der Oberfläche weiter ausbreitet, die einen vollständig chronischen Verlauf zeigt und 30 und mehr Jahre dauern kann, dabei wahrschein-

1) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXXI. S. 122.

2) Verhandl. der otolog. Gesellsch. 1898.

3) Virchows Archiv. Bd. XXVII. S. 163.

4) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXX.

5) Dieses Archiv. Bd. IV. S. 254.

lich auch öfters Nachschübe frischer Entzündung zeigt, bei der Eiterung und Nekrose fehlen oder doch nur ausnahmsweise vorkommen, und auch keine Bakterien sich im erkrankten Gewebe bisher als Ursache nachweisen ließen, also durchwegs Veränderungen, wie sie auch bei der Syphilis der Knochen beobachtet werden. Auch das Auftreten mehrerer Erkrankungsherde im Knochen wird bei Syphilis beobachtet; so fand Chiari¹⁾ zahlreiche Herde in den langen Röhrenknochen und ist auch das gleichzeitige Auftreten mehrerer Herde in den Schädelknochen nichts Ungewöhnliches. Wenn dabei dem Schläfenbein bisher von sämtlichen Autoren eine gewisse Immunität gegen Syphilis zugeschrieben wurde (M. B. Schmidt²⁾), so beruht dies nur darauf, daß gerade diese Erkrankungsherde der klinischen Untersuchung fast gar nicht, und der pathologisch-anatomischen äußerst selten zugänglich sind. Die Seltenheit der Erkrankung an Syphilis wird noch dadurch erklärlich, daß hier äußere Reize, die häufig die Veranlassung zu syphilitischer Erkrankung einzelner Gewebe bilden, fast ganz fehlen. Manchmal mag eine Mittelohrentzündung die Veranlassung bilden, daß dieluetische Erkrankung hier auftritt, und möchte ich die schon erwähnte Ansicht von Katz³⁾, daß der öfters dabei vorkommende Mittelohrprozeß nur die Bedeutung eines begünstigenden Momentes habe, in diesem Sinne deuten. Die feineren histologischen Vorgänge bei dieser Form der Knochenerkrankung, wie sie oben beschrieben wurden, sind in gleicher Weise auch bei Syphilis beobachtet worden. So erwähnt Soloweitschik⁴⁾, daß bei der Syphilis der Schädelknochen die Osteoklasten selten vorkommen, und die Kanalikulation nach Rindfleisch, sowie auch die Vaskularisation nach Volkmann den wesentlichsten Anteil an der Knochenauflösung nehmen. Er beobachtete auch die Vergrößerung der Knochenkörperchen und daß sie an dem Krankheitsprozesse aktiven Anteil nehmen. Wenn alle diese Vorgänge auch für Syphilis nichts Charakteristisches haben, so ist immerhin die Übereinstimmung meiner Befunde mit denen bei echter Syphilis der Schädelknochen beachtenswert. Betrachten wir nun noch das Endstadium des Prozesses besonders in einem Falle, in dem die Krankheit eine größere Ausdehnung erreicht hat, so z. B. in meinem 6. Fall, so

1) Vierteljahrsschr. f. Dermatol. u. Syphilis. Bd. IX. S. 389.

2) Ergebnisse der allgem. Pathol. u. pathol. Anatomie. VII. S. 248.

3) Dieses Archiv. Bd. LIII. S. 75.

4) Virchows Archiv. Bd. XLVIII.

zeigt auch die Dickenzunahme des ganzen Knochens, die Hyperostose desselben bei der fast durchwegs porösen Beschaffenheit der erkrankten Stellen, wie auch die spongiösen Exostosen im Fall I und anderen, deutliche Analogien mit den bei Syphilis beobachteten Knochenveränderungen. Wir werden erinnert an die an den langen Röhrenknochen vorkommende Dickenzunahme und umschriebenen Auftreibungen bei Porosität und größeren Brüchigkeit der ganzen Knochensubstanz, so daß nur der Umstand, daß diese Veränderungen an einem anderen ungewöhnlichen Orte, der Felsenbeinpyramide, vorkommen, einen Unterschied bildet.

Zwei Umstände bleiben noch zu erwähnen, die gegen die Deutung dieser Knochenveränderungen als syphilitische in Betracht gezogen werden müssen, das Fehlen ausgesprochen gummosen Gewebes und das seltene Vorkommen destruktiver Veränderungen überhaupt, insbesondere von Karies und Nekrose des Knochens. Daß diese Momente nicht gegen Syphilis sprechen, dafür kann ich mich zunächst auf Virchow¹⁾ berufen, der erwähnt, daß bei schwacher Wirkung des syphilitischen Virus gewöhnlich Produkte entstehen, die häufig nur den Charakter der Hyperplasie tragen und als Beispiele dieser Art syphilitischer Veränderungen die Hyperostosen der Extremitätenknochen anführt, die, wie ich oben erwähnte, in meinem Fall VI in gleicher Weise im Schläfebein entwickelt sind. Auch Volkmann²⁾ sagt, neben dem mehr spezifischen Prozeß der Gummabildung zeigen die syphilitischen Knochenleiden auch nur das Bild einfacher Entzündung, die sich nicht wesentlich von der nicht syphilitischen unterscheidet, sondern höchstens durch die Lokalität und den Gesamthabitus der hervorgerufenen Veränderungen ein eigentümliches Verhalten darbietet. Soloweitschik³⁾ erwähnt in seiner Arbeit über die syphilitischen Schädelaffektionen, daß Karies und Nekrose nicht als selbständige, der Syphilis zugehörige Krankheiten zu betrachten sind, sondern nur als der allerdings mögliche Ausgang der Periostitis und Ostitis gummosa unter besonders ungünstigen, zufälligen Umständen. Daß übrigens Zerstörungsprozesse auch in meinen Fällen nicht vollständig fehlten, zeigen die Präparate von Fall I, II, III und VI, in denen sich Knochendefekte im inneren Gehörgang, und von Fall I und II, in denen sich ähnliche Defekte des Knochens auch in der Nische des ovalen Fensters finden.

1) Die krankhaften Geschwülste. II. S. 403.

2) Handbuch von Pitha und Billroth. II. 2. Abt. S. 268.

3) Virchows Archiv. Bd. XLVIII. S. 195.

Erstere insbesondere machen ganz den Eindruck, als ob es sich um geheilte gummöse Periostitis und Ostitis gehandelt habe. Der zweite Umstand, der gegen die Deutung dieser Erkrankungsform als einer syphilitischen angeführt werden kann, ist das Fehlen anderweitiger syphilitischer Veränderungen im übrigen Körper. Sehen wir uns nun die erwähnten Fälle von Sklerose in der Literatur genauer an, so finden wir bei der größeren Zahl derselben den genauen Sektionsbefund gar nicht angegeben, und selbst, wenn er angegeben wurde und nichts von Syphilis enthält, ist dies noch lange kein Beweis, daß keine Syphilis überstanden wurde. Wird doch gerade das Knochensystem häufig allein von der Syphilis ergriffen, während die inneren Organe und die Haut keine Veränderungen mehr aufweisen, und wird eine genaue Untersuchung der Knochen auch bei der Sektion oft nicht vorgenommen. Die Diagnose überstandener Syphilis wird an der Leiche gewiß viel seltener gemacht, als sie während des Lebens beobachtet wird. Hinweisen möchte ich hier noch darauf, daß auch in einigen meiner Fälle im Sektionsprotokoll sich die Angabe findet: Schädeldach dick und kompakt, und besonders im Fall VII die hochgradige Hyperostose des Schädels, die am Stirnbein zu einer Dickenzunahme bis 12 mm geführt hatte, erwähnt wird, so daß die Vermutung nahe liegt, daß es sich bei dieser Kranken um eine hereditäre Lues gehandelt hat. Auf eine Veränderung, die bei Syphilis gewöhnlich vorkommt, die Erkrankung der Gefäße, habe ich leider bei meinen Präparaten anfangs zu wenig geachtet, und erst nachträglich die Schnitte noch daraufhin untersucht, und gefunden, daß bei den meisten der von mir untersuchten Fälle sich endarteriitische Veränderungen nachweisen ließen, und daß ich solche nur in dem Fall II und VII vermißte. In einzelnen der erwähnten Fälle mögen diese Veränderungen auch durch das Alter der Betroffenen ihre Erklärung finden können, und wird bei der Untersuchung neuer frischer Fälle gerade auf diese Veränderungen besonders geachtet werden müssen.

Von anderen Ursachen, die für die Entstehung dieser Krankheit noch in Betracht gezogen werden könnten, wäre in erster Reihe die akute und chronische Mittelohrentzündung zu nennen, und war ich auch bisher der Meinung, daß diese in abgeschwächter Form unter besonderen Umständen auf den Knochen übergreifen und diese Veränderungen im Knochen hervorrufen können. Daß wirklich Knochenkrankungen bei der akuten und chronischen Mittelohrentzündung auftreten, dafür liegen, abgesehen von

den zahlreichen klinischen Beobachtungen, auch eine Reihe pathologisch-histologischer Untersuchungen vor. So habe ich selbst¹⁾ nachgewiesen, daß bei der akuten eitrigen Mittelohrentzündung die Entzündung gewöhnlich zunächst auf die zelligen Räume, pneumatischen und Markräume, die an das Mittelohr angrenzen und mit demselben in Verbindung stehen, übergreift, und daß je nach der bei verschiedenen Personen verschiedenen Entwicklung dieser Räume, sei es ober- oder unterhalb des Labyrinths, auch umschriebene Entzündungen und auch kleine Empyeme in diesen Räumen auftreten, während die eigentliche knöcherne Labyrinthkapsel nur geringe Veränderungen in den größeren Gefäßkanälen des Knochens (Folgen kongestiver Hyperämie) zeigt, und erst sekundär, sei es vom eigentlichen Mittelohr her oder von den genannten zelligen Räumen von der Entzündung mitergriffen werden kann. Es kommt an einer Stelle zu einer Arrosion des Knochens und zu einem Durchbruch ins Labyrinth, und sind Beispiele dieser Art in letzter Zeit in größerer Zahl von Panse²⁾ und Manasse³⁾ beschrieben worden. Ich habe selbst auch noch mehr solcher Fälle untersucht, wenn auch noch nicht ausführlich beschrieben.

Außerdem habe ich zwei Erkrankungsformen des Knochens beschrieben, die gleichfalls mit Hyperostose der inneren Wand einhergehen und infolge von Mittelohrentzündung auftreten; bei der einen⁴⁾ entsteht die Hyperostose des Promontoriums und eventuell auch die Verlegung der Fenster durch eine ossifizierende Periostitis, bei der anderen⁵⁾ durch eine oberflächliche Ostitis, eine Erkrankungsform, die trotz der Ähnlichkeit mit der bei der sogenannten Sklerose vorkommenden sich doch noch wesentlich in ihrer Ausbreitung, Dauer und ihrem Endausgang von ihr unterscheidet.

Eine zweite Form von Knochenentzündung, die zur Erklärung der Otosklerose in Betracht kommen könnte, ist die infektiöse Osteomyelitis. Diese Erkrankung kommt gleichfalls auf dem Weg der Gefäße in den Knochen und kann unter Umständen auch noch nach Ablauf einer großen Zahl, selbst noch nach 29 Jahren, zu neuen Rezidiven von Entzündung im Knochen führen. Auch bestehen von dieser Erkrankung gelindere Formen, die Kocher und Tavel⁶⁾ als proliferierende Formen

1) Dieses Archiv. Bd. XLII. S. 128.

2) Dieses Archiv. Bd. LVIII. S. 184.

3) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XLIV. S. 41.

4) Dieses Archiv. Bd. LIII. S. 52. 5) Ebenda. Bd. L. S. 242.

6) Vorlesungen über chirurg. Infektionskrankheiten. I. S. 145.

(Ostitis vasculosa, sclerotica, granulosa und serosa) bezeichnen. Solche mehr chronisch verlaufende Formen der infektiösen Osteomyelitis sind von Garré¹⁾, Kocher²⁾, Ehrlich³⁾ und Jordan⁴⁾ beschrieben worden, und Albert und Kolisko⁵⁾ sprachen in einer Arbeit über Osteomyelitis der Schädelknochen direkt die Vermutung aus, daß diese öfter im Schläfebein Veranlassung zu einer Otitis media geben und unter dem Bilde dieser verlaufen dürfte. Auch teilt Zeroni⁶⁾ einen Fall mit, in dem neben anderen osteomyelitischen Herden im Körper auch einer im Knochen des äußeren Gehörgangs ohne Beteiligung der Paukenhöhle seinen Sitz hatte.

Ein Umstand aber, der sehr gegen eine solche Deutung unserer Ostitis als einer gelinden Form dieser Krankheit spricht, ist der, daß, wie die meisten Autoren angeben, die infektiöse Osteomyelitis nur eine Erkrankung des jugendlichen Alters ist, und daß schon mit dem 20. Lebensjahr die Disposition zu dieser Erkrankung fast ganz erlischt, während bei der Otosklerose das erste Auftreten der Krankheit fast ausschließlich in den späteren Lebensjahren, von 20—50, beobachtet wird. Weiter spricht gegen eine solche Deutung, daß auch bei den chronisch verlaufenden Formen der infektiösen Osteomyelitis Sequesterbildung im Knochen sehr häufig, wenn nicht sogar Regel ist, wie die Beobachtungen der erwähnten Autoren ergeben. Endlich wurden bei dieser Krankheit die Infektionserreger, meist die Staphylokokken, im Knochen gefunden, und können sie sich dort viele Jahre erhalten; bei den bisher untersuchten Fällen von Otosklerose aber sind Bakterien nicht als Ursache nachgewiesen worden.

Von anderen Ursachen, die bei der Entstehung der beschriebenen Knochenerkrankung in Betracht kommen könnten, möchte ich noch eine erwähnen, die Katz besonders betont, die rheumatisch-gichtische Anlage. Bei der Gicht handelt es sich um die Ablagerung harnsaurer Salze in die Gelenke, in die Grundsubstanz des Knorpels, die Kapseln der Gelenke, die Sehnenscheiden und Bänder, während die Knochen an der Erkrankung nicht teilnehmen, also um einen wesentlich andern Prozeß als unsern, der hauptsächlich sich im Knochen abspielt

1) Beiträge zur klin. Chirurgie. 1893. 2) L. c. S. 141.

3) Über latente Eiterherde im Knochen. Münch. med. Woch. 1896.

4) Über akute Osteomyelitis. Beitr. zur klin. Chirurgie. Bd. X. S. 749 und Bd. XV. S. 457.

5) Untersuchungen über Osteomyelitis. Wien. S. 27.

6) Dieses Archiv. Bd. LIII. S. 316.

Ähnlich verhält es sich auch mit den rheumatischen Gelenkerkrankungen und könnte hier höchstens noch an die Arthritis deformans gedacht werden. Es spricht jedoch gegen eine solche Erkrankung nicht bloß der abweichende histologische Befund, wie ich mich selbst an einem Beispiel, das ich untersuchen konnte, überzeugte, sondern auch das Freibleiben der andern Gelenke des Körpers, von denen gewöhnlich bei den Arthritis deformans eine größere Anzahl erkrankt sind.

Daß das Puerperium in einer ursächlichen Beziehung zur Otoklerose stehe, wird insbesondere von Politzer behauptet, und zwei meiner Fälle, Nr. IV und VII, scheinen dies auch zu bestätigen. Es ist ja bekannt, daß im Puerperium Veränderungen am Knochensystem nicht selten erfolgen, und hat besonders Hanau²⁾ diese Veränderungen in letzter Zeit genauer studiert. Hanau hat auch, wie Siebenmann berichtet, seine Präparate von Otoklerose durchgesehen und sein Urteil darüber abgegeben, aber von irgendwelchen Beziehungen oder einer Ähnlichkeit mit dem puerperalen Knochenprozeß wird darin nichts berichtet. Soviel ich aus Hanaus Angaben über die puerperale Knochenkrankung entnahm und auch durch eigene Untersuchung zweier Fälle dieser Erkrankung mich überzeugen konnte, handelt es sich da um wesentlich verschiedene Prozesse. Eine teilweise Richtigkeit läßt sich aber der Ansicht Politzers, die ich durch mehrfache eigene klinische Beobachtungen nur bestätigen kann, nicht absprechen. Es kommt eben mit der Schwängerung nicht selten auch zu einer Infektion mit Syphilis, und wissen wir, daß gerade bei solchen Frauen die Syphilis häufig mehr latent verläuft, ohne deutliche äußere Symptome zu zeigen. Ebenso kann auch eine hereditär Luetische infolge von Schwangerschaft an Otoklerose erkranken, wofür Fall VII als Beispiel dienen könnte, wenn hier nicht schon vor der Schwangerschaft die Erkrankung im Knochen begonnen hatte.

Vergleichen wir mit dem Ergebnis obiger Untersuchungen auch unsere klinischen Erfahrungen, so sprechen auch diese mit großer Wahrscheinlichkeit für eine solche Ursache der Otoklerose. Wenn auch zugegeben werden muß, daß auch Formen von Tuben und Mittelohrkatarrh sowie auch leichtere Formen akuter Mittelohrentzündung zu einer gleichen Hörstörung mit den Charakteren

1) Beleuchtungsbilder des Trommelfells. 1896. S. 79.

2) Internationaler Kongreß in Rom. Bd. II. S. 148.

3) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXXIV.

eines starken Schallleitungshindernisses führen können, so bleiben doch immerhin Fälle genug, bei denen mit Sicherheit Syphilis als Ursache nachgewiesen werden kann. Unter 116 Fällen vonluetischer Erkrankung des Gehörorgans, die ich zu meiner Abhandlung über dieluetischen Erkrankungen des Ohres¹⁾ verwertete, fand ich 24, die bei der Hörprüfung das Bild eines hochgradigen Schallleitungshindernisses boten und bei denen ich die Hörstörung aufluetische Veränderungen an der inneren Wand der Paukenhöhle und in den Fensternischen zurückführen mußte. In den Krankengeschichten unserer Klinik der letzten 5 Jahre fand ich neuerdings 20 (9 Männer, 11 Weiber), bei denen Lues als Ursache der Sklerose nachgewiesen werden konnte, außerdem 25 andere (darunter 7 Männer und 18 Weiber), bei denen über Lues nichts notiert wurde, ein anderes ätiologisches Moment aber auch nicht aufzufinden war, es sei denn, daß es sich um fortgeleitete eitrig-Katarrhe des Nasenrachenraums handelte. Gewiß aber war in einzelnen dieser Fälle auch Lues nicht ganz auszuschließen.

Von den ersteren 20 Kranken waren 7 im Alter von 21 bis 30, 7 im Alter von 31—40, 3 im Alter von 41—50, einer im Alter von 51—60 Jahren. Ein Knabe mit 7 Jahren bot mäßige Sklerose auf Basis ererbter Lues, und ein 19-Jähriger hatte sie 2 Jahre früher erworben. Von den anderen 25 Kranken waren 4 zwischen 21 und 30, 11 zwischen 31—40, 9 zwischen 40—50 und einer 52 Jahre alt an Schwerhörigkeit erkrankt.

Symptome. Wie schon erwähnt wurde, fallen unter den Begriff der Otosklerose verschiedene Krankheiten, je nachdem man dieses Leiden mehr vom klinischen oder mehr vom pathologisch-anatomischen Standpunkt aus definiert. Hier kann es sich nur darum handeln, die Symptome jener Fälle anzuführen, die bei der pathologisch-anatomischen Untersuchung den oben wiederholt geschilderten Befund zeigten.

Die Schwerhörigkeit bildet eines der häufigsten Symptome, und kann manchmal schon in kurzer Zeit einen hohen Grad erreichen, wenn die Erkrankung besonders die Paukenfenster stark in Mitleidenschaft zieht, unter Umständen, besonders im Beginn, aber auch nur minimal sein oder fehlen, wenn, wie in meinem Fall VII, nur ein ostitischer Herd am lateralen Teil der runden Fensternische vorhanden ist. Das gleiche kann der Fall sein, wenn sich der Herd im ovalen Fenster zunächst mehr nach

1) Haugs Sammlung klinischer Vorträge. Bd. I.

vorn ausbreitet und den Steigbügel und seine Verbindung nicht ergreift, doch dürfte dies selten geschehen.

Die Hörprüfungsergebnisse werden also in diesen Fällen wenig Charakteristisches zeigen, ebenso aber auch in jenen hochgradigen Fällen, in denen schon fast gänzliche Taubheit eingetreten ist, wie z. B. in meinem Fall VI. Bei den Fällen mittleren Grades, die die Mehrzahl bilden dürften, werden die von Bezold für die knöcherne Steigbügelankylose nachgewiesenen Zeichen als charakteristisch angeführt, das Hinaufrücken der unteren Tongrenze, der negative Rinne und die Verlängerung der Kopfknochenleitung. Während die ersten beiden Zeichen meist vorhanden sind, fehlte das letzte in meinem Fall III, und wenn ich die bloß klinisch untersuchten 20 Fälle vonluetischer Sklerose daraufhin durchsehe, findet es sich auch bei diesen nur 3 mal notiert. Es ist also wenigstens bei der von mir geübten Prüfungsmethode die Verlängerung der Knochenleitung mit der kleinen von Lucae empfohlenen c-Stimmgabel nur selten vorhanden. Worin die Erklärung dafür zu suchen ist, müssen weitere Untersuchungen ergeben. Die Bedeutung des Gelléschen Versuches für die Diagnose der Steigbügelankylose, für die besonders Bloch und seine Schüler¹⁾ eintreten, muß hier gleichfalls erwähnt werden.

Ein zweites Symptom, das häufig vorhanden ist, die subjektiven Geräusche, findet in manchen Fällen seine Erklärung, wie ich²⁾ schon früher angab, in dem Übergreifen der Erkrankung auf das runde Fenster und die angrenzenden Nerven der basalen Windung und die Schneckenwindung. Auch die Veränderungen im inneren Gehörgang und in der Lamina spiralis kommen in Betracht. Ebenso kann auch durch das Übergreifen der Erkrankung vom ovalen Fenster her auf den Nervendurchtritt der Bogengangsnerven Schwindel³⁾ ausgelöst werden, der ebenso, wie die subjektiven Geräusche, nach Ablauf des Prozesses wieder verschwinden kann. Auch die Erkrankung des Endosts kann, wie Siebenmann angibt, Druckminderung der Labyrinthflüssigkeit und dadurch auch Reizsymptome auslösen, ebenso wie dies in meinem Fall IV durch den Verschluß der Schneckenwasserleitung geschehen konnte. Der schon von Schwartze angegebene, für Steigbügelankylose charakteristische Trommelfellbefund, den ich schon in meiner pathologischen Anatomie zu der Knochenerkrankung im Promontorium in Beziehung brachte, wird nur in jenen Fällen vor-

1) Stern, Die Unbeweglichkeit des Steigbügels. Wiesbaden 1903.

2) Schwartzes Handbuch. Bd. I. S. 248. 3) Ebenda.

handen sein, in denen das Trommelfell nicht schon durch frühere Erkrankung weniger durchsichtig geworden war. Er kann übrigens auch auftreten, wenn bloß durch katarrhalische Prozesse eine Hyperämie am Promontorium vorhanden ist.

Die Diagnose bietet keine Schwierigkeiten, wenn die Ursache, die syphilitische Infektion, festgestellt ist, wenn dies aber nicht möglich ist, so wird die Abgrenzung von anderen Prozessen, die gleichfalls zu einer Verlegung der Fensternischen und auch zu Steigbügelankylose führen können, Schwierigkeiten machen. Als solche Prozesse, die mit ersterer Form verwechselt werden und zur nichtluetischen Sklerose führen können, kommen vorwiegend katarrhalische Entzündungen der Tuba und Paukenhöhle in Betracht, die von der Nase her auf das Ohr übergreifen, und in zweiter Reihe auch gewisse Formen von Mittelohrentzündung, die ohne heftige subjektive Symptome und ohne Durchbruch des Trommelfells verlaufen und in kurzer Zeit durch Organisation des Exsudats in den Fensternischen zu bedeutender Schwerhörigkeit führen können. Die Abgrenzung dieser Formen von derluetischen Sklerose wird durch eine genaue Krankengeschichte, und insbesondere auch durch den Umstand häufig gelingen, daß bei den katarrhalischen Formen Verschlimmerungen durch äußere Einflüsse, Katarrhe der Nase usw. öfter eintreten und auch Besserungen durch Katheter und Behandlung der Katarrhe häufiger möglich sind.

Die Abgrenzung derluetischen Sklerose als einer vorwiegend vom Periost ausgehenden syphilitischen Otitis und Osteomyelitis von den anderen Formen syphilitischer Labyrinthkrankung kann unter Umständen gleichfalls schwer, wenn nicht unmöglich sein. Besonders gilt dies von der vom Endost ausgehenden Syphilis der Labyrinthhöhle, der endostalen Labyrinthsyphilis, die zur Ausfüllung der Innenräume des Labyrinths mit Bindegewebe (Manasse¹⁾) oder auch mit Knochen (Downie²⁾) und wahrscheinlich auch Fall III von mir) führen kann. Leichter ist die Diagnose der Nervensyphilis, die auch viel häufiger zur Beobachtung kommt, als die beiden genannten Formen, und für die gleichfalls histologische Untersuchungen von Manasse¹⁾ und Politzer³⁾ vorliegen.

Die Behandlung derluetischen Sklerose kann nur eine antiluetische sein, wenn ich auch zugeben muß, daß wir damit häufig zu spät kommen werden. Daß von ihr unter günstigen

1) Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. XXXIX. S. 1.

2) Ebenda. Bd. XXX.

3) Lehrbuch der Ohrenheilkunde.

Verhältnissen noch etwas zu erwarten ist, dafür spricht auch der Umstand, daß Jodpräparate bei den chronischen Formen progressiver Schwerhörigkeit einen langbewährten Ruf in der Ohrenheilkunde besitzen. Gegen die Feststellung des Schallleitungsapparates kommen dann noch vorwiegend die mechanischen Verfahren vom äußeren Gehörgang aus, die den Zweck haben, die Beweglichkeit wieder herzustellen, in Betracht. Einige eigene Beobachtungen lehren mich, daß auf diese Weise noch wenn auch nur mäßige Erfolge zu erreichen sind.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel II—VII.

Fig. 1. Schnitt durch den vorderen Teil des ovalen Fensters im rechten Ohr von Fall I. Der Knochen oberhalb sklerotisch und sowohl oberhalb als auch unterhalb usuriert und die Periostschicht darüber verdickt. Ankylose an der unteren Peripherie. Vergr. 25.

Fig. 2. Schnitt durch dasselbe Fenster weiter hinten, trifft das Köpfchen, den hintern Schenkel, den hintern Teil der Macula acustica utriculi und den N. facialis. Knochen oberhalb der Fensternische und oberer Teil der Basis krank; knöcherne Ankylose. Vergr. 15.

Fig. 3. Schnitt durch das Promontorium unmittelbar vor den Fensterischen im Fall II, rechtes Ohr. Auch in der Paukentreppe neugebildeter Knochen. Vergr. 15.

Fig. 4. Schnitt durch den vorderen Teil der Schnecke und den inneren Gehörgang, Fall II, linkes Ohr. In der Spitzenwindung der Schnecke Sägespäne. Erkrankung des Knochens an der vorderen Peripherie des inneren Gehörgangs und an der inneren Paukenwand. Endostale Knochenneubildung in der Paukentreppe der basalen Windung. Vergr. 6.

Fig. 5. Schnitt durch das Promontorium, den N. facialis, den R. vestibularis und Endteil der basalen Windung. Die Paukentreppe zum Teil mit Knochen ausgefüllt. Vergr. 6.

Fig. 6. Schnitt durch die beiden Fenster und die Mac. acust. utriculi des gleichen Ohres. Fall II, linkes Ohr. Ankylose des Steigbügels. In beiden Nischen reichlich Bindegewebe. Vergr. 15.

Fig. 7. Fall III, linkes Ohr. Schnitt durch die Schnecke und den inneren Gehörgang. Erkrankungsherd im inneren Gehörgang. Vergr. 7.

Fig. 8. Schnitt durch das Promontorium, den Endteil der basalen Windung und den Macula acust. sacculi rotundi. Ostitischer Herd vom runden und vom ovalen Fenster. Verschiedene Stadien der Ostitis nebeneinander. Vergr. 15.

Fig. 9. Fall VI, rechtes Ohr. Schnitt durch den Warzenfortsatz, die Bogengänge, den N. facialis und die Vorhofswasserleitung. Vergr. 7.

Fig. 10. Fall VI, linkes Ohr. Schnitt durch die Schnecke und den inneren Gehörgang. Der N. acusticus fehlt im Schnitt und das Lig. spirale hat sich in einem Teil der mittleren Windung durch die Präparation abgelöst. Vergr. 7.

Fig. 11. Dasselbe Ohr. Schnitt durch die Fenster. Luxation des Steigbügels und scheinbar isolierter Herd im Knochen. Vergr. 7.

Fig. 12. Dasselbe Ohr. Schnitt etwas weiter nach hinten. Vergr. 7.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.