die Lösung. Nun neutralisirt man vorsichtig mit kohlensaurem Natron und fällt mit kohlensaurem Baryt, filtrirt sofort ab und ergänzt das Filtrat auf 1 l. Man titrirt nun je 200 cc und lässt auf eine vorläufige, approximativ richtige Probe, die sehr schnell ausgeführt ist, eine genaue, mit der grössten Vorsicht ausgeführte Titrirung folgen, die wenig Zeit in Anspruch nimmt. Man wird sich leicht die Ueberzeugung verschaffen, dass wiederholte Proben sehr gut übereinstimmen.

Die Concentration der Chamäleonflüssigkeit ist derart zu wählen, dass 1 cc etwa 2—3 mg Mangan entspricht.

In Bezug auf die Beobachtung der Endreaction ist es nothwendig, die Erscheinungen genau zu kennen, welche während des Titrirens eintreten. In der ersten Zeit scheidet sich der Niederschlag sehr voluminös aus und ist es kaum möglich, die Farbe der Flüssigkeit zu unterscheiden. Bei weiterem Zusatze von Kaliumpermanganat wird aber der Niederschlag immer dichter, und ist hierbei das Umrühren mit einem Glasstabe sehr förderlich. Die Färbung der Flüssigkeit ist zuerst gelbbraun, sowie man aber dem Ende der Reaction naht, wird die Flüssigkeit mit dem Niederschlage deutlich braunroth, und wenn man jetzt das Chamäleon tropfenweise hinzufügt, so sieht man, dass sich die Tropfen nur langsam entfärben; rührt man nun tüchtig um, lässt ganz kurze Zeit absitzen und wiederholt dies nach tropfenweiser Zugabe von Chamäleon, so erreicht man genau den Punkt, wo die Flüssigkeit eine rein rosenrothe Färbung annimmt, die sich nun auch erhält. Entschieden erfordert die Anwendung der Methode grosse Aufmerksamkeit und Uebung, bereitet aber dann keine Schwierigkeiten. Man darf sich nur nicht durch die ungünstigen Erscheinungen beim Beginne der Reaction abschrecken lassen.

Wenn es sich um eine rasche Ermittlung des Mangangehaltes in Spathisensteinen handeln sollte, dürfte die Anwendung dieser Methode nach Ansicht der Verfasser besonders empfehlenswerth sein.

Eine Reaction auf Kobalt empfiehlt T. Tattersall. *) Versetzt man die Lösung eines Kobaltsalzes so lange mit Cyankaliumlösung, bis der anfangs entstandene bräunlichweisse Niederschlag sich zu einer gelben Flüssigkeit gelöst hat und fügt nun einige Tropfen gelbes Schwefelammonium hinzu, so färbt sich die Flüssigkeit blutroth. Nickelsalze verhindern die Reaction nicht, wohl aber Kupfersalze.

*) Chem. News 39, 66.