DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Mit Berücksichtigung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Dritter Jahrgang.

Redacteur Dr. P. Börner.

Druck und Verlag von G. Reimer in Berlin.

I. Neue Fälle von Ovariectomie und einige andere casuistische chirurgische Mittheilungen.

Ein kleiner Beitrag zur Wund-Behandlung nach Lister's Principien.

Von

Dr. B. Stilling,

Geheimen Sanitäts-Rathe in Cassel.

(Fortsetzung aus No. 3.)

I.

2. Extra-ovariale Hydatiden-Geschwulst oder multiple Cysten-Geschwulst, von dem Ligamentum latum und der Narbenfläche eines exstirpirten Cystovariumstiels ausgehend; kurze Dauer der Krankheit, bedeutender Ascites und hochgradiger Verfall der Constitution. Laparotomie (33. Fall) und Exstirpation der Cysten-Geschwulst. Heilung.

In der „Deutschen Klinik“, herausgegeben von Götschen, 1872 No. 39, hatte ich den 22. Fall meiner Ovariectomien beschrieben. Er betraf eine 25jährige unverheirathete Dame (Comtesse Mathilde v. d. B... in Namur), die unter sehr ungünstiger Prognose operirt, aber glücklich geheilt wurde. Diese Dame blieb bis zum Frühling 1876 völlig gesund, machte am Hofe in Brüssel alle oft recht ermüdenden Freuden und Feste der grossen Welt, mit und ward so blühend, wie nie zuvor in ihrem Leben. Im Frühling 1876 spürte dieselbe — ob nach einer Erhitzung, Erkältung, einer übergrossen Körperanstrengung, oder andern weniger bekannten Ursachen —

Schmerzen in der rechten Nierengegend. Dieselben schwanden nach einiger Zeit. Indess der Unterleib wurde etwas dicker. Allmählig nahm die Geschwulst des Leibes zu und im August 1876 constatirte Dr. Hamoir in Namur Fluctuation im Unterleib. Mitte August kam Patientin nach Cassel; die Peripherie des Unterleibs, in der Höhe des Nabels, betrug 90 Centimeter. Man fühlte überall Fluctuation, nirgends eine Härte. Das Fluidum im Bauche war offenbar freier Ascites, denn bei dem Wechsel der Rückenlage in die Seitenlage trat die Flüssigkeit an die niedrigst gelegenen Stellen, und von einer Cyste war nichts mit Sicherheit zu fühlen. Alle Organe gesund. Urin normal, obwohl das specif. Gewicht 1,026. Exploratio per vaginam et rectum, sowie die bimanuelle Untersuchung liessen nirgends eine Abnormität erkennen. Da die Pat. übrigens völlig gesund und vom blühendsten Aussehen war, so hielt ich jeden chirurgischen Eingriff für verfrüht. Ich rieth der Patientin einige Wochen in einem Seebade zu verbringen, sich kräftig zu nähren und abzuwarten. Im Falle der Zunahme des Exsudats im Bauche wollte ich die Punction vornehmen, um nach der Entleerung der Flüssigkeit zu einer sicheren Diagnose zu gelangen.

Wegen der schlechten Witterung in der letzten Hälfte des August und Anfang Septembers konnte Pat. nicht an die See reisen. Der Erguss im Leibe nahm rapid zu, die Kräfte der Pat. nahmen ab, sie konnte nicht mehr ordentlich essen, erbrach sich öfter, ihr Schlaf war gestört, sie magerte ab.

Am 9. September 1876 kam sie daher wieder nach Cassel. Durch die Reise war die Menstruation, die vor

3 Wochen erst vorhanden war, von neuem vorzeitig eingetreten. Ich liess die Pat. am 9. und 10. September sich ruhig zu Bette halten. Ihr Unterleib mass in der Höhe des Nabels 101 Centimeter. Da am 11. September die Menses aufgehört hatten, wiederholte ich die Manual-Untersuchung, konnte aber nichts Anderes constatiren als vor drei Wochen. Ich schritt daher, Nachmittags 5 Uhr, unter Assistenz von Dr. Krause, zur Punction des Unterleibs. Ich stach dicht am oberen Ende der Operationsnarbe in der Linea alba den Troikart ein, entleerte 2 $\frac{1}{2}$ Eimer voll einer ganz klaren, bernsteingelben, klebrigen Flüssigkeit, die, als die letzten Portionen kamen, einige weissliche Flocken zeigte. Die Flüssigkeit war geruchlos, hatte ein specifisches Gewicht von 1,028 und enthielt eine colossale Menge von Albumen (gerann über der Weingeistflamme im Reagensgläschen zu einer fast festen Masse). Nach Ausleerung dieser Flüssigkeit fühlte ich in der rechten Unterbauchgegend auf das Deutlichste harte Massen von Apfel- und Faustgrösse, die sich in das Becken hinein erstreckten. Die Untersuchung per vaginam et rectum und die bimanuelle Untersuchung zeigten, dass diese Geschwulstmassen mit dem Uterus, der retrovertirt war, zusammenhingen. Demnach liess sich schliessen, dass eine cystoide Degeneration des rechten Ovariums vorhanden sei. Ich hatte aber in der Operationsgeschichte von 1871 mitgetheilt, dass das rechte Ovarium exstirpirt worden, das linke gesund geblieben sei. Ob dies ein Irrthum war, konnte nur die Folge ergeben.

Der Unterleib der Pat. war nach der Entleerung ganz flach, maass in der Taille 67 Centimeter, in der Höhe des Nabels 76 Centimeter. Eine Stunde nach der Operation stellte sich ein Fieberanfall ein, Frost, Hitze, Schweiss und ein Schmerz im Unterleib um die Punctionsstelle herum. Auch blieb der ganze Leib empfindlich gegen Druck und Pat. konnte nicht ohne Schmerz tief einathmen. Sie erbrach auch die genossenen Speisen.

Am folgenden Tage ging alles leidlich gut. Die Empfindlichkeit des Unterleibs aber bestand noch fort. Ich unterliess daher, die Länge der Uterushöhle mit der Sonde zu prüfen, wie ich es gerne gewünscht hätte, denn ich konnte nicht sicher sein, ob die Geschwulst vom Ovarium oder vom Uterus ausging, wiewohl ersteres das Wahrscheinlichste war. Und wenn mein erster Bericht, in welchem ich angegeben, dass ich das rechte Ovarium exstirpirt hatte, richtig war, so blieb

es sehr zweifelhaft, ob ich hier eine Ovarial-Cyste vor mir hatte. Denn der Tumor war ganz in der rechten Seite des Unterleibs, während die linke frei davon blieb.

Am 13. September Morgens fand ich die Pat. im ganzen leidlich, doch war der Unterleib noch empfindlich. Ich wagte also nicht, die Uterus-Sonde anzuwenden.

Am Nachmittage reiste Pat. in ihre Heimath zurück. Ich hatte die Absicht, wenn der Erguss im Leibe sich wiederholen sollte, die Laparotomie resp. die Ovariectomie vorzunehmen, in der Hoffnung, dass, wenn überhaupt ein Ovarial-Tumor vorhanden war, dieser von dem linken Ovarium ausging, welches durch eine Torsion in die rechte Seite des Unterleibs gelangt war; oder wenn der Tumor wirklich von der Basis des (exstirpirten) rechten Ovariums ausgehen sollte, ich es hier mit einem Tumor zu thun hatte, ähnlich dem am 13. April 1868 von mir operirten Falle (16. Fall, Frau Tom Dieck in Oldenburg, s. Deutsche Klinik 1868).

Die Prognose konnte um so weniger günstig gestellt werden, als man über die Natur des Tumors irgend eine sichere Meinung haben konnte, bevor man solchen zu Gesicht bekommen hatte. Jedenfalls musste die enorm rasche Production und Reproduction einer fast ganz aus Eiweiss bestehenden Flüssigkeit, durch welche die Kräfte des Körpers auffallend rapid geschwächt wurden, bedenklich erscheinen. Und ich gestehe, dass ich nur mit einem gewissen Widerstreben und mit banger Sorge um das Leben der Patientin, die Exstirpation des Tumors zu unternehmen versprach.

Die Klagen der Pat. vermehrten sich indess so rapid, dass ich schon in den ersten Tagen des October mich zur Abreise nach Namur rüsten musste, und ich fand hier am 5. October die Patientin bereits so auffallend verändert, schwach, blass, athemlos, den Umfang des Unterleibes grösser denn je, die Harnmenge auf ein Minimum reducirt, ebenso den Appetit, dagegen stets Brechneigung, Schlaflosigkeit, dass ich nicht lange säumen durfte, wenn ich nicht das Leben der Pat. durch Suffocation u. s. w. schwinden sehen wollte. Die Menses hatten am 2. October begonnen und endeten am 5. October.

Laparotomie, ausgeführt in Namur, am 7. October 1876.

Gegenwärtig: Dr. Krause, Dr. J. Stilling, aus Cassel, Dr. Dethiers und Dr. Hamoir (der Hausarzt der Patientin

aus Namur. Die Anästhesie mittelst Chloroform ward erst nach langwieriger Inhalation bewerkstelligt, mehr als 40 Grm. wurden verbraucht. Dann wurde, unter Lister's Spray, der Schnitt in der Linea alba, dicht zur Seite der alten, sehr verbreiterten (1 Ctm.) Narbe gemacht.

Sofort nachdem die Bauchwand und das Bauchfell eingesehritten war, stürzte in starkem Strom eine bernsteinfarbige Flüssigkeit hervor, mindestens 2 Eimer voll. Nach dereu Ansleerung und der Erweiterung der Bauchfellwunde bis auf $3\frac{1}{2}$ —4 Zoll (conform der Hautwunde), präsentirte sich eine dunkelblaurothe Masse, ähnlich einer grossen blauen Weintraube, welche aus einer grossen Masse zahlloser kleiner, haselnussgrosser Cysten bestand, die eine helle Flüssigkeit enthielten, und sehr leicht barsten. Bei dem Anblick des Tumors äusserte der erfahrenste meiner Assistenten, dass es am gerathensten sei, von jeder weiteren Operation abzustehen, und die Bauchwunde sofort wieder zu schliessen. Ich fand mich indess nicht bewogen, diesem Rathe zu folgen; denn ich hätte damit die Kranke dem sicheren Untergang überlassen. Ich hielt es für meine Pflicht, Alles aufzubieten, um das Afterproduct radical zu entfernen, selbst auf die Gefahr hin, die Kranke durch den Tod zu verlieren. Denn ich wollte Alles wagen um Alles zu gewinnen. Ich setzte somit mein Operationsverfahren fort. Bei dem Versuche den ganzen Tumor zu umgehen und mit dem Zeigefinger zu umfühlen, barsten eine Menge der kleinen Cysten, und es konnte der Eintritt der aus ihnen sich ergiessenden Flüssigkeit in die Bauchhöhle nicht verhindert werden.

Ich suchte vorsichtig die Geschwulst aus der Bauchhöhle herauszuziehen, es gelang aber nicht. Es blieb mir somit nichts anderes übrig, als den Tumor stückweise auszuziehen, mit dem Finger möglichst viel davon abzubrechen, was sehr leicht gelang, bis es mir ermöglicht war, an die Basis des Tumors zu gelangen. Diese befand sich dicht an der rechten oberen Ecke des Uterus, an der Eintrittsstelle der Tuba Falloppii, resp. an der Stelle, wo, bei der vor 5 Jahren unternommenen Ovariectomie, das erkrankte Ovarium (somit Ligamentum latum) abgeschnitten worden war. Die Basis der ehemaligen Tuba Falloppii (und des Ligamentum latum etc.) war hier gut von der Dicke zweier Finger. Ich legte eine Darmsaitenligatur um dieselbe, ganz nahe am Uterus, und schnitt einen guten Theil des Tumors oberhalb der Ligatur

ab, es blieben aber wohl noch zwei Dritttheile des Tumors übrig, die theils mit dem Netz verwachsen waren, theils von dem oberen rechten Horn des Uterus auszugehen schienen. Die Basis auch dieser Theile des Tumors wurde mit carbolisirten Darmsaiten unterbunden, der Rest des Tumors abgeschnitten, die — ähnlich zweien langen Fingern — vom Netze ausgehenden, mit dem Tumor zusammenhängenden Fortsätze in gleicher Art mit Darmsaiten unterbunden. Man konnte jetzt den nicht vergrösserten, ganz normalen Uterus sehen und befühlen, ebenso konnte ich das linke, normale Ovarium mit meinen Fingern genauer betasten. Nur wenige Darmsehlingen kamen in Sicht, ohne vorzufallen.

Nach langer, mühsamer Arbeit schien alles Kranke entfernt, und die Blutung gestillt. Es wurde mit reinen, in Carbonsäure ausgewaschenen Schwämmen die Höhle des Beckens bestens gereinigt, doch kam immer noch ein wenig blutige Flüssigkeit aus der Bauchwunde. Die Operation hatte bereits eine volle Stunde gedauert. Ich legte 3 Drainröhren in die Höhle des Beckens, vereinigte die Bauchwunde mit 4 bis 5 Knopfnäthen, legte dann den Lister'schen Verband an. Ich umgab den Leib mit den Lister'schen Mullbinden, nachdem ich über die Gaze-Schicht eine dicke Lage 4procentiger Salicyl-Watte gelegt hatte. Die zahlreichen Mullbinden wurden straff angezogen, und somit wurde der ganze Unterleib durch circuläre Compression fest umschnürt, somit der, von den etwas erschlafften Bauchwandungen nicht genügend ausgeübte Druck auf die Bauchorgane künstlich ersetzt. Die Wunde ward somit, mit Ausnahme der kleinen Stelle im unteren Wundwinkel, aus dem die Drainröhren kamen, völlig occludirt.

Die Kranke ward in ein erwärmtes Bett gebracht; sie hatte viel Brechneigung, und heftige Schmerzen an dem unteren Wundwinkel. Ihr Habitus war sehr übel; Puls 120, sehr klein. Die Drainröhren lieferten Anfangs viel blutige seröse Flüssigkeit; eine Stunde später gar nichts mehr. Ich zog desshalb erst eine derselben aus, in deren unterem Ende ein Blutcoagulum sich vorfand. Die Kranke klagte fortwährend über Schmerzen im unteren Wundwinkel. Daher zog ich auch die übrigen Drainröhren aus. Alle enthielten ein wenig coagulirten Blutes im unteren Ende. Ich machte der Pat. eine subcutane Morphinum-injection (von $\frac{1}{4}$ Gran circa). Darnach hörten die Schmerzen auf, sie wurde ruhig, verfiel

in einen profusen Schweiss. Uebelkeit verschwand aber nicht ganz.

An der Basis des abgeschnittenen Tumors war eine knochenharte, unter der Messerschneide sich ganz wie Knochen verhaltende (verknöcherte) Stelle, wie eine Haselnuss gross, wie ein ovaler Ring aus Sehnenmasse um ein weiches Centrum; ob eine früher angelegte Ligatur sich hier mit Kalk- oder Knochenmasse umgeben, eingekapselt hatte? Schade, dass ich die Natur der Geschwulst nicht genauer ermitteln konnte. Ich hatte kein Mikroskop, und konnte auch nur stückweise dieselbe entfernen.

Die einzelnen kleineren und grösseren Cysten waren sehr dünnwandig, halb durchsichtig, sehr brüchig; auch das ganze sie untereinander verbindende Gewebe (der Mutterboden) war sehr dünn, membranartig, und brüchig. Das Ganze mit vielen kleinen Blutgefässen durchzogen, doch an der Basis von einer starken Arterie, die sehr heftig spritzte als sie durchtrennt war, ausgehend. Auf den ersten Blick konnte man den Tumor als eine Colloid-Geschwulst, aus zahllosen kleinen Colloid-Cystchen zusammengesetzt, ansprechen. Ich wage nicht zu entscheiden, ob dies richtig ist, oder nicht.

Eben so wenig ist zu entscheiden, ob die grosse Masse der Ascitesflüssigkeit von den geborstenen Theilen dieser Geschwulst abgesondert worden war, oder als ein krankhaftes Secret des Peritonäums angesehen werden muss.

Abends 9 Uhr: Temperatur 38,2° C. Puls 120. Der mit dem Katheter um 9 Uhr abgelassene Urin war nicht hoch gestellt, klar, 10—12 Unzen etwa. Um 9 Uhr eine Morphium-injection gemacht. Patientin schlief nur selten einige Minuten, bis höchstens $\frac{1}{4}$ Stunde. Sie klagte meist über Schmerz im unteren Theil des Unterleibes, über Brechneigung, erbrach wiederholt wässerige und schleimige Massen mit wenig Galle gemischt.

Am 8. October, Sonntag. Morgens früh 4 Uhr Application des Catheters. Urin hoch gestellt; 8 Unzen circa. Neue Injection von Morphium. Habitus der Pat. gut; sie transpirirt viel, klagt über grosse Hitze. Die Zimmer-Temperatur wird stets auf +18—19° R. gehalten durch ein gutes Kaminfeuer, und das Bett durch heisse Steinkrüge stets gut erwärmt. Temperatur Morgens 9 Uhr +38°, Puls 115, Respiration 16. Haut allgemein schwitzend, Blick gut, Zunge mässig weisslich belegt und feucht. Um 8 Uhr lässt Pat. freiwillig Urin, circa

6 Unzen, mässig hoch gestellt. Nirgends Schmerz, viel Durst, Brechen der genossenen Flüssigkeit seltner. Lässt im Lauf des Tags noch mehrere Male freiwillig Urin. Trinkt Champagner mit Sodawasser und Eis, abwechselnd eine Tasse schwarzen Thee.

Abends 6 Uhr: Temperatur 39,3°, Puls 120, Respiration 16, klagt über Hitze, grosse Unruhe, hat am Tage zu viel gesprochen; wird im Bette bequem gelagert. Neue Morphium-Injection bedingt starkes Hautjucken. Um 9 Uhr Alles etwas besser. Doch war die Nacht eine sehr üble. Die Vomitionationen wiederholten sich häufig, alles was die Operirte trank, Sodawasser, Eiswasser, Wasser mit Champagner gemischt, Eiswasser mit Eau de fleurs d'oranges, schwarzer Thee — Alles wurde wieder ausgebrochen. Sie schlief nur kurze Intervallen, trotz grosser Ermüdung, einmal höchstens 20 Minuten anhaltend, im Ganzen kaum eine Stunde.

Am 9. October. Auch am Vormittag dauerte die continuirliche Brechneigung und das Erbrechen der genossenen Flüssigkeiten fort. Trotzdem ist der Habitus der Operirten nicht schlechter. Das einzige weniger Gute im Habitus ist der auffallend matte Blick, bedingt durch das schlaffere obere Augenlid (der Levator palpebrae superioris zeigt seinen Tonus vermindert). Indessen die Operirte hat heute viel geweint, fürchtete die Wiederkehr einer Magenentzündung, woran sie früher einmal gelitten, macht sich Sorgen um die Gesundheit eines ihrer Brüder u. s. w. Die Temperatur betrug (Morgens 8 Uhr) +38,3° C., der Puls ziemlich voll, in der Minute 117, die Respirationszahl 17. Der Urin ist hochgestellt und trübt sich nach kurzem Stehen (harn- und phosphorsaure Salze); Pat. hat in der Nacht 3—4 Mal freiwillig Harn gelassen. Wäre im Schlund nicht das stete Gefühl, das zum Würgen und Brechen zwingt, so würde der übrige Zustand der Pat. leidlich genannt werden können. Es ist wahrscheinlich, dass ein Exsudat im Becken vorhanden ist und durch seine Zersetzung und Resorption das Fieber und das Erbrechen bedingt, doch sind nirgends Schmerzgefühle im Unterleib vorhanden. Nur der Act des Brechens verursacht Schmerz im ganzen Unterleib, vorübergehend.

Da sich die Operirte vor der subcutanen Injection (wegen des geringen Schmerzes) fürchtet, so verzichte ich auf deren weitere Anwendung. Nach Berathung mit Dr. Hamoir beschliessen wir: die Anwendung von Laudan. liq. Sydenhami

zehn Tropfen in lauem Wasser als Klystier, täglich 1, 2 bis 3 Mal; wenn ohne Nutzen: dann die Anwendung von Syrup. morphini, alle 2—3 Stunden einen Theelöffel voll (= 1 Centigramm Morphin). Ausserdem soll eiskalte Bouillon genommen werden. Gegen 10 $\frac{1}{2}$ Uhr wurde das Klystier mit Laudanum applicirt. Hiernach schlummerte die Operirte wohl eine viertel Stunde ziemlich ruhig. Darnach noch mehrmals, wohl fast 1 Stunde im Ganzen. Dann fing das Erbrechen wieder an, wonach ein zweites Klystier mit Laudanum gegeben wurde. Auch hiernach trat wieder Schlaf ein. Das Erbrechen aber kehrte dennoch wieder. Trotzdem aber schienen doch die Opiat-Klystiere das Erbrechen vermindert zu haben. Sehr unangenehm bleibt immer der Umstand, dass die Operirte nicht im Stande ist, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, wodurch ihre Schwäche vergrössert wird. Den Kaffee, welchen sie heut früh genommen, erbrach sie. Ebenso Thee, Bouillon u. s. w. Ein Versuch, einige Austern zu essen, misslang. Pat. hatte grosse Lust zu Orangeade mit Sodawasser, die sie mit grossem Behagen (einige Schluck) trank. Sie hatte Verlangen nach stark moussirendem erfrischenden Bier. Immer aber hatte sie im Schlunde das Gefühl, als müsste eine Speise aus dem verdorbenen Magen heraufgewürgt werden. Im Unterleibe liessen sich häufig Borborygmen hören; bei der dadurch verursachten Darmbewegung empfand Pat. einen geringen Schmerz. Sie sass aber, wenn einmal aufgerichtet, leichter im Bette aufrecht, als gestern und vorgestern. Sie hatte Nachmittags wiederholt, im Ganzen wohl 1 Stunde geschlafen. Gegen 4—5 Uhr war ihr Blick wieder gut, ebenso ihr Habitus. Ihr besserer Zustand blieb den ganzen Abend. Wenn sie geschlafen hatte, so erwachte sie jedes Mal mit Erbrechen (von Wasser mit etwas Galle und Schleim gemischt). Im Ganzen mochte sie am heutigen Tage wohl 3 Stunden geschlafen haben. Abends 6 Uhr hatte sie, bei 15 Respirationen in der Minute, 115 Pulsschläge, und das Thermometer zeigte 38,5° Blutwärme. Urin wiederholt freiwillig gelassen. Abends nach 9 Uhr: drittes Klystier mit Laudanum. Die Operirte schlief in der folgenden Nacht mehr als in den vorhergehenden und auch anhaltender, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ — 1 — 1 $\frac{1}{4}$ Stunden, im Ganzen wohl fünf Stunden. Bei jedem Erwachen trat Erbrechen ein (genossene Flüssigkeit mit etwas Schleim und Galle), continuirlich das bezeichnete Gefühl im Schlunde. Noch nicht eine einzige Blähung nach unten ist bisher abgegangen.

(Fortsetzung folgt.)