[Aus dem staatlich-hygienischen Institut zu Bremen.]

(Mit der Oberleitung beauftragt: Prof. Dr. Tjaden.)

Zur kulturellen Unterscheidung der Typhus-Paratyphus-Colibakterien untereinander.

Von

Dr. W. Buchholz,
Assistenten am Institut.

(Hierzu Taf. II–IV.)

Unter den kulturellen Differenzierungsmethoden, die zur Unterscheidung des Eberth-Gaffkyschen Typhusbazillus von den Paratyphusbazillen und dem *Bacterium coli* dienen, nimmt außer der Prüfung auf Vergärung des Traubenzuckers die von Rothberger¹ 1899 eingeführte Neutralrotprobe eine hervorragende Stelle ein. In der Tat ist das Verhalten des Typhusbazillus dem Neutralrot gegenüber so charakteristisch, daß er sich dadurch scharf von den Bazillen der Paratyphus-Coligruppen unterscheidet.

Der Wert der Probe wurde ursprünglich durch die Umständlichkeit der Herstellung einer Schüttelkultur beeinträchtigt. Scheffler² benutzte statt dessen bekanntlich unter Zusatz von Traubenzucker die Stichkultur. Auch diesem Verfahren haftet noch der Nachteil an, daß die Reaktion verhältnismäßig spät deutlich wird, da vor 24 Stunden eine Veränderung des Nährbodens kaum zu erkennen ist und man bis zur endgültigen Entscheidung oft noch länger warten muß.

Es war daher ein großer Fortschritt, den Oldekop³ durch die Benutzung eines wenig konsistenten Nähragars mit 0.3 Prozent Agargehalt

¹ Rothberger, *Centralblatt für Bakteriologie*. Bd. XXIV. Nr. 14.

² Scheffler, *Ebenda*. Bd. XXVIII. S. 199.

³ Oldekop, *Ebenda*. Bd. XXXV. Orig. S. 120.

erzielte, denn mit Hilfe dieses Agars, dem außer einer kleinen Menge Traubenzucker 1 Prozent einer gesättigten Neutralrotlösung hinzugefügt wird, gelingt es, die charakteristische Reaktion schon nach 14 bis 16 Stunden in ausgeprägteste Form zu erhalten. Neuerdings hat Heller¹ empfohlen, statt des Agars Gelatine zu verwenden, die dann ebenfalls bei 37° gehalten werden soll. Heller gibt jedoch selbst an, daß im allgemeinen der Oldekopsche Agar ein sehr brauchbarer Nährboden für den genannten Zweck sei. Auch Bock² konnte dies neuerdings bestätigen. Jedenfalls läßt der Oldekopsche Agar den Unterschied im Verhalten der Typhusbazillen und der Paratyphusbazillen dem Neutralrot gegenüber in wünschenswertester Deutlichkeit und kürzester Zeit erkennen. Ebenso ist das *Bacterium coli* Escherich durch diese Probe scharf vom Typhus zu trennen, während lediglich die Ruhrbakterien und die ihnen nahestehenden Pseudoruhrstämme sich dem Typhus gleich verhalten, aber schon durch ihre Unbeweglichkeit vom Eberth-Gaffkyschen Typhusbazillus zu trennen sind.

Merkwürdigerweise ist die von Oldekop angegebene Modifikation des Rothberger-Schefflerschen Neutralrotagars keineswegs so allgemein bekannt, wie sie es verdiente; selbst in neuesten Lehrbüchern geschieht ihrer nicht überall Erwähnung.

Es lag nahe, zu untersuchen, ob die von Oldekop empfohlene halbflüssige Konsistenz des Nähragars sich auch bei Prüfung anderer Farbstoffe bewähren würde.

In der Tat hat sich bei umfangreichen Versuchen, die ich in diesem Sinne unternommen habe, herausgestellt, daß der 0.3 bis 0.5 prozentige Nähragar ganz allgemein vorzüglich geeignet ist, die Reduktion von Farbstoffen durch Bakterien zur Erscheinung zu bringen. Auch üben hierbei selbst starke Zusatzmengen von Farbstofflösungen nicht die schädigende Wirkung auf das Wachstum der Bakterien aus, die man z. B. beim Zusatz zur Nährbouillon oder zum gewöhnlichen Nähragar sofort bemerken kann. Man vermag auf diese Weise noch die Reduktion eines ganz beträchtlichen Zusatzes z. B. von Methylenblau oder indig-schwefelsaurem Natrium in kurzer Zeit herbeizuführen, wobei stets ein schmaler Ring der Agarsäule im Röhrchen unmittelbar an der Oberfläche infolge des Kontakts mit dem Sauerstoff der Luft gefärbt bleibt. Hält man jedoch das mit Stichkultur geimpfte Röhrchen unter Sauerstoffabschluß, so vollzieht sich die Reduktion des Farbstoffes in ganzer Ausdehnung des Agars. Auf Anregung des Hrn. Prof. L. Pfeiffer habe ich im hygienischen Institut der Universität Rostock eine Reihe von Anilinfarbstoffen auf ihre Reduktions-

¹ Heller, *Centralblatt für Bakteriologie*. Bd. XXXVIII. Orig. S. 117.

² Bock, *Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamte*. 1906. Bd. XXIV.

fähigkeit durch *Bakterium coli* zu prüfen begonnen, mußte jedoch aus äußeren Gründen die Versuche abbrechen, nachdem ich lediglich die erwähnte Verwendung des Oldekopschen Nähragars als empfehlenswert gegenüber dem auch von mir benutzten Nähragar hatte konstatieren können. Selbständige weitere Versuche, die ich auf Grund bestimmter, von mir gemachter Beobachtungen auf das gesamte Gebiet der Typhus-Paratyphus-Bakterium coli-Gruppen mit Einschluß der Ruhr ausdehnte, fanden ihre Fortsetzung und ihren Abschluß im hygienischen Institut zu Bremen. Über das Ergebnis sei im folgenden berichtet:

Bereits von verschiedenen früheren Untersuchern¹ war festgestellt worden, daß der Typhusbazillus manchen Farbstoffen gegenüber ein anderes Verhalten zeigte, als das *Bacterium coli*. In neuester Zeit hat Löffler² in dem Malachitgrün einen Farbstoff entdeckt, der eine besonders deutliche Unterscheidung beider Gruppen gestattet. Bestimmte mit Malachitgrün versehene Nährböden, nach Löfflers Angaben hergestellt, haben sich bereits als wertvolle Ergänzung der vorhandenen Hilfsmittel in der Bakteriologie des Typhus erwiesen. Die auf diesen Nährböden zu erkennenden Unterschiede im Verhalten der genannten Mikroorganismen lassen sich auch im Agarröhrchen demonstrieren, wenn man den Oldekopschen Agar mit 4 Prozent einer gesättigten Lösung von Malachitgrün 120 (Höchst) versetzt. Diese Zusammensetzung wurde nach zahlreichen Versuchen als die geeignetste gefunden, um besonders den Paratyphusbazillus vom Typus Schottmüller-Kurth gegen den Eberth-Gaffkyschen Typhusbazillus und das *Bacterium coli* abzugrenzen, während ja das Neutralrot eine Trennung des Paratyphus vom *Bacterium coli* nicht gestattet. Andererseits gelingt auch die Unterscheidung des Typhusbazillus vom *Bacterium coli* mit Hilfe des 4prozentigen Malachitgrünagars. Mit Rücksicht auf die Inkonsistenz des von der Fabrik gelieferten Farbstoffes³ ist es gleichwohl zweckmäßig, nötigenfalls die auf 4 Prozent angegebene Menge des Farbstoffzusatzes zum Agar etwas zu verändern, um die angegebenen Reaktionen zu erhalten. Im allgemeinen treten diese um so schärfer hervor, je höher der Malachitgrünzusatz ist, zugleich verlängert sich aber auch die Reaktionszeit.

Impft man ein mit ca. 5^{cem} des genannten Malachitgrünagars gefülltes Röhrchen mit einer 1 bis 2 Tage alten Paratyphuskultur des

¹ Vgl. Neufeld, Typhus im *Handbuch der pathogenen Mikroorganismen* von Kollé-Wassermann. Bd. II.

² Löffler, *Deutsche med. Wochenschrift*. 1906. Nr. 8.

³ Vgl. Leuchs, *Deutsche med. Wochenschrift*. 1906. Nr. 33. — Királyi, *Centralblatt für Bakteriologie*. 1906. Bd. XLII.

Typus B unter 3 maligem Einstich der Nadel, so ist in 16 bis 20 Stunden die ganze Agarsäule entfärbt. Sie hat dann eine hellgelbliche Färbung angenommen, die bisweilen noch einen leicht grünlichen Schimmer zeigt. Sehr oft ist schon in 16 Stunden die Entfärbung ganz oder bis auf einige zerstreute kleine Reste vollendet. Genau das gleiche Resultat ergibt eine Stichkultur des Mäusetyphus oder des *Bacterium enterit. Gärtner*. Impft man zu gleicher Zeit außerdem ein Röhrchen mit Typhus, ein weiteres mit *Bacterium coli*, ein drittes mit dem Paratyphus vom Typus Brion-Kayser, so sieht man in diesen Röhrchen nach Verlauf von 24 Stunden entweder gar keine Veränderung oder höchstens beim Typhus und Paratyphus A eine leichte Aufhellung des grünen Farbtones und beginnende Entfärbung.

Unter keinen Umständen tritt innerhalb der ersten 20 Stunden eine so völlige Umwandlung des Farbstoffes ein wie bei der Gruppe des Paratyphus B-Mäusetyphus-*Bacterium enterit. Gärtner*. Die völlige Entfärbung dauert vielmehr beim Typhus und beim Paratyphus A Brion-Kayser 1 bis 2 Tage, beim *Bacterium coli* 2 bis 4 Tage. Die einzelnen Stämme der gleichen Art zeigen in der Zeitdauer, bis die Entfärbung vollendet ist, oft untereinander noch wieder kleine Unterschiede, die aber nicht konstant zu sein scheinen. Um so schärfer ist in jedem Falle die Abgrenzung gegen den Paratyphus B-Mäusetyphus-*Bacterium enterit. Gärtner* durchzuführen.

Völlig indifferent verhält sich dem Malachitgrünagar gegenüber in der angegebenen Konzentration des Farbstoffes der Ruhrbazillus Shiga-Kruse und seine Verwandten: entweder kommt es zu gar keiner Veränderung oder nach frühestens 3 Tagen bilden sich am unteren Pol der Stichkanäle kleine Entfärbungszonen. Eine völlige Umwandlung des Farbstoffes tritt nie ein. Dabei läßt sich an dem deutlich erkennbaren Auswachsen der Stichkanäle feststellen, daß die Entwicklung der Stichkultur nicht gehemmt ist.

Wie schon Löffler¹ hervorhebt, wird die Entfärbung des Malachitgrüns durch einen höheren Peptonzusatz zum Agar beschleunigt. Nimmt man statt 1 Prozent Pepton bei der Bereitung des 4 prozentigen Malachitgrünagars 5 Prozent Pepton, so ist auch die Stichkultur des Typhus und Paratyphus A in 20 Stunden entfärbt und beim *Bacterium coli* sieht man die Veränderung des Farbstoffes schon in 2 Tagen vor sich gehen. Der Ruhrbazillus ist jedoch erst bei etwa zehnfacher Verdünnung des Farbstoffzusatzes imstande, eine Entfärbung zu erzeugen.

¹ Löffler, a. a. O.

Worauf die Umwandlung des Farbstoffes beruht, ließ sich bisher nicht feststellen. Daß irgend welche aus dem Pepton sich abspaltende Stoffe dabei beteiligt sind, läßt sich aus der Einwirkung des höheren Peptonzusatzes ohne weiteres schließen. Vielleicht spielt die Bildung von Ammoniak dabei eine Rolle, da man durch Zusatz von Ammoniak auch künstlich eine sofortige Entfärbung des Malachitgrüns erzeugen kann. Durch Erhitzen oder Schütteln mit Luft läßt sich die ursprüngliche Farbe nicht wiederherstellen, wie dies z. B. beim Methylenblau eintritt, wo anscheinend eine einfache Reduktion durch Sauerstoffverbrauch seitens der Bakterien vor sich geht. Unter diesen durch die reduzierende Tätigkeit von Bakterien veränderlichen Farbstoffen fanden sich die aus den Orseilleflechten gewonnenen Farbstoffe, das Orcëin und der Lackmus, besonders geeignet zur Unterscheidung der Typhus-Paratyphus-Coli-Bazillen untereinander, da sie einer durchaus ungleichmäßigen Einwirkung seitens der einzelnen Bakteriengruppen unterliegen, die sich wieder scharf trennt von deren Verhalten dem Malachitgrün gegenüber.

Setzt man zu einem Nähragar nach Oldekops Vorschrift, jedoch mit 0.5 Prozent Agargehalt, 5 Prozent einer mit 50 Prozent Alkohol hergestellten gesättigten Orcëinlösung, so bemerkt man nach Anlage der entsprechenden Stichkulturen, daß die mit Typhus, Paratyphus B — Mäusetyphus — *Bacillus enterit*. Gärtner geimpften Röhrechen nach 10 bis 20 Stunden bis auf einen schmalen Ring an der Oberfläche völlig entfärbt sind und ein helles klares Ockergelb zeigen, während die mit dem Paratyphus A, dem *Bacterium coli* und dem Ruhrbazillus geimpften Röhrechen ganz unverändert sind. Erst nach mehreren Tagen zeigt sich bei den ersten beiden eine leichte Aufhellung der Färbung, wohingegen die Ruhr auch nach einigen Tagen noch die gleiche Beschaffenheit des Röhrechens wie zu Anfang zeigt, sich also auch hier wieder ganz indifferent erweist.

Ähnlich sind die Resultate, wenn man dem 0.5 prozentigen Agar 15 Prozent einer Lackmuslösung, die 1 Prozent Lackmus enthält, hinzufügt. Die Entfärbung tritt in diesem Falle bei den Typhus-Paratyphus B-Bazillen, dem Mäusetyphus und *Bacillus enterit*. noch früher ein als bei den Orcëinröhrechen. Schon nach 10 Stunden ist sie beim Paratyphus B völlig, beim Typhus größtenteils eingetreten. Öfter sieht man bei nicht ganz vollendeter Entfärbung eine wolkige, flockige Verteilung von Farbstoffresten in der bereits entfärbten übrigen Substanz.

Die mit dem Paratyphus A, dem *Bacterium coli*, dem Ruhrbazillus geimpften Röhrechen zeigen auch hier wieder trotz deutlichen Wachstums der Stichkultur zunächst unverändertes Aussehen. Innerhalb 36 bis 48 Stunden tritt die Entfärbung beim *Bacterium coli* ein, während beim

Paratyphus A Brion-Kayser und dem Ruhrbazillus Shiga-Kruse erst nach 3 bis 4 Tagen eine leichte Aufhellung des Farbtones beginnt.

Die Orcëinröhrchen und Lackmusröhrchen (unter dem Namen Orseille-röhrchen zusammengefaßt) sind nach der Entfärbung durch Erwärmen oder Schütteln mit Luft nur unvollkommnn wieder auf den früheren Färbungsgrad zurückzubringen. Beim Erwärmen tritt ein intensiver Schwefelwasserstoffgeruch besonders beim Paratyphus B auf, zugleich wird Bleipapier geschwärzt.

Bei nachträglicher Durchsicht der Literatur fand ich eine vereinzelte Angabe von Wolff¹, wonach das Orcëin vom Typhusbazillus rascher reduziert wird, als vom Bacterium coli. Ferner erschien im Laufe meiner Untersuchungen eine Arbeit von Zupnik², in der ein mit Lackmustinktur gefärbter Nährboden angegeben wird, der ebenfalls die Unterscheidung des Paratyphus A vom Paratyphus B und Typhusbazillus bezweckt, jedoch unter Verwendung von 2 prozent. Nähragar und Zusatz von Erythrit oder Raffinose. Da die erheblich einfachere Herstellung der oben angegebenen Lackmusröhrchen dieselben Resultate in kürzester Zeit ermöglicht, lag kein Grund zu einer Nachprüfung des von Zupnik empfohlenen Nährbodens vor.

Es sind im Laufe der letzten Monate von mir 40 Typhusstämme des Eberth-Gaffkyschen Typus, 28 Paratyphusstämme des Typus Schottmüller-Kurth (B), 7 Paratyphusstämme des Typus Brion-Kaiser (A), 2 Stämme von Mäusetyphus, 9 Stämme des Bacillus enterit. Gärtner (I und II), 6 Stämme des Ruhrbazillus Shiga-Kruse und eine größere Zahl von Stämmen des Bacterium coli verschiedenster Herkunft der Prüfung auf den angegebenen Nährböden unterzogen worden. Sämtliche Stämme von Typhus, Paratyphus A und B, Mäusetyphus, Bacillus enterit. Gärtner I und II, Ruhr zeigten das für die betreffende Art charakteristische Verhalten. Auch das Bacterium coli des Escherichschen Typus ließ stets das oben beschriebene Verhalten erkennen. Um so wechselnder waren die Ergebnisse bei Prüfung zahlreicher weiterer Bakterien der Darmflora, die bisher noch vielfach in ziemlich summarischer Weise dem Bacterium coli zugezählt zu werden pflegen, vielfach auch in ihrem Wachstum auf dem Endo- bzw. Drigalski-Conradi-Agar ein vollkommen typhusähnliches Aussehen zeigen und infolgedessen öfter Gelegenheit zu unliebsamen Verwechslungen geben können. Der von Petruschky beschriebene Bacillus faecalis alkaligenes³ scheint unter den Darmbewohnern nicht sehr

¹ Wolff, *Centralblatt für Bakteriologie*. Bd. XXVII. S. 849.

² Zupnik, *Diese Zeitschrift*. Bd. LII.

³ Vgl. Neufeld, a. a. O. — Petruschky, *Centralblatt für Bakteriologie*. Bd. XIX. S. 187.

häufig zu sein. Ich selbst habe ihn nur selten gefunden und Graeff¹ ist es bei einer größeren Reihe von Stuhluntersuchungen nicht gelungen, ihn festzustellen. Weitaus häufiger sind unter den typhusähnlich wachsenden und lebhafte Beweglichkeit zeigenden Darmbakterien vom Alkaligenestypus diejenigen, die Neutralrot rasch entfärben und Traubenzucker vergären, während sie sich in der Indolbildung, der Milchgerinnung, dem Verhalten in den Malachitgrün-Orseilleröhrchen wesentlich unterscheiden. Jedenfalls steht die Mehrzahl dieser Alkaligenesformen dem Paratyphus B vom Typus Schottmüller-Kurth viel näher in kultureller Beziehung wie dem Eberth-Gaffkyschen Typhusbazillus. Soweit bisher zu übersehen, ist lediglich die dauernde, schließliche Blaufärbung der Lackmusmolke ein dem Paratyphusbazillus vom Typus B, dem Mäusetyphus und *Bacterium enterit.* eigenes Merkmal, das sie zwar auch nicht ausschließlich auszeichnet, aber im Verein mit den anderen kulturellen Eigentümlichkeiten ihre Unterscheidung auch von einem sonst sehr ähnlichen Alkaligenesstamm gestattet. Denn es vermögen zwar auch alle Alkaligenesarten die Lackmusmolke nach kurzer, anfänglicher Rötung zu bläuen, aber es erfolgt nach einigen Tagen bzw. 1 Woche stets ein endgültiger Umschlag in eine zweite dauernde Rötung.² Bemerkenswert ist ferner, daß ein manchmal im Kot zu findendes, lebhaft bewegliches Stäbchen vom kulturellen Charakter des *Proteus vulgaris* sich dem Paratyphus B auf den oben angegebenen Nährböden völlig gleich verhält, auch die Lackmusmolke dauernd bläut, jedoch die Gelatine in 2 Tagen verflüssigt und damit sofort vom Paratyphus zu trennen ist.

Auch Rolly³ macht auf die Möglichkeit einer Verwechslung dieses Mikroorganismus mit dem Paratyphusbazillus aufmerksam. Die Prüfung des Gelatinewachstums ist daher stets notwendig, um einen zweifelhaften Stamm zu identifizieren.

Die Bildung von Indol ist eine weder bei dem *Bacterium coli* noch bei den Alkaligenesarten regelmäßig vorkommende Eigenschaft. Es gibt unzweifelhaft Stämme aus diesen Gruppen, die kein Indol bilden. Zur Prüfung der Indolbildung ist die neuerdings von Boehme⁴ empfohlene Ehrlichsche Indolreaktion vorzüglich geeignet. Sie gestattet den Nachweis von Indol oft noch in den Fällen, in denen die bisher übliche Nitroso-Indolreaktion versagt.

Ebensowenig wie die Indolbildung kann die Gerinnung der Milch

¹ Graeff, *Diese Zeitschrift*. Bd. LIV.

² Eine Ausnahme bildet nur der *B. faecalis alkaligenes*, bei dem dieser Umschlag nicht erfolgt.

³ Rolly, *Münchener med. Wochenschrift*. 1906. Nr. 37.

⁴ Boehme, *Centralblatt für Bakteriologie*. Bd. XL. Orig.

eine ausschlaggebende Rolle bei der Identifizierung eines zweifelhaften Stammes beanspruchen. Es gibt gerade unter den typhus- bzw. paratyphusähnlichen Alkaligenesarten eine ganze Anzahl, die die Milch nicht zur Gerinnung zu bringen. Das gleiche wechselnde Verhalten beobachtet man gegenüber dem Traubenzucker. Außer den erwähnten Bakteriengruppen wurden je ein Stamm des für Ratten pathogenen Bac. Danysz und der Schweinepest auf ihr Verhalten gegenüber den angegebenen Nährböden geprüft. Während der Bac. Danysz sich völlig dem Paratyphus B-Mäusetyphus gleich verhielt, zeigte der Schweinepeststamm nicht die erwartete Ähnlichkeit mit dieser Gruppe, sondern verhielt sich in seiner Indifferenz gegenüber dem Malachitgrün und in den Orseilleröhrchen eher dem Paratyphus A und der Ruhr gleich.¹ Völlig unverändert ließ sämtliche Farbstoffnährböden der bisweilen in den Faeces zu findende Bac. pyocyaneus. Nur die Lackmusmolke wird von diesem lebhaft beweglichen Stäbchen intensiv und dauernd gebläut.

Zur Herstellung des Malachitgrünagars und der Orseilleröhrchen ist zu bemerken, daß die gesättigten Farblösungen in filtriertem Zustande dem heißflüssigen, fertigen Agar zuzusetzen sind. Nach Zusatz des Malachitgrüns und der Lackmuslösung wird der Agar am besten sofort in Röhrchen gefüllt und kurz nochmals aufgekocht. Es ist zu beachten, daß das Malachitgrün sich bei zu langem Kochen leicht zersetzt. Der Inhalt der Röhrchen muß völlig klar und durchsichtig sein. Der Malachitgrünagar ist wie der Neutralrotagar vor Licht zu schützen. Letzterer nimmt bei längerem Stehen gleichwohl eine hellere Färbung an, bleibt aber trotzdem brauchbar.

Der Zusatz der alkoholischen Orcäinlösung zum Agar bewirkt einen Ausfall schwärzlicher Flocken in der heißen Lösung, die erst durch 2 maliges Filtrieren ganz zu entfernen sind. Beim Verbleiben in dem Agar stören sie das Bild der Entfärbung außerordentlich, da sie nicht mit entfärbt werden. Die fertigen Röhrchen müssen ein schönes klares Weinrot zeigen.

Das Orcäin wurde von Dr. Grübler, Leipzig, bezogen, der Lackmus in Substanz von Kahlbaum, Berlin, das Malachitgrün 120 von den Höchster Farbwerken.

Für die Anlage der StICKKulturen bedient man sich am besten einer an der Spitze lanzettartig verbreiterten Platinnadel, die etwa zur Hälfte der einen Lanzettseite mit der zu impfenden Kultur beschickt und dann 3 mal durch die ganze Agarsäule gestochen wird. Die benutzte Kultur-

¹ Anm. bei der Korrektur. Ein mittlerweile geprüfter zweiter Schweinepeststamm zeigte sich kulturell durchaus dem Paratyphus B gleich. Der oben erwähnte Stamm zeigt auf allen künstlichen Nährböden ein so kümmerliches Wachstum, daß er nicht als typischer Vertreter der Art gelten kann.

menge muß bei allen Stämmen möglichst gleichmäßig sein. Bei zu geringer Menge versagt die Reaktion besonders beim Malachitgrün manchmal ganz oder sie tritt verspätet ein. Alte Agarkulturen geben verzögerte Reaktionen. Am intensivsten treten die letzteren bei frisch aus dem Körper gezüchteten 24 bis 48 stündigen Agarkulturen auf. Zur Vergleichung der Reaktionszeiten empfiehlt es sich in Zweifelfällen, gleichzeitig mit dem zu prüfenden Mikroorganismus eine entsprechende Reihe von Röhrchen mit einem sicher identifizierten Stamm der gleichen Art zu impfen bzw. derjenigen Art, die man in dem zu prüfenden Stamm vermutet. Dies ist schon deshalb empfehlenswert, weil geringe Schwankungen in der Zusammensetzung der Nährböden, betreffend Alkaleszenz, Agargehalt usw., wie sie in der Praxis öfter vorkommen, die Reaktionszeiten beeinflussen können. Sowohl eine Erhöhung des Agargehalts wie eine solche des Farbstoffzusatzes läßt die Reaktionen verspätet auftreten und umgekehrt.

Als Ergebnis der vorliegenden Untersuchungen läßt sich folgendes zusammenfassen (siehe die beigelegten Taf. II bis IV):

1. Der Eberth-Gaffkysche Typhusbazillus, die Paratyphusbazillen vom Typus Schottmüller-Kurth mit Einschluß des Mäusetyphus und des *Bac. enterit.* Gärtner, der Paratyphus vom Typus Brion-Kayser, das *Bacterium coli* und der Ruhrbazillus Shiga-Kruse lassen sich in ihrem Verhalten gegenüber dem Neutralrot, dem Malachitgrün und den Farbstoffen der Orseilleflechten als scharf unterschiedene Gruppen auch kulturell voneinander trennen.

Die Unterschiede treten am schnellsten und deutlichsten bei Verwendung eines wenig konsistenten Agars auf, unter Zusatz bestimmter Mengen der einzelnen Farbstoffe. Am besten eignet sich der einer kolloidalen Lösung nahekommende 0.3 bis 0.5 proz. Nähragar nach Oldekop.

Durch Verwendung flüssiger Nährsubstrate wird die gleiche Erscheinung nicht oder sehr viel undeutlicher hervorgerufen.

Um die Reaktionen in der angegebenen Zeit erscheinen zu lassen, bedarf es in jedem Falle der für die betreffenden Keime optimalen Temperatur. Es besteht daher ein Zusammenhang zwischen Reaktion und Lebenstätigkeit der Bakterien.

2. Der Eberth-Gaffkysche Typhusbazillus läßt das Neutralrot stets unverändert. Er entfärbt die Orseilleröhrchen im Laufe der ersten 20 Stunden, das Malachitgrünröhrchen spätestens im Laufe des 2. Tages. Durch diese Reaktionen läßt sich der Typhusbazillus bei gleichzeitiger Prüfung des Verhaltens zum Traubenzucker ohne weiteres scharf von allen folgenden Gruppen trennen.¹

¹ Der *B. faecalis alkaligenes* läßt die Röhrchen noch nach Tagen völlig unverändert und gestattet dadurch ebenfalls eine sofortige Trennung vom Typhusbazillus.

3. Die Paratyphusbazillen vom Typus Schottmüller-Kurth mit Einschluß des Mäusetyphus und des Bac. enterit. Gärtner zeichnen sich durch schnelle Entfärbung sämtlicher angegebenen Nährböden im Laufe des ersten Beobachtungstages aus. Die Entfärbung geht oft schon in 12 Stunden vor sich. Sie unterscheiden sich durch dies Verhalten scharf vom Typhus wie auch vom Paratyphus A, Bacterium coli und der Ruhr. Nicht zu trennen sind sie dagegen durch dies Verhalten von einzelnen, kulturell ihnen sehr ähnlichen Arten alkalibildender Darmbakterien.

4. Der Paratyphus A, Typus Brion-Kayser, verändert die Orseille-röhrchen nicht oder erst im Laufe mehrerer Tage und läßt sich dadurch sofort von den Vertretern der vorigen Gruppen abgrenzen. Sein Verhalten gegenüber dem Malachitgrün gleicht ungefähr dem des Typhusbazillus. Doch entfärbt er im Unterschied zu diesem das Neutralrot, und zwar etwas langsamer als der Paratyphus B.

5. Das Bacterium coli zeigt gegenüber dem Malachitgrün eine weitere Verlängerung der Reaktionszeit im Vergleich zu den vorhergehenden Gruppen. Die Reduktion der Orseilleröhrchen erfolgt deutlich später als beim Typhusbazillus und beim Paratyphus B, dagegen früher als beim Paratyphus A. Neutralrot wird stets entfärbt, wenn auch etwas langsamer als beim Paratyphus B und A.

6. Der Ruhrbazillus Shiga-Kruse verändert keinen der angegebenen Nährböden in den ersten Tagen. Völlige Entfärbung tritt auch nach längerer Zeit nicht ein.

7. Auch unter denjenigen Bakterien der menschlichen Darmflora, die den vorerwähnten Gruppen nicht angehören, lassen sich mit Hilfe der angegebenen Nährböden und der übrigen Kulturmethode verschiedene, mehr oder weniger scharf voneinander abgegrenzte Arten feststellen. Manche auf dem Endo- bzw. Conradi-Drigalski-Agar typhusähnlich wachsende Darmbakterien ähneln auch im übrigen kulturell dem Typhus, andere stehen dem Paratyphus B oder der Ruhr nahe. Bei Benutzung der bisher üblichen Kulturmethode und der oben angegebenen Nährböden gelingt jedoch eine Trennung der pathogenen und nichtpathogenen Keime. Weitere eingehende Untersuchungen dieser typhusähnlichen bzw. ruhr-ähnlichen Mikroorganismen dürften auch für die Frage des Bestehens von Übergangstypen zwischen pathogenen und nichtpathogenen Angehörigen der umfangreichen Familie Typhus-Paratyphus-Bacterium coli-Ruhr von Bedeutung sein. Eine endgültige Differenzierung der einzelnen Arten bedarf jedoch außer den kulturellen auch der serodiagnostischen Methoden, da kulturelle Ähnlichkeiten nicht ohne weiteres die Annahme verwandtschaftlicher Stellung zu rechtfertigen scheinen.

Die bei der vorliegenden Untersuchung verwandten Typhusstämme und ein Teil der Paratyphusstämme vom Typus Schottmüller-Kurth, ferner 2 Enteritisstämme wurden von mir im hygienischen Institut zu Bremen aus eingesandtem Untersuchungsmaterial reingezüchtet und mit den üblichen Kulturmethoden sowie durch die Agglutinationsprüfung mit hochwertigem, spezifischem Serum in ihrer Identität festgestellt. Ebenso wurden die untersuchten Colistämme, Alkaligenesstämme, Ruhrstämme und die übrigen Darmbakterien aus Untersuchungsmaterial verschiedenster Herkunft im Institut gewonnen. Ein Mäusetyphusstamm und der Rattenbazillus Danysz waren unter den Beständen des Instituts vorhanden, ein Schweinepeststamm war im tierpathologischen Institut zu Rostock gezüchtet. Die Paratyphusstämme vom Typus Brion-Kayser verdanke ich, mit Ausnahme eines von Kral, Prag, bezogenen, der Liebenswürdigkeit der Herren Stabsarzt Dr. Kutscher, kommandiert zum Institut für Infektionskrankheiten in Berlin, Oberarzt Dr. Kayser, kommandiert zum hygienischen Institut der Universität Straßburg und Oberarzt Dr. Christian, kommandiert zum hygienischen Institut der Universität Berlin. Genannten Herren bin ich ebenso für Überlassung einiger Stämme des Paratyphus B, eines Mäusetyphusstammes und des Bac. enterit. Gärtner zu großem Dank verpflichtet. Einige weitere Stämme des Gärtnerschen Typus und einen Schweinepeststamm übersandte mir Hr. Prof. Dr. Neufeld vom Kaiserl. Gesundheitsamte auf meine Bitte; zwei Stämme des Bac. faecalis alkaligenes erhielt ich von Hrn. Prof. Dr. Petruschky, Danzig. Sämtlichen Herren sei auch an dieser Stelle mein aufrichtiger Dank für freundliche Erfüllung meiner Bitte ausgedrückt.

Erklärung der Abbildungen.

(Taf. II—IV.)

Je 6 untereinanderstehende Röhrchen bilden eine Farbstoffeinheit in der Reihenfolge: Neutralrot, Malachitgrün, Lackmus, Orcëin.

Den Anfang bildet jedesmal das unveränderte Röhrchen. Es folgen dann der Reihe nach die mit einer Typhuskultur geimpften Röhrchen (*T*), die mit Paratyphus B bzw. Mäusetyphus oder Bac. enterit. Gärtner geimpften (*B*), die mit Paratyphus A geimpften (*A*), die mit Bacterium coli geimpften (*C*), die mit Ruhr geimpften (*R*).

Fig. 1 veranschaulicht die nach ca. 12 Stunden vorgegangene Veränderung in der Färbung der Röhrchen.

Fig. 2 zeigt das Aussehen der Röhrchen nach ca. 24 Stunden.¹

Fig. 3 zeigt das Aussehen der Röhrchen nach 36 bis 43 Stunden.

¹ Die Malachitgrünröhrchen können bei einzelnen Stämmen des Typhus und Paratyphus A nach dieser Zeit bereits beginnende Entfärbung zeigen.

T

B

A

C

R

T

B

A

C

R