Ich theile die bezüglichlichen Bestimmungen nachstehend mit. Das Senföl aus *sinapis juncea* und das aus *sinapis nigra* waren von Schimmel & Co. in Leipzig aus unzweifelhaft ächtem Samen, das künstliche Senföl von C. A. F. Kahlbaum in Berlin mit grösster Sorgfalt dargestellt worden.

Bestimmung des Schwefelkohlenstoffgehaltes im Senföl
aus *sinapis juncea*.

- I. 100 g Senföl lieferten 1,0431 g Triäthylphosphinverbindung, entsprechend 0,4086 g = 0,41 Proc. Schwefelkohlenstoff.
- II. 70 g Senföl lieferten 0,6592 g Triäthylphosphinverbindung, entsprechend 0,2582 g = 0,37 Proc. Schwefelkohlenstoff.

Bestimmung des Schwefelkohlenstoffgehaltes im Senföl
aus *sinapis nigra*.

- I. 102 g Senföl lieferten 1,3208 g Triäthylphosphinverbindung, entsprechend 0,5174 g = 0,51 Proc. Schwefelkohlenstoff.
- II. 120 g Senföl lieferten 1,7028 g Triäthylphosphinverbindung, entsprechend 0,6670 g = 0,56 Proc. Schwefelkohlenstoff.

Bestimmung des Schwefelkohlenstoffgehaltes im künstlichen Senföl, aus Jodallyl und Schwefelcyanammonium dargestellt.

100 g künstliches Senföl lieferten 0,8181 g Triäthylphosphinverbindung, entsprechend 0,32 g = 0,32 Proc. Schwefelkohlenstoff.

IV. Specielle analytische Methoden.

1. Auf Lebensmittel, Handel, Industrie, Agricultur und Pharmacie bezüglichliche.

Von

W. Lenz.

Zur Bestimmung der organischen Verunreinigungen des Trinkwassers*) hat G. Lechartier**) die bekannte Frankland'sche***)

*) Vergl. diese Zeitschr. 19, 491.

**) Ann. de chim. et de phys. [V sér.] 19, 257.

***) Diese Zeitschr. 8, 485.

Methode modificirt, indem er, wie Dittmar und Robinson*) die Bestimmung des Kohlenstoffs getrennt von der des Stickstoffs vornimmt. Erstere wird nach den Angaben Frankland's ausgeführt, bei letzterer werden die Carbonate und Nitrate des Wassers nicht durch schweflige Säure (und Eisenoxydulsalz) zerstört, sondern durch Eindampfen von 1 *l* Wasser mit circa 0,2 *g* gebrannter Magnesia das Ammoniak entfernt. Bei der nun folgenden volumetrischen Bestimmung des im erhaltenen trocknen Rückstande befindlichen Stickstoffs durch Verbrennung erhält man die Summe des einerseits in Form von salpetersauren resp. salpetrigsauren Salzen, und andererseits in organischen Verbindungen vorhanden gewesenen Stickstoffs. Bezüglich Ausführung dieser Verbrennung kann hier nur auf die ausführlichen Angaben des Originals verwiesen werden.

Zur Milchanalyse.**) Alexander Müller hat den schon vor geraumer Zeit veröffentlichten vorläufigen Mittheilungen***) über seine Methode der Milchanalyse nunmehr die früher versprochene ausführliche Abhandlung †) folgen lassen. Als aussergewöhnliche Apparate dienen kleine Digestionsfläschchen von höchstens 25 *g* Gewicht, welche den Schüttelfläschchen zur Gay-Lussac'schen Silbertitrirung nachgebildet sind; Durchmesser ungefähr 35 *mm*, Höhe des cylindrischen Theiles circa 55 *mm* bei 60—65 *cc* Inhalt. Der Hals ist 12 *mm* weit und in ihm äusserst fein ein hohler Glasstopfen mit Kugelgriff eingerieben. ††) In das Digestionsfläschchen bringt man aus der sorgfältig bereiteten Mittelprobe der Milch 6 *cc* und wägt. Hierzu fügt man 50 *cc* eines in mittelgrossen Standflaschen (ca. 1 *l*) vorrätigen Gemisches von 1 Vol. absol. Alkohol und 3 Vol. absol. Aether. Den Resttropfen beim Ausfluss der Pipette bläst man nicht mit dem Munde aus, da sich so in der Pipette leicht Wasser condensirt, sondern mittelst eines Kautschukbällchens, das man mit leichtem Druck an die obere Oeffnung auf einen Augenblick ansetzt. Wägung des Digestionsfläschchens mit Milch und Reagens ist nicht nothwendig, aber eine gute Controle des Arbeitens. Das Fläsch-

---

*) Diese Zeitschr. 19, 491.

**) Vergl. die Literaturangabe in dieser Zeitschr. 19, 368.

***) Diese Zeitschr. 2, 107; 11, 285.

†) Forschungen auf dem Gebiete der Viehhaltung etc. Vom Verfasser eingesandt.

††) Solche Fläschchen sind durch Franz Schmidt & Haensch in Berlin zu beziehen.