Über ein zentrales Sinnesorgan (?) bei den Vertebraten.

Von

Erik Agduhr.

(Aus dem Anatomischen Institut der Kgl. Tierärztlichen Hochschule in Stockholm.)

Mit 18 Tafeln.

(Eingegangen am 1. Juli 1922.)

Inhaltsverzeichnis.

Einleitung (S. 225).	Osmerus eperlanus (S. 253).
A. Material (S. 227).	Alburnus alburnus (S. 253).
B. Technik (S. 229).	Tinca tinca (S. 253).
C. Über die intraependymalen Nervelemente (S. 230).	Cyprinus auratus, carassius f. gibelio et carassius (S. 254).
a) Literaturübersicht (S. 230).	Anguilla anguilla (S. 254).
b) Medulla spinalis (S. 232).	Spinachia spinachia (S. 254 u. 256).
α) Vorkommen und Morphologie der intraependymalen Nervelemente (S. 232).	Gaidropsarus mustela et cimbrius (S. 256).
I. Leptocardii (S. 232).	Molva molva (S. 256).
Amphioxus lanceolatus (S. 232).	Merluccius merluccius (S. 256).
II. Cyclostomata (S. 238).	Gadus esmarkii, pollachius, virens, minutus, luscus, merlangus et callarias (S. 253, 254, 255 u. 257).
Myxine glutinosa (S. 239).	Pleuronectes limanda, platessa et kitt (S. 257).
Ammocoetes (S. 240).	Arnoglossus laterna (S. 257).
Petromyzon fluviatilis (S. 244).	Hippoglossoides platessoides (S. 257).
III. Pisces (S. 246).	Hippoglossus hippoglossus (S. 257).
Myliobatis aquila (S. 246).	Lycodes gracilis (S. 254).
Trygon pastinaca et violacea (S. 246).	Zoarces viviparus (S. 257).
Raja batis, radiata et clavata (S. 247).	Anarrhichas lupus (S. 257).
Spinax niger (S. 247).	Callionymus lyra (S. 253 u. 258).
Centrophorus granulosus (S. 248).	Trigla gurnardus (S. 258).
Squalus acanthias (S. 248).	Cottus bubalis et scorpius (S. 258).
Notidanus cinereus et griseus (S. 251).	Sebastes viviparus (S. 254).
Mustelus laevis (S. 251).	Gobius flavescens, niger et pictus (S. 253).
Sphyrna zygaena (S. 251).	Scomber scomber (S. 254).
Galeus canis (S. 251).	Trachurus trachurus (S. 254).
Chimaera monstrosa (S. 252).	Labrus exoletus, melops, rupestris, mixtus et berggylta (S. 253, 254 u. 258).
Acipenser sturio (S. 252).	Ceratodus Forsteri (S. 254).
Cyclotone microdon et signata (S. 254).	
Argentinasphyraena (S. 254).	

IV. Amphibia (S. 258).

- Amblystoma mexicanum* (S. 258).
- Molge vulgaris et palustris* (S. 259).
- Rana arvalis, temporaria et esculenta* (S. 259).
- Hyla arborea* (S. 260).
- Bufo calamita, viridis et bufo* (S. 260).

V. Reptilia (S. 260).

- Lacerta vivipara et agilis* (S. 260).
- Ascalabotes fascicularis* (S. 260).
- Anguis fragilis* (S. 261).
- Vipera berus* (S. 261).
- Tropidonotus natrix* (S. 261).
- Coronella austriaca* (S. 262).
- Chrysemys marginata* (S. 262).
- Emys europaea* (S. 262).
- Testudo graeca* (S. 262).
- Alligator mississippiensis* (S. 262).

VI. Aves (S. 262).

- Uria troille* (S. 263).
- Sterna hirundo et minuta* (S. 263).
- Larus argentatus et ridibundus* (S. 263).
- Anser anser* (S. 263).
- Cygnus olor* (S. 264).
- Anas platyrhyncha* (S. 264).
- Somateria mollissima* (S. 264).
- Scolopax rusticola* (S. 264).
- Totanus totanus* (S. 264).
- Numenius phaeopus et arquatus* (S. 265).
- Haematopus ostralegus* (S. 265).
- Lyrurus tetrix* (S. 266).
- Meleagris gallopavo* (S. 266).
- Gallus domesticus* (S. 266).
- Perdix perdix* (S. 267).
- Columba aenas* (S. 267).
- Circus aeruginosus* (S. 267).
- Accipiter nisus* (S. 267).
- Milvus milvus* (S. 267).
- Pandion haliaëtus* (S. 267).
- Buteo buteo* (S. 268).
- Falco subbuteo, peregrinus et merillus* (S. 268).
- Syrnium aluco* (S. 268).
- Asio accipitrinus et otus* (S. 269).
- Dryobates major* (S. 269).
- Picus viridis* (S. 269).

- Eustephanus galeritus* (S. 269).
- Dandalus rubecula* (S. 270).
- Tardus pilaris* (S. 270).
- Regulus regulus* (S. 270).
- Parus caeruleus, palustris et major* (S. 270).
- Sitta europaea* (S. 270).
- Motacilla alba* (S. 270).
- Emberiza hortulana* (S. 271).
- Passer domesticus et montanus* (S. 271).
- Chloris chloris* (S. 271).
- Linota cannabina* (S. 271).
- Carduelis carduelis* (S. 271).
- Pyrrhula pyrrhula* (S. 271).
- Serinus canaria* (S. 271).
- Pinicola enucleator* (S. 272).
- Pica pica* (S. 272).
- Coloeus monedula* (S. 272).
- Corvus cornix* (S. 272).

VII. Mammalia (S. 273).

- Ornithorhynchus anatinus* (S. 273).
- Didelphys virginiana* (S. 273).
- Halmaturus Benetti* (S. 273).
- Erinaceus europaeus* (S. 274).
- Sorex minutus* (S. 275).
- Talpa europaea* (S. 275).
- Vespertilio mystacinus* (S. 276).
- Synotis barbastellus* (S. 276).
- Vesperugo pipistrellus* (S. 276).
- Dasyppus setosus* (S. 276).
- Sciurus vulgaris* (S. 277).
- Mus musculus, var. albus, norvegicus et rattus* (S. 277).
- Lepus timidus et cuniculus* (S. 278 u. 279).
- Cavia cohaya* (S. 280).
- Phoca vitulina* (S. 281).
- Lynx lynx* (S. 282).
- Felis domestica* (S. 283).
- Mustela erminea* (S. 283).
- Lutra lutra* (S. 284).
- Canis familiaris, lupus et aureus* (S. 284—287).
- Equus caballus et asinus* (S. 288 u. 289).
- Bos taurus* (S. 289).
- Bison bonasus* (S. 295).
- Capra hircus* (S. 296).
- Ovis aries* (S. 297).
- Rangifer tarandus* (S. 298).
- Alces alces* (S. 298).
- Capreolus capreolus* (S. 299).
- Dama dama* (S. 299).
- Sus scrofa domestica* (S. 299).

- Cynocephalus babuin (S. 300).
 Macacus rhesus (S. 300).
 Cercopithecus mona (S. 301).
 Homo sapiens (S. 301).
- β) Die Entwicklung der intraependymalen Nervenzellen (S. 302).
 Ammocoetes (S. 306).
 Spinax niger (S. 306).
 Squalus acanthias (S. 306).
 Dasypus setosus (S. 306).
 Lepus cuniculus (S. 303).
 Bos taurus (S. 305).
 Capra hircus (S. 306).
 Alces alces (S. 306).
 Sus scrofa domestica (S. 306).
 Homo sapiens (S. 306).
- c) Medulla oblongata (S. 306).
 α) Vorkommen und Morphologie der intraependymalen Nervelemente (S. 306).
 Ammocoetes (S. 306).
 Petromyzon fluviatilis (S. 307).
 Raja batis, radiata et clavata (S. 307).
 Squalus acanthias (S. 307).
 Chimaera monstrosa (S. 310).
 Salmo trutta fario (S. 310).
 Osmerus eperlanus (S. 311).
 Alburnus alburnus (S. 311).
 Merlucius merlucius (S. 311).
 Gadus pollachius et luscus (S. 312).
 Pleuronectes limanda (S. 312).
 Anarrhichas lupus (S. 312).
- Lacerta vivipara (S. 312).
 Regulus regulus (S. 312).
 Parus major (S. 312).
 Corvus cornix (S. 313).
 Sorex minutus (S. 313).
 Lepus cuniculus (S. 313).
 Bos taurus (S. 313).
 Rangifer tarandus (S. 313).
- D. Über den sogenannten *Reissnerschen* Faden (S. 314).
 a) Literaturübersicht (S. 314).
 b) Über das Vorkommen, die Färbbarkeit und die Morphologie des *Reissnerschen* Fadens (S. 316).
 c) Über die Entwicklung des *Reissnerschen* Fadens (S. 321).
 Squalus acanthias (S. 321).
 Mus musculus var. albus (S. 322).
 Lepus cuniculus (S. 323).
 Bos taurus (S. 323).
 Zusammenstellung und Kritik der Ergebnisse (S. 327).
 d) Über das Wachstum des *Reissnerschen* Fadens (S. 329).
 e) Über die Bedeutung des *Reissnerschen* Fadens (S. 330).
 Petromyzon fluviatilis (S. 330).
 Osmerus eperlanus (S. 331).
- E. Zusammenfassung (S. 333).
 F. Nachschrift zum Manuskript (S. 343).
 G. Tabelle (S. 347).
 H. Literaturverzeichnis (S. 352).
 I. Tafeln mit Figurenerklärungen (S. 355).

Einleitung.

Bei meinen Untersuchungen über das Ependym der Medulla spinalis hinsichtlich des Vorkommens von Keimzellen, die während des postfötalen Lebens u. a. sich zu Nervenzellen entwickeln können, wurde beim Rinde meine Aufmerksamkeit auf einen Zelltyp gelenkt, der in Form und Bau von den fraglichen Keimzellen und den langen und schmalen eigentlichen Ependymzellen bedeutend abwich. Bei näherer Untersuchung zeigte sich, daß dieser Zelltyp die wesentlichsten Merkmale einer gewöhnlichen Nervenzelle aufwies, wie z. B. einen bläschenförmigen und chromatinarmen Kern mit Nißlkörnchen und Neurofibrillen im Protoplasma. Diese Zellen waren zudem bedeutend größer als die eigentlichen Ependymzellen und sandten einen kräftigen Ausläufer in das Lumen des Zentralkanals hinein, wo dieser in der Regel an seinem freien Ende etwas verdickt war. Dagegen fehlten bei diesen Zellen Flimmerhaare und Sekretionserscheinungen. Die fraglichen Zellen konnten deswegen mit gutem Grunde zur Gruppe der Nervenzellen gerechnet werden. Derartige intraependymal gelegene Nervenzellen¹⁾ sind vorher in der Reihe der Wirbeltiere nur bei Acrania und

¹⁾ Dabei sehe ich von den in der Paraphyse, Epiphyse, im Infundibularorgan und Saccus vasculosus beschriebenen Sinneszellen ab, die mit den fraglichen Zellen nicht direkt verglichen werden können.

Cyclostomata gefunden worden. Bei den letzteren ist jedoch die nervöse Natur dieser Zellen bezweifelt worden.

Das Vorkommen derartiger nervöser Elemente innerhalb des Ependyms kann eigentlich von vornherein erwartet werden, wenn man die phylo- und ontogenetischen Verhältnisse in Betracht zieht.

Die Zellen des Ektoderms entwickeln ihre multipotenten Eigenschaften in 2 Hauptrichtungen, nämlich teils als schützende und teils als hauptsächlich reizleitende Elemente. Diese Zellelemente liegen nebeneinander und bilden die äußere Bekleidung des Tieres bei den meisten Metazoa-Evertebraten. Auch bei den niederen Vertebraten ist das Vorkommen von Nervenzellen in der Epidermis neben den rein schützenden Zellelementen bewiesen (*Dogiel*). In der einschlägigen Literatur sind ähnliche Beobachtungen auch bei den am höchsten stehenden Vertebraten beschrieben (*Hägquist*). Die Hauptmasse der Nervenzellen häuft sich jedoch sowohl bei den Vertebraten als auch bei den am höchsten stehenden Evertebraten zur Neuralfurche bzw. zum Medullarrohr an, die später sich zum Nervensystem und zu Teilen der Sinnesorgane differenzieren. Innerhalb dieser differenziert sich ein Teil der Ektodermzellen zu stützenden Elementen. Im zentralen Nervensystem sind die Ependymzellen eine Gruppe derartiger Stützelemente. Die Aufgabe des Ependyms im zentralen Nervensystem besteht u. a. auch darin, die Wandungen des hier vorhandenen Hohlraumsystems zu bilden bzw. auszukleiden. Da nun die vom Ektoderm entwickelte, mehr schützende Epidermis Nervenzellen (wenigstens bei den niederen Vertebraten) und zahlreiche Nervenendigungen besitzt, so wäre es zum mindesten eigentümlich, wenn das nicht auch der Fall sein sollte bei dem Teil des Ektoderms, von dem aus das zentrale Nervensystem sich entwickelt, vor allem bei dessen innerer Zellschicht, der Ependym-Keimschicht.

Während der Ontogenese des zentralen Nervensystems sieht man, wie von den inneren Zellschichten des Medullarrohrs (das sich aus einer vertieften Medullarrinne oder — wie bei einigen Fischen — aus einem kompakten Zellstrang entwickelt, der sekundär ein Lumen erhält) Zellen sich zu Nerven- und Stützelementen differenzieren, die gewöhnlich peripher wandern. Ein Teil der zu Stützzellen sich entwickelnden Zellen bleibt in loco liegen und wird zu Ependymzellen, ein anderer Teil wandert peripher und wird zu Gliazellen. Während des ganzen fötalen und des frühesten postembryonalen Lebens differenziert sich auch ein Teil der in der Ependymschicht liegenden Keimzellen zu Nerven- und Stützelementen. Der größte Teil von diesen Zellen wandert peripher; es ist aber nur natürlich, wenn ein Teil der Keimzellen zu in loco bleibenden Nervelementen — zu intraependymalen Nervenzellen — sich entwickelt.

Im Gebiete des Gehirns kennt man bereits einige Beispiele von Zellen mit besonders ausdifferenzierter Sinnesfunktion, die zwischen den Ependymzellen liegen. Ich meine die zentralen Sinnesorgane, die sich deutlich von der Ependymkeimschicht herleiten, wie Auge, Paraphyse, Epiphyse, Infundibularorgan und Saccus vasculosus. Die obenerwähnten Funde von intraependymalen Nervenzellen im Rückenmark des Rindes sprechen ja dafür, daß das Ependym auch an anderen Stellen auf bisher unbekannte Weise mit besonders rezipierenden Elementen ausgestattet werden kann, die eine oder einige spezielle Sinnesfunktionen besitzen.

Die große Anzahl Spekulationen über die Bedeutung des sogenannten *Reissnerschen Fadens*, die man in der einschlägigen Literatur der letzten 50 Jahre findet, hat eigentümlicherweise bisher keine einzige vergleichend-anatomische Arbeit über dieses Problem veranlaßt. Meine oben erwähnten Funde von intrapendymalen Nervenzellen im Rückenmark des Rindes nebst anderen, hierauf bezüglichen Befunden haben zusammen mit den genannten Spekulationen mich sehr interessiert. Seit mehreren Jahren habe ich das Material für die Untersuchungen gesammelt und bearbeitet, die den folgenden Ausführungen zugrunde liegen.

Diese Untersuchungen beabsichtigten zunächst, die intrapendymalen Nervenzellen und andere wahrscheinlich rezipierende Nervelemente im Ependym bei den Vertebraten zu studieren. In diesem Zusammenhange wurden die fraglichen Bildungen vor allem in demjenigen Teil des Ependyms untersucht, das den Zentralkanal und die Fossa rhomboidea auskleidet — mit Ausnahme jedoch des den Plexus choriodeus ventriculi quarti bekleidenden Ependyms. Außerdem beabsichtigte ich (soweit es möglich war, das hierzu nötige Material zu verschaffen), die Ontogenese der fraglichen Bildungen festzustellen. Ferner sollte der *Reissnersche Faden* hinsichtlich Vorkommen, Morphologie, Entwicklung und Bedeutung studiert werden.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, den Herren Prof. Dr. *Erik Müller* und Prof. Dr. *Nils Holmgren*, die nach meinen Präparaten eine Anzahl der dieser Arbeit beigegebenen Abbildungen nachgeprüft haben, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Ferner bitte ich die Herren Prof. Dr. *Arvid M. Bergman*, Prof. A. V. *Sahlstedt*, Prof. Dr. *F. Henschen*, Prof. Dr. *Nils Holmgren*, Vorstand der Zoologischen Station Kristineberg Dr. *Hj. Östergren*, Regimentsveterinär *I. Carlin*, Lic. med. *H. L. Davide* und Lic. phil. *Kåre Bäckström* meinen wärmsten Dank entgegenzunehmen für die Beschaffung und Vermittlung des seltenen und wertvollen Materials, das meine Untersuchungen ermöglichte.

Zu herzlichem Danke bin ich außerdem verpflichtet Herrn Dr. *Rud. Süppel*, Prosektor des Anatomischen Instituts der Tierärztlichen Hochschule zu Dresden, der die Korrigierung des deutschen Textes besorgte.

A. Material.

Ein großer Teil des reichlichen Materials, das diesen Untersuchungen zugrunde liegt, ist in den letzten 4 Jahren gesammelt und bearbeitet worden. Das meiste Material von Leptocardii, Cyclostomata und Pisces dagegen wurde im Sommer 1921 während meines Aufenthalts in der Zoologischen Station Kristineberg von mir gesammelt. Den dortigen Forschern und Arbeitskollegen danke ich herzlichst für alle Hilfe bei der Sammlung des Materials.

Das bearbeitete Material besteht aus:

Leptocardii: *Amphioxus lanceolatus**) (2—5 cm Länge).

Cyclostomata: *Myxine glutinosa*, *Ammocoetes* (2,5—16 cm Länge), *Petromyzon fluviatilis*.

Pisces: *Elasmobranchii:* *Plagiostomi:* *Myliobatis aquila*, *Trygon pastinaca*, *Trygon violacea*, *Raja batis*, *Raja radiata*, *Raja clavata*, *Spinax niger* (ein erwachsenes Tier von 34 cm Länge und 3 Embryonen von 6—12 cm Länge),

*) Bei der Nomenklatur der Tiere bin ich *Lönnberg*⁶¹⁾ und *Leunis*⁶⁰⁾ gefolgt.

Centrophorus granulosus, *Squalus acanthias* (geborene Tiere von 25—100 cm Länge und Embryonen von 15—22 cm Länge), *Notidanus cinereus* (*Heptanchus*), *Notidanus griseus* (*Hexanchus*), *Mustelus laevis*, *Sphyrna zygaena*, *Galeus canis*. *Holocephali*: *Chimaera monstrosa*. *Teleostomi*: *Chondrostei*: *Acipenser sturio*. *Teleostei*: *Cyclotone microdon*, *Cyclotone signata*, *Clupea harengus*, *Clupea sprattus*, *Coregonus lavaretus*, *Argentina sphyraena*, *Osmerus eperlanus*, *Salmo trutta fario*, *Salmo salar*, *Esox lucius*, *Silurus glanis*, *Abramis brama*, *Alburnus alburnus*, *Leuciscus rutilus*, *Tinca tinca*, *Cyprinus auratus*, *Cyprinus carassius* f. *gibelio* Bloch, *Cyprinus carassius*, *Anguilla anguilla*, *Exocoetus volitans*, *Nerophis aequoreus*, *Nerophis ophidion*, *Siphostoma typhle*, *Syngnathus acus*, *Spinachia spinachia*, *Gasterosteus pungitius*, *Gasterosteus aculeatus*, *Gaidropsarus mustela*, *Gaidropsarus cimbrius*, *Lota lota*, *Molva molva* (2 Exemplare von 15 cm und eins von 65 cm Länge), *Merlucius merlucius*, *Gadus esmarkii*, *Gadus pollachius*, *Gadus virens*, *Gadus minutus*, *Gadus luscus*, *Gadus merlangus*, *Gadus callarias* s. *morrhua*, *Pleuronectes limanda*, *Pleuronectes platessa*, *Pleuronectes kitt*, *Arnoglossus laterna*, *Hippoglossoides platessoides*, *Hippoglossus hippoglossus*, *Lycodes gracilis*, *Zoarces viviparus*, *Pholis gunellus*, *Anarrhichas lupus*, *Callionymus lyra*, *Trigla gurnardus*, *Cottus bubalis*, *Cottus scorpius*, *Sebastes viviparus*, *Gobius flavescens*, *Gobius niger*, *Gobius pictus*, *Scomber scomber*, *Trachurus trachurus*, *Lucioperca lucioperca*, *Perca fluviatilis*, *Labrus exoletus*, *Labrus melops*, *Labrus rupestris*, *Labrus mixtus*, *Labrus berggylta*. *Dipnoi*: *Monopneumones*: *Ceratodus* Forsteri.

Amphibia: *Urodela*: *Amblystoma mexicanum*, *Molge vulgaris* (*Triton punctatus*), *Molge palustris* (*Triton cristatus*), *Salamandra maculosa*. *Anura*: *Rana arvalis*, *Rana temporaria*, *Rana esculenta*, *Hyla arborea*, *Bufo calamita*, *Bufo viridis*, *Bufo bufo*.

Reptilia: *Saurii*: *Lacerta vivipara*, *Lacerta agilis*, *Ascalabotes fascicularis*, *Anguis fragilis*. *Ophidia*: *Vipera berus*, *Coronella austriaca*, *Tropidonotus natrix*. *Chelonia*: *Chrysemys marginata*, *Emys europaea*, *Testudo graeca*. *Crocodylina*: *Alligator mississippiensis* (43 cm lang).

Aves: *Alciiformes*: *Uria troille*. *Longipennes*: *Sterna hirundo*, *Sterna minuta*, *Larus argentatus*, *Larus ridibundus*. *Lamellirostres*: *Anser anser*, *Cygnus olor*, *Anas platyrhynchos*, *Somateria mollissima*. *Grallatores*: *Scolopax rusticola*, *Totanus totanus*, *Numenius phaeopus*, *Numenius arquatus*, *Haematopus ostralegus*. *Gallinae*: *Lyrurus tetrix*, *Meleagris gallopavo*, *Gallus domesticus*, *Perdix perdix*. *Pullastrae*: *Columba aenas*. *Accipitres*: *Circus aeruginosus*, *Accipiter nisus*, *Milvus milvus*, *Pandion haliaëtus*, *Buteo buteo*, *Falco subbuteo*, *Falco peregrinus*, *Falco merillus*. *Striges*: *Syrnium aluco*, *Asio accipitrinus*, *Asio otus*. *Zygodactyli*: *Dryobates major*, *Picus viridis*, *Eustephanus galeritus*. *Passeres*: *Dandalus rubecula*, *Turdus pilaris*, *Regulus regulus*, *Parus caeruleus*, *Parus palustris*, *Parus major*, *Sitta europaea*, *Motacilla alba*, *Emberiza hortulana*, *Passer domesticus*, *Passer montanus*, *Chloris chloris*, *Linota cannabina*, *Carduelis carduelis*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Pinicola enucleator*, *Serinus canaria*, *Pica pica*, *Coloeus monedula*, *Corvus cornix*.

Mammalia: *Monotremata*: *Ornithorhynchus anatinus*. *Marsupialia*: *Didelphys virginiana*, *Halmaturus Benetti*. *Monodelphia*: *Insectivora*: *Erina-*

ecus europaeus, *Sorex minutus*, *Talpa europaea*. *Chiroptera*: *Vespertilio mystacinus*, *Synotis barbastellus*, *Vesperugo pipistrellus*. *Edentata*: *Dasypus setosus* (8 cm langer Embryo). *Glires* (Rodentia): *Sciurus vulgaris*, *Mus musculus*, *Mus musculus* var. *albus*, *Mus norvegicus*, *Mus rattus*, *Lepus timidus* (2 neugeborene Junge), *Lepus cuniculus* (Embryonen, junge und erwachsene Tiere), *Cavia cobaya*. *Carnivora*: *Phoca vitulina*, *Lynx lynx*, *Felis domestica*, *Mustela erminea*, *Lutra lutra*, *Canis familiaris*, *Canis lupus*, *Canis aureus*. *Perissodactyla*: *Equus caballus*, *Equus asinus*. *Artiodactyla*: *Bos taurus* (Embryonen und geborene Tiere verschiedenen Alters), *Bison bonasus*, *Capra hircus*, *Ovis aries*, *Rangifer tarandus*, *Alces alces*, *Capreolus capreolus*, *Dama dama*, *Sus scrofa domestica*. *Primates*: *Cynocephalus babuin*, *Macacus rhesus*, *Cercopithecus mona*, *Homo sapiens* (30jähriger Mann, 14 jähriger Knabe und Embryonen von 20, 26 und 30 cm Länge).

B. Technik.

Bei all den eben erwähnten Tieren war die Medulla spinalis Gegenstand der Untersuchung; bei einer großen Anzahl von ihnen wurden auch die Medulla oblongata und bei einem Teil der Tiere außerdem auch die übrigen Teile des Encephalon untersucht.

Um bindende Beweise für das Vorkommen von Nervenzellen im Ependym zu schaffen, untersuchte ich Form, Lage, Kerne, Protoplasma und Ausläufer der fraglichen Zellen und die Umkopplung ihrer Ausläufer auf andere Neuronen. Außerdem erschien es notwendig, vergleichende Untersuchungen über das Vorkommen von Gliafasern im Ependym anzustellen.

I. Das Material, das für das Studium der mehr allgemeinen Verhältnisse der Zellen im Ependym geeignet erschien, wurde mit Vorteil fixiert in a) *Flemmingscher* und b) *Zenkerscher* Fixierungsflüssigkeit, c) *Erik Müllers* Formol-Kaliumbichromatlösung zur Gliafärbung, d) Formalin und konz. Sublimatlösung aa — diese Fixierungsflüssigkeit ist von *G. Hügqvist* als für embryonales Material besonders geeignet empfohlen worden —, e) in einer Mischung von 4 Teilen 3 proz. Kaliumbichromatlösung und 1 Teil 1 proz. Osmiumsäure, f) in absolutem Alkohol oder g) Trichloressigsäure.

Zur Färbung dieses Materials dienten *M. Heidenhains* Eisenalaun-Hämatoxylin, *Helds* Molybdän-Hämatoxylin und *Ehrlichs* saures Hämatoxylin.

II. Das Material, an dem das Vorkommen von Tigroidschollen in den intraependymalen Nervenzellen studiert werden sollte, wurde in 96 proz. Alkohol fixiert und nach der *Nisslschen* Methode oder mit Toluidinblau, Kresylviolett oder Thionin gefärbt.

III. Das Material, das der Untersuchung über das Vorkommen von Neurofibrillen in den fraglichen Zellen diente, wurde in neutralem oder schwach saurem 20 proz. Formalin fixiert und dann der Stückimprägnation nach *meiner Modifikation der Bielschowskyschen Silberimprägnationsmethode* unterworfen. In einigen Fällen wurden die mit Formalin fixierten Präparate vor der Imprägnation je nach Eignung mit Pyridin, schwacher NaOH-Lösung oder 33 proz. Alkohol behandelt. Auch mit der *Cajalschen* Imprägnationsmethode wurden Stückfärbungen versucht. Es zeigte sich dabei, daß periphere Inkrustierung auch hier vermieden werden kann, wenn man nach der Alkoholfixierung die Stücke genügend

lange und intensiv in destilliertem Wasser auswäscht. Diese Imprägnationsmethode ergab jedoch schlechtere Resultate als meine oben angegebene Methode.

IV. Zum genaueren Studium der Ausläufer der intraependymalen Nervenzellen und deren Umkopplung auf andere Neuronen wurde ein großer Teil des von Embryonen und geborenen Tieren stammenden Materials mit der *Golgischen* Chromsilbermethode behandelt. Hierbei wurde der größte Teil der beschriebenen Modifikationen dieser Methode geprüft. Mit Vorteil bediente ich mich der von *Cajal* angegebenen Methode mit Osmiumsäure. Eine $\frac{1}{4}$ –24 Stunden dauernde Formalinbehandlung des Materials oder seine Erwärmung in Wasser von 80° während etwa 20 Sekunden erwies sich für mehrere Tierarten als außerordentlich geeignet. Auch nach einer längere Zeit (6–12 Monate) anhaltenden Formalinbehandlung bekam ich noch schöne Golgi-Bilder im Rückenmark und Gehirn von *Rana*, *Larus*, *Cygnus*, *Talpa* und *Mustela*.

V. Für das Studium der Gliafasern wurden die Gliamethoden nach *Weigert* und nach *Erik Müller* (Formol-Kaliumbichromat und Eisenaun-Hämatoxylin) angewandt.

Bei der Fixierung des zentralen Nervensystems der erwähnten Tiere wurde verschieden verfahren. Galt es bei kleineren Tieren das ganze Nervensystem in einer und derselben Flüssigkeit zu fixieren, so wurde es in situ in die Fixierungsflüssigkeit gelegt, nachdem es dorsal freigelegt war, oder es wurde das ganze Tier durch Injektion von Fixierungsflüssigkeit vom Herzen aus fixiert. In beiden Fällen wurde das zentrale Nervensystem nach einigen Stunden freipräpariert und nachfixiert. Hierdurch war es möglich, die natürliche Form des Präparates zu bewahren. Galt es aber andererseits, einzelne Stücke des zentralen Nervensystems von einem und demselben Tier in verschiedenen Flüssigkeiten zu fixieren, so wurde das Nervensystem äußerst vorsichtig auspräpariert und in geeigneter Weise zerlegt.

C. Über die intraependymalen Nervelemente.

a) Literaturübersicht.

Im Gebiete des Bulbus medullae, im Ependym des Ventriculus quartus, beschrieb *Renaud*⁷³⁾ 1882 intraependymal gelegene Nervenzellen beim erwachsenen Neunauge. Von der Schilderung *Renauts* (S. 635–636) möchte ich anführen: „Au voisinage du point d'origine du nerf acoustique, par exemple, entre le ganglion latéral supérieur et le point où le plancher du 4. ventricule s'unit angulairement à sa voûte, on voit des cellules ganglionnaires disséminées, *toutes unipolaires*¹⁾ et dont les filaments de Deiters énormes filent à travers la névroglie dans la direction du faisceau pénicillé de fibres qui constitue l'origine de l'auditif. Ces cellules méritent, je crois, de recevoir le nom de juxtaépendymaires ou même d'intraépendymaires, car elles constituent un type à part.“

2 Jahre später beschrieb *Hermes*³²⁾ entsprechende Zellen bei der Larvenform des Neunauges. Von *Hermes* Schilderung zitiere ich das folgende (S. 336): „Nach meinen Beobachtungen an der Medulla oblongata von *Ammocoetes* bilden sich große Nervenzellen innerhalb des Epithels des Ventrikels, indem einzelne Zellen

¹⁾ Von mir kursiv hervorgehoben.

durch bedeutendes Wachstum vor den Nachbarzellen sich auszuzeichnen beginnen. Einmal entstanden, senken sich diese Zellen unter das Epithel und werden von den benachbarten, die den Charakter der Epithelzellen beibehalten haben, sukzessive überwachsen und so von der Lichtung des Ventrikels getrennt.“

Im Jahre 1900 erwähnt *Studnička*⁹¹⁾ das Vorkommen von intraependymalen Nervenzellen und betont, daß alle Nervenzellen, die man beim erwachsenen Tiere findet, bestimmt nicht als in loco entstanden zu betrachten sind. Er findet bei *Petromyzon* im Ependym der Seitenwände des 4. Ventrikels große Nervenzellen, die alle Anzeichen beginnender Atrophie aufweisen, und andere, die im Begriff sind, in das Lumen des Zentralkanals hinein sich vorzustülpen. *Studnička* hebt hervor, daß diese Zellen von der benachbarten grauen Hirnsubstanz aus in das Ependym wandern und daß auch die meisten der von *Herms* abgebildeten Zellen in diese Gruppe gehören. Nur die in *Herms* Abb. 4 abgebildeten Zellen sollten nach *Studnička* intraependymal entwickelt sein.

Studnička bildet selbst in seiner Abb. 15, Tafel XL/XLI, eine intraependymal liegende Nervenzelle vom oberen Abschnitte der Seitenwand der Fossa rhomboidea bei *Petromyzon Planeri* ab. Diese Nervenzelle ist, wie aus *Studnička's* Abbildung hervorgeht, unipolar und hat ihren einzigen Ausläufer peripher gerichtet. Die Nervenzelle stimmt also hinsichtlich Zahl und Richtung der Ausläufer mit der von *Renaut* abgebildeten überein. Bemerkenswert ist folgender Satz *Studnička's* betreffs der Frequenz der intraependymalen Nervenzellen (S. 402): „Trotz allem Suchen konnten wir eine solche Stelle, wie wir sie gerade beschrieben, anderswo an demselben Objekte oder an einem anderen nicht finden, und es scheint uns deshalb, daß es sich in diesem Falle ebenfalls nur um eine seltene Ausnahme handelt, der man eine besondere theoretische Bedeutung natürlich nicht absprechen kann.“

Auch im Ependym des Rückenmarks der am niedrigsten stehenden Vertebraten (Lanzettfische und Rundmäuler) sind Zellen beschrieben, die von mehreren Forschern als Nerven- oder Sinneszellen gedeutet worden sind. Diese Forscher sind hinsichtlich des Lanzettfisches *Edinger* (1906), *Wolff* (1907) und *Stendell* (1914). Bei *Ammocoetes* sind ähnliche Beobachtungen von *Kolmer**)⁵⁵⁾ (1905), *Tretjakoff* (1909) und bei *Petromyzon* von *Tretjakoff* (1913) gemacht. Im Jahre 1919 schreibt *Kolmer*⁵⁶⁾, nachdem er das Vorkommen von intraependymalen Nervenzellen bei *Petromyzon* betont hat (S. 6): „Es ist

*) *Kolmers*⁵⁵⁾ (1905) Beschreibung von kleinen Zellen, die nahe dem Ependym im Rückenmark von *Ammocoetes* liegen, betrifft nicht die intraependymalen Nervenzellen, was jedoch *Tretjakoff* anzunehmen scheint. Über die betreffenden Zellen sagt *Kolmer*: „Im zentralsten Teil des Rückenmarks, in der Nähe des Ependyms, ist auch das Vorkommen von Übergangstypen von Ependymzellen zu Ganglienzellen resp. Gliazellen als wahrscheinlich anzunehmen, da ja hier der gemeinsame Boden ist, von dem beide Elemente ontogenetisch und wahrscheinlich phylogenetisch abstammen. So lassen sich auch nicht allzu selten fibrilläre Strukturen in einzelnen Ependymzellen nachweisen.“ Diese von *Kolmer* beschriebenen Zellen sind wahrscheinlich Neuroblasten, die gleichzeitig mit ihrer Ausdifferenzierung vom Ependym des Zentralkanals aus peripher wandern. Dieses Verhalten unterscheidet sie von den intraependymalen Nervenzellen, die sich in loco entwickeln und liegen bleiben und nach ihrem Untergang in das Lumen des Zentralkanals ausgestoßen werden.

die Annahme erlaubt, daß auch bei anderen Vertebraten Ependymzellen, die es nicht auf den ersten Blick erkennen lassen, am basalen Ende in Nervenfasern übergehen und als Sinneszellen funktionieren.“

Indessen sind auch bei den niedrigstehenden Vertebraten (Myxine und Petromyzon) Beobachtungen gemacht worden, die die Deutung der fraglichen Zellen als Nerven- oder Sinneszellen in Zweifel setzen. So schreibt *) *Retzius*^{74a)} (1916) in einer Zusammenfassung seiner Abhandlung „Einige Beiträge zur Kenntnis der Struktur der Ependym- und Nervenzellen im Rückenmark der Cyclostomen“ u. a.: „Verfasser hat nun bei Myxine ähnliche, mit Methylenblau färbbare Zellen im Rückenmarksependym gefunden, deren „nervöse“ Natur jedoch noch zweifelhaft ist. Und bei Petromyzon konnte er mit der Silberbehandlung nach *Bielschowsky* ebenfalls im Ependym des Rückenmarks zahlreiche stark färbbare Zellen nachweisen, von denen aber nur in sehr seltenen Fällen ein peripherischer Fortsatz hinausläuft, während das Verhalten ihres inneren färbbaren Faserwerkes, welches kein „Netz“ im Sinne *Tretjakoffs*, sondern vielmehr ein sehr variierendes Geflecht darstellt, gegen seine Sinneszelltheorie spricht und jedenfalls diese seine Theorie bis auf weiteres dubiös macht.“

Ich selbst¹⁾ beschrieb 1920 intraependymal gelegene Zellen beim Rinde, die mit gutem Grund und ohne Zweifel zur Gruppe der Nervenzellen gerechnet werden können.

Gestützt auf Golgi-impregnierte Präparate vom Rückenmark junger Hunde beschrieb *Pensa*⁶⁹⁾ 1903 Nervenfasern im Ependym des Zentralkanals. Nach *Pensa* sollen diese Nervenfasern eine netzförmige Anordnung innerhalb des Ependyms haben und mit knötchenförmigen Bildungen enden, die etwas peripher von der inneren Fläche des Ependyms an den Ependymzellen sich finden.

b) Medulla spinalis.

Durch meine Untersuchungen über die intraependymalen Nerven Elemente der Medulla spinalis beabsichtige ich zunächst ihr Vorkommen, ihren Bau und ihre Entwicklung zu studieren. Ich gedenke außerdem noch u. a. die Lage der Nerven Elemente im Ependym des Zentralkanals zu untersuchen — und zwar teils die Lage im Verhältnis zu den Ependymzellen selbst und teils die Ausbreitung der Nerven Elemente im Verhältnis zur Längen- und Querrichtung des Zentralkanals. Diese letztgenannte Lage könnte ja eine Erläuterung geben für das richtige Verständnis der Bedeutung der fraglichen Nerven Elemente.

α) Vorkommen und Morphologie der intraependymalen Nerven Elemente.

sollen im folgenden für alle untersuchten Tierarten etwas näher ausgeführt werden.

I. Leptocardii.

Amphioxus lanceolatus. (Hierzu Abb. 1—8; Tafel VI und VII.) In einer „Einiges vom ‚Gehirn‘ des *Amphioxus*“ betitelten Abhandlung beschreibt *Edinger*²²⁾ u. a. an Sinneszellen erinnernde Bildungen im Ependym des Rückenmarks des

*) In einer Abhandlung, die 1921 in den „Biologischen Untersuchungen“, Neue Folge, 19 erschienen ist — nach *Retzius* Tode von Prof. Dr. C. M. *Fürst* herausgegeben — kommen dieselben Gesichtspunkte wieder vor. S. Literaturverzeichnis Nr. 75.

Lanzettfisches. Zu betonen ist, daß *Edinger* den Zentralkanal (Abb. 8—11) als einen dorso-ventral verlaufenden Spalt abgebildet hat. Betreffs dessen Epithelbekleidung schreibt er: „Da ist zunächst nachzuweisen, daß im Epithel des zentralen Hohlraumes 3 verschiedenartige Zellarten stecken, einfache Epithelzellen mit Flimmern und dünnere Körper mit einem starr in den Hohlraum ragenden Fortsatz und einem langen Endfaden, der sich innerhalb der longitudinalen Nervenbahnen verliert. Diese letzteren Zellen schwärzen sich ganz wie Nerventassern von dem in den Hohlraum ragenden Stäbchen bis zu ihrem Endfaden. Sie machen durchaus den Eindruck von „Sinneszellen“.“ *Edinger* hebt auch hervor, daß mitten unter das Epithel eingelagert (intraependymal) zuweilen die von *Retzius* mittels der Methylenblaumethode nachgewiesenen Kolossalzellen zu finden sind, in denen *Edinger* seinerseits feine Neurofibrillen feststellte, die sich in die Ausläufer der Zellen hinein fortsetzen. *Edinger* spricht sich bestimmter als *Retzius* dafür aus, daß diese Zellen Nervenzellen sind. Nach *Edingers* Abb. 11 zu urteilen, hat er in Wirklichkeit noch einen Typ von Nervenzellen auf diesem Gebiete beobachtet, nämlich die sogenannten Commissurenzellen, die, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, das Lumen des Zentralkanals durchziehen.

*Wolff*¹⁰¹⁾, der ebenfalls diese 3 Nervenzelltypen beim *Amphioxus* beschreibt, geht hauptsächlich dagegen an, daß nur ein Teil der Rückenmarksspalte als Zentralkanal anzusehen sei. Er schreibt hierüber u. a.: „Ich bin sogar der Ansicht — man braucht nur die *Hatscheckschen* Tafeln zum Vergleich heranzuziehen —, daß man besser täte, sehr vorsichtig mit einem Vergleich der hinteren Rhapshe der Akranier und der Cranioten zu sein usw. . . . Nach allem halte ich es für verfehlt, diese Spalte, die bis zu ihrem dorsalen Ende von Ependym ausgekleidet und eng von Nervenzellen umlagert ist, mit der Rhapshe höherer Vertebraten, und nur den Boden der Spalte, der im allgemeinen noch nicht einmal ein stärkeres Auseinanderweichen der Seitenwände des Rohres zeigt, mit dem Zentralkanal der letzteren zu homologisieren. Die Rhapshe der Cranioten ist eine Neubildung, und sehr natürlich erscheint es, daß in sie, die von den *Gollischen* und *Burdachschen* Strängen usw. begleitet wird, Verlagerungen von Nervenzellen auf dem oben geschilderten Wege nicht erfolgen können usw.“

Erik Müller^{64 u. 65)} beschreibt in seiner Neurogliaarbeit einen spaltförmigen und nach unten zu erweiterten Zentralkanal bei *Amphioxus* und gibt an, daß der Kanal mit einer einfachen Schicht von Ependymzellen bekleidet ist. Es ist darauf hinzuweisen, daß *E. Müller* in seiner Querschnittabbildung (Abb. 2, Tafel II) vom Rückenmark des Lanzettfisches einen durch eine kräftige Brücke von dem dorsalen Spalt getrennten, abgerundeten, ventralen Kanal abbildet und daß noch 4 Querbrücken durch den dorsalen Spalt eingezeichnet sind.

In *Oskar Hertwigs* Handbuch der vergleichenden und experimentellen Entwicklungslehre der Wirbeltiere schreibt *K. v. Kupfer*⁵⁸⁾ (S. 5): „... Diese umschließt den Zentralkanal, der aber nur in seinem ventralen Teil als sekundärer Zentralkanal*) kreisförmig klafft, in seinem bedeutend größeren dorsalen Abschnitt aber einen ganz engen Spalt bildet oder ganz geschlossen ist, indem hier die Wände sich berühren.“

*) Von mir kursiv hervorgehoben.

*Joseph*⁵⁰⁾ hat einige Jahre früher in einer Arbeit über die eigentümliche Zellenstruktur im Rückenmark des Lanzettfisches zu der Frage über den Zentralkanal bei diesem Tiere Stellung genommen. *Joseph*, der mit gut fixiertem Material gearbeitet hat (fixiert mit *Erik Müllers* Formol-Kaliumbichromat-Gemisch), bildet den Zentralkanal durchweg als eine ventral liegende Röhre ab (Abb. 3, 4 u. 6) und bezeichnet den dorsal davon gelegenen Rand als „Rhaphe“. *Boekes*^{9 u. 10)} Abbildungen sprechen für eine gleiche Auffassung vom Zentralkanal des Lanzettfisches.

*Stendell*⁸⁶⁾ scheint ohne weiteres die *Wolffs*che Auffassung über den Zentralkanal beim Lanzettfisch gutgeheißen zu haben; er schreibt (S. 260): „... den Zentralkanal, der bekanntlich einen vertikal stehenden schmalen Spalt darstellt, als enges Lumen bloßgelegt.“ Infolgedessen rechnet *Stendell* dieselben Nervenzelltypen wie *Wolff* zu denjenigen, die in Verbindung mit dem Lumen des Zentralkanals stehen.

Eigene Untersuchungen.

Bevor ich dazu übergehe, das Resultat meiner Untersuchungen über die intraependymalen Nervenzellen beim Lanzettfisch zu beschreiben, ist es notwendig, daß ich zu folgender Frage Stellung nehme: *Welcher Teil des Spaltraums im Rückenmark des Lanzettfisches ist mit dem Zentralkanal bei den übrigen Vertebraten analog?*

Aus obigem Literaturreferat gehen zum mindesten zwei Auffassungen über den Zentralkanal (= Z.-K.)* bei *Amphioxus* hervor. Die eine läuft darauf hinaus, daß der übrigbleibende (der eigentliche oder der sekundäre) Z.-K. ventral liegt und daß der dorsale Teil des ursprünglichen Spaltes die Rhaphe oder den durch Commissurzellen sekundär mehr oder weniger vollständig geschlossenen Teil bildet [s. hierüber *Joseph*⁵⁰⁾ und *v. Kupfer*⁵⁸⁾ sowie *Boeke*¹⁰⁾ und *Erik Müllers*⁶⁴⁾ Abb. 2, Tafel II]. Die zweite Auffassung, die darauf hinausgeht, daß der Z.-K. im Querschnitt ein langgestreckter Spalt ist, der ventral — wie *Wolff*¹⁰¹⁾ sagt — „nicht einmal ein stärkeres Auseinanderweichen der Seitenwände des Rohres zeigt“, wird energisch von *Wolff* (1907) verfochten. *Edinger*²²⁾ (1906) scheint jedenfalls, seinen Zeichnungen nach zu urteilen, schon vor *Wolff* eine derartige Auffassung über das Aussehen des Z.-K. bei diesem Tiere gehabt zu haben. *Stendell*⁸⁶⁾ (1914) schließt sich ausdrücklich der *Wolffs*chen Ansicht an.

Ist die letztere Deutung richtig, so zeigt der Z.-K. des Lanzettfisches ein so eigentümliches Verhalten, daß ein gleiches bei irgendeinem anderen Vertreter der Vertebratenreihe nicht zu finden ist — zum mindesten nicht auf Grund meines doch recht reichlichen Materials. Er hat nämlich in diesem Fall ein Lumen, das dorsal von großen Mengen von Nervenfasern und Nervenzellen fast aller im Rückenmark vorkommenden Größen durchkreuzt wird. Diese Durchkreuzung der Rückenmarksspalte fehlt dagegen durchweg im ventralen Teil (s. Abb. 1—7). Diese Tatsache erwies sich bei meinem Material, welches aus lückenlosen Schnittserien von 10 nach mehreren Methoden gut fixierten Lanzettfischen verschiedener Größe besteht, als völlig konstant.

Ist anderseits eine Deutung des Z.-K. wie die von *Joseph* und von *v. Kupfer* richtig, so stimmen die Verhältnisse bei *Amphioxus* recht gut mit denen bei den

*) „Zentralkanal“ wird für die Folge in „Z.-K.“ abgekürzt.

übrigen Vertebraten überein. Wir bekommen da ein von Nervensträngen und Ganglienzellen freies Lumen im Z.-K. *) und eine dorsal von diesem gelegene Rhaphe.

Eine eingehendere Nachprüfung der von den angeführten Autoren eingeschlagenen verschiedenen Wege, auf denen sie zu ihren Resultaten gelangten, zeigt nun, daß zum mindesten *Erik Müller*, *Joseph* und *Boeke* mit erstklassig fixiertem Material arbeiteten, während den Untersuchungen und Resultaten von *Edinger*, *Wolff* und *Stendell* nur formalinfixierte und Bielschowsky-imprägnierte Präparate zugrunde lagen. Formalin ergibt aber bei diesem Tier alles andere als gute Fixierung. Die Fixierung wird jedoch bei Zerlegung des Tieres und Verwendung von 20- oder 40proz. und schwach angesäuerter Formaldehydlösung etwas besser als bei Verwendung von der durch *Bielschowsky* empfohlenen 10proz. Formollösung.

Ein jeder, der beim Lanzettfisch feinere Strukturen zu erhalten versucht hat, wird hierbei sicherlich Gelegenheit zu der Feststellung gehabt haben, wie schwer es ist, hier gute Fixierungen zu bekommen, ganz besonders hinsichtlich des Nervensystems. Die besten Resultate geben die *Erik Müllersche* ⁶⁴⁾ Formol-Kaliumbichromat-Lösung und die von *Boeke* ¹¹⁾ 1908 veröffentlichte Mischung von *Hermannscher* Flüssigkeit und konzentrierter Sublimatlösung aa. Ich selbst habe außerdem gute Resultate mit *Bendas* und vor allem mit *Zenkers* Fixierungsmitteln erhalten (s. Abb. 6, 7 u. 8). Eine Zerstückelung größerer Tiere in kleine Stücke erwies sich bei der Fixierung als vorteilhaft.

Von den mit diesen Flüssigkeiten fixierten und im übrigen richtig weiterbehandelten Präparaten bekommt man sowohl von den einzelnen Zellelementen als auch vom Hohlraum im zentralen Nervensystem Bilder, die ganz bedeutend von denen abweichen, die man bei Fixierung mit 10proz. Formalinlösung erhält. Diese letztere Fixierung läßt die Zellen so hervortreten, daß mitunter der Eindruck entsteht, als ob der Kern ausgefallen wäre (s. Abb. 1 u. 2), wozu oft noch ein bedeutendes Schrumpfen der Zellen kommen kann. Der Z.-K. sieht bei derartigem Material oft wie ein gleichbreiter Spalt aus. Bei Fixierung mit 20- bis 40proz. Formalin habe ich dagegen in mehreren Fällen die Form des Z.-K. in fast derselben Form erhalten können, wie es bei den durch die *Erik Müller*-Fixierung erhaltenen Resultaten der Fall war. Bei Fixierung nach den übrigen oben erwähnten Methoden (also nicht Formalin) ist die Zellstruktur auch im zentralen Nervensystem gut erhalten und die Form des Z.-K. stimmt mit der von *Joseph*, *v. Kupfer*, *Boeke* u. a. angegebenen überein.

Mein eigenes Material zeigt hinsichtlich des Z.-K. folgendes:

Lanzettfisch, 22 mm lang, in 10proz. Formalin fixiert und B-imprägniert. Querschnitte. An vielen Stellen ist der Z.-K. spaltförmig, ohne daß sein ventraler Teil irgendeine nennenswerte Erweiterung aufweist. Mehrfach ist die Ependymschicht der beiden Seiten dorsal vom sekundären Z.-K. zusammengewachsen (bei *a* in Abb. 7). Die Verwachsungen sind in sagittaler Richtung nur 20–40 μ lang und durch weite Spalten getrennt, die dem primären Z.-K. entsprechen. In gleicher Höhe mit den Stellen, an denen die Ependymschicht der beiden

*) Dieses trifft für die Vertebraten mit wenigen Ausnahmen und natürlich nur unter der Voraussetzung zu, daß die Ansicht, der *Reissnersche* Faden sei ein Nervenfaden, falsch ist.

Seiten. zusammengewachsen ist, findet sich ventral ein röhrenförmiger Teil, der längs des ganzen Rückenmarks Commissurenstränge und Commissurenzellen vermissen läßt. Der Teil des Z.-K., welcher der Partie dorsal von *a* in Abb. 7 entspricht, ist bei diesem Tiere von zahlreichen Nervensträngen und Nervenzellen durchzogen.

Ein 4–5 cm langer Lanzettfisch, der in gleicher Weise wie das vorhergehende Tier fixiert und gefärbt worden war, zeigte im Prinzip dasselbe, nur waren hier die Zusammenwachsungen zahlreicher.

4 Lanzettfische von 4, 4,5 und 5 cm Länge, von denen 2 in 20- und einer in 35–40 proz. Formalin fixiert und B-imprägniert waren, zeigten durchweg ventral einen erweiterten Röhrenteil des Z.-K. Dieser kommuniziert nur an wenigen Stellen mit dem dorsalen Spalt (s. Abb. 1 u. 2) und ist im übrigen durch lange und teilweise auch hohe Commissuren vom Spalt getrennt (siehe Abb. 3). Der dorsale Teil ist an zahlreichen Stellen (auch in einem und demselben Querschnitt) von Nervenfasern und Nervenzellen durchzogen (s. Abb. 1, 2 u. 3), während in dem ventralen Teile des Z.-K. derartiges nirgends festgestellt werden kann.

Von 4 anderen Lanzettfischen ist einer (5 cm lang) Benda-fixiert, einer (3,2 cm lang) Erik Müller-fixiert und die beiden anderen (2 bzw. 5 cm lang) sind Zenker-fixiert. Die beiden letztgenannten Fixierungen ergaben die besten Resultate. Diese Schnittserien wurden verschiedenen Färbungen unterzogen, u. a. Färbungen mit Toluidinblau und Hämatoxylin.

Nicht bei einem einzigen Präparat der Schnittserien dieser Tiere fehlten die bei *a* in Abb. 6 u. 7 abgebildeten Commissuren. Nur an ganz wenigen Stellen waren diese so schwach wie bei *a* in Abb. 7. Eine Erklärung dafür, daß diese Commissur so schwach sein kann wie die bei der eben erwähnten Abb. 7, habe ich in dünnen Medianschnitten durch das Rückenmark gefunden. Abb. 8 zeigt einen solchen. Man sieht hier bei *b* einen kleinen Kanal, der vom Z.-K. aus dorsal in den Commissurbereich zieht. In meinen Präparaten kommen mehrere derartige Kanäle vor. Diese Kanäle sind nicht so weit, daß in einem 10 μ dicken Querschnitt neben einem derartigen Kanal nicht noch Commissurteile (*a* in Abb. 6 und 7) zu erkennen wären.

Bei meinem gut fixierten Material von *Amphioxus* besteht der Z.-K. also aus einer ventral gelegenen Röhre, die im allgemeinen von den dorsal gelegenen Spalten getrennt ist. Hier und dort kommuniziert der ventrale Kanal (der sekundäre Z.-K. nach *v. Kupfer*) jedoch — zum mindesten bei kleineren Tieren — durch enge röhrenförmige Bildungen mit den dorsalen Spalten. Diese Spalten werden während des Wachstums des Tieres mehr oder weniger vollständig verdrängt, und zwar einerseits dadurch, daß sich die ependymbekleideten Wände aneinanderlegen und zusammenwachsen, anderseits dadurch, daß die Nervenfasern und Nervenzellen Commissuren bilden, wobei sie gleichzeitig die Ependymzellen mehr oder weniger weit zur Seite drängen (s. Abb. 5). Diese Commissurenzellen können auch aus Kolossalzellen bestehen (s. *Wolff*, Abb. 3). Auch mein Material weist mehrere derartige Fälle auf. Betreffs Entwicklung dieser Nervenzellencommissuren gibt *Wolff* an, daß die Nervenzellen bei dem Wachstum des Rückenmarks passiv durch den Spalt gezogen werden. *Stendell* weist außerdem das Vorkommen von sogenannten anastomosierenden Commissurenzellen nach.

Aus obenstehendem dürfte zur Genüge hervorgehen, daß *Edingers*, *Wolffs* und *Stendells* Auffassung von der Form des Z.-K. des Lanzettfisches nur durch Kunstprodukte gestützt wird, die durch schlecht fixiertes und Bielschowsky-imprägniertes Material hervorgerufen wurden. Meine Resultate decken sich mit denen *v. Kupffers* nämlich darin, daß der dorsale Teil des primären Z.-K. mehr oder weniger vollständig zusammenschmilzt und daß ventral ein offener sekundärer Z.-K. bestehen bleibt. Dieser sekundäre Z.-K. allein ist, wenigstens meiner Ansicht nach, am nächsten homolog mit dem der übrigen Vertebraten. Hierfür spricht auch das Verhalten der Ependym- und intraependymalen Nervenzellen. Diese Zellen bilden unter normalen Verhältnissen keine Commissuren durch das Lumen des (sekundären) Z.-K. Daß *Wolff* die verschiedenartige Entwicklung des Z.-K. beim Lanzettfisch und bei einem Teil höherstehender Vertebraten gleichsam als eine Stütze für die Sonderstellung des Kanals beim Lanzettfisch hervorhebt, beweist nichts für die Richtigkeit seiner Auffassung. Man könnte ja ebensowenig die verschiedenen Keimblätter beim Lanzettfisch mit den bei den höheren Vertebraten vorkommenden homologisieren, da der Lanzettfisch doch so auffallende Eigentümlichkeiten auch hinsichtlich der Entwicklung der Keimblätter aufweist. *Wolffs* Hinweis darauf, daß der dorsale Teil des Z.-K. mit Ependym ausgekleidet ist, bietet ebenfalls keinen Rückhalt für seine Auffassung. Diese Ependymzellen, werden da, wo die Nervenzellen Commissuren bilden (s. Abb. 1, 2, 3 u. 4), zur Seite gedrängt, während sie an anderen Stellen, an denen die Zusammenwachsung ohne Nervenzellen erfolgt ist, liegen geblieben sind, obschon sie das Lumen nicht erreichen (s. Abb. 6 bei a).

Den hier eben gemachten Auslegungen über den Z.-K. des Lanzettfisches zufolge ist es eigentlich nur eine Gruppe der von *Edinger*, *Wolff* und *Stendell* als intraependymal beschriebenen und mit dem Lumen des Z.-K. in Verbindung stehenden Nervenzellen, die unbedingt ausgeschlossen werden muß. Diese Gruppe besteht aus den Commissurzellen (s. Abb. 1, 2, 3, 4 u. 5 bei k).

Unter den Nervenzellen, die einen Ausläufer zwischen den Ependymzellen hindurch zum Lumen des eigentlichen Z.-K. senden, befinden sich sowohl bi- als auch multipolare Formen. Den peripheren Ausläufer der bipolaren Zellen habe ich auf dicken und intensiv imprägnierten Horizontalschnitten ein Stück weit lateral verfolgen können, wobei zu beachten war, daß er zuweilen umbiegt und den longitudinal verlaufenden Leitungsbahnen folgt. In einzelnen Fällen konnte ich beobachten, daß der periphere Ausläufer sich zuweilen T-förmig teilt und daß die beiden Zweige dann den in der Längsrichtung verlaufenden Leitungsbahnen folgen. Ein Verfolgen dieses peripheren Ausläufers auf größere Strecken ist bei einem Bielschowsky-Präparat selbstverständlich nicht möglich. Gelungene Golgi-Präparate von diesem Tiere stehen mir aber nicht zur Verfügung.

Von den multipolaren intraependymalen Nervenzellen (= i. N.-Z.)*), die mit einem Ausläufer das Lumen des Z.-K. erreichen, kann man 2 Arten unterscheiden, nämlich große und kleine. Die großen sind identisch mit den Kolossalzellen (*Retzius*). Die kleinen Nervenzellen unterscheiden sich von den oben beschriebenen bipolaren Zellen in der Hauptsache nur dadurch, daß sie peripher mehr als einen Ausläufer aussenden. Diejenigen dieser Ausläufer, die ich

*) „Intraependymale Nervenzellen“ werden für die Folge in „i. N.-Z.“ abgekürzt.“

ein längeres Stück habe verfolgen können, verhielten sich genau wie die peripheren Ausläufer der oben erwähnten intraependymal liegenden bipolaren Zellen. Von den im Rückenmark des Lanzettfisches vorkommenden Kolossalzellen senden einige einen Dendriten zwischen den Ependymzellen hindurch zum Lumen des Z.-K. (s. *k.c.* und *c.k.* Abb. 1). Die anderen Dendriten der in Abb. 1 abgebildeten Kolossalzellen verlaufen ein Stück weit dorsal und biegen dann in kranialer Richtung ab. Der periphere Ausläufer der Kolossalzellen (in Abb. 1 und 2 verläuft er in ventro-lateraler Richtung) ist hinsichtlich seines Verlaufs von *Retzius* genauer untersucht worden. *Retzius*⁷⁴⁾ sagt darüber (S. 40): „Nachdem sie (die peripheren Ausläufer) eine weite Strecke in gerader Richtung nach vorn hin gelaufen, werden sie schmaler und varikös und entziehen sich unter den übrigen zahlreichen Längsfasern der weiteren Verfolgung. Es ist mir deshalb leider nie gelungen, die Bestimmung dieser Fasern darzulegen. Weder eine Teilung noch ein Austreten derselben durch die Nervenwurzeln ließ sich nachweisen.“

Retzius arbeitete bei diesen Untersuchungen mit der vitalen Methylenblau-methode und es gelang ihm auch, die sogenannten Kolossalzellen gefärbt zu erhalten. Er spricht sich jedoch nicht mit absoluter Bestimmtheit über die Natur dieser Zellen aus. Später haben u. a. *Edinger*, *Wolff* und *Stendell* Neurofibrillen in den fraglichen Zellen nachgewiesen. Dies bestätigen auch meine Präparate. Die nervöse Natur der Kolossalzellen dürfte damit bewiesen sein.

II. Cyclostomata.

In einer Abhandlung „Das Rückenmark bei *Ammocoetes*“ (1905) schreibt *Kolmer*⁵⁵⁾: „Im zentralsten Teil des Rückenmarks, in der Nähe des Ependyms, ist auch das Vorkommen von Übergangstypen von Ependymzellen zu Ganglienzellen resp. Gliazellen als wahrscheinlich anzunehmen, da ja hier der gemeinsame Boden ist, von dem beide Elemente ontogenetisch und wahrscheinlich phylogenetisch abstammen. So lassen sich auch nicht allzu selten fibrilläre Strukturen in einzelnen Ependymzellen nachweisen.“ Ob die hier bezeichneten Zellen mit den bei diesem Tiere vorgefundenen intraependymal liegenden Nervenzellen identisch sind, geht nicht deutlich aus *Kolmers* Abhandlung hervor.

1909 untersuchte *Tretjakoff*⁹⁷⁾ *Ammocoetes* auf das Vorkommen der i. N.-Z.; er konstatierte deren intraependymale Lage und deutete sie als kaum differenzierte Nervenzellen. Er stellte dabei fest, daß sie mindestens bipolar und nicht unipolar sind, wie nach seinen Angaben *Kolmer* behauptet haben soll. *Tretjakoff* fand diese Zellen im Anfang nur bei den kleinsten der untersuchten Exemplare von *Ammocoetes* und hielt sie deshalb für Anfangsstadien der Entwicklung zu kleinen Nervenzellen, die nachher peripher wandern und die Verbindung mit dem Ependym verlieren. In einer späteren Veröffentlichung⁹⁸⁾ hebt *Tretjakoff* hervor, daß er derartige Zellen auch bei 15–18 cm langen *Ammocoetes* und bei erwachsenen Neunaugen gefunden hat. In einer 1913 veröffentlichten Abhandlung über „Die zentralen Sinnesorgane bei *Petromyzon*“ gibt *Tretjakoff*⁹⁹⁾ u. a. eine eingehendere Beschreibung über diese i. N.-Z. im Rückenmark beim erwachsenen Neunauge. *Tretjakoffs* Ansicht über diese Zellen geht dahin, daß sie Sinneszellen sind und zusammen ein zentrales Sinnesorgan bilden.

In einer 1916 erschienenen Abhandlung ficht *Retzius*^{74a)}, der *Myxine* und *Petromyzon* untersuchte, diese Sinneszellentheorie *Tretjakoffs* an. In der Zusammenfassung dieser Abhandlung hebt *Retzius* u. a. hervor, daß er bei *Myxine* ähnliche, mit Methylenblau färbbare Zellen im Rückenmarksependym gefunden hat. Ihre „nervöse“ Natur jedoch noch zweifelhaft sei. Bei *Petromyzon* konnte er mit der Silberbehandlung nach *Bielschowsky* zahlreiche stark färbbare, im Ependym des Rückenmarks gelegene Zellen nachweisen, von denen aber nur in sehr seltenen Fällen ein peripherischer Fortsatz ausläuft. Das Verhalten des inneren färbbaren Faserwerkes dieser Zellen stellt nach *Retzius* kein „Netz“ im Sinne *Tretjakoffs* dar, sondern vielmehr ein variierendes Geflecht. Dieses Verhalten spricht nach *Retzius* Meinung gegen *Tretjakoffs* Sinneszellentheorie.

Eigene Untersuchungen.

Mein Material besteht aus zahlreichen, verschieden langen Exemplaren von *Myxine glutinosa*, *Ammocoetes* (1,5–18 cm) und *Petromyzon fluviatilis*. *Myxine* bekam ich reichlich durch meinen Aufenthalt auf der Zoologischen Station Kristineberg. *Ammocoetes* und *Petromyzon* erhielt ich durch das freundliche Entgegenkommen des Vorstehers der „Älvkarleby Laxfiske“ im lebenden Zustand und bewahrte diese im Aquarium auf, so daß mir also durchaus frisches Material zur Verfügung stand. *Golgis* Chromsilbermethode mit allen oben angegebenen Modifikationen hat sich bei diesem Material und für den bestimmten Zweck weniger gut bewährt. Bei *Myxine* zeigten auch andere Nervenfärbemethoden kein besonders gutes Resultat; am geeignetsten scheint mir hierfür die vitale Methylenblaumethode zu sein. Besonders bei *Ammocoetes*, aber auch bei *Petromyzon* hat die Stückimprägnation mit meinen Modifikationen der Bielschowsky-Methode sehr gute Resultate ergeben. *Tretjakoff* (1913) erzielte die schönsten Neurofibrillen-Imprägnationen durch „Behandlung nach *Golgi* (1908) zur Färbung der Binnennetze“. *Tretjakoff* arbeitete mit Ag-Imprägnationsmethoden, außerdem mit der *Cajalschen* und der Bielschowsky-Methode. Ich versuchte diese Methoden ebenfalls und erzielte auch Resultate, welche aber bedeutend denen unterlegen sind, die man auf oben angegebene Weise erhält.

***Myxine glutinosa*.** (Hierzu Abb. 23 u. 24; Tafel IX.) Die Ependymzellen liegen bei diesem Tier um den Z.-K. dicht angehäuft; ihre Kerne befinden sich in verschiedener Höhenlage. Am Verhalten der Zellkerne kann man 2 Typen dieser Zellen unterscheiden. Der eine Zelltyp hat im Hämatoxylinpräparat längliche, dunklere Kerne, die mehr zentral liegen als die der übrigen Zellen. Der andere Zelltyp hat mehr peripher gelegene runde Kerne, die zwar ebenfalls etwas Chromatin enthalten, die aber sowohl im Hämatoxylin- als im Nissl-Präparat absolut heller sind als die, welche zu dem ersten Zelltyp gehören. Im Nissl-Präparat sieht man außerdem manchmal bei diesem Zelltyp unmittelbar zentral vom Kern Andeutungen von Tigroidschollen (s. Abb. 23).

Bei geglückter Methylenblaufärbung werden die Zellen, die zu letzterem Typus gehören, blau gefärbt. Meine Resultate mit dieser Untersuchungsmethode gehen auch nicht weiter als die, welche *Retzius* (74 u. 75) bei derselben Tierart erhielt. Siehe seine Abb. 1 und 2. *Retzius*' Angabe über die Schwierigkeit der Ag-Imprägnation der fraglichen Zellen bei *Myxine* kann ich völlig bestätigen. Nach

vielen Versuchen mit verschiedenen Modifikationen von *Bielschowskys* und anderen Neurofibrillen-Methoden erzielte ich endlich ein Resultat mit der erstgenannten Methode, jedoch auch hier kein besonders gutes. Die Abb. 24 gibt eine Vorstellung davon, wie sich die Neurofibrillenstruktur bei dem bestgeglückten Präparat zeigt. Dieses Resultat dürfte zusammen mit den Ergebnissen der vorhergenannten Färbungen die nervöse Natur der fraglichen Zellen beweisen.

Die intraependymal liegenden Nervenzellen sind, soweit dies meine Präparate erkennen lassen, durchgehend bipolar. Der eine Ausläufer ist zentral gegen das Lumen des Z.-K. gerichtet, während der andere peripher verläuft. Oft ist der zentrale Ausläufer etwas dicker als der periphere und hat eine in das Lumen des Z.-K. ragende kleine, klumpenförmige Verdickung. Der periphere Ausläufer ist feiner. Infolge der unzureichenden Dicke des Schnittes ist es mir nicht geglückt, ihn weiter zu verfolgen, als Abb. 24 zeigt.

Um das Verhalten des peripheren Ausläufers näher zu studieren, wandte ich die Golgi-Chromsilber-Methode an. Obgleich mehrere verschiedene Imprägnationen nach *Golgis* eigener Methode und nach bekannten Modifikationen dieser Methode ausgeführt wurden, gelang es mir doch nicht, gute Imprägnationen der peripheren Ausläufer dieser Rückenmarkszellen zu erhalten. Auch *Nils Holmgrens* Modifikation der Golgi-Methode für Myxine³⁵), die so schöne Ergebnisse bei den nervösen Elementen des Gehirns liefert, hat mich hinsichtlich der peripheren Ausläufer der behandelten Nervenzellen des Rückenmarks bei demselben Tier im Stich gelassen.

Ammocoetes. (Hierzu Abb. 10—19; Tafel VII u. VIII.) In einem durch den Z.-K. gelegten Längs- oder Querschnitt des Rückenmarks von *Ammocoetes* kann man schon bei *Heidenhains* Eisenalaun-Hämatoxylin-Färbung oder auch bei gewöhnlicher Hämatoxylin-Eosin-Färbung konstatieren, daß das Ependym hier von einer großen Anzahl Zellen aufgebaut ist, deren Kerne in verschiedener Höhe liegen. Die Zellen haben einen zentral gerichteten Ausläufer, der bis zum Lumen des Z.K. reicht, und einen oder mehrere periphere Ausläufer, die man nicht immer weit verfolgen kann. Im speziell behandelten Präparat (z. B. nach der Methode von *Erik Müller*) kann man manchmal den peripheren Ausläufer der eigentlichen Ependymzellen bis zur Peripherie des Rückenmarks verfolgen. Abgesehen von der Lage der Kerne erinnert das Ependym an ein mehrreihiges Epithel. Die periphere Grenze der einzelnen Ependymzellen liegt indessen in verschiedener Höhe, und dem Ependym als Ganzem fehlt sonach eine scharfe periphere Grenze. Form und Größe der Kerne dieser Zellen variieren (s. Abb. 9—19). Die Anzahl der Nucleolen in jedem Kern ist verschieden. Ein großer Teil dieser Zellkerne hat abgerundete Form und unter ihnen finden sich einige, die wegen einer geringeren Menge gefärbter Chromatinsubstanz etwas heller sind als die übrigen Kerne. Diese helleren Zellkerne sind außerdem größer und mehr bläschenförmig als die anderen und haben immer einen gut entwickelten Nucleolus. Man kann also bei dieser Färbung im Ependym Zellen beobachten, die große, bläschenförmige und relativ chromatinarme Kerne besitzen. Die Zellkerne erinnern also an die von Nervenzellen; und man hat schon aus solchem einfach gefärbten Präparat Ursache zu vermuten, daß es im Ependym außer den typischen Ependymzellen auch einen anderen Zelltyp gibt, nämlich Zellen nervöser Natur.

Im Nissl-Präparat (sowohl bei Anwendung von *Nissls* Originalmethode als auch bei Kresylviolett- und Toluidinblaufärbung) läßt das Protoplasma der letztgenannten Zellgruppe, besonders in dem zentral vom Kern gelegenen Zellabschnitt, kleine blaugefärbte Körner erkennen. Hierdurch unterscheiden sich die fraglichen Zellen von den eigentlichen Ependymzellen, deren Protoplasma diese Färbung nicht zeigt. Ein Vergleich mit den großen und typischen Nervenzellen in der grauen Substanz des Rückenmarks ergibt, daß auch hier derartige feine, blaugefärbte Körner im Protoplasma vorkommen. Diese kleinen, blaugefärbten Körner, die bedeutend kleinere Dimensionen haben als die Tigroidschollen, die man in den Nervenzellen bei den meisten Vertebraten findet, sind nach allem zu urteilen, Nissl-Körnchen (Tigroidsubstanz).

*Kolmer*⁵⁵⁾ gibt an (S. 194), daß er Nissl-Körnchen in den Nervenzellen des Rückenmarks bei *Ammocoetes* nicht nachweisen konnte, vielmehr „sahen der ganze Zelleib und auch ein Teil seiner Fortsätze ziemlich gleichmäßig blau gefärbt usw.“ Vielleicht beruht *Kolmers* Meinung über das Vorkommen von Nissl-Körnchen darauf, daß er nicht mit hinreichend dünnen Schnitten gearbeitet hat. *Kolmer* hebt nämlich die Schwierigkeit hervor, solche dünne Schnitte zu erhalten. Ich selbst habe mit 2–10 μ dicken Schnitten gearbeitet. Vielleicht ist der Befund *Kolmers* aber auch darauf zurückzuführen, daß sein Material bei der Fixierung in einem Funktionszustand sich befand, bei dem Nissl-Körnchen nicht als solche vorhanden sind.

Meine Nissl-Präparate bestärken also meine frühere Vermutung, daß ein Teil der Zellen im Ependym bei *Ammocoetes* nervöser Natur ist. Die Häufigkeit solcher im Ependym liegender Zellen mit Nissl-Körnchen variiert sehr stark. In einigen Querschnitten wiesen nur wenige Zellen Nissl-Körnchen auf, in anderen dagegen besaßen die meisten Zellen solche. Eine Ausnahme davon machen die Zellen, die den dorsalen und den ventralen Ependymkeil aufbauen. In diesen Keilen kommen nur sehr spärlich nervöse Elemente vor.

Präparate von *Ammocoetes* mit geglückter Ag-Imprägnation geben weitere erklärende Bilder von der Struktur und Art dieser Zellen. In Abb. 9–19 (Mikrophotographien und Zeichnungen) sind einige Zellen abgebildet, die hinsichtlich Form und Lage mit den Zellen übereinstimmen, die bei den beiden vorhergehenden Färbungsmethoden die an Nervenzellen erinnernden Charaktere zeigten. Wie aus den Abbildungen hervorgeht, hat die angewandte Imprägnationsmethode im Protoplasma der genannten Zellen eine Faserstruktur hervortreten lassen, die lebhaft an die Neurofibrillen der Nervenzellen erinnert. Die Kenntnis der Spezifität der angewandten Imprägnierungsmethode sowohl für Neurofibrillenfärbung als auch für das morphologische Verhalten der Faserstruktur gibt einen an Gewißheit grenzenden Anhalt für die Identifizierung der Fasern mit Neurofibrillen.

Aus meinen Zeichnungen und auch aus den Mikrophotogrammen kann man leicht den Eindruck gewinnen, als ob die Neurofibrillen in diesen intraependymal liegenden Nervenzellen ein wirkliches Netz bildeten. Das scheint besonders aus den Zeichnungen der kurzen Nervenzellen hervorzugehen. Das ist jedoch nicht meine Auffassung von der Sache. Soweit ich die Neurofibrillenstrukturen in diesen Zellen analysieren konnte, handelt es sich mehr um eine Geflecht- als um eine Netz-

anordnung dieser Fasern. Man sieht gewiß oft Bilder, die auf eine Y- oder T-förmige Teilung von Neurofibrillen deuten, aber an den allermeisten Stellen, wo Neurofibrillen sich kreuzen, findet man in diesen kurzen Zellen bei genauer und vorsichtiger Einstellung an verschiedenen Stellen, wie die Neurofibrillen sich einander umflechten. Diese Flechtwerkanordnung scheinen die Zeichnungen der langgestreckten Zellen deutlicher wiederzugeben. Es ist, soweit ich feststellen konnte, kein prinzipieller Unterschied in der Anordnung der Neurofibrillen zwischen den kurzen und den langen Zellen. Daß sie sich im Präparat und in den Zeichnungen verschieden darstellen, beruht nur auf der Schwierigkeit, die dritte Dimension zu zeichnen. Für ein „Neurofibrillennetz“, wie es *Tretjakoff* beschreibt, halte ich es folglich bei diesem Objekt nicht. *Tretjakoffs* Resultat — Neurofibrillennetz — dürfte vielleicht teilweise auf der von ihm angewandten Technik beruhen: „Behandlung nach *Golgi* (1908) zur Färbung der Binnennetze.“

Ein Teil der kurzen i. N.-Z. besitzt zentral vom Kern ein Neurofibrillenknäuel (Abb. 11 u. 14). Der Nucleolus liegt hier exzentrisch, und den Zellen fehlt der Ausläufer. Diese Zellen, die nahe dem Lumen des Z.-K. liegen, sind wahrscheinlich embryonale Elemente — Neuroblasten.

Die Neurofibrillen in den intraependymal liegenden Nervenzellen sind entweder fein und gleichdick, oder es kommen ein oder mehrere dickere Fasern neben einem Flechtwerk von feineren Fasern vor. Von den Hunderten derartiger Nervenzellen, die ich in Präparaten von *Ammocoetes* durchgesehen habe, erhielt ich den Eindruck, daß die feinen Neurofibrillen mit den dickeren zusammenhängen und vielleicht als Auffaserung von diesen zu betrachten sind. Die Neurofibrillen liegen gewöhnlich dicht aneinander gehäuft um den Kern herum im zentralen Teil der Zelle. Abb. 14 zeigt aber andererseits ein Beispiel dafür, daß der peripher vom Kern gelegene Zellabschnitt die zahlreichsten Neurofibrillen besitzen kann und daß dem zentral gerichteten Ausläufer solche fehlen können. Da ein plötzliches Aufhören der Neurofibrillen nicht festgestellt werden konnte und das Präparat besonders stark imprägniert war, dürfte das Fehlen der Neurofibrillen zentral nicht auf unvollständiger Färbung beruhen. Wahrscheinlich kann man das am besten so deuten, daß diese Zellen in der Entwicklung begriffen sind. Hierfür spricht auch das Verhalten, daß bei erwachsenen Neunaugen, bei denen in Präparaten mit gut geglückter Imprägnation, wo also zusammenhängende Neurofibrillengeflechte vorhanden waren, in dem zentral gerichteten Ausläufer immer Neurofibrillen wahrgenommen wurden (s. Abb. 20 u. 22).

Die Neurofibrillen liegen oft nahe der Oberfläche des Zellprotoplasmas. Durch einen Längs- und Querschnitt durch eine derartige Zelle kann man sich indessen leicht davon überzeugen, daß die Neurofibrillen auch die zentralen Teile der Zelle durchziehen (s. Abb. 14).

Bei vollentwickelten i. N.-Z. sind gewöhnlich wenigstens 2 Ausläufer vorhanden. Von diesen erstreckt sich einer ein kleines Stück in das Lumen des Z.-K. und der andere setzt sich in peripherer Richtung fort.

In dem zentral gerichteten Ausläufer konnten mitunter Centrosomen nachgewiesen werden. In zwei Fällen schien der zentrale Ausläufer eine Protoplasmabrücke durch das Lumen des Z.-K. zu dem entsprechenden Ausläufer

einer gegenüberliegenden Zelle abzuschicken. Diese Protoplasmabrücken (siehe Abb. 11), die an das Verhalten bei den Lanzettfischen erinnern, zeigen Spuren von argentophiler Struktur, die mit den Neurofibrillen der fraglichen Zellen zusammenhängt.

Von peripheren Ausläufern sind ein bis mehrere vorhanden. Dieser Ausläufer ist zum Unterschied von dem peripheren Ausläufer einer eigentlichen Ependymzelle äußerst fein (vgl. a_1 , b_1 , c_1 mit d_1 , Abb. 17). In die peripheren Ausläufer setzen sich ein oder mehrere Neurofibrillen von der Zelle aus fort. Ein Verhalten, wie die Zelle c der Abb. 11 zeigt, bei der der periphere Ausläufer entwickelt ist, ohne neurofibrilläre Struktur erkennen zu lassen, scheint mir zu beweisen, daß hier eine unvollständige Färbung vorliegt — obgleich irgendein freies Neurofibrillenende in der Zelle nicht nachgewiesen werden konnte. Der periphere Ausläufer ist sehr oft kurz, in anderen Fällen wieder hat er eine recht bedeutende Länge. — Ausnahmsweise könnte ich ihn (in Golgi-Präparaten) bis zur Peripherie des Rückenmarks verfolgen,

Diese dünnen Schnitte, die man bei so hartem Ag-imprägniertem Material, wie es bei diesen Untersuchungen nötig ist, anfertigen muß, sind in der Regel nicht geeignet, wenn es gilt, den Verlauf eines längeren peripheren Ausläufers zu verfolgen. Deshalb habe ich die Golgi-Chromsilbermethode zur Hilfe nehmen müssen. Bei dieser Methode kann man bekanntlich mit sehr dicken Schnitten arbeiten. Von den zahlreichen Golgi-Imprägnierungen, die ich von *Ammocoetes* anfertigte, scheinen mir die Resultate, die ich bei einem 8 cm langen Tier erhalten habe, die lehrreichsten in bezug auf die peripheren Ausläufer dieser Zellen zu sein. Einige Zellen mit diesen typischen peripheren Ausläufern werden in Abb. 17 und 19 dargestellt. Der Ausläufer in Abb. 19 zeigt im Präparat keine Verzweigung und läßt sich genau lateral in die graue Substanz ziemlich weit gegen die laterale Kante des Rückenmarks verfolgen. Dieser Ausläufer sowohl wie der kürzere der übrigen Zellen in derselben Abbildung bleibt also in der grauen Substanz. Eine Verzweigung oder Umkopplung dieser Ausläufer konnte in diesen Präparaten nicht nachgewiesen werden. Die Zellen a_1 , b_1 und c_1 in Abb. 17 haben sämtlich verzweigte periphere Ausläufer und können wegen deren verschiedener Länge in solche mit kurzen (b_1) und solche mit langen Ausläufern eingeteilt werden. Die Ausläufer der Zelle b_1 verzweigen sich dicht lateral vom Ependym, die Verzweigung des peripheren Ausläufers der Zelle c_1 erfolgt weiter lateral in der grauen Substanz, wo auch die imprägnierten Teile des Ausläufers aufhören. Von der Zelle a_1 geht der periphere Ausläufer unter wiederholten Verzweigungen in ventro-lateraler Richtung weiter. Die am weitesten peripher gelegenen Verzweigungen liegen ventro-lateral in der weißen Substanz. Auch hier konnte eine Umkopplung nicht nachgewiesen werden. Im Ag-imprägnierten Präparat habe ich in wenigen Fällen (eine Umkopplung und) eine T-Teilung der peripheren Ausläufer nachweisen können (s. Abb. 11, 12, 13, 15 u. 18). Diese T-Teilung erfolgt wenigstens manchmal in der weißen Substanz (s. Abb. 13 u. 18).

Im Ependym verlaufen einige mehr oder weniger dicke Nervenfasern (Abb. 10, 12, 14, 15 u. 16), die sich, wie ich wenigstens in einer Anzahl Fälle nachweisen konnte, mit den i. N.-Z. verbinden. In einigen Fällen erfolgt diese Verbindung mit den peripheren Ausläufern der Zellen. In anderen Fällen geht sie,

wie Abb. 12a und 15 zeigen, in der Mitte der Nervenzellen vor sich. Die Nervenfasern legt sich hier spiralig um den Zellkörper herum — ob hier ein extra- oder intraprotoplasmatischer Verlauf der Nervenfasern vorliegt, ist nicht leicht mit Sicherheit festzustellen, doch spricht das Präparat am meisten für einen intraprotoplasmatischen Verlauf (s. Abb. 12a u. 15) — und geht in das neurofibrilläre Flechtwerk der Zelle über.

Ein noch eigentümlicheres Verhalten scheinen mir die Zellen der Abb. 10, 11a, 14a u. 16a zu zeigen. (Das Verhalten, das dem Mikrophotogramm Abb. 10 zugrunde liegt, ist schematisch in der Zeichnung Abb. 16a wiedergegeben.) Bei diesen letztgenannten Zellen tritt der eigentümliche Fall ein, daß eine recht dicke Nervenfasern in das neurofibrilläre Flechtwerk der Nervenzellen in Höhe der Basis des zentralen Ausläufers oder sogar an dessen Spitze übergeht (Abb. 10 u. 16a). Wie aus Abb. 16 hervorgeht, setzt sich hier die Nervenfasern bis zu einer großen bipolaren Nervenzelle fort. Irgendein *Heldscher* Endfuß konnte hier nicht nachgewiesen werden. Die Lage der Fasern zu den Neurofibrillen der großen Nervenzelle spricht jedoch für eine intimere Verbindung (eine Umkopplung?).

Die intraependymal liegenden Nervenzellen bei *Ammocoetes* werden längs der ganzen Medulla spinalis vorgefunden. Eine bestimmte Gruppierung der Zellen konnte nicht beobachtet werden, abgesehen davon, daß sie bilateral zahlreicher als dorsal und ventral vorkommen. Bei den kleineren Tieren sind die unentwickelten Formen (Abb. 11 n. bl., 13 n. bl. u. 14) dieser Zellen in bedeutend größerer Zahl vorgekommen als bei den größeren.

***Petromyzon fluviatilis*.** (Hierzu Abb. 20—22, Tafel IX). Mit Hämatoxylin und Eosin gefärbte Quer- und Horizontalschnitte vom Rückenmark dieser Tierart zeigen ein Ependym von prinzipiell gleicher cellullärer Anordnung wie bei *Ammocoetes*. Die Ependymzellen liegen bei diesen Tieren jedoch nicht so dicht aneinandergelagert wie bei *Myxine*; hierauf beruht zugleich die mehr runde Form der Kerne bei einer relativ größeren Anzahl dieser Zellen. Man kann hier ebenfalls wie bei *Ammocoetes* in der Regel mehr peripher gelegene hellere und mehr zentral gelegene dunklere Zellkerne unterscheiden. Dorsal und ventral (in den Ependymkeilen) kommen Zellen mit dunkleren Kernen zahlreicher vor als anderswo.

In einigen Nissl-Präparaten glückte es mir, in den mit größeren runden Kernen versehenen intraependymalen Zellen deutliche, aber feine Nissl-Körner nachzuweisen.

Die zahlreichen Golgi-Imprägnationen, die ich mit dem Material von *Petromyzon* ausgeführt habe, lieferten für die peripheren Ausläufer der Zellen im Ependym nicht so vollständig geglückte Resultate, wie sie oben bei *Ammocoetes* beschrieben wurden. Von großer Bedeutung scheint mir zu sein, daß bei allen diesen imprägnierten Zellen, die hinsichtlich Lage und Kernform identisch sind mit den eben genannten Zellen, bei denen Nissl-Körner nachgewiesen werden konnten, ebenfalls konstant ein peripherer Ausläufer imprägniert worden ist. Dieser periphere Ausläufer ist sehr fein. In keinem Fall ist er ein längeres Stück imprägniert worden als die kurzen peripheren Ausläufer, die Abb. 19 von *Ammocoetes* wiedergibt. Diese feinen peripheren Ausläufer, die Lage und Form des Kerns sowie das Vorkommen von Nissl-Körnchen sprechen für die Identität dieser

Zellen mit den schon bei *Ammocoetes* beschriebenen intraependymal liegenden Nervenzellen.

Diese Tatsache wird durch die Resultate der Ag-Imprägnation vollständig bewiesen. Diese Imprägnierungen müssen möglichst intensiv ausgeführt werden — natürlich unter Vermeidung einer zu starken Imprägnation, die eine vollständige Inkrustierung des ganzen Stückes nach sich ziehen würde.

Eine derartige Faserstruktur der i. N.-Z., wie *Retzius*⁷⁵⁾ in seinen Abb. 3—19 wiedergibt, kann ich ebenfalls in einem ganzen Teil meiner Präparate nachweisen. Diese Präparate (Abb. 22) gehören aber zu denen, deren Imprägnation weniger intensiv und weniger gelungen war. In einigen Präparaten mit mehr intensiver und gelungener Imprägnation gelang es mir, eine große Anzahl intraependymaler Zellen mit bedeutend zahlreicheren und dichter angehäuften Neurofibrillen nachzuweisen, als in den faserreichsten Zellen, die *Retzius* abbildet, vorhanden sind. Meine diesbezüglichen Beobachtungen stimmen dagegen besser mit dem überein, was *Tretjakoff*⁹⁹⁾ (1913) beschreibt und abbildet, mit Ausnahme des einen Punktes, daß die Neurofibrillen in diesen Zellen ein Netzwerk („Netz“, „Neurofibrillennetz“) bilden sollen. Es ist natürlich sehr schwer mit Sicherheit festzustellen, ob es sich hier um ein Netz- oder um ein Flechtwerk handelt. Ein genaueres Studium der Neurofibrillen in den Zellen, die eine einfachere Faserstruktur zeigen, spricht jedoch, wie *Retzius* bereits hervorgehoben hat, mit aller Bestimmtheit für ein Flechtwerk. Auch die intraependymal liegenden Nervenzellen, die zahlreiche Neurofibrillen haben (s. links und Abb. 20 oben), zeigen ein Verhalten, das diese Ansicht *Tretjakoffs* bestimmt widerlegt. Denn eine sorgfältigere Prüfung zeigt, daß die Neurofibrillenstruktur in diesen intraependymalen Zellen prinzipiell mit der in den übrigen Nervenzellen übereinstimmt (s. Abb. 20 oben).

Gestützt auf die Länge der i. N.-Z. und auf die Dichte ihrer Neurofibrillenstruktur unterscheidet *Tretjakoff* unter diesen Zellen mehrere Gruppen. Ich selbst stimme vollständig mit *Retzius* überein, der (S. 588) schreibt: „Aber natürlich muß hier von neuem betont werden, daß eine Menge Variationen vorkommen, ‚Zwischenformen‘ zwischen den hier angeführten und abgebildeten, weshalb man auch nicht einige eigentliche Typen aufstellen kann und darf.“ Bei der Entwicklung aller dieser Formen scheinen mir mehrere Faktoren eine Rolle zu spielen. Raumursachen spielen wahrscheinlich eine Rolle bei der Entwicklung der langen Zellformen. Die großen runden Kerne dieser Zellen bekommen den besten Platz peripher von den Ependymzellen. Die verschiedenartige Dichte, die eine Neurofibrillenstruktur aufweisen kann, beruht oft, wie meine Erfahrung lehrt, teils auf unvollständiger Imprägnation, teils darauf, daß diese Zellen sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden.

Retzius hat, wie oben bereits hervorgehoben wurde, diese Arten der von mir oben in den intraependymalen Zellen als Neurofibrillen bezeichneten Faserstrukturen angezweifelt. *Retzius* wirft die Frage auf (S. 590), „ob vielleicht die oben beschriebenen Faserwerke in den geschilderten intraependymalen Zellen der von *Holmgren*³⁴⁾ und *Golgi* entdeckten Klasse der Strukturelemente angehören können und aus derartigen mit Silberlösung gefärbten Elementen bestehen.“ Nachdem *Retzius* die auffälligen Unterschiede zwischen den fraglichen Faser-

strukturen und dem Element von *Holmgren* und *Golgi* hervorgehoben hat, scheint es seine größte Schwierigkeit zu sein, sich mit der Meinung vertraut zu machen — die schon von *Tretjakoff* ausgesprochen wurde —, daß die Faserstruktur mit der Neurofibrillenstruktur identisch ist und zwar deswegen, weil er (S. 589) „in den Hunderten und Aberhunderten dieser schön und scharf Ag-imprägnierten Zellen . . . im allgemeinen vergebens einen peripheren Ausläufer gesucht hat.“ *Retzius* ist es bei seinem großen Material nur in 3 Fällen geglückt, eine feine Faser nachzuweisen, die von dem peripher vom Kern gelegenen Faserwerk abging.

Diese Beobachtungen von *Retzius* über die peripheren Ausläufer der behandelten Zellen stehen im schärfsten Gegensatz zu denen, die *Tretjakoff* gemacht hat. *Tretjakoffs* Ansicht geht dahin, daß alle diese Zellen periphere Ausläufer haben. Hinsichtlich meiner eigenen Beobachtungen über die fraglichen Ausläufer möchte ich teils auf das oben beschriebene Verhalten bei *Ammocoetes*, teils auf die oben mitgeteilten Ergebnisse meiner Golgi-Imprägnationen des Rückenmarks von *Petromyzon* hinweisen. Außerdem soll hervorgehoben werden, daß die Ag-imprägnierten Präparate von *Petromyzon* betreffs der peripheren und anderen Ausläufer dieser Zellen im Prinzip dasselbe Resultat ergeben haben wie bei *Ammocoetes*. Sowohl ein Teil dieser Zellen als auch deren periphere Ausläufer sind bei diesem Tiere bedeutend kräftiger als bei *Ammocoetes*, was ja auch zu erwarten war (s. Abb. 20). Es ist zwar Tatsache, daß auch in meinen Präparaten (von *Petromyzon*) bei den bestgeglückten Imprägnierungen ein Teil i. N.-Z. vorkommt, denen deutlich ein peripherer Ausläufer fehlt. Derartige Fälle beziehen sich meines Erachtens jedoch durchweg auf teils unvollständige Imprägnationen, teils auf unentwickelte Zellformen.

III. Pisces.

Elasmobranchii.

Von den oben unter „Material“ angeführten Spezies dieser Gruppe, die auf das Vorkommen von i. N.-Z. untersucht wurden, erhielt ich die besten Imprägnationen bei *Raja*-Arten (in Größe von 8—70 cm), bei Embryonen von *Spinax* (von 5, 7 und 10 cm Länge) und *Squalus* (untersucht wurden Embryonen von 15, 18 und 22 cm Länge). Auch von erwachsenen Tieren dieser Spezies und außerdem auch von *Myliobatis*, *Trygon*, *Notidanus*, *Mustelus*, *Sphyrna*, *Galeus* und *Chimaera* ist es mir gelungen, einige kräftige Ag-Imprägnationen der fraglichen Zellen zu erhalten.

Die Färbungen mit Toluidinblau und mit Hämatoxylin gaben ebenfalls gute Bilder, die einen besonderen Zelltyp mit Nervenzellcharakter zwischen den gewöhnlichen Ependymzellen erkennen lassen. Im folgenden bringe ich einzelne Tatsachen aus den Untersuchungen der verschiedenen Tierarten.

Myliobatis aquila hat ein recht hohes Ependym aus verhältnismäßig kleinen Zellen, deren Kerne in mehreren Reihen angeordnet sind; i. N.-Z. kommen vor. Ihr kernführender Abschnitt liegt in der Regel ganz intraependymal. In meinem Material schwankt ihre Größe zwischen der einer Ependymzelle und dem 3fachen. Bei

Trygon pastinaca und *violacea* habe ich i. N.-Z. nachweisen können. In meinem Material kommen derartige Zellen bei dem erstgenannten Tiere spärlich und bei dem letztgenannten Tiere recht zahlreich vor. Die i. N.-Z. bei *Trygon*

violacea variieren zwar in der Größe, sind aber gewöhnlich recht groß. Sie haben einen großen, bläschenförmigen und chromatinarmen Kern, der mit einem bis mehreren Nucleolen versehen ist. Neurofibrillen sind nachgewiesen. Bei der Nissl-Färbung zeigt das Protoplasma ähnlich wie bei den peripher liegenden typischen Nervenzellen oftmals eine schwache Rosafarbe und hat auch kleine Nissl-Körnchen. Die i. N.-Z. sind gewöhnlich bipolar, doch sind auch einzelne multipolare Formen gefunden worden. Der zentral gerichtete Ausläufer erstreckt sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo sein freies Ende im allgemeinen ohne Verdickung oder Zuspitzung endet. Die Kerne der i. N.-Z. liegen in der Regel in Höhe der am weitesten peripher gelegenen Ependymzellkerne.

Raja batis, radiata und clavata. Die i. N.-Z. sind bei diesen Tieren, meinen Präparaten nach zu urteilen, durch Neurofibrillenimprägnation leichter nachzuweisen als bei *Squalus*. Ihre Kerne sind sowohl in den mit Hämatoxylin als auch in den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten heller als die Kerne der Ependymzellen. Der zentral gerichtete Ausläufer der i. N.-Z. ist so lang, daß deren Kern zwischen die am weitesten peripher gelegenen Ependymzellkerne zu liegen kommt. Sowohl die Tigroid- als auch die Neurofibrillenimprägnation ist in diesen intraependymalen Zellen durchgehends etwas schwächer als in den peripher liegenden eigentlichen Ependymzellen. Präparate sowohl von jungen Tieren als auch von Embryonen von *Spinax* und *Squalus* machen den Eindruck, daß diese intraependymalen Zellen ihren Nervenzellcharakter parallel mit der peripheren Wanderung erhalten*).

Spinax niger. (Hierzu Abb. 25 u. 26; Tafel IX.) *Mit Toluidinblau gefärbte Präparate.* Die Kerne der Ependymzellen sind durchgehends groß und von variierender Form. In den Ependymkeilen ist die Kernform gewöhnlich langgestreckt, aber auch an den übrigen Stellen des Ependyms kommen mehr oder weniger langgestreckte Kerne vor. Sowohl an den Kanten der Ependymkeile als auch — und das ist die Regel — mehr lateral sind im Ependym Zellen anzutreffen, die einen runden, bläschenförmigen Kern besitzen. Unter den Zellen mit rundem Kern sind einige, die eine gegenüber den anderen Zellen spärlichere Chromatinmenge und einen deutlichen Nucleolus aufweisen. Das Protoplasma dieser letztgenannten Zellen färbt sich ähnlich wie in den weiter lateral in der grauen Substanz liegenden typischen Nervenzellen. Auch in den Ependymkeilen können vereinzelt Zellen von diesem Typ vorkommen. Die Präparate der untersuchten Embryonen (von 7, 10 und 15 cm Länge) zeigen die oben angegebenen Verhältnisse besonders schön. Mehrere Präparate von Embryonen und einzelne von erwachsenen Tieren ergaben Bilder, die dafür sprachen, daß einige Nervenzellen ihre Verbindung mit dem Lumen des Z.-K. verlieren und peripher wandern — andere derartige Zellen dagegen bleiben mit ihrem in das Lumen des Z.-K. sich erstreckenden Ausläufer liegen, und sie sind wahre i. N.-Z. Unter diesen peripher wandernden Zellen finden sich hinsichtlich Kernstruktur und Tigroidfärbung alle Übergangsstadien zwischen Neuroblasten und typischen peripheren Nervenzellen.

*) Die unten geschilderten Studien über die Entwicklung der i. N.-Z. bei *Lepus* haben gezeigt, daß sich die i. N.-Z. bereits in einem sehr frühen Entwicklungsstadium von den Nervenzellen und deren Bildungszellen (den Neuroblasten) scharf unterscheiden.

In den mit *Hämatoxylin* gefärbten Präparaten sind die Kerne der i. N.-Z. etwas chromatinärmer als die der eigentlichen Ependymzellen; eine mit den Kernen der Nervenzellen übereinstimmende Kernstruktur haben sie jedoch nicht. Sie besitzen einen deutlichen Nucleolus, sind aber chromatinreicher als Kerne der gewöhnlichen Nervenzellen.

Ag-imprägnierte Präparate dieses Tieres lassen in den entsprechenden Zellen, die bei der Toluidinblaufärbung Nervenzellcharakter zeigten, in gelungenen Präparaten sowohl bei Embryonen als bei erwachsenen Tieren eine Faserstruktur (Neurofibrillen im Protoplasma) erkennen. In Präparaten mit weniger gelungener Imprägnation sieht man nur eine Braunfärbung des Protoplasmas. Besonders gut gelungene Imprägnationen der fraglichen Zellen habe ich bei dieser Spezies überhaupt nicht erhalten können. Die eigentlichen Ependymzellen tragen lange Haare, die ein Stück in das Lumen des Z.-K. hineinragen. Derartige Bildungen fehlen den i. N.-Z.

In *Golgi-Präparaten* von *Spinax* findet man nicht nur bi-, sondern auch multipolare i. N.-Z. Die Abb. 25 und 26 zeigen 2 Typen derartiger bipolarer Zellen. Die eine Zelle (Abb. 25) hat einen äußerst feinen peripheren Ausläufer, der sich erst etwas peripher vom Ependym T-förmig teilt. Der andere Typ (Abb. 26) hat einen kurzen und dicken peripheren Ausläufer, der sich direkt peripher vom Kern vogelfußähnlich in 3 dicke, aber kurze Ausläufer teilt. Dieses Verhalten erinnert etwas an ein Bild (s. Abb. 102), das ich bei einem Rinderfoetus sah. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch hier eine Umkopplung vorhanden ist, obwohl die zugehörige andere Zelle nicht imprägniert ist.

Centrophorus granulosus. Die Imprägnationen des Materials von diesem Tier ergaben keine guten Resultate und lieferten also keine beweiskräftigen Bilder für das Vorkommen von i. N.-Z. Nissl-Körnchen habe ich nur ausnahmsweise in den spärlich vorhandenen intraependymalen Zellelementen nachweisen können. M. E. sind jedoch einige intraependymale Zellen bei diesem Tiere von nervöser Natur, trotzdem sie gewöhnlich keine Nissl-Körnchen besitzen; denn das übrige Verhalten der fraglichen Zellen spricht dafür. Die großen, bläschenförmigen und chromatinarmen Kerne dieser i. N.-Z. liegen in verschiedener Höhe. Sie können sogar zentral von den Kernen der Ependymzellen liegen.

Squalus acanthias. (Hierzu Abb. 28—31; Tafel IX u. X.) Es wurden Embryonen von 15, 18 und 22 cm Länge und Tiere in verschiedenem postfötalem Alter untersucht.

Besonders von dem embryonalen Material erhielt ich in Neurofibrillen-imprägnierten und mit Toluidinblau gefärbten Präparaten mehrere Beweise für das Vorkommen einer großen Anzahl von i. N.-Z. Wie bei *Spinax*, so findet man auch bei diesem Tiere mehrere Beispiele von jungen Nervenzellen, die innerhalb des Ependyms oder peripher von diesem liegen und Kern- und Protoplasmastrukturen zeigen, die mehrere Zwischenstadien zwischen Neuroblasten und typischen peripheren Nervenzellen aufweisen.

Bei den genannten Embryonen konnte ich in einigen Fällen zwischen den Ependymzellen verlaufende Nervenfasern nachweisen. Stellenweise bildeten diese Nervenfasern Schlingen um den zentral gerichteten Ausläufer der intra-

ependymal liegenden Nervenzellen, sie zeigten also annähernd dasselbe Verhalten wie bei *Ammocoetes*.

Beim erwachsenen Tier ist es im allgemeinen recht schwer, gelungene Imprägnationen der fraglichen Zellen zu erhalten. Die Abb. 28 gibt eines der besser gelungenen Präparate wieder. Die Abbildung zeigt u. a. die Ependymauskleidung der dorsalen Teile des Z.-K. Wie aus der Abbildung hervorgeht, finden sich hier außer den gewöhnlichen Ependymzellen 4 Zellen mit intensiv dunkelgefärbtem, rundem Kern*). Diese Kerne liegen im Verhältnis zu den Kernen der Ependymzellen recht weit peripher. Bei intensiver Beleuchtung sieht man neben einigen anderen Strukturen einen deutlichen Nucleolus. Die mittlere Zelle in Abb. 28 hatte scharf imprägnierte Neurofibrillen. In dem zentral gerichteten Ausläufer kann man eine wellenförmig verlaufende dickere und wenigstens eine mehr gerade verlaufende feine Neurofibrille unterscheiden. Diese Neurofibrillen fasern sich direkt zentral vom Kern in eine Anzahl feinere Fibrillen auf, die sich auf der entgegengesetzten Seite des Kernes in den peripheren Ausläufer fortsetzen. Gegen das Lumen des Z.-K. verdickt sich der zentral gerichtete Ausläufer. Die Neurofibrillen fasern sich hier zu einem kegelförmigen Knäuel auf. In den übrigen in diesem Schnitte vorhandenen i. N.-Z. war die neurofibrilläre Struktur nur angedeutet.

In den meisten anderen Ag-imprägnierten Präparaten des Rückenmarks von *Squalus* sind die Kerne der fraglichen Zellen eher heller als diejenigen der Ependymzellen und haben einen bis mehrere große Nucleolen.

Die mit Hämatoxylin und Toluidinblau gefärbten Präparate zeigen in diesen Zellen Kerne, die wegen geringerer Chromatinmenge heller sind als in den eigentlichen Ependymzellen.

Im Nissl-gefärbten Präparat erinnert die Färbung des Protoplasmas der intraependymalen Zellen vollkommen an die der peripheren Nervenzellen — das Protoplasma hat eine diffuse bis feinkörnige Blaufärbung.

Die Abb. 29—31 zeigen einige ausgewählte Beispiele mit Golgi-Cajal-Imprägnation dieses Materials. Unter den Zellen in Abb. 31 sind *a*, *b* und *e* (die rechte Zelle) mit größter Wahrscheinlichkeit i. N.-Z., während die Zellen *c* und *d* gewöhnliche Ependymzellen sind. Für den Charakter der 3 erstgenannten Zellen als i. N.-Z. sprechen

1. die Form und periphere Lage der Kerne,
2. die Form und Faserstruktur des zentral gerichteten Ausläufers, vor allem aber die gegen das Lumen des Z.-K. gerichtete kegelförmige Auftreibung,
3. die Feinheit und der Verlauf der peripheren Ausläufer — sie nähern sich sehr der Peripherie des Rückenmarks.

Der Ependymzellcharakter der Zelle *d* geht u. a. aus dem Flimmerhaar hervor, das sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein erstreckt — Flimmerhaare fehlen den erwähnten Nervenzellen —, und aus dem dicken peripheren Ausläufer. Hinsichtlich der Zelle *c* neige ich zu der Annahme, daß sie eine Epen-

*) Auch die peripher im Rückenmark liegenden typischen Nervenzellen haben einen intensiv dunkelgefärbten Kern, während alle übrigen Zellkerne hell gefärbt sind. Dies ist meiner Erfahrung nach eine außergewöhnliche Varietät in den vielen verschiedenen Farbnuancen der Neurofibrillen-imprägnierten Präparate.

dymzelle im Sekretionsstadium ist. Die Fäden, die von dem zentral gerichteten Ausläufer der Zelle *a* nach links abgehen, dürften den Nervenfasern gleich zu achten sein, die sich, wie oben erwähnt, in Ag-imprägnierten Präparaten vom Rückenmark der Haiembryonen um den zentral gerichteten Ausläufer der i. N.-Z. winden. Analoge Verhältnisse sind oben auch bei *Ammocoetes* beschrieben. Ich meine also, daß diese Nervenfasern mit den von *Bonne*¹²⁾ beim Rinderfoetus beschriebenen nicht gleichwertig sind. Die erwähnten *Bonneschen* Fäserchen, die ich in reichlicher Menge in Golgi-Präparaten von Rinderembryonen und einem Teil anderer Tiere wiedergefunden habe, verlaufen senkrecht zum zentral gerichteten Ausläufer typischer Ependymzellen und sind bedeutend dicker als die der Zelle *a*. Die peripheren Ausläufer der multipolaren Zelle *e* (die rechte Zelle) gehen weit dorsal und ventral in die weiße Substanz hinein, wo sie innerhalb des 100 μ dicken Schnittes nahe der Peripherie des Rückenmarkes umbiegen und längs verlaufen.

In Abb. 30, die nach einem Golgi-Präparat vom Rückenmark eines 22 cm langen Haiembryos gezeichnet ist, sieht man eine teilweise intraependymal liegende multipolare Zelle, die wahrscheinlich nervöser Natur ist. Ob einer der in der Abbildung abgebildeten Ausläufer ein Neurit ist, habe ich nicht mit Sicherheit entscheiden können. Vielleicht ist dies der Fall; vielleicht verläuft aber der Ausläufer in der 3. Dimension, vielleicht handelt es sich aber auch um eine amakrine Zelle. Amakrine Zellen kommen, wie bekannt, in anderen Ependym-Sinnesorganen (z. B. Auge) vor. Ja, auch subependymal im Rückenmark habe ich derartige amakrine Zellen bei einer ganzen Reihe Vertebraten angetroffen, vom Lanzettfisch, von Rundmäulern bis zu unseren Haustieren. Diese amakrinen Nervenzellen sind jedoch im allgemeinen bedeutend kleiner als die hier erwähnten Zellen und haben weder so lange Ausläufer, noch senden sie diese in das Lumen des Z.-K. hinein. Die hier erwähnte Zelle (Abb. 30) sendet einen Ausläufer in das Ependym bis zum Lumen des Z.-K., wo er mit einer kleinen Anschwellung endet. Von den anderen Ausläufern, die diese Zelle hat, sind 2 besonders lang und erstrecken sich diagonal weit in die weiße Substanz hinein, und zwar der eine dorsal und nach rechts und der andere ventral und nach links. Der letztgenannte Ausläufer biegt weit peripher im Schnitt zum Längsverlauf um. Von den übrigen Ausläufern der Zelle ist ein Teil sicher unvollständig imprägniert; einige von diesen verbleiben in der grauen Substanz, andere dagegen scheinen über die weiße Substanz nach rechts und ventral zu ziehen. Diese bemerkenswerte Nervenzelle vereint also mit ihren übrigen Eigenschaften auch die einer Commissurenzelle.

Im Golgi-Präparat erwachsener Haie habe ich ähnliche Wahrnehmungen gemacht. Abb. 29 zeigt ein Bild von diesem Material. Hier liegen 2 an den erwähnten Typ erinnernde Zellen bilateral vom Lumen des Z.-K. Einen Neuriten habe ich bei diesen Zellen nicht mit Sicherheit nachweisen können, wenn nicht die Ausläufer, die ventral den Ependymkeil kreuzen, als solche angesehen werden können, was jedoch wahrscheinlich der Fall ist. Diese beiden Zellen haben, wie die Abbildung zeigt, einen intraependymal gelegenen Ausläufer, der am Lumen des Z.-K. eine kugelförmige Anschwellung besitzt. Von den langen peripheren Ausläufern, die weit peripher verlaufen, biegen einige innerhalb des Präparates

in den Längsverlauf um. Aus der Abbildung geht hervor, daß diese beiden Zellen wie die in Abb. 30 Commissurenzellen sind.

Notidanus cinereus (Heptanchus). Der Z.-K. zeigt an einigen Stellen Erweiterungen, an anderen Verengungen seines Lumens, an einer Stelle sogar eine beginnende Verwachsung. Es sind sehr deutliche i. N.-Z. vorhanden, die mit ihrem kernführenden Abschnitt ganz intraependymal liegen und gewöhnlich bipolar sind. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich mit seinem zugespitzten Ende ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein. Die Kerne dieser Zellen sind in der Regel bedeutend größer als die der Ependymzellen. Sie sind dazu bläschenförmig und chromatinarm und liegen in der Regel in Höhe der Kerne der Ependymzellen. Neurofibrillen und Nissl-Körnchen wurden bei *Heptanchus* in größeren Formen dieser Zellen gefunden.

Notidanus griseus (Hexanchus) hat eine bemerkenswert große Weite des Z.-K. (s. Tab. G). Es kommen langgestreckt-birnförmige i. N.-Z. vor, die einen großen, bläschenförmigen und chromatinarmen Kern mit einem bis mehreren deutlichen Nucleolen besitzen. Diese Nervenzellen erinnern sehr an die von *Alligator mississippiensis*, die in Abb. 47 abgebildet sind, und haben Neurofibrillen; in mit Toluidinblau gefärbten Präparaten zeigen diese Zellen eine Protoplasmastruktur, die an die von peripher liegenden typischen Nervenzellen erinnert. Bei *Hexanchus* sind die i. N.-Z. gewöhnlich bedeutend größer als die relativ kleinen eigentlichen Ependymzellen. Die größten Formen dieser Nervenzellen wurden ventral im Ependym des Z.-K. gefunden.

Mustelus laevis hat wenig Zellelemente, die nach ihrem Verhalten in Nissl-gefärbten Präparaten als i. N.-Z. gedeutet werden können. Die peripher im Rückenmark liegenden Nervenzellen haben in derartigen Präparaten große, distinkt gefärbte Nissl-Körnchen. Die i. N.-Z. haben in Nissl-Präparaten kleine, blau-gefärbte Körnchen in ihrem Protoplasma. Ihre Kerne sind groß und chromatinarm. Der zentral gerichtete Ausläufer dieser Zellen endet gewöhnlich in Höhe der inneren Fläche des Ependyms. Eine andere, zahlreicher vertretene Gruppe intraependymaler Zellen unterscheidet sich von den typischen Ependymzellen durch das Vorhandensein eines großen, bläschenförmigen Kernes; dieser Kern hat einen großen Nucleolus und recht viel Chromatin; in den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten weist die Zelle eine Blaufärbung des Protoplasmas und in den mit Hämatoxylin gefärbten Präparaten eine dunkle Färbung auf. Diese Zellen senden einen zentral gerichteten Ausläufer, der an seinem freien Ende zugespitzt ist, ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein. Da es mir nicht gelungen ist, Neurofibrillen in den letztgenannten Zellen nachzuweisen, scheint mir deren Sinneszellnatur bis auf weiteres problematisch.

Sphyrna zygaena besitzt i. N.-Z., deren Größe der der eigentlichen Ependymzellen entspricht oder diese bis um das 3-fache übertrifft. In den größeren Formen dieser Zellen wurden Neurofibrillen und Nissl-Körnchen nachgewiesen. Die fraglichen Zellen haben einen großen, chromatinarmen Kern, sind gewöhnlich bipolar und senden einen zentral gerichteten Ausläufer ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo er gleichdick endet.

Galeus canis besitzt zwischen den gewöhnlichen Ependymzellen eine Anzahl Zellen, die einen großen, bläschenförmigen Kern mit 1—2 recht deutlichen

Nucleolen haben. Es ist mir nie gelungen, deutliche Neurofibrillen oder Nissl-Körnchen in diesen Zellen nachzuweisen. Die genannten Zellen haben mehr oder weniger langgestreckte Birnform und sind gewöhnlich bipolar. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich in der Regel ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein. Ihr Protoplasma erinnert sowohl in den mit Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbten Präparaten als in Nissl-Präparaten an das peripherer Nervenzellen. Ich halte es für wahrscheinlich, daß diese Zellen zu der Gruppe der i. N.-Z. gehören.

Chimaera monstrosa. Abb. 27 zeigt u. a. i. N.-Z. verschiedener Größe und Art, die ich im Rückenmark dieses Tieres gefunden habe. Die Linie *a—b* verläuft in dorsoventraler Richtung (*b* liegt ventral). Alle die eingezeichneten Zellen mit faserförmiger Protoplasmastruktur sind intraependymale Nerven- oder Sinneszellen, die mit Ausnahme der direkt über *b* gelegenen großen Zelle in einem 10 μ dicken Schnitt vorkommen. Die große Zelle direkt oberhalb von *b* ist die größte, die ich bei diesem Tiere gefunden habe, und sie befindet sich in entsprechender Lage, wie Abb. 27 zeigt, in einem nachfolgenden Schnitt. Alle hier abgebildeten Sinneszellen sind von bipolarem Typ; wahrscheinlich kommen aber auch bei diesem Tiere multipolare Formen vor, ich habe sie jedoch in 10 μ dicken Schnitten nicht nachweisen können. Die peripheren Ausläufer dieser Zellen sind bedeutend dünner als die zentral gerichteten, die mit ihrem abgerundeten Ende ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein sich erstrecken. In gelungenen Ag-imprägnierten Präparaten ist das Protoplasma dieser Zellen bedeutend dunkler gefärbt als in Ependymzellen und zeigt eine äußerst zarte Faserstruktur, die an Neurofibrillen erinnert. Die Kerne dieser Sinneszellen liegen oft peripher von denen der übrigen Zellen und haben gewöhnlich eine runde Form.

In den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten haben die peripher gelegenen Nervenzellen große Tigroidschollen. Die fraglichen i. N.-Z. haben ebenfalls zum Teil Tigroidschollen, die jedoch nicht so groß sind wie in den genannten peripheren Nervenzellen. Die Kerne der i. N.-Z. sind etwas heller als die der Ependymzellen. Dasselbe Verhältnis hinsichtlich der Kerne zeigen auch die mit Hämatoxylin gefärbten Präparate.

Teleostomi.

Chondrostei.

Acipenser sturio. (Hierzu Abb. 32 u. 33; Tafel X.) Es wurde ein etwa 7 cm langes Stück vom kranialen Ende des Rückenmarks untersucht. Das Ependym ist durchgehends sehr hoch. Die größte Höhe ist median vorhanden, wo dorsal und ventral die Ependymkeile liegen, und bilateral, wo die peripheren Ausläufer der Ependymzellen in die Ventralhörner übergehen. In diesen 4 Gegenden hat das Ependym eine zwischen 30 und 60 μ variierende Höhe, während die dazwischenliegenden Gegenden eine Höhe von 15—25 μ aufweisen. Die Ependymzellen sind schmal und langgestreckt und haben in mehreren Reihen geordnete runde, ovale bis unregelmäßig geformte Kerne. Es kommen recht zahlreiche i. N.-Z. vor, die wegen ihres von dem der Ependymzellen abweichenden Baues bei den meisten Färbemethoden deutlich, besonders schön jedoch bei Nissl-Färbung und bei gelungener Neurofibrillenimprägnation hervortreten. Die fraglichen Zellen scheinen in dem untersuchten Material diffus im Ependym verbreitet zu sein. Der kernführende Abschnitt ihres Zellkörpers liegt in der Regel ganz

intraependymal. Die Zellen scheinen unbedeutend in der Größe zu variieren, sind aber durchgängig deutlich größer als die eigentlichen Ependymzellen. Bi- und tripolare Formen der i. N.-Z. sind nachgewiesen. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich mit seinem freien Ende, das zuweilen etwas verdickt ist, nur ein wenig in das Lumen des Z.-K. hinein. Die Kerne dieser Zellen sind groß, gerundet, chromatinarm und haben 1—2 Nucleolen. Sie liegen gewöhnlich in Höhe der peripheren Ependymzellkerne, zuweilen weiter zentral, und nur ausnahmsweise habe ich sie in Höhe der zentralen Ependymzellkerne liegen gefunden. In den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten tritt eine kräftige Blaufärbung des Protoplasmas der i. N.-Z. deutlich hervor. Diese Blaufärbung hängt im wesentlichen von einer Anzahl hier liegender kleiner Nissl-Körnchen ab. So kräftige Nissl-Körnchen, wie man sie in den peripheren Nervenzellen findet, konnte ich hier nie nachweisen. Jedoch fand ich deutliche Neurofibrillen in diesen Zellen.

Teleostei.

Im Jahre 1912 beschrieb *Franz*²⁴⁾ (unter Beifügung von Abbildungen) einige Wahrnehmungen in Golgi-Präparaten über das Ependym im „Ventrikelspalt des Thalamus“ des Goldfischs. *Franz* hat hier Zellen wahrgenommen, die einen Ausläufer bis zum Lumen dieses Spaltes senden, während der periphere Ausläufer (gewöhnlich einer, zuweilen mehrere) sich dendritähnlich teilt. Er hält diese Zellen für einen neuen Typ, „denn noch niemand hat einen derartigen Verästelungsmodus bei Zellen des Ependyms jemals gesehen“. Gestützt auf das Aussehen der peripheren Ausläufer dieser Zellen, die an die der Nervenzellen erinnern, nennt *Franz* sie „Neuroependymzellen“. *Franz* hebt außerdem hervor, daß er beinahe alle Teile des Gehirns und Rückenmarks bei den Fischen untersucht hat und daß er „ausgenommen hier und da im mächtig entwickelten Hypothalamus der Fische“ keine Neuroependymzellen gefunden hat. Er spricht die Vermutung aus, daß die von ihm gefundenen „Neuroependymzellen“ nervöser Natur sind. Hinsichtlich der Funktion der fraglichen Zellen kommen nach *Franz* hydrostatische und hydrodynamische Druckreize oder Lichtreize in Frage. In diesem Zusammenhang erwähnt er die Untersuchungen von *v. Frisch*²⁵⁾, deren Ergebnis dahingeht, daß die Epiphyse ein für den Farbwechsel bedeutungsvolles Organ sein soll, und daß auch andere in der Nähe der Epiphyse gelegene Hirnteile eine ähnliche Bedeutung haben. *Franz* hält es nicht für ausgeschlossen, daß die von ihm in der Gegend des Hypothalamus gefundenen „Neuroependymzellen“ eine Funktion haben könnten, die mit der von *von Frisch* angegebenen übereinstimmt.

Meine eigenen Untersuchungen über die intraependymalen Nerven- oder Sinneszellen bei Knochenfischen beziehen sich hauptsächlich auf das Ependym des Rückenmarks und der Medulla oblongata.

Von dem oben angeführten reichen Material, das Gegenstand der Untersuchung gewesen ist, hat die Golgi-Chromsilbermethode die besten Resultate ergeben bei *Gadus virens*, *Labrus berggylta*, *Merluccius merluccius*, *Tinca tinca*, *Molva molva*, *Callionymus lyra* (von diesem Tiere wurde nur das Rückenmark untersucht), *Gobius flavescens* und *Osmerus eperlanus*, *Alburnus alburnus*.

Die modifizierte Bielschowsky-Methode ergab die besten Resultate bei *Cyclotone microdon* und *signata*, *Gadus luscus*, *virens* und *pollachius*, *Labrus mixtus*, *Lycodes gracilis*, *Sebastes viviparus*, *Argentina sphyraena*, *Scomber scomber*, *Trachurus trachurus*, *Cyprinus*, *Anguilla*, *Spinachia spinachia* und *Ceratodus Forsteri*.

Bei all den untersuchten Knochenfischen, bei denen Schnitte von einem größeren Teile des Rückenmarks durchgesehen wurden, ist es in den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten*) von geeignet fixiertem Material gelungen, Nissl-Körnchen in einem Teile der intraependymal liegenden Zellen nachzuweisen, die in Form und Lage mit den Zellen übereinstimmen, die bei einem Teil der Knochenfische Neurofibrillen aufweisen.

Ein Vergleich zwischen Neurofibrillen-impregnierten, toluidinblau- und hämatoxylingefärbten Präparaten zeigt, daß die fraglichen Nervenzellen hier ebenso wie bei den vorhererwähnten Tieren bläschenförmige und chromatinarme Kerne besitzen, die mehr oder weniger weit peripher liegen.

Bei den Knochenfischen, bei denen mich Golgi- und Bielschowsky-Imprägnierungen im Stiche ließen, zeigen doch die Resultate der mit Toluidinblau und Hämatoxylin gefärbten Präparate zusammen mit den nicht vollbeweisenden Imprägnationen, daß auch hier i. N.-Z. vorkommen. Die Ursache für das Versagen der Neurofibrillen-Imprägnation ist zuerst in technischen Gründen zu suchen. Jedermann, der mit diesem Gebiete hinreichend vertraut ist, weiß wohl, wie schwer diese Imprägnationsmethoden sein können — jede Tierart, jedes Gewebe erfordern beinahe eine besondere Modifikation der Imprägnation, wenn diese gelingen soll.

Von den meisten Knochenfischen sind Querschnittsserien von 5—8 Stellen des Rückenmarks angefertigt worden. Ein Vergleich der Schnitte der verschiedenen Stellen zeigt, daß das Ependym längs der Medulla spinalis im Bau variiert. Die i. N.-Z. fehlen an einigen Stellen, an anderen kommen sie spärlich, an anderen wieder zahlreich vor. Anscheinend bestehen recht große Verschiedenheiten auch bei den einzelnen Tierarten.

Eine eingehende Beschreibung der fraglichen Verhältnisse bei allen untersuchten Arten erscheint mir in diesem Zusammenhang unnötig. Daher beschränke ich mich darauf, nur einige Abbildungen zu erläutern und die Verhältnisse bei einigen ausgewählten Vertretern der Knochenfische zu erörtern.

Die Abb. 39 zeigt einen Querschnitt durch das kraniale Ende des Rückenmarks von *Cyclotone microdon*. Man sieht hier bei *c k* den sehr engen Z.-K. ventral in der Mitte der dreieckigen Ausbreitung liegen, die hier die graue Substanz bildet. Ein weiter caudal gewonnener Querschnitt durch das Rückenmark zeigt eine mehr dorsale Lage des Z.-K.; er liegt hier ungefähr im Zentrum der ebenfalls dreieckig geformten grauen Substanz. Die in der grauen Substanz liegenden Nervenzellen scheinen keine bestimmte Anordnung im Querschnitt zu haben. Gewöhnlich liegen sie nahe dem Z.-K. Zuweilen sieht man, wie eine

*) Um eine gelungene Färbung mit beweiskräftigen Bildern von Nissl-Körnchen in diesen Zellen zu erhalten, ist es oft nötig gewesen, die Schnittstärke für die betreffenden Objekte genau anzupassen. Außerdem war es nötig, mit stark verdünnten Farblösungen während einer längeren Zeit zu färben und die Präparate genau zu differenzieren.

multipolare Nervenzelle intraependymal liegt und mit einer ihrer Seiten die Wand des Z.-K. bilden hilft, ohne einen Ausläufer in dessen Lumen zu senden. Dieses stimmt mit den oben angegebenen Verhältnissen bei *Ammocoetes* überein (siehe Abb. 14). Öfters kommt es jedoch vor, daß bi- und multipolare Nervenzellen, die intraependymal liegen, einen ihrer Ausläufer bis an das Lumen des Z.-K. senden. Diese i. N.-Z. färben sich völlig wie die weiter peripher liegenden Nervenzellen. In Abb. 39 sieht man 2 bipolare Nervenzellen, die intraependymal liegen und einen Ausläufer bis an das Lumen des Z.-K. senden. Auch multipolare, teilweise intraependymal liegende Nervenzellen, die einen Ausläufer bis an das Lumen des Z.-K. senden, kommen vor. Dieses Verhalten erinnert an die oben beschriebenen Verhältnisse bei *Amphioxus* (s. Abb. 1 u. 3).

Abb. 45 zeigt eine Golgi-imprägnierte Nervenzelle (?) bei *Gadus virens*, die ventrolateral im Ependym des Z.-K. liegt. Diese Zelle hat einen zentral gerichteten Ausläufer, dessen kugelförmig aufgetriebenes freies Ende innerhalb des Z.-K. liegt, und einen peripher gerichteten Ausläufer, der mit seiner Verzweigung deutlich an den Ausläufer einer Nervenzelle erinnert. Auftreibungen oder Verdickungen am freien Ende der zentral gerichteten Ausläufer dieser i. N.-Z. sind nicht seltene Erscheinungen. Ein Teil von ihnen hat, wie Abb. 45 zeigt, Kugelform, andere haben Kegel- oder noch andere Form. Derartige Auftreibungen können aber auch fehlen. Dieses Verhalten der fraglichen intraependymalen Zellen deutet mit Sicherheit auf ihre Nervenzellnatur hin.

Ein Beispiel für einen anderen Typ derartiger intraependymal liegender Zellen zeigt Abb. 44, die nach einem Präparat aus dem mittleren Teile des Rückenmarks von *Gadus virens* gezeichnet ist. Der zentral gerichtete Ausläufer ist an seinem Ende ohne Auftreibung. Die peripher gerichteten Ausläufer haben reichliche Verzweigungen. Diese Zellen erinnern etwas an die Nervenzellen, die unten bei *Ammocoetes* im Ependym der Fossa rhomboidea beschrieben sind. Ein kritischer Beobachter könnte vielleicht bei Betrachtung der Abb. 44 den Eindruck erhalten, als ob die hier wiedergegebene Zelle in Wirklichkeit aus mehreren Zellen bestünde, die aufeinanderliegen und nur infolge einer kräftigen Imprägnation fälschlicherweise als einheitliche Zelle erscheinen. Daß dies indessen nicht der Fall ist, geht mit aller gewünschten Deutlichkeit aus dem Präparat hervor.

In meinen gelungenen Golgi-Präparaten von den erwähnten Knochenfischen finden sich im Ependym des Rückenmarks zahlreiche Nervenzellen von oben beschriebenem oder ähnlichem Typ. Ein Teil dieser Zellen erinnert sehr an die von *Franz*⁽²⁴⁾ im Ependym der Thalamusregion des Goldfisches beschriebenen Zellen. Die von *Franz* gefundenen Zellen liegen intraependymal und bekamen von ihm den Namen „Neuroependymzellen“. Mein Befund zeigt also einmal, daß die fraglichen Neuroependymzellen nicht für die Thalamusregion spezifische Bildungen sind, wie *Franz* meint, und zweitens, daß derartige Zellen nicht nur beim Goldfisch, sondern auch bei anderen Knochenfischen vorkommen.

Die Bielschowsky-Imprägnation läßt aus mehreren Ursachen die peripheren Ausläufer der i. N.-Z. nie so deutlich hervortreten wie gelungene Golgi-Imprägnationen. Einige Tatsachen, wie das Aussehen des Zellkörpers, die Lage der Kerne, das Verhalten des zentral gerichteten Ausläufers, die hervortretenden Teile der peripher gerichteten Ausläufer usw., sprechen sämtlich dafür, daß diese

Golgi-imprägnierten Zellen mit denjenigen Zellen auf eine Stufe zu stellen sind, die in gelungenen Bielschowsky-Präparaten Neurofibrillen zeigen. In einem Teile der fraglichen Zellen kann man außerdem mit Toluidinblaufärbung Tigroidsubstanz nachweisen. Der nervöse Charakter der mehrmals beschriebenen intraependymalen Zellen dürfte also festgestellt sein.

Unter den Knochenfischen, bei denen die Toluidinblaufärbung die i. N.-Z. deutlich hervortreten ließ, möchte ich die folgenden etwas näher besprechen.

Spinachia spinachia (hierzu Abb. 34; Tafel X) hat zahlreiche i. N.-Z., die in ihrer Größe sehr variieren. Die Abb. 34 zeigt einige der vorkommenden extremen Größen. Auch bei den kleinsten Formen sind Nissl-Körnchen nachgewiesen worden. Die i. N.-Z. kommen am zahlreichsten ventral im Z.-K. vor, ihr kernführender Abschnitt liegt gewöhnlich ganz intraependymal. Der zentral gerichtete Ausläufer endet im allgemeinen in Höhe der inneren Fläche des Ependyms.

Gaidropsarus mustela et eimbrius (hierzu Abb. 35 u. 40; Tafel X u. XI) haben zahlreiche, mit Nissl-Körnchen versehene i. N.-Z., die ziemlich diffus längs des Z.-K. verteilt zu sein scheinen. Eine durchgehends größere Frequenz ventral im Z.-K. habe ich für diese Tiere nicht feststellen können. Abb. 40 (ventral ist in der Abbildung unten) deutet eher auf ein umgekehrtes Verhältnis, aber auch dies ist nicht durchgehend, sondern die Verteilung der i. N.-Z. ist auch im Querschnitt des Z.-K. ziemlich diffus. Der kernführende Abschnitt dieser Zellen liegt im allgemeinen ganz intraependymal — Ausnahmen kommen jedoch vor, wie Abb. 40 zeigt. Diese Abbildung läßt auch eine weitgehende Variation in der Größe dieser Zellen erkennen. Sie haben mehrere Ausläufer, von denen der zentral gerichtete entweder in Höhe der inneren Fläche des Ependyms endet oder sich noch ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein erstreckt. In beiden Fällen kann dieser Ausläufer an seinem freien Ende verdickt sein oder nicht (s. Abb. 35 u. 40). Die Kerne der i. N.-Z. sind durchgehends bläschenförmig, chromatinarm und mit einem recht großen, scharf begrenzten Nucleolus versehen. Nissl-Körnchen treten in den meisten Formen dieser Zellen deutlich hervor.

Molva molva hat in den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten sehr schön hervortretende i. N.-Z. Ihr bläschenförmiger, chromatinarmer Kern ist gewöhnlich größer als der der Ependymzellen und liegt in der Regel innerhalb des Ependyms. Die Zellen sind bi- bis multipolar. Der zentral gerichtete Ausläufer endet oft mit einer kleinen Auftreibung, die entweder in Höhe der inneren Fläche des Ependyms liegt oder auch ein Stück in das Lumen des Z.-K. hineinragt; andererseits wurden aber auch gleichdicke und mitunter zugespitzte Endigungen des zentral gerichteten Ausläufers wahrgenommen. In einer großen Zahl dieser i. N.-Z. wurden scharf konturierte Nissl-Körnchen festgestellt.

Merluccius merluccius. (Hierzu Abb. 38; Tafel XI.) Bei diesem Tiere wurden zahlreiche i. N.-Z. sowohl durch Neurofibrillenimprägnation als auch durch Nissl-Färbung nachgewiesen. Am leichtesten sind sie durch die letztere Methode festzustellen. Diese Zellen variieren in ihrer Größe, sind in der Regel aber etwas größer als Ependymzellen. Sie sind gewöhnlich bipolar, doch kommen mitunter auch multipolare Formen vor. Der zentral gerichtete Ausläufer erstreckt sich gewöhnlich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo er gleich dick oder etwas

zugespitzt endet (siehe Abb. 38). Die i. N.-Z. kommen durchgehends zahlreicher ventral im Z.-K. vor, was auch aus Abb. 38 hervorgeht.

Gadus esmarkii hat zahlreiche i. N.-Z., die durch ihre Form, Größe und Lage sehr an die von *Merlucius* erinnern.

Gadus merlangus besitzt eine Anzahl i. N.-Z., die an Größe die bei diesem Tiere relativ kleinen Ependymzellen in der Regel nicht übertreffen. Diese letzteren haben im allgemeinen eine Breite von 4μ . Bei einer Anzahl i. N.-Z. sind Nissl-Körnchen nachgewiesen. Die Kerne der i. N.-Z. sind wie gewöhnlich bläschenförmig und chromatinarm.

Gadus minutus (hierzu Abb. 42; Tafel XI) hat zahlreiche i. N.-Z., die an Größe die Ependymzellen nicht übertreffen, die ebenfalls recht große, bläschenförmige und chromatinarme Kerne haben (s. Abb. 42). Die i. N.-Z. sind bi- bis multipolar. Ihr zentral gerichteter Ausläufer endet verschieden, nicht selten sieht man, daß er mit seinem verdickten Ende ein Stück in das Lumen des Z.-K. hineinragt.

Pleuronectes limanda hat große und in Nissl-gefärbten Präparaten gut hervortretende i. N.-Z. Dies gilt auch für *Pleuronectes platessa*, während meine Präparate von *Pleuronectes kitt* nur kleine i. N.-Z. und Ependymzellen erkennen lassen.

Arnoglossus laterna besitzt i. N.-Z., die in der Größe bedeutend variieren; sie scheinen sowohl in der Längs- als in der Querrichtung des Z.-K. diffus verteilt zu sein.

Hippoglossoides platessoides zeigt insofern bemerkenswerte Verhältnisse, als im Lumen des Z.-K. eine Anzahl großer, nicht degenerierter Nervenzellen vorkommt, die Ausläufer in die den Z.-K. umgebende graue Substanz senden. Mehrere derartige hintereinanderliegende und durch ziemlich gleichgroße Zwischenräume getrennte Nervenzellen konnte ich in einer lückenlosen Serie von etwa 200 Schnitten nachweisen. Eingehendere Untersuchungen über dieses eigentümliche Verhalten wurden bis jetzt nicht angestellt. Es kommt hier eine Anzahl intraependymal liegender, birnförmiger Zellen vor, die große, bläschenförmige und chromatinarme Kerne haben. Sowohl Nissl-Färbungen als auch Neurofibrillenimprägnationen haben indessen negative Resultate ergeben, und ich kann mich daher nicht mit Bestimmtheit über die Natur dieser Zellen äußern, wenn ich es auch für sehr wahrscheinlich halte, daß sie zu der Gruppe der i. N.-Z. zu rechnen sind.

Hippoglossus hippoglossus hat Nissl-Körnchen in den i. N.-Z., die etwas in der Größe variieren. Diese Zellen kommen am zahlreichsten ventral im Z.-K. vor. Das freie Ende ihres zentral gerichteten Ausläufers variiert etwas in Form und Lage.

Zoarces viviparus (hierzu Abb. 36; Tafel X) hat schöne, mit Toluidinblaufärbung leicht nachweisbare i. N.-Z. (s. Abb. 36), die wenigstens in meinen Präparaten zahlreicher ventral als bilateral und dorsal vom Z.-K. vorkommen.

Anarrhichas lupus hat zahlreiche birnförmige i. N.-Z., von denen einige recht langgestreckt sind. Diese Zellen senden ihren zentral gerichteten Ausläufer ein recht großes Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo deren freies Ende gewöhnlich etwas zugespitzt ist. Die Kerne der i. N.-Z. sind bläschenförmig, chromatinarm und mit recht großen Nucleolen versehen.

Callionymus lyra hat zahlreiche, in Präparaten mit gelungener Toluidinblaufärbung schön hervortretende i. N.-Z. Diese Zellen scheinen recht diffus im Ependym verteilt zu sein. Ein Teil der Präparate spricht für eine größere Frequenz der i. N.-Z. ventral im Z.-K. Bei

Trigla gurnardus zeigen meine mit Toluidinblau gefärbten Präparate sehr spärlich vorkommende i. N.-Z. Bei

Cottus scorpius treten in den mit Toluidinblau gefärbten, 5μ dicken Schnitten i. N.-Z. sehr schön hervor. Sie sind in der Regel bedeutend größer als die eigentlichen Ependymzellen. Es kommen bi- bis multipolare Formen vor. Die Kerne sind wie gewöhnlich groß, bläschenförmig, chromatinarm und mit einem recht großen Nucleolus versehen. Der zentral gerichtete Ausläufer erstreckt sich unbedeutend in das Lumen des Z.-K. hinein. Das Protoplasma dieser i. N.-Z. färbt sich völlig wie das der mehr peripher liegenden großen Nervenzellen, d. h. Nissl-Körnchen heben sich von einem schwach rosagefärbten Protoplasma ab.

Labrus berggylta (hierzu Abb. 41; Tafel XI) hat recht zahlreiche, bei gelungener Toluidinblaufärbung schön hervortretende i. N.-Z. (dünne Schnitte — 5μ — und langanhaltende Färbung in stark verdünnten Farblösungen sind zu empfehlen). Die i. N.-Z. sind längs des ganzen Z.-K. recht diffus verteilt, jedoch kann man nicht selten ventral ein zahlreicheres Vorkommen feststellen als anderswo. Ihr kernführender Abschnitt liegt gewöhnlich ganz intraependymal. Eine nennenswerte Variation in der Größe habe ich bei diesen Zellen nicht nachweisen können (s. Abb. 41). Die Zellen sind in der Regel bipolar, nur ausnahmsweise wurden multipolare Formen gefunden. Das freie Ende des zentral gerichteten Ausläufers liegt entweder in Höhe der inneren Fläche des Ependyms oder ragt unbedeutend in das Lumen des Z.-K. hinein. Die Kerne sind bläschenförmig, chromatinarm und mit einem scharfbegrenzten, relativ großen Nucleolus versehen. Die eigentlichen Ependymzellen treten bei dieser Färbung weniger deutlich hervor. Beinahe dieselben Verhältnisse zeigen *Labrus exoletus*, *melops* und *rupestris*.

Labrus mixtus (hierzu Abb. 43; Tafel XI) unterscheidet sich von den oben erwähnten Labrusarten u. a. durch das Vorkommen einer großen Zahl von ventral und teilweise bilateral im Ependym des Z.-K. gelegener Zellen, die große, bläschenförmige, chromatinarme und mit einem großen Nucleolus versehene Kerne haben. Nur bei einer geringen Anzahl dieser Zellen habe ich Nissl-Körnchen nachweisen können. Die Neurofibrillenimprägnation ließ argentophile Faserstruktur bei einer größeren Anzahl dieser Zellen erkennen (s. Abb. 43). Weitere Untersuchungen sind nötig, um den Charakter der Zellen festzustellen, die ventral im Ependym des Z.-K. vorkommen und keine Nissl-Körnchen zeigen. Dorsal im Ependym des Z.-K. haben die Zellen eine Struktur, die an die bei *Labrus berggylta* erinnert.

IV. Amphibia.

Amblystoma mexicanum (Axolotl). Außer den gewöhnlichen Ependymzellen sieht man in den mit Hämatoxylin gefärbten Präparaten eine Anzahl intraependymal liegender Zellen, die einen bläschenförmigen, chromatinarmen Kern haben. Mit Ag-Imprägnationen ist es mir nie gelungen, deutliche Neurofibrillen in diesen Zellen nachzuweisen, sie zeigen lediglich eine etwas dunklere Protoplasmafärbung

als die eigentlichen Ependymzellen. Dies ist in erster Linie auf eine weniger gut gelungene Imprägnation zurückzuführen. Mit Toluidinblau gefärbte Präparate lassen eine Blaufärbung des Protoplasmas in den fraglichen Zellen erkennen.

Molge vulgaris et palustris zeigen beide hinsichtlich der i. N.-Z. dieselben Verhältnisse. Diese Zellen haben relativ große, bläschenförmige und chromatinarme Kerne, die in verschiedener Höhe, oft recht weit peripher liegen. Mit Toluidinblau gefärbte Präparate lassen zwar Blaufärbung des Protoplasmas, aber keine deutlichen Tigroidschollen erkennen. In Ag-imprägnierten Präparaten treten Neurofibrillen nicht deutlich hervor, das Protoplasma aber ist dunkel gefärbt. In einigen derartigen Präparaten waren die Kerne der i. N.-Z. bedeutend dunkler als die der Ependymzellen, ließen also ein Verhalten erkennen, das an die obenerwähnten eigentümlichen Verhältnisse in einigen Präparaten von *Squalus* erinnert (s. oben und Abb. 28). Die i. N.-Z. sind bei diesen Tieren, soweit meine Präparate es zeigen, längs des ganzen Rückenmarks ziemlich gleichmäßig verteilt.

Rana arvalis, temporaria et esculenta. (Hierzu Abb. 46; Tafel XI.) Bei diesen Tieren haben in meinen Präparaten die Nervelemente des Ependyms eine ziemlich gleichmäßige Anordnung. Verstreut zwischen den gewöhnlichen Ependymzellen sieht man ab und zu i. N.-Z., die von recht wechselnder Größe sind, ihre bläschenförmigen Kerne liegen in verschiedener Höhe, gewöhnlich aber peripher in Höhe der peripheren Kerne der Ependymzellen und treten wegen ihrer helleren Färbung und des großen Nucleolus deutlich hervor. Die Form dieser Zellen variiert. Die kurzen Zellen sind birnförmig, die langen mehr keilförmig. Toluidinblaufärbungen haben bei diesen Zellen einige Nissl-Körnchen zum Vorschein gebracht. In Ag-imprägnierten Präparaten ist das Protoplasma der fraglichen Zellen höchstens dunkler gefärbt, ohne deutliche Neurofibrillen hervortreten zu lassen.

In Golgi-Präparaten treten die i. N.-Z. nur ausnahmsweise deutlich hervor, lassen dagegen feine, verzweigte Ausläufer gut erkennen. Im Ependym der Medulla spinalis treten in Golgi-Präparaten zuweilen Nervenfasern hervor, die in Verlauf und Endigung im Prinzip mit den in Abb. 46 abgebildeten übereinstimmen. Dagegen habe ich diese Fasern nicht bis zu Nervenzellen verfolgen können. Ähnliche Nervenfasern treten auch in einem Teil der Golgi-Präparate aus der Gegend der Gehirnventrikel bei denselben Tieren hervor. Hier kann man diese Nervenfasern vom Ependym der Ventrikel bis in Zellen von nervösem Charakter verfolgen. Daß auch die in Abb. 46 abgebildeten Fäden nervöser Natur sind, scheint mir mehr als wahrscheinlich zu sein. Für diese Ansicht sprechen außer dem Ergebnis des Vergleiches mit den Nervenfasern im Ependym der Gehirnventrikel auch das Aussehen, der Verlauf und die Endigung der fraglichen Fäden. Wenn man also voraussetzen darf, daß alle diese Endigungen vollständig gefärbt sind, hätten wir also teils mit Auftreibungen, teils spitz endigende Nervenfasern. Die meisten der mit Auftreibungen endigenden Nervenfasern sind meines Erachtens vollständig gefärbt. Ich bin dagegen nicht davon überzeugt, daß dasselbe auch für die spitz endigenden Nervenfasern (s. Abb. 46) gilt. Diese Nervenfasern erinnern in gewisser Beziehung an die von *Pensa*⁶⁹⁾ beschriebenen. Man kann jedoch fast mit Bestimmtheit sagen, daß zwischen

den von mir im Ependym bei *Rana* gefundenen Nervenfasern (Abb. 46) und den von *Pensa* im Ependym des Z.-K. bei *Canis familiaris* beschriebenen und abgebildeten Fasern bestimmte Unterschiede bestehen. In dem Teil des Präparates, der der Abb. 46 zugrunde liegt, finden sich eigentlich nur 3 absolut sichere Nervenendigungen, und sie erstrecken sich alle nur ein sehr kleines Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, liegen also nur zum Teil zentral vom Ependym. Die zwei etwas mehr peripher im Ependym liegenden und mit knötchenförmigen Auftreibungen endigenden Nervenfasern (Abb. 46) können sehr wohl unvollständige Färbungen sein; die Knötchen können z. B. einer der weiter peripher längs des ganzen Nervenfadens liegenden knötchenförmigen Auftreibungen entsprechen. Wenn die von *Pensa* in Golgi-Präparaten gefundenen und als Nervenfasern beschriebenen Fasern, die im Ependym verlaufen, wirklich Nervenfasern sind, und wenn die als Punkte gezeichneten Enden dieser Fasern nervöse Endorgane sind, so liegen sie alle innerhalb des Ependyms und erstrecken sich also nicht in das Lumen des Z.-K. hinein wie die von mir oben beschriebenen und abgebildeten Nervenfasern.

Pensa meint, daß die von ihm gefundenen und als Nervenfasern beschriebenen Bildungen die sekretorische Innervation des Ependyms besorgen. Das kann aber kaum der Fall sein bei Nervenfasern, die zentral vom Ependym im Lumen des Z.-K. enden. Ich sehe vielmehr in den von mir gefundenen Nervenfasern und ihren tatsächlich als Endapparate aufzufassenden Knötchen Bildungen, die an einen Teil der Endapparate erinnern, die ich beim Hai im Ependym der Fossa rhomboidea gefunden und unten näher beschrieben habe.

Hyla arborea, Bufo calamita, viridis et bufo. Bei diesen Tieren habe ich mit Ag-Imprägnationen, Toluidinblau- und Hämatoxylinfärbung das Vorkommen von i. N.-Z. beweisende Präparate erhalten. Die fraglichen Zellen haben große, chromatinarme Kerne, die verschieden weit peripher liegen. Auch Neurofibrillen und Nissl-Körnchen habe ich in einem Teil dieser Zellen nachweisen können.

V. Reptilia.

Lacerta vivipara hat im Ependym des Rückenmarks zahlreiche deutliche i. N.-Z., die von variierender Größe sind und deren bläschenförmiger und chromatinarmer Kern verschieden weit peripher liegt. Bei einem Teil der i. N.-Z. liegen die Kerne peripher von den Kernen der Ependymzellen, bei einem anderen Teil in gleicher Höhe mit diesen. Neurofibrillen und Nissl-Körnchen wurden in einigen i. N.-Z. nachgewiesen. Die Zellen haben gewöhnlich einen bis in das Lumen des Z.-K. sich erstreckenden zentralen und einen bis mehrere periphere Ausläufer.

Lacerta agilis. Auch bei diesem Tiere wurden zahlreiche i. N.-Z. nachgewiesen. Die Zellen liegen nicht in Gruppen, sondern finden sich abwechselnd mit Stütz- oder Ependymzellen, haben variierende Größe und sind recht langgestreckt und ziemlich schmal. Größere Typen von ihnen wurden nicht gefunden.

Ascalabotes fascicularis (Gecko) hat deutliche, mehr oder weniger birnförmige i. N.-Z., deren bläschenförmiger Kern zuweilen peripher vom Ependym liegt. Die Kerne sind chromatinarm und mit einem großen Nucleolus versehen. Neurofibrillen wurden in mehreren größeren Formen dieser Zellen gefunden.

Anguis fragilis (hierzu Abb. 48; Tafel XII) hat zahlreiche i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. In Abb. 48 ist ein Querschnitt durch den Z.-K. vom Ag-imprägnierten Rückenmark dieses Tieres abgebildet. Wie aus der Abbildung hervorgeht, finden sich in dem Schnitte 4 i. N.-Z., die einen großen, bläschenförmigen Kern mit großem Nucleolus und eine an Neurofibrillen erinnernde Faserstruktur sowie zwei bis mehrere Ausläufer besitzen. Diese Zellen sind von variierender Größe, ihre Kerne liegen verschieden weit peripher. In den Zellen, deren Kern näher dem Lumen des Z.-K. liegt, ist der zentral gerichtete Ausläufer oft breiter und umgekehrt, wenn man gleich große i. N.-Z. miteinander vergleicht (s. Abb. 48). In einigen Ag-imprägnierten Präparaten ist der Kern der i. N.-Z. dunkler, in den meisten Präparaten dagegen heller als der der Ependymzellen. Der zentral gerichtete Ausläufer ragt, wenigstens bei einem Teil der Fälle, mit seinem zugespitzten Ende etwas in das Lumen des Z.-K. hinein (s. Abb. 48). In mit Hämatoxylin und Toluidinblau gefärbten Präparaten sind die Kerne der i. N.-Z. wegen ihrer geringeren Chromatinmenge bedeutend heller als die der Ependymzellen. In mit Toluidinblau gefärbten Präparaten hat das Protoplasma konstant Blaufärbung — diffus bis Färbung kleiner Körnchen, während das Protoplasma der eigentlichen Ependymzellen ganz ungefärbt ist. In einigen Ag-imprägnierten Präparaten habe ich Zellen gefunden, die hinsichtlich ihrer Struktur an i. N.-Z. erinnern; diese Zellen liegen subependymal, und ihre ebenfalls subependymal gelegenen Ausläufer verlaufen eine große Strecke parallel zum Ependym. Sie sind wahrscheinlich mit den oben beschriebenen amakrinen Zellen identisch.

Vipera berus hat i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Sie liegen abwechselnd zwischen den Ependymzellen. Die Kerne dieser Zellen liegen oft in Höhe der inneren Kernreihe der Ependymzellen. Der zentral gerichtete Ausläufer erstreckt sich bisweilen ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo er an seinem freien Ende mitunter etwas verdickt ist. Das freie Ende ist mitunter aber auch abgerundet und liegt dann in Höhe der inneren Fläche des Ependyms. Im übrigen besteht große Verschiedenheit im Aussehen dieser Zellen an verschiedenen Stellen des Z.-K. An den Stellen, wo das Ependym mehr hoch ist, sind die i. N.-Z. mehr langgestreckt, an anderen Stellen wieder, wo das Ependym niedriger ist, sind sie kurz und birnförmig. In mit Toluidinblau gefärbten Präparaten ist das Protoplasma blaufärbt, zum Unterschied gegen die gewöhnlichen Ependymzellen, deren Protoplasma ungefärbt ist. Auch Nissl-Körnchen wurden in einigen größeren i. N.-Z. nachgewiesen.

Tropidonotus natrix. Im Ependym der Ringelnatter finden sich birnförmige Zellen mit bläschenförmigem Kern, die einen großen Nucleolus haben. In den mit Hämatoxylin und Toluidinblau gefärbten Präparaten sind die Kerne dieser Zellen bedeutend chromatinärmer als die der eigentlichen Ependymzellen. Die birnförmigen Zellen sind anscheinend mit den intraependymalen Nervenzellen identisch. Sie zeigen in den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten eine Blaufärbung des Protoplasmas — einige dieser Zellen weisen auch Nissl-Körnchen auf. Die Kerne der i. N.-Z. liegen in verschiedener Höhe, in der Regel jedoch zwischen den peripheren Kernen des Ependyms. Die i. N.-Z. senden an einigen Stellen einen zentral gerichteten Ausläufer eine Strecke in das Lumen des Z.-K. hinein, wo er gewöhnlich etwas zugespitzt ist. An anderen Stellen dagegen enden

diese Ausläufer ohne Auftreibung in Höhe der inneren Fläche des Ependyms. In Golgi-imprägnierten Präparaten zeigen die Ependymzellen deutliche Cilien. Auch subependymal gelegene amakrine Nervenzellen sind bei diesem Tiere nachgewiesen.

Coronella austriaca hat zahlreiche i. N.-Z., die, nach meinem Material zu urteilen, denen der Ringelnatter ähneln.

Chrysemys marginata hat zahlreiche i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K., die in Form und Größe sehr variieren. Ihre Kerne liegen in verschiedener Höhe und sind chromatinarm, bläschenförmig und mit einem großen Nucleolus versehen. Gewöhnlich werden diese Zellen von Ependymzellen gestützt. In den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten hat das Protoplasma der i. N.-Z. diffuse Blaufärbung — in einigen Zellen wurden Nissl-Körnchen nachgewiesen.

Emys europaea. Das Material von diesem Tiere war nicht gut fixiert. Es gab jedoch einige Präparate, die zeigten, daß i. N.-Z. auch hier vorhanden sind.

Testudo graeca hat schöne i. N.-Z., die in der Größe sehr variieren und deren Zellkörper teils birnförmig, teils mehr langgestreckt sind. Ihre Kerne sind bläschenförmig und chromatinarm und liegen in verschiedener Höhe, zuweilen recht weit peripher. Unter den i. N.-Z. hat wenigstens ein Teil ein spitz auslaufendes Ende, das ein Stück in das Lumen des Z.-K. hineinragt. Ein Teil der i. N.-Z. hat recht bedeutende Größe, so z. B. hatten einige eine Breite von 9μ und eine Länge — vom peripheren Ende des Kernes bis zum Lumen des Z.-K. — von 20μ , während die eigentlichen Ependymzellen eine Breite von $2-4\mu$ und variierende Länge haben. In Toluidinblaupräparaten zeigt ein Teil der i. N.-Z. Blaufärbung des Protoplasmas, während in einigen anderen deutliche Nissl-Körnchen vorhanden sind. Neurofibrillen wurden in der Mehrzahl der i. N.-Z. nachgewiesen.

Alligator mississippiensis. (Hierzu Abb. 47; Tafel XII.) Das Ependym ist hoch und von langgestreckten Zellen aufgebaut, deren Kerne in mehreren Reihen geordnet sind. Längs des ganzen Z.-K. kommen zahlreiche i. N.-Z. vor. Eine bestimmte Anordnung dieser Zellen habe ich nicht nachweisen können. Sie liegen mit ihrem kernführenden Zellabschnitt in der Regel ganz intraependymal und zeigen recht wechselnde Größe. Die kleinsten Formen der i. N.-Z. haben eine Größe, die mit der der eigentlichen Ependymzellen beinahe übereinstimmt. Die größten Formen erreichen mehr als die doppelte Breite der Ependymzellen. Die i. N.-Z. sind gewöhnlich bipolar. Nur spärlich kommen tri- bis multipolare Formen dieser Zellen vor. Einer ihrer Ausläufer setzt sich bis zum Lumen des Z.-K. fort, wo er zuweilen in Höhe der inneren Fläche des Ependyms endet. Oft sieht man jedoch, daß der zentral gerichtete Ausläufer ein Stück in das Lumen des Z.-K. hineinragt. In diesem Falle ist sein freies Ende in der Regel etwas zugespitzt. In einigen Fällen sah ich borstenähnliche Bildungen, die sich vom freien Ende des zentral gerichteten Ausläufers scharf absetzten und ein Stück in das Lumen des Z.-K. hineinragten. Die Kerne der i. N.-Z. sind bläschenförmig, chromatinarm und mit einem bis mehreren Nucleolen versehen. Ihre Größe schwankt zwischen der der Ependymzellkerne und dem Mehrfachen. Die Kerne der i. N.-Z. können eine ähnlich wechselnde Lage haben wie die Kerne der gewöhnlichen Ependymzellen. Im Protoplasma der i. N.-Z. wurden Neurofibrillen und Nissl-Körnchen nachgewiesen. Auch bei Eisenalaun-Hämatoxylinfärbung tritt eine an Neurofibrillen erinnernde Faserstruktur gelegentlich auf.

VI. Aves.

Uria troille. Das Material war nicht von erstklassiger Qualität, doch beweisen die aus den Färbungen erhaltenen Resultate das Vorkommen von i. N.-Z. im Rückenmark. Auch der Teil des Z.-K., der den *Hoffmannschen* Kern durchzieht, besitzt derartige Zellen, wenngleich sie hier nur spärlich vorkommen.

Sterna hirundo hat zahlreiche i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Die fraglichen Zellen scheinen stellenweise spärlicher als anderswo vorhanden zu sein und haben dann recht kleine Formen. An anderen Stellen wiederum sind die Zellen zahlreicher und ein Teil von ihnen besitzt auch größere Dimensionen. Auch im mittleren Teil des *Hoffmannschen* Kernes sind die i. N.-Z. recht zahlreich. Die großen, bläschenförmigen und chromatinarmen Kerne dieser Zellen haben gewöhnlich unter mehreren Nucleolen einen größeren und liegen in ungleicher Höhe.

Sterna minuta besitzt i. N.-Z. von variierender Größe längs des ganzen Z.-K. Die bläschenförmigen, chromatinarmen Kerne liegen in ungleicher Höhe — zum Teil sogar recht weit peripher — und sind höchstens doppelt so groß wie die der typischen Ependymzellen. Sie erscheinen ferner im Ag-impregnierten Präparat bedeutend heller als diese. In solchen Präparaten mit gelungener Imprägnation sieht man deutlich Neurofibrillen in diesen Zellen. In toluidinblau-gefärbten Präparaten kann man bei einigen i. N.-Z. Nissl-Körnchen in dem zentral vom Kern gelegenen Teil der Zelle nachweisen — andere derartige Zellen zeigen hier mehr oder weniger stark diffuse Blaufärbung.

Larus argentatus besitzt längs des ganzen Z.-K. schöne i. N.-Z. von sehr variierender Form und Größe; besonders große Formen kommen jedoch nicht vor. Bei einer Anzahl langgestreckter i. N.-Z. liegen die Kerne weit peripher von den Zellkörpern des Ependyms, bei anderen wiederum befinden sich die Kerne in ungleicher Höhe zwischen den Ependymzellen. Der mehr oder weniger lange, teils sehr feine, teils verhältnismäßig dicke, zentral gerichtete Ausläufer erreicht das Lumen des Z.-K., wo er entweder in Höhe der inneren Oberfläche des Ependyms endigt oder auch ein Stück in das Lumen zugespitzt sich fortsetzt. In diesen Zellen konnten Neurofibrillen und gelegentlich Nissl-Körnchen nachgewiesen werden. Auch multipolare i. N.-Z. gibt es bei diesem Tier. Ebenso ließen sich vereinzelt subependymal gelegene amakrine Nervenzellen nachweisen.

Larus ridibundus. Bei diesem Tiere wurden einige i. N.-Z. in verschiedenen Regionen des Rückenmarks festgestellt. Diese Zellen sind recht klein — jedoch deutlich größer als die eigentlichen Ependymzellen — und kommen wenigstens an den Stellen, von denen meine Präparate herrühren, verhältnismäßig spärlich vor.

Anser anser (hierzu Abb. 58; Tafel XIII) besitzt zahlreiche bi- und multipolare i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Die Zellen wechseln in der Größe, sind aber im allgemeinen recht groß. Siehe Abb. 58! Die chromatinarmen, bläschenförmigen Kerne dieser Zellen haben ein bis mehrere Nucleolen, die größer als die der Ependymzellen sind. Die Kerne liegen in wechselnder Höhe; vereinzelt finden sie sich weit peripher. Die Kerne fast aller i. N.-Z. liegen peripher von den Zellkörpern der eigentlichen Ependymzellen und bilden hier eine Reihe für sich. Wie aus der Abbildung hervorgeht, kommen die i. N.-Z. recht zahlreich vor. So

konnte ich an vielen Stellen eines und desselben 10 μ dicken Schnittes mehr als 10 derartige Zellen nachweisen. In meinen Präparaten sind die i. N.-Z. in der Lendenregion deutlich größer als an anderen Stellen. Auch in der Mitte des *Hoffmannschen* Kerns finden sich viele i. N.-Z. Hier kann man den peripheren Ausläufer dieser Zellen in wirkliche Nervenfasern übergehen sehen.

Cygnus olor besitzt i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K., ebenso in dem Teil, der den *Hoffmannschen* Kern durchzieht. Die Zellen sind recht klein und treten deshalb nicht so deutlich hervor. Die Kerne sind oval, bläschenförmig und chromatinarm und besitzen einen bis mehrere deutliche Nucleolen. Sie liegen in ungleicher Höhe, mitunter recht weit peripher. Im toluidinblaufärbten Präparat ist das Protoplasma dieser Zellen blaufärbt — Nissl-Körnchen konnte ich jedoch nicht ermitteln. Im gelungenen neurofibrillen-impregnierten Präparat besitzen die i. N.-Z. bei diesem Tier undeutliche Neurofibrillen.

Anas platyrhynchos. Bei diesem Tier untersuchte ich nur die Brust-, Lenden- und Sakralregion, fand aber durchweg i. N.-Z. von wechselnder Größe, jedoch keine besonders großen. Bei einer Anzahl dieser Zellen konnte ich feststellen, daß der zentral gerichtete Ausläufer zugespitzt war und deutlich in das Lumen des Z.-K. sich fortsetzte. Die bläschenförmigen Kerne der Zellen lagen ungleich weit peripher — bei einem Teil befanden sie sich besonders weit peripher vom Ependym. Die i. N.-Z. der letzteren Art haben in der Regel einen fast fadenartigen zentral gerichteten Ausläufer.

Somateria mollissima besitzt i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Sie haben wechselnde Größe, sind jedoch nicht besonders groß. Auch in Höhe des *Hoffmannschen* Kernes finden sich in jedem Schnitt gewöhnlich mehrere i. N.-Z. abwechselnd mit stützenden Ependymzellen.

Scelopax rusticola besitzt zahlreiche i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Die Zellen haben wechselnde Größe und sind in der Regel recht klein.

Totanus totanus. Das untersuchte Tier hatte in Höhe des *Hoffmannschen* Kernes, wo der Z.-K. einheitlich war, eine spärliche Anzahl i. N.-Z. von kleinen und mittelgroßen Formen. In Höhe der Thorakalregion besteht der Z.-K. aus zwei im Zusammenwachsen begriffenen bilateralen Teilen. An anderen Stellen innerhalb derselben Region ist der Z.-K. einheitlich, jedoch im Zusammenwachsen begriffen. In anderen Gegenden der Thorakalregion wiederum läßt sich eine durchgängige Zusammenwachsung des Z.-K. konstatieren und das Ganze sieht im Querschnitt wie eine kernreiche Fläche aus — kleine Zellen mit chromatinreichen Kernen. An denjenigen Stellen, an welchen der Z.-K. im Zusammenwachsen begriffen ist, erweisen sich die dorsal gelegenen Ependymzellen oft noch intakt. Zwischen diesen Ependymzellen kann man Zellen nachweisen, die in ihrer Form und im Aussehen ihres Kernes an i. N.-Z. erinnern; Neurofibrillen konnten dagegen in diesen Zellen nicht ermittelt werden. An den Stellen, an welchen der Z.-K. vollständig zusammengewachsen ist, ließen sich i. N.-Z. oder an diese erinnernde Zellen nicht feststellen. Der *Reissnersche* Faden, der dort vorhanden ist, wo der Z.-K. noch weit offen ist, war an den zusammengewachsenen oder im Zusammenwachsen begriffenen Stellen nicht nachzuweisen. Der Z.-K. in der Cervicalregion zeigt ähnliche Verhältnisse wie in der Thorakalregion.

Da ich jedoch nur ein Tier untersuchte, ist es natürlich unmöglich, sich über das gewöhnliche Vorkommen dieser Eigentümlichkeiten bei der fraglichen Art zu äußern.

Numenius arquatus besitzt zahlreiche i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. In der Cervical- und Thorakalregion sind die i. N.-Z. in der Regel bedeutend größer als die eigentlichen Ependymzellen, die recht kleine Dimensionen haben. Die Kerne sind groß, bläschenförmig, chromatinarm und mit einem großen Nucleolus versehen. Sie liegen in ungleicher Höhe, mitunter weit peripher vom Ependym. Diese i. N.-Z. haben deutliche Neurofibrillen, auch Nissl-Körner konnten bei einigen ermittelt werden. Die Zellen sind bi- bis multipolar und senden einen ihrer Ausläufer in das Lumen des Z.-K., wo er entweder in Höhe der inneren Oberfläche des Ependyms endet oder sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein zugespitzt fortsetzt. Das letztere Verhalten konnte ich vielfach konstatieren. Der in das Lumen sich fortsetzende Teil des zentralen Ausläufers steht mit dem *Reissnerschen* Faden nicht in Verbindung. Diese Bildung scheint dagegen mittels einer Anzahl von fadenähnlichen Gebilden — koagulierte Inhalt des Z.-K. — mit einigen Ependymzellen in Verbindung zu stehen. Unmittelbar unter den Ependymzellen stellte ich Nervenzellen fest. Diese sind wahrscheinlich den oben beschriebenen, subependymal gelegenen amakrinen Zellen analog.

Bei diesem Tiere finden sich auch intraependymal verlaufende Nervenfasern. Ein zu diesen Nervenfasern gehörendes Endorgan konnte in keinem Falle nachgewiesen werden. Wahrscheinlich sind wenigstens einige dieser Nervenfasern zu unvollständig gefärbten Commissurfasern zu rechnen.

In der Lumbal-, Sakral- und Coccygealregion, also auch in dem Teil des Z.-K., der durch den *Hoffmannschen* Kern verläuft, finden sich im Ependym zahlreiche i. N.-Z. Die meisten dieser Zellen liegen mit ihrem breiten, kernführenden Teil peripher von den Ependymzellen. Die im mittleren Teil des *Hoffmannschen* Kernes befindlichen i. N.-Z. besitzen einen mehr oder weniger fadenförmigen zentral gerichteten Ausläufer, der bis zum Lumen des Z.-K. heranreicht; letzterer ist hier spaltförmig verengt (Kunstprodukt?). In meinen neurofibrillen-imprägnierten Präparaten aus diesen Regionen treten die i. N.-Z. sehr schön hervor, und man kann an mehreren Stellen sehen, wie der anfangs wegen der lockeren Struktur seiner neurofibrillären Substanz hell gefärbte periphere Ausläufer weiter peripher in einen wirklichen, schwarzimprägnierten Nervenfasern übergeht. Auch im Conus terminalis finden sich mehrere i. N.-Z. In diesen Regionen — in Übereinstimmung mit den Verhältnissen weiter kranial — senden die fraglichen Zellen in der Regel einen zugespitzten zentralen Ausläufer ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein.

Numenius phaeopus besitzt ebenfalls zahlreiche i. N.-Z., die im Prinzip mit denen bei *Numenius arquatus* übereinstimmen.

Haematopus ostralegus hat längs des ganzen Z.-K. i. N.-Z. von verhältnismäßig kleinen Dimensionen. An einigen Stellen im Thorakalrückenmark sind derartige Zellen quer durch das Lumen des Z.-K. gewachsen, bilden sonach Commissurenzellen. Dieses Verhalten erinnert an dasjenige, das normalerweise der zusammengewachsene spaltförmige dorsale Teil des Z.-K. beim Lanzettfisch zeigt. Daß das genannte Verhalten bei der Strandstelze ebenfalls mit einer be-

ginnenden Zusammenwachsung des Z.-K. zusammenhängt, dürfte sicher sein. Die Kerne der i. N.-Z. sind chromatinarm, bläschenförmig und mit einem verhältnismäßig großen Nucleolus versehen und liegen in ungleicher Höhe, jedoch in der Regel innerhalb der Ependymschicht. Nissl-Körnchen konnten in den fraglichen Zellen nicht nachgewiesen werden — eine Blaufärbung des Protoplasmas dagegen bewirkte die Nissl-Färbung oft.

Lyrurus tetrax besitzt i. N.-Z. in allen Regionen des Rückenmarks; auch in den zentralen Teilen des *Hoffmannschen* Kernes kommen solche vor. Die i. N.-Z. variieren sehr in ihrer Größe. Recht große derartige Zellen wurden in der Thorakal- und Cervicalregion gefunden. Die chromatinarmen, bläschenförmigen Kerne liegen in ungleicher Höhe, oft peripher vom Ependym. Toluidinblaugefärbte Präparate zeigen in einer Anzahl größerer Formen der i. N.-Z. schöne Nissl-Körnchen; in anderen derartigen Zellen besteht eine fast diffuse Blaufärbung.

Meleagris gallopavo (hierzu Abb. 49; Taf. XII) hat zahlreiche i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K., ebenso im zentralen Teil des *Hoffmannschen* Kernes. In der Abb. 49 wird ein Querschnitt durch den Z.-K. in Höhe des vorderen Endes des genannten Kernes wiedergegeben. Wie die Abbildung zeigt, zeichnen sich die i. N.-Z. durch Größe der Zellkörper und Kerne nicht besonders aus, sondern sie treten erst bei Spezialfärbungen deutlich hervor. Ein Teil der Ependymzellen ist nämlich sogar größer und hat größere Kerne als die gewöhnlichen Formen der hier vorkommenden i. N.-Z. Die Kerne der i. N.-Z. sind indessen etwas chromatinärmer, mehr abgerundet und bläschenförmiger als die der Ependymzellen, bei denen sie oft kantige und unregelmäßige Formen haben. Außerdem ist der Nucleolus in den Kernen der i. N.-Z. größer und tritt stärker hervor als der in den Ependymzellkernen. Die Kerne der fraglichen Zellen liegen in ungleicher Höhe und oft peripher von den Kernen der Ependymzellen. Die i. N.-Z. sind bi- bis multipolar und senden stets einen ihrer Ausläufer zwischen die Ependymzellen bis in das Lumen des Z.-K. Das zentrale Ende dieses Ausläufers hat in gelungenen neurofibrillen-imprägnierten Präparaten teilweise körnige Struktur. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, liegen zwei größere Körner an der Peripherie des Ausläufers, während sich kleinere dem freien Ende nähern. Aus der Einstellung in verschiedenen Ebenen geht deutlich hervor, daß diese größeren Körner in Wirklichkeit ein Band darstellen, das rund um den Ausläufer verläuft — ähnliche Bildungen kommen auch an den Ependymzellen vor und sind wahrscheinlich Schlußleisten. Die feineren Körner in der Spitze des Ausläufers konnten nicht sicher identifiziert werden. Sie stehen nicht in Zusammenhang mit dem kurzen Haar, das vom Ende des Ausläufers in das Lumen des Z.-K. ragt. Sie erinnern ferner nicht an Zentralkörper — solche wurden in einer Anzahl Ependymzellen festgestellt. Die betreffenden kleinen Körner scheinen auch keine Präcipitate zu sein und werden in Eisenalaun-Hämatoxylinpräparaten nicht sichtbar. Beachtenswert sind die kurzen, borstenähnlichen Bildungen, die sich vom zentral gerichteten Ausläufer der i. N.-Z. ein Stück in das Lumen des Z.-K. fortsetzen (s. Abb. 49). Nissl-Körnchen und Neurofibrillen wurden in einer Anzahl dieser Zellen nachgewiesen.

Gallus domesticus besitzt i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Die Zellen haben variierende Größe, sind jedoch ziemlich klein. Ihre Kerne liegen in verschiedener

Höhe, mitunter recht weit peripher von den Ependymzellen. Sie sind oval bis rund, chromatinarm und haben einen bis mehrere Nucleolen. Die i. N.-Z. setzen sich mit dem zugespitzten Ende des zentral gerichteten Ausläufers in der Regel ein Stück in den Z.-K. fort. Die freien Enden der Ausläufer scheinen mit dem R.-F. weder in Verbindung noch in Kontakt zu stehen.

Perdix perdix. Das Material dieses Tieres war von keiner guten Beschaffenheit. Die Resultate machen es jedoch höchst wahrscheinlich, daß sich auch hier i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. vorfinden.

Columba aenas besitzt längs des ganzen Z.-K. i. N.-Z., die in Höhe des Lumbalwulstes an Zahl stark variieren. In mehreren Schnitten fehlen die Zellen ganz, in anderen kommen sie spärlich vor und in anderen Schnitten von demselben Teil sind die i. N.-Z. zahlreich vorhanden. Die fraglichen Zellen variieren in der Länge und Breite. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich mit seinem zugespitzten Ende gewöhnlich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, ohne mit dem R.-F. in Verbindung zu treten.

Circus aeruginosus. Das Material dieses Tieres war nicht genügend frisch, um beweisende Bilder für das Vorhandensein i. N.-Z. liefern zu können. Daß sich jedoch derartige Zellen auch bei diesem Tiere vorfinden, machen die erhaltenen Resultate wahrscheinlich.

Accipiter nisus hat i. N.-Z. an verschiedenen Stellen des Z.-K. Diese Zellen besitzen recht kleine Dimensionen und treten deshalb nicht so deutlich hervor. An anderen Stellen ist der Z.-K. völlig zusammengewachsen; hier konnten i. N.-Z. nicht nachgewiesen werden. Auch an mehreren anderen Stellen, an denen der Z.-K. noch vollständig offen war, ließen sich i. N.-Z. trotz der meist gelungenen Färbungen nicht ermitteln. Die gefundenen i. N.-Z. haben ovale bis runde Kerne mit geringer Chromatinmenge und einem bis mehreren Nucleolen. Die Kerne liegen in ungleichen Ebenen, teils in Höhe der Ependymzellen, teils peripher von diesen. Bei den meisten dieser i. N.-Z. ließen sich deutlich Neurofibrillen nachweisen, jedoch keine Nissl-Körnchen.

Milvus milvus zeigt betreffs der i. N.-Z. ähnliche Verhältnisse wie *Accipiter nisus*.

Pandion haliaëtus (hierzu Abb. 59; Taf. XIII). Hier setzt sich wie bei anderen Vögeln der Z.-K. direkt durch den *Hoffmannschen* Kern fort und liegt gegen dessen Mitte ziemlich weit dorsal.

Der Z.-K. wird hier also von allen Seiten von dieser eigentümlichen Gliabildung umgeben. Der Gliakern ist ebenso wie bei anderen Vögeln von zahlreichen Commissurnervenfaser durchzogen. Die i. N.-Z., welche nach den oben mitgeteilten Ergebnissen bei der Mehrzahl der beschriebenen Vögel auch in den zentralen Teilen der genannten Gliabildung zahlreich vorkommen, sind bei *Pandion* sehr spärlich. Sobald der Z.-K. gegen das Ende des Kernes mit der darunterliegenden grauen Substanz des Rückenmarks in Berührung kommt, treten die i. N.-Z. zahlreich auf. Am zahlreichsten sieht man hier die Zellen bilateral, aber sie können auch dorsal und ventral vorhanden sein. Auch in den übrigen Teilen des Z.-K. treten die i. N.-Z. zahlreich auf. Ihre Größe und Form variiert sehr (Abb. 59). Sie sind bi- bis multipolar und haben stets einen bis zum Lumen des Z.-K. sich fortsetzenden Ausläufer; dieser erstreckt sich mit seinem

zugespitzten Ende gewöhnlich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, erreicht aber nicht immer den R.-F. Dieser Faden scheint gewöhnlich mit einer Anzahl Ependymzellen durch fadenförmige Bildungen in Zusammenhang zu stehen, die bei der Fixierung durch Koagulation des Inhalts des Z.-K. entstanden sind. Die Kerne der i. N.-Z. sind, wie aus der Abb. 59 ersichtlich ist, meistens nicht größer als die der Ependymzellen — eine Anzahl zeigt eher das Gegenteil —, sie sind jedoch mehr abgerundet und bläschenförmig und besitzen einen großen Nucleolus, während die Ependymzellen einen bis mehrere kleine Nucleolen aufweisen. Die Kerne treten in hämatoxylin- und toluidinblaugefärbten Präparaten wegen ihres geringen Chromatingehaltes ziemlich hell hervor und sind hierdurch leicht von denen der Ependymzellen zu unterscheiden. Sie liegen, wie aus der Abb. 59 teilweise ersichtlich ist, in sehr variierender Höhe; in einigen Fällen lagen sie so weit peripher, daß der zentral gerichtete Ausläufer eine Länge bis zu 70 μ (Gl. a, 2. Reihe, 1. Schn. v. r.) erreichte. Die Neurofibrillen-Imprägnationen brachten sehr schöne Resultate in diesen i. N.-Z.

Bei *Buteo buteo* kommen i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. recht spärlich vor. Sie sind klein und mittelgroß, ungefähr wie bei *Pandion haliaëtus*. Das freie Ende des zentral gerichteten Ausläufers der i. N.-Z. verhält sich verschieden; zuweilen endigt es in Höhe der inneren Oberfläche des Ependyms, in anderen Fällen ragt es in das Lumen des Z.-K. hinein und ist dort gewöhnlich zugespitzt, mitunter aber auch etwas verdickt.

Falco subbuteo. Absolut beweisende Bilder für das Vorkommen von i. N.-Z. habe ich bei diesem Tiere nicht erhalten, obwohl das Material gut war und die Färbungen gelungen waren. Das eine und andere Bild deutet jedoch daraufhin, daß derartige Nervenzellen im Ependym des Z.-K. auch bei diesem Tiere vorkommen.

Falco peregrinus hat zahlreiche i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Die Größe der Zellen schwankt zwischen der der Ependymzellen und fast dem Doppelten. Ihre Form variiert nach der Lage des Kerns sehr. Die i. N.-Z. haben dann, wenn der Kern in der Nähe des Z.-K. liegt, gewöhnlich Spulenform. Liegt der Kern aber mehr oder weniger weit peripher, so haben die Zellen dieses Typs einen langgezogenen zentral gerichteten Ausläufer, der haarfein werden kann, wenn der Kern weit peripher liegt. Der Kern dieser Zellen unterscheidet sich nicht immer durch seine Größe von dem der Ependymzellen, sondern im wesentlichen nur dadurch, daß er abgerundet (oval bis rund), bläschenförmig und chromatinarm ist und einen bis mehrere große Nucleolen besitzt. Nissl-Körnchen waren in einigen größeren Formen der i. N.-Z. nachzuweisen. Ebenso ließen sich Neurofibrillen in einigen Zellen ermitteln.

Falco merillus. Das Material von diesem Tiere war weniger gut. Die Ergebnisse der Neurofibrillenimprägnationen sowie der Toluidinblau- und Hämatoxylinfärbungen beweisen jedoch das Vorkommen von i. N.-Z. Derartige Zellen scheinen sich längs des ganzen Z.-K. zu finden. Sie haben wechselnde Größe, ihre Kerne liegen in verschiedener Höhe.

Syrnium aluco (hierzu Abb. 61; Taf. XIII) besitzt längs des ganzen Z.-K. große i. N.-Z. mit Kernen, die sich von denen der Ependymzellen scharf unter-

scheiden. Die Kerne der i. N.-Z. ähneln fast völlig denjenigen typischer Nervenzellen. Sie sind bläschenförmig, fast sphärisch und sehr chromatinarm, mit einem verhältnismäßig großen Nucleolus versehen und haben einen Durchmesser, der um das 1,5—4 fache den kleinsten Durchmesser der länglichen Ependymzellkerne übertrifft. Die Kerne der i. N.-Z. liegen in ungleichem Abstände vom Lumen des Z.-K. und damit auch von den Kernen der Ependymzellen, deren Kerne ebenfalls in verschiedenen Höhenlagen sich finden können (s. Abb. 61). Die i. N.-Z. sind längs des Z.-K. ungleich verteilt. Gewöhnlich werden sie durch die Ependymzellen voneinander getrennt, aber gelegentlich wird auch Gruppierung der Zellen beobachtet. Links in Abb. 61 liegen 2 solche Zellen dicht nebeneinander. Es kommen in meinen Präparaten aber auch Beispiele vor, daß 3 bis 4 i. N.-Z. unmittelbar nebeneinander liegen können, ohne daß sie von Ependymzellen gestützt werden. Der zentral gerichtete Ausläufer der i. N.-Z. ragt mit seinem zugespitzten Ende gewöhnlich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein; mitunter endigt er aber auch abgestumpft in Höhe der inneren Oberfläche des Ependyms. Toluidinblaufärbte Präparate lassen sehr oft Nissl-Körnchen in diesen i. N.-Z. erkennen. Auch die Ergebnisse der Neurofibrillen-Imprägnationen beweisen, daß die fraglichen Zellen Nervenzellen sind.

Asio accipitrinus erinnert hinsichtlich des Vorkommens und des Verhaltens der i. N.-Z. sehr an *Syrnium aluco*.

Asio otus. Das Material von diesem Tiere war nicht von der besten Qualität. Die Resultate beweisen jedoch das Vorkommen von i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Diese Zellen sind recht groß und weichen — soweit ich es aus meinen Untersuchungsergebnissen beurteilen kann — nicht wesentlich von denen bei *Syrnium* ab.

Dryobates major besitzt zahlreiche und schöne i. N.-Z. von wechselnder Größe längs des ganzen Z.-K. Hier und da kommen auch i. N.-Z. von recht großen Dimensionen vor. So z. B. hatte der Zellkörper einer multipolaren i. N.-Z., die zum größten Teil peripher vom Ependym lag, eine Breite von 10μ und ihr Kern einen Durchmesser von 8μ . Der zentral gerichtete Ausläufer der fraglichen Zelle ragte mit seinem zugespitzten freien Ende 15μ weit in das Lumen des Z.-K. hinein. Auch i. N.-Z. von geringeren Dimensionen senden gewöhnlich einen zugespitzten Ausläufer in das Lumen des Z.-K. Die i. N.-Z. unterscheiden sich durch ihren bläschenförmigen chromatinarmen Kern mit einem großen Nucleolus leicht von den eigentlichen Ependymzellen. Eine ganze Anzahl i. N.-Z. zeigte in gelungenen neurofibrillen-impregnierten Präparaten schöne Neurofibrillenstruktur. Toluidinblaufärbung ließ in diesen Zellen teils diffuse Blaufärbung des Protoplasmas, teils Nissl-Körnchen erkennen. Auch subependymal gelegene amakrine Nervenzellen kommen vor.

Picus viridis. Das von diesem Tiere stammende Material war nicht von erstklassiger Qualität, so daß die Ergebnisse nicht als beweisend für das Vorhandensein von i. N.-Z. angesehen werden können. An mehreren Stellen längs des Z.-K. ließen sich jedoch Bilder nachweisen, die an solche Zellen erinnern.

Eustephanus galaritus. Gelungene Neurofibrillen-Imprägnationen vom Rückenmark dieses Tieres habe ich nicht erhalten können. Die erzielten Resultate deuten

jedoch auf das Vorkommen von Neurofibrillen in einer Anzahl größerer ependymaler Zellen hin. Außerdem hob die Toluidinblaufärbung die Tigroidsubstanz in einem Teil dieser Zellen hervor und machte dadurch deren Identität mit i.N.-Z. mehr als wahrscheinlich. Diese i. N.-Z. sind bedeutend größer als die eigentlichen Ependymzellen. Sie haben große, bläschen-, ja kugelförmige Kerne, die einen großen Nucleolus und geringen Chromatingehalt besitzen. Die Kerne variieren in der Lage, gewöhnlich liegen sie aber peripher im Ependym, zuweilen auch peripher von den Ependymzellen. Im untersuchten Material kommen sowohl bi- als auch multipolare i. N.-Z. vor.

Dandalus rubecula hat i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K., auch in den zentralen Teilen des *Hoffmannschen* Kernes. Die i. N.-Z. kommen in wechselnder Größe vor, sind aber gewöhnlich größer als die Ependymzellen. Ihre mit einem oder mehreren verhältnismäßig großen Nucleolen versehenen chromatinarmen und bläschenförmigen Kerne liegen in wechselnder Höhe — eine größere Frequenz in der Lage zentral oder andererseits peripher von den Kernen der Ependymzellen konnte ich in den untersuchten Präparaten nicht feststellen. Neurofibrillen waren in den fraglichen Zellen nachzuweisen, dagegen ließen Toluidinblaufärbungen irgendwelche Nissl-Körnchen nicht hervortreten.

Tardus pilaris besitzt i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Die Zellen sind nicht besonders groß; es kommen zuweilen jedoch Formen vor, die größer als die Ependymzellen sind. Die Kerne sind durch Bläschenform und ihren geringen Chromatingehalt charakterisiert und liegen in wechselndem Abstand vom Lumen des Z.-K. Die i. N.-Z. sind bi- und multipolar. Der zentral gerichtete Ausläufer ragt mit seinem zugespitzten Ende gewöhnlich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein.

Regulus regulus hat längs des ganzen Z.-K. i. N.-Z., die fast nur durch kleinere Formen vertreten sind. Ihre Kerne sind rund oder bläschenförmig und chromatinarm und liegen in wechselnder Höhe. Die i. N.-Z. zeigten in toluidinblaugefärbten Präparaten diffuse Blaufärbung des Protoplasmas, Nissl-Körnchen waren jedoch nicht nachzuweisen. Gelungene Neurofibrillen-Imprägnationen gewähren untrügliche Beweise für die nervöse Natur dieser Zellen. Die i. N.-Z. zeigen in derartigen Präparaten außer ihren bläschenförmigen Kernen eine durch dicht angehäuften feine Neurofibrillen bedingte Dunkelfärbung des Protoplasmas zum Unterschied von den Ependymzellen, bei denen die Zellkörper beinahe ungefärbt sind.

Parus caeruleus, palustris und major. Bei diesen Tieren gelang es mir nicht, völlig beweisende Bilder für das Vorkommen von i. N.-Z. zu erhalten. Mehrere auf verschiedene Weise gefärbte Präparate machen es jedoch mehr als wahrscheinlich, daß sich die fraglichen Zellen auch hier vorfinden.

Sitta europaea zeigt bezüglich der i. N.-Z. ein ähnliches Verhalten wie die Parusarten.

Motacilla alba besitzt zahlreiche i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Sie sind deutlich sichtbar auch in dem Teil des Z.-K., der durch den sogenannten *Hoffmannschen* Kern verläuft. Die i. N.-Z. treten jedoch durch ihre Größe nirgends besonders hervor. Sie unterscheiden sich von den eigentlichen Ependymzellen vor allem 1. durch ihre bläschenförmigen, chromatinarmen Kerne, die mit einem

oder mehreren verhältnismäßig großen Nucleolen versehen sind; 2. durch ihre in gelungenen neurofibrillen-impregnierten Präparaten hervortretende Neurofibrillenstruktur und 3. durch die in toluidinblaufärbten Präparaten deutlich auftretende Blaufärbung ihres Protoplasmas. — Nissl-Körnchen ließen sich jedoch nicht nachweisen.

Emberiza hortulana hat ebenfalls zahlreiche i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Diese Zellen erinnern sehr an die bei *Motacilla alba*. Jedoch finden sich auch einige i. N.-Z., die durch ihren größeren Umfang im Vergleich zu den Ependymzellen sich auszeichnen. Außer den gewöhnlich vorkommenden bipolaren i. N.-Z. ließen sich auch einige multipolare Formen ermitteln. Ferner scheinen hier und da subependymal gelegene Nervenzellen vorhanden zu sein, die aller Wahrscheinlichkeit nach zu dem oben beschriebenen anakrinen Zelltyp gehören.

Passer domesticus hat längs des ganzen Z.-K. zahlreiche und deutlich hervortretende i. N.-Z. Diese Zellen sind bereits durch ihre relativ große Form von den Ependymzellen deutlich zu unterscheiden. Ihre Größe variiert zwar, sie sind aber gewöhnlich größer als die Ependymzellen. Die bipolaren Formen herrschen vor, es finden sich aber auch tri- und multipolare Formen. Der zentral gerichtete Ausläufer variiert hinsichtlich des Verhaltens seines freien Endes. Oft ist dieses zugespitzt und ragt mehr oder weniger weit in das Lumen des Z.-K. hinein; ich besitze jedoch andererseits auch Präparate, die deutlich zeigen, daß dieser Ausläufer in Höhe der inneren Fläche des Ependyms enden kann, wobei sein freies Ende zuweilen etwas verdickt ist. Die peripher gerichteten Ausläufer sind gewöhnlich reich verzweigt. Gelungene Ag-impregnierte Präparate lassen öfters feine Neurofibrillen in diesen Zellen erkennen. Die Toluidinblaufärbung ließ nur ausnahmsweise Nissl-Körnchen hervortreten. In derartigen Präparaten ist gewöhnlich das Protoplasma dieser Zellen recht diffus blaufärbt, während es in den Ependymzellen ungefärbt ist. Die Kerne der i. N.-Z. liegen in verschieden weitem Abstände vom Z.-K., jedoch oft peripher vom Ependym.

Passer montanus. Bei diesem Tiere habe ich nur Stücke des Thorakal-, Lumbal- und Sakralmarks untersucht. In diesen Regionen finden sich i. N.-Z. von variierender Größe; auch einige relativ große derartige Zellen kommen vor. Die Zellen haben einen bläschenförmigen, chromatinarmen Kern, der in variierender Höhe, jedoch oft peripher vom Ependym liegt. Bi- und multipolare Formen der i. N.-Z. kommen vor. Der zentral gerichtete Ausläufer verhält sich hinsichtlich seines freien Endes wie bei *Passer domesticus*.

Chloris chloris. Die Neurofibrillen-Imprägnationen sind bei diesem Tiere nicht besonders gelungen. Die Resultate der Imprägnationen jedoch zusammen mit den Ergebnissen der Toluidinblau- und Hämatoxylinfärbungen beweisen das Vorkommen von i. N.-Z. Derartige Zellen sind, wenn auch nicht besonders zahlreich, längs des ganzen Z.-K. vorhanden. Die i. N.-Z. variieren in der Größe, sind im allgemeinen aber nicht nennenswert größer als die Ependymzellen. Die Bläschenform des Kernes und deren geringe Menge an Chromatin und die Reaktionen des Protoplasmas auf die genannten Spezialfärbungen heben jedoch die fraglichen Zellen deutlich hervor.

Linota cannabina, *Carduelis carduelis*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Serinus canaria* und *Carduelis canaria* verhalten sich hinsichtlich der i. N.-Z. wie *Chloris*.

Pinicola enucleator hat längs des ganzen Z.-K. i. N.-Z. Diese Zellen kommen jedoch innerhalb des *Hoffmannschen* Kernes relativ spärlich vor. Ihre Größe variiert. Sie sind relativ klein, obwohl ein Teil von ihnen größer als Ependymzellen ist. Die Kerne sind rund, chromatinarm und mit einem oder mehreren relativ großen Nucleolen versehen. Die Lage der Kerne wechselt, sie liegen jedoch oft peripher vom Ependym. Kleine Nissl-Körnchen wurden in größeren Formen der i. N.-Z. nachgewiesen. Die meisten Zellen zeigen nur schwache Blaufärbung des Protoplasmas in Toluidinblaupräparaten. Bei einigen größeren Formen der i. N.-Z. wurden deutliche Neurofibrillen nachgewiesen.

Pica pica (hierzu Abb. 60 u. 62; Tafel XIII) besitzt i. N.-Z. längs des ganzen Z.-K. Wie aus Abb. 60 und 62 hervorgeht, wechselt ihre Größe bedeutend. Die größten i. N.-Z. der Abb. 60 hatten eine Breite von 9μ , während die kleinsten Formen etwa 4μ breit sind und die Ependymzellen eine Breite von $2-6\mu$ haben. In gelungenen Neurofibrillen-impregnierten Präparaten zeigen die i. N.-Z. eine deutliche Neurofibrillenstruktur. Ihre Kerne, deren Größe etwas variiert, sind bläschenförmig chromatinarm und mit einem relativ großen Nucleolus versehen. Wenn mehrere i. N.-Z. in einem und demselben Schnitt vorkommen, sieht man oft, daß ihre Kerne sich in einer Reihe peripher von den Ependymzellen anordnen. Diese Kerne können aber auch in verschiedener Höhe zwischen den Kernen der Ependymzellen liegen. In Hämatoxylin- und Toluidinblaupräparaten treten die Kerne der i. N.-Z. vor allem wegen ihrer geringen Chromatinmenge deutlich hervor. Alle im Ependym liegenden hellen, runden Kerne gehören jedoch nicht zu den i. N.-Z., sondern hier finden sich auch einige Keimzellen, deren Kern heller als der der eigentlichen Ependymzellen ist. In Kresylviolett- und Toluidinblaupräparaten wurden Nissl-Körnchen bei allen Größen und Formen der i. N.-Z. nachgewiesen. Von den i. N.-Z. kommen in meinen Präparaten bi- und multipolare Formen vor. Von den verschiedenen Ausläufern verläuft einer in zentraler Richtung bis an das Lumen des Z.-K., wo er entweder mit einer kleinen Auftreibung in Höhe der inneren Fläche des Ependyms endet oder mit seinem zugespitzten Ende ein Stück in das Lumen des Z.-K. hineinragt. In meinen Präparaten finden sich gültige Beweise für diese beiden Endigungsarten. Außerdem wurden einige subependymal gelegene amakrine Nervenzellen nachgewiesen.

Coloeus monedula hat an den meisten Stellen des Z.-K. i. N.-Z. Diese Zellen sind außerordentlich klein und spärlich in dem Teil des Z.-K., der den *Hoffmannschen* Kern durchzieht. An den übrigen Stellen des Z.-K. erinnern diese Zellen sehr an die Verhältnisse bei dem folgenden Tiere. Subependymal gelegene amakrine Nervenzellen habe ich in den untersuchten Präparaten nicht nachweisen können.

Corvus cornix (hierzu Abb. 63, Tafel XIII) hat längs des ganzen Z.-K. i. N.-Z., die jedoch in Höhe des *Hoffmannschen* Kernes bemerkenswert spärlich vorkommen. In Neurofibrillen-impregnierten Präparaten zeigte sich, daß die Größe der i. N.-Z. zwischen der einer Ependymzelle und dem 4 fachen schwanken kann. Man kann also in derartigen Präparaten in der Regel bereits durch ihre Größe die i. N.-Z. von den gewöhnlichen Ependymzellen unterscheiden. Noch besser und leichter geschieht dies durch einen Vergleich der Kerne der betreffenden Zellen (s. Abb. 63). In Ependymzellen sind die Kerne chromatinreich, relativ klein und variieren zwi-

schen Spindel- und Kugelform. Diese Kerne besitzen außerdem einen bis mehrere kleine Nucleolen. In den i. N.-Z. dagegen sind die Kerne zumeist bläschenförmig und gewöhnlich bedeutend größer als die der Ependymzellen. Sie sind außerdem chromatinarm und mit einem großen Nucleolus versehen und liegen gewöhnlich zwischen den peripheren Ependymzellkernen, gelegentlich aber auch peripher von den Ependymzellen. Die i. N.-Z. sind bi- bis multipolar. Von den Ausläufern zieht einer gegen das Lumen des Z.-K. Sein freies Ende verhält sich verschieden zum Lumen des Z.-K. Gewöhnlich sieht man das zugespitzte Ende etwas in das Lumen des Z.-K. hineinragen; mitunter endet jedoch auch der Ausläufer mit einer kleinen Verdickung in Höhe der inneren Fläche des Ependyms. In Ag-imprägnierten Präparaten habe ich in mehreren derartigen Zellen Neurofibrillen nachweisen können. Bei einigen größeren Formen der i. N.-Z. wurden auch Nissl-Körnchen gefunden. Außer den i. N.-Z. sieht man gelegentlich auch subependymal gelegene kleine Nervenzellen, die hinsichtlich des Verhaltens ihrer Ausläufer an die oben beschriebenen amacrinen Zellen erinnern.

VII. Mammalia.

Ornithorhynchus anatinus. Das Material dieses Tieres hatte längere Zeit in Spiritus gelegen und gab deswegen keine beweiskräftigen Bilder für das Vorkommen von i. N.-Z. Höchstens können einige im Ependym gelegene Zellen derartige i. N.-Z. andeuten.

Didelphus virginiana. (Hierzu Abb. 65, Tafel XIII.) Von diesem Tiere wurden Stücke des Thorakal- und Cervicalrückenmarks untersucht. Die Ependymschicht besteht im allgemeinen aus einer Reihe von recht niedrigen, zylinderförmigen Zellen (s. *a* in Abb. 65). An anderen Stellen finden sich Andeutungen einer mehrreihigen Anordnung der Kerne im Ependym. Die einzelnen Zellen sind dann höher (s. *b* in Abb. 65). I. N.-Z. kommen recht häufig vor. Diese Zellen sind von sehr verschiedener Form und Größe. Die meisten von ihnen liegen mit ihrem Zellkörper direkt peripher vom Ependym, jedoch kommen auch Zellen vor, die ganz intraependymal liegen. Die kurzen intraependymalen Nervenzellen haben gewöhnlich Birnenform, während die langen mehr keilförmig sind. Die fraglichen Zellen sind durchweg größer als die Ependymzellen und können zuweilen relativ bedeutende Dimensionen haben (s. *b* in Abb. 65). Ihre Kerne sind bläschenförmig und chromatinarm und haben mindestens einen großen Nucleolus. Die i. N.-Z. sind bi- bis multipolar. Ihr zentral gerichteter Ausläufer ragt ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo er in der Regel ohne Auftreibung endet. Durch Färbung mit Toluidinblau konnten Nissl-Körnchen in einigen der größeren Nervenzellen nachgewiesen werden. Die Neurofibrillen-Imprägnationen lieferten dagegen keine gelungenen Resultate, was wahrscheinlich darauf beruht, daß das Material zu Anfang nicht gehörig konserviert war. Außer den i. N.-Z. konnten auch einige subependymal gelegene Zellen nachgewiesen werden, von denen mindestens ein Teil den oben beschriebenen amacrinen Formen analog ist.

Halmaturus Benetti. Das Ependym ist recht hoch und aus langgestreckten, schmalen Zellen aufgebaut, deren Kerne in mehreren Reihen angeordnet sind. Das Material war nicht von bester Beschaffenheit, jedoch gaben die Färbungen beweiskräftige Bilder für das Vorkommen von i. N.-Z. Diese Zellen scheinen

recht zahlreich zu sein. Mit ihrem Körper ganz intraependymal liegende Nervenzellen kommen in meinen Präparaten nicht vor, vielmehr liegen die i. N.-Z. mit ihrem kernführenden Abschnitt dicht peripher vom Ependym. Sie senden einen recht feinen Ausläufer bis an und oft auch ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein. Das freie Ende dieses Ausläufers hat oft eine kleine Auftreibung. Periphere Ausläufer sind mitunter mehrere vorhanden. Die i. N.-Z. sind mittelgroß und fast gleichgroß; extreme Formen wurden nicht gefunden. Sie erinnern sehr an die peripheren Ganglienzellen, vor allem infolge des ziemlich großen und scharf begrenzten Nucleolus ihrer Kerne, die ihrerseits auffällig groß, bläschenförmig und chromatinarm sind. In allen nachgewiesenen Formen von i. N.-Z. wurden Nissl-Körnchen beobachtet. Neurofibrillen traten in diesem recht schlecht fixierten Material nicht schön hervor. Dicht peripher vom Ependym finden sich einige Nervenzellen von mittlerer Größe, bei denen in das Ependym sich erstreckende Ausläufer nicht nachgewiesen werden konnten.

Erinaceus europaeus. (Hierzu Abb. 64, Tafel XIII.) Die Höhe des Ependyms variiert bedeutend innerhalb der verschiedenen Regionen. An der einen Stelle besteht es aus kubischen, an der anderen aus zylindrischen Ependymzellen, deren Kerne in gleicher Höhe liegen (s. *b* in Abb. 64). Mehrere Gebiete des Z.-K. haben jedoch eine Ependymbekleidung, die an mehrreihiges Zylinderepithel erinnert (s. *a* in Abb. 64).

Unmittelbar peripher vom Ependym befinden sich zahlreiche Nervenzellen von relativ großen Dimensionen und mit einer Struktur, die für vollentwickelte Formen spricht. An einigen Stellen liegen derartige große Nervenzellen ganz innerhalb des Ependyms (wo dieses hoch ist); es ist mir jedoch nicht gelungen, einen Ausläufer nachzuweisen, der bis zum Lumen des Z.-K. reicht. Dagegen fand ich in meinen Präparaten einige Stellen, wo derartige große Nervenzellen mit ihrer einen Seite teilweise dazu beitragen, das Lumen des Z.-K. zu begrenzen, und zwar ohne daß irgendein in das Lumen des Z.-K. sich erstreckender Ausläufer nachgewiesen werden konnte. Dieses Verhalten erinnert demnach an das oben bei *Ammocoetes* (Abb. 14) angedeutete. Eine ähnliche intraependymale Lage haben einige Zellen in dem dünnen Dache des Ventriculus terminalis, die, ihrer Struktur nach zu urteilen, als zurückgebliebene Spinal-Ganglienzellen, sogenannte *Rohon-Beardsche* Zellen, aufzufassen sind (s. Abb. 141–143). Zu beachten ist, daß die hier in Frage kommenden Nervenzellen *nicht* in der Degeneration begriffen sind und auch keine Andeutung zeigen, daß sie nach und nach in das Lumen des Z.-K. abgestoßen werden. Alle hier beschriebenen Nervenzellen sind, nach ihrer Struktur zu urteilen, voll vital und weisen also keinerlei Degenerationserscheinungen auf. Bei einem Teil dieser subependymal gelegenen großen Nervenzellen habe ich einen Ausläufer nachweisen können, der bis zum Lumen des Z.-K. und bisweilen ein Stück in dieses hinein sich erstreckt und dort sehr oft, aber nicht immer an seinem freien Ende verdickt ist (s. Abb. 64 *b*). In diesen teils subependymal und teils intraependymal gelegenen großen Nervenzellen habe ich zahlreiche und zum Teil recht große Nissl-Körnchen, in den letztgenannten Zellen außerdem auch deutliche Neurofibrillenstruktur nachweisen können. Die i. N.-Z. sind in der Regel multipolar und senden oft einen ihrer Ausläufer zum Lumen des Z.-K. Es scheint mir

übrigens, daß ein Teil der fraglichen Zellen zu dem oben beschriebenen amacrinen Zelltyp gehört.

Einen ganz anderen Typ von i. N.-Z. sieht man im Ependym des Conus terminalis und an anderen Stellen. Abb. 64 a zeigt einige solche Zellen aus der Mitte des Conus terminalis. Diese i. N.-Z. sind bipolar, und nur bei wenigen von ihnen konnte ich den zentral gerichteten Ausläufer bis zum Lumen des Z.-K. verfolgen. Diese Zellen erinnern unzweifelhaft an junge Nervenzellen, einige durchaus an Neuroblasten. Bei einigen derartigen intraependymal liegenden Nervenzellen konnten keinerlei zentral gerichtete Ausläufer — auch keine abgeschnittenen — nachgewiesen werden, sondern mehrere Anzeichen deuten daraufhin, daß es sich um junge, im Entwicklungsstadium befindliche Nervenzellen handelt, die auf der Wanderung peripher begriffen sind. Hierfür spricht außerdem die Tatsache, daß man verschiedene Entwicklungsstadien derartiger Nervenzellen lateral vom Z.-K. liegen sieht. (Näheres hierüber s. *Agduhr*¹). Daß es auch wirkliche i. N.-Z. unter diesen gibt, geht daraus hervor, daß einige das Lumen des Z.-K. mit dem zentral gerichteten Ausläufer erreichen. Die besprochenen Nervenzellen färben sich in Toluidinblau ebenso intensiv wie peripher gelegene Nervenzellen und enthalten auch Nissl-Körnchen.

Sorex minutus. Es wurden nur von einem Tiere Stücke des Rückenmarks aus der Cervical-, Thorakal- und Lumbalregion untersucht. Irgendein Z.-K. konnte bei diesem Tiere nicht nachgewiesen werden, ebensowenig ein Zellstrang, der ein Zusammenwachsen des Lumens des Z.-K. andeutet. Hier und da finden sich zwar Zellreihen bzw. Zellengruppen innerhalb der mittleren Teile der grauen Substanz, jedoch treten diese nicht konstant auf. Derartige, gewöhnlich nur in einem oder bisweilen in zwei aufeinanderfolgenden 10 μ dicken Schnitten auftretende Reihen bzw. Haufen kleiner und großer Nerven- und Gliazellen kommen aber auch an anderen Stellen innerhalb der grauen Substanz vor und nicht nur da, wo man den Z.-K. hätte erwarten können. Diese Zellgruppen brauchen oder — besser gesagt — können also nicht als Andeutung für einen zusammengewachsenen Z.-K. ausgelegt werden. Es gibt folglich keine sicheren Anhaltspunkte dafür, daß bei diesem Tier ein Z.-K. ursprünglich vorhanden und später infolge Zusammenwachsens wieder verschwunden ist. Mehrere Gruppen größerer Ganglienzellen, die in der Medianebene innerhalb der grauen Substanz auch an den Stellen liegen, wo der Z.-K. zu erwarten wäre, sprechen eher dafür, daß hier nie ein Z.-K. bestand, oder, falls er doch vorhanden war, daß er sehr zeitig sein Lumen verlor.

Talpa europaea. (Hierzu Abb. 66—69, Tafel XIII.) Das Ependym besteht aus einer Lage kubischer bis niedriger zylindrischer Zellen, deren Kerne in einer Reihe angeordnet sind. Diese Zellen haben mit relativ wenigen Ausnahmen große, runde Kerne. Zahlreiche i. N.-Z. wurden nachgewiesen, die sämtlich mit ihrem kernführenden Abschnitt peripher von denen der Ependymzellen liegen, und von denen nur der zentral gerichtete Ausläufer intraependymal gelegen ist. Eine der kleinsten Formen von i. N.-Z., die ich bei diesem Tiere nachweisen konnte, ist in Abb. 69 wiedergegeben. Die gewöhnlich vorkommenden Größen der i. N.-Z. bei *Talpa* zeigt Abb. 66, die größten Formen, die ich antraf, geben Abb. 67 und 68 wieder. Gewöhnlich sind die i. N.-Z. multipolar; nur in wenigen Fällen konnten

bipolare Formen nachgewiesen werden. Im allgemeinen senden diese Zellen nur einen ihrer Ausläufer zwischen den Ependymzellen hindurch zum Lumen des Z.-K., während der oder die anderen ihren Verlauf in verschiedenen peripheren Richtungen nehmen. Der zentral gerichtete Ausläufer kann entweder an der inneren Oberfläche des Ependyms enden oder ein Stück in das Lumen des Z.-K. hineinragen. In diesem Falle trägt er an seinem freien Ende gelegentlich eine verschieden geformte Verdickung. Eine besonders beachtenswerte Ausnahme in der angegebenen Anzahl der zentral gerichteten Ausläufer zeigt die in Abb. 68 wiedergegebene große Nervenzelle. Diese Zelle sendet nämlich nicht weniger als 4 Ausläufer zum Lumen des Z.-K. Alle diese Ausläufer endigen in Höhe der inneren, freien Oberfläche des Ependyms, ohne irgendwelche Verdickung aufzuweisen. Dies ist der einzige Fall, wo ich gefunden habe, daß i. N.-Z. mehr als einen zentral gerichteten Ausläufer haben können, die das Lumen des Z.-K. erreichen. Die Nervenzelle Abb. 68 weist keinerlei Erscheinungen von Degeneration auf. Soviel das Präparat zeigt, muß daher die große Zelle in Abb. 68 als wirkliche Ganglienzelle betrachtet werden. Die i. N.-Z. haben einen großen, bläschenförmigen, chromatinarmen Kern mit einem großen Nucleolus. In allen i. N.-Z. habe ich bei diesem Tiere in toluidinblaufärbten Präparaten Nissl-Körnchen und in gelungenen Ag-impregnierten Präparaten Neurofibrillen nachweisen können.

Vespertilio mystacinus, Synotus barbastellus und Vesperugo pipistrellus. Das von diesen Tieren stammende Material war schon fixiert und alt, als es zur Bearbeitung in meine Hände kam. Die Qualität des Materials war daher nicht gut, so daß Neurofibrillen-Imprägnationen und Nissl-Färbungen wenig befriedigende Resultate ergaben. Diese erbringen aber trotzdem den Beweis, daß i. N.-Z. auch bei diesen Tieren vorkommen. Die i. N.-Z. liegen mit ihren Zellkörpern peripher von dem relativ niedrigen Ependym. Nur in Ausnahmefällen konnten ganz intraependymal liegende Nervenzellen nachgewiesen werden. Meinem Material nach zu urteilen, finden sich sowohl bi- als auch multipolare Formen dieser Zellen. Ein Teil der Bilder deutete auch auf das Vorkommen von subependymal gelegenen amacrinen Nervenzellen hin.

Dasypus setosus. Es wurde ein 3 cm langer Embryo untersucht, der jedoch nicht gut fixiert war. Das Ependym besteht aus mehrreihig angeordneten Zellen, deren Kerne langgestreckt und schmal bis rund sind. Auf den meisten Ependymzellen befinden sich gut entwickelte Flimmerhaare. Zwischen den Ependymzellen und direkt peripher von ihnen kommen Zellen mit großen runden Kernen vor, von denen mehrere chromatinarm sind. Einige dieser Zellen erinnern an Neuroblasten. Unter ihnen befinden sich aber mehrere Zellen, von denen aus man einen zentral gerichteten Ausläufer zum Lumen des Z.-K. verfolgen kann. Diese Zellen erinnern somit an i. N.-Z. Das Material war jedoch nicht von so guter Beschaffenheit, daß es mir gelungen wäre, Beweise für die Identität dieser Zellen mit i. N.-Z. zu erhalten, denn sowohl Neurofibrillen-Imprägnationen als auch Nissl-Färbungen ließen mich im Stich. Auf Grund der erhaltenen Resultate ist es aber immerhin mehr als wahrscheinlich, daß i. N.-Z. bei diesem Tiere vorkommen.

Seiurus vulgaris. (Hierzu Abb. 81, Tafel XIV.) Das Ependym ist von mittlerer Höhe und besteht aus zylindrischen Ependymzellen, deren relativ große Kerne rund oder oval bis polymorph sind und zuweilen in einer bis mehreren Reihen liegen; in der Regel ist diese Reihenordnung der Kerne aber nicht deutlich, sondern diese sind zum Teil gegeneinander verschoben. I. N.-Z. kommen vor, scheinen aber nicht sehr zahlreich vertreten zu sein. Von den mehr als 200 Schnitten, die ich von diesem Tier untersuchte, befanden sich in zahlreichen Schnitten überhaupt keine derartigen Zellen, während an anderen Stellen dagegen in mehreren aufeinanderfolgenden Schnitten eine Anzahl i. N.-Z., ja in einem und demselben Schnitt einmal sogar mehrere derartige Zellen unmittelbar nebeneinander festgestellt werden konnten.

So lagen z. B. die bei *a* und *b* in Abb. 81 abgebildeten i. N.-Z. auf einer und derselben Stelle, aber in verschiedener Ebene, in einem und demselben Schnitt. Für die Lage dieser Zellen scheint mir sehr beachtlich zu sein, daß in meinen Präparaten von diesem Tiere die i. N.-Z. ausnahmslos ventral im Ependym und gewöhnlich in der Nähe der Medianebene liegen. Hieraus dürfte hervorgehen, daß eine Rekonstruktion der i. N.-Z. in der Lage nach meinem Material zeigen würde, daß diese in Gruppen geordnet ventral im Ependym liegen. Es wäre von Interesse, an der Hand von reichhaltigem Material festzustellen, ob diese Gruppierung der i. N.-Z. bei dieser Spezies konstant ist, und in bejahendem Falle, welche Bedeutung diese Gruppierung haben kann. Der kernführende Teil der i. N.-Z. variiert in seiner Höhenlage unbedeutend — in Abb. 81 gibt *c* die am meisten zentrale und *b* die am meisten periphere Lage der erwähnten Zellteile an, die ich bei meinem Material zu beobachten Gelegenheit hatte. Die i. N.-Z. sind durchweg bedeutend größer als die Ependymzellen — die von mir beobachtete größte Form ist bei *c* in Abb. 81 wiedergegeben. Die fraglichen Nervenzellen sind bi- bis multipolar. Ihr zentral gerichteter Ausläufer reicht bis zum Lumen des Z.-K. Gewöhnlich liegt das freie Ende dieses Ausläufers in gleicher Höhe mit der inneren Oberfläche der Ependymzellen, ausnahmsweise sieht man ihn auch ein Stück in das Lumen des Z.-K. hineinragen.

In keinem dieser Fälle konnte eine Verdickung am freien Ende des zentral gerichteten Ausläufers nachgewiesen werden. Die peripher gerichteten Ausläufer haben einen verschiedenen Verlauf. Die Kerne der i. N.-Z. sind groß, bläschenförmig, chromatinarm und mit einem relativ großen Nucleolus versehen und scheinen in der Größe etwas variieren zu können, auch bei gleichgroßen i. N.-Z. Neurofibrillen wurden in einem Teile dieser Nervenzellen nachgewiesen, und zwar obgleich dieselben in sonst besonders gut geglücktem Präparat schlecht Neurofibrillen-impregniert waren. Die besten und deutlichsten Bilder ergaben die Nissl-Färbungen. Bei allen beobachteten Formen der i. N.-Z. dieser Spezies wurden auch Nissl-Körnchen nachgewiesen, desgleichen einige subependymal gelegene Nervenzellen, welche keine Ausläufer zum Z.-K. senden.

Mus musculus, mus musculus var. albus, mus norvegicus und mus rattus. (Hierzu Abb. 79, Tafel XIV.) Da sowohl das Ependym als auch die i. N.-Z. bei diesen Tieren viel Übereinstimmendes zeigen, werden diese hier zusammen behandelt. Das Ependym ist von mittlerer Höhe mit einigen geringen Schwankungen und besteht aus langen, zylindrischen bis kubischen Ependymzellen. Besonders bei jungen

Tieren kommen außerdem Zellen mit großen, runden Kernen vor, die etwas heller sind als die Kerne der gewöhnlichen Ependymzellen. Die Kerne der Ependymzellen sind recht voluminös, rund oder oval bis unregelmäßig geformt. Sie weisen geringe Verschiedenheiten in bezug auf ihre Höhenlage auf, ohne deutliche Reihen zu bilden. Sowohl in Neurofibrillen-imprägnierten als auch in toluidinblaufärbten Präparaten wurden i. N.-Z. nachgewiesen. Diese Zellen sind recht zahlreich, scheinen aber ziemlich diffus sowohl im Umkreise des Z.-K. als auch in dessen Längsrichtung verteilt zu sein. Sie liegen entweder ganz intraependymal oder — und das ist die Regel — unmittelbar peripher von den kernführenden Teilen der Ependymzellen. Die i. N.-Z. variieren recht bedeutend hinsichtlich ihrer Größe. Die kleinsten Formen können sogar noch kleiner sein als Ependymzellen. Eine der kleineren Formen dieser Zellen ist links bei *b* in Abb. 79 wiedergegeben. Zu den größten Formen, die bei diesen Spezies nachgewiesen wurden, gehören die bei *c* in Abb. 79 abgebildeten i. N.-Z. Die fraglichen Zellen sind bis multipolar. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich bis zum Lumen des Z.-K. und endet gewöhnlich in Höhe der inneren Fläche des Ependyms, ohne eine Verdickung an seinem freien Ende aufzuweisen. Die peripher gerichteten Ausläufer variieren in ihrem Verlauf bedeutend. Die Kerne der i. N.-Z. sind groß und bläschenförmig und wegen ihres geringen Chromatingehalts ziemlich hell. Sie haben einen großen Nucleolus und zuweilen noch einen oder mehrere kleinere. Diese Kerne liegen gewöhnlich direkt peripher von denen der Ependymzellen. In allen Formen dieser Zellen konnten Nissl-Körnchen, aber nur in einigen von ihnen Spuren von Neurofibrillen nachgewiesen werden. Direkt peripher vom Ependym liegen einige Nervenzellen, bei denen ich zum Lumen des Z.-K. sich erstreckende Ausläufer nicht nachweisen konnte. Es ist möglich, daß einige dieser Zellen amacrinier Natur sind.

Lepus timidus. (Hierzu Abb. 77 und 78, Tafel XIV.) Es wurde das Rückenmark von 2 neugeborenen Kaninchen untersucht. Der Z.-K. war durchweg weit offen. Das Rückenmark der Cervicalregion des einen Jungen wurde zum großen Teil in eine lückenlose Schnittserie aufgelegt. In dieser Schnittserie zeigt der Z.-K. folgendes: im Anfang ist der Z.-K. einheitlich und hat einen Durchmesser von 36×114 bis $39 \times 174 \mu$. Etwas weiter caudal teilt er sich in 2, später in 3 und weiter caudal schließlich in 4 schmale, vom Ependym ganz umgebene Röhren, welche sich noch weiter caudal wieder zu einem einheitlichen Z.-K. von ungefähr derselben Weite wie im Anfang vereinigen. Die Teilung des Z.-K. beginnt damit, daß das Ependym dorsal in der Medianebene durch proliferierendes Gliagewebe getrennt wird. Die freien Ependymenden biegen ventral und darauf teilweise bilateral um. Das aus dorsaler Richtung kommende Gliagewebe wächst mit der ventralen Wand zusammen, wo sich das Ependym ebenfalls teilt und dem aus dorsaler Richtung kommenden entgegenstrebt. Die beiden paarigen freien Ependymkanten verwachsen bilateral miteinander. Die beiden auf diese Weise entstandenen ependymbekleideten Kanäle teilen sich weiter caudal wiederum, und zwar in der Weise, daß Ependym und Gliagewebe auf der medialen Seite dieser Kanäle sich genau so verhalten wie bei der ersten Teilung, die dorsal vor sich ging. Diese Teilung des Z.-K. erfolgt auf einem ca. 700μ langen Raum.

Das den einheitlichen Z.-K. und die sekundären Röhren auskleidende Ependym variiert in seiner Höhe zwischen 20 und 30 μ . Es setzt sich in der Hauptsache aus langgestreckten und schmalen Ependymzellen zusammen, deren lange oder ovale bis runde und unregelmäßige Kerne in mehreren Reihen angeordnet sind. I. N.-Z. kommen zahlreich vor, und zwar sowohl da, wo der Z.-K. einheitlich ist, als auch dort, wo er in kleinere Röhren geteilt ist. Zwar enthalten einige Schnitte bedeutend mehr i. N.-Z. als andere, irgendeine bestimmte Gruppierung der Zellen in der Längsrichtung des Z.-K. konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Die i. N.-Z. scheinen aber im Ependym des Z.-K. zahlreicher ventral als dorsal und bilateral vorzukommen. Die kleineren Formen (*a* in Abb. 78) sind am zahlreichsten vertreten — es konnten bis zu 30 derartiger Zellen in einem und demselben 20 μ dicken Querschnitte nachgewiesen werden. Seltener vertreten waren die größten Formen dieser Zellen (Abb. 77), von denen man 2-3 Stück in einem und demselben Schnitte beobachten konnte; sie fehlten häufig aber auch völlig. Hinsichtlich Größe und Lage des kernführenden Teils dieser Zellen kann man 3 Gruppen unterscheiden. I. N.-Z., die zur Gruppe I gehören, liegen ganz intraependymal. Sie sind die kleinsten, obwohl ihr Kern ebenso groß ist wie der in einem Teil der Zellen der Gruppe II. Die zur Gruppe II gehörenden Zellen liegen mit ihrem kernführenden Teil sämtlich etwas peripher vom Ependym (*b* in Abb. 78). Die Kerne dieser Zellen sind gleichgroß oder etwas größer als die der Gruppe I. Den zentral gerichteten Ausläufer dieser Zellen konnte man nicht immer bis zum Lumen des Z.-K. verfolgen, was wohl zumeist darauf beruht, daß der Ausläufer schräg verlief und in dem betreffenden Querschnitt abgeschnitten war. Einige Beobachtungen sprechen jedoch andererseits auch dafür, daß es unter diesen Zellen auch solche geben muß, deren zentral gerichteter Ausläufer die Verbindung mit dem Lumen des Z.-K. verloren hat. Die i. N.-Z. der Gruppe III haben bedeutend größere Zellkörper und Kerne als die vorhergehenden und liegen mit ihrem kernführenden Zellabschnitt bedeutend weiter peripher vom Ependym als die Zellen der Gruppe II. Der Nucleolus in den Kernen der zu Gruppe III gehörenden Zellen ist ferner bedeutend größer als bei Gruppe I und II. Unter diesen 3 Zellgruppen befinden sich auch i. N.-Z. von Übergangstypen, jedoch sind von diesen so außerordentlich wenige vorhanden, daß mir deren Zusammenfassung zu einer weiteren Gruppe nicht notwendig erscheint.

Die i. N.-Z. sind bi- bis multipolar. Ihr zentral gerichteter Ausläufer endigt in Höhe der inneren Oberfläche des Ependyms, ohne an seinem freien Ende eine Verdickung zu bilden. Die Kerne dieser Zellen sind gegenüber denen der Ependymzellen groß, bläschenförmig und chromatinarm und mit einem großen Nucleolus versehen. Alle nachgewiesenen i. N.-Z. haben Nissl-Körnchen, die sich am deutlichsten in den zu Gruppe I und II gehörenden Zellen gefärbt haben. Aber auch die großen i. N.-Z. der Gruppe III enthalten unzweideutig Tigroidsubstanz, obgleich sich diese in meinen Präparaten nicht so intensiv färbte wie in den übrigen i. N.-Z. Auch einzelne subependymal gelegene Nervenzellen kamen vor, die keine Ausläufer zwischen die Ependymzellen aussenden. Ob von diesen einige amacriner Natur sind, konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

Lepus cuniculus. (Hierzu Abb. 80, Tafel XIV.) *Neugeborenes Tier.* Das Ependym besteht aus Zellen, deren Kerne in verschiedener Höhenlage sich finden

und zwischen denen zahlreiche i. N.-Z. vorkommen. Nach meinen Präparaten zu urteilen, sind diese i. N.-Z. nicht diffus verteilt, sondern kommen an einigen Stellen zahlreicher als an anderen vor. Das gilt für ihre Ausbreitung nicht nur in der Längsrichtung, sondern auch betreffs des Umrisses des Z.-K. Auf Querschnitten des Z.-K. können i. N.-Z. in allen Teilen des Ependyms auftreten, ihre Frequenz ist aber ohne Frage ventral am größten. Die Kerne dieser i. N.-Z. sind groß, bläschenförmig und chromatinarm. Die i. N.-Z. liegen während dieses Entwicklungsstadiums mit ihrem kernführenden Abschnitt in der Regel ganz intraependymal. Ihre zentral gerichteten Ausläufer ragen ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein und sind an ihrem freien Ende nur ausnahmsweise etwas verdickt.

3 Wochen altes Tier. Das Ependym ist einreihig und besteht aus zylindrischen Zellen. Es kommen zahlreiche i. N.-Z. vor, deren Verteilung sowohl in der Längsrichtung als auch betreffs des Umrisses des Z.-K. ganz wie beim neugeborenen Tier ist. Die fraglichen Nervenzellen liegen in diesem Entwicklungsstadium mit ihrem kernführenden Abschnitt in der Regel etwas peripher vom Ependym, nur kleinere und jüngere Formen dieser Zellen liegen ganz intraependymal. Die vollentwickelten i. N.-Z. sind um das Mehrfache größer als Ependymzellen und bi- bis multipolar. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo er mit einer kugel- oder umgekehrt birnförmigen Verdickung endet. Ihre Kerne sind groß und bläschenförmig und stimmen in ihrem Bau mit denen der peripher gelegenen Nervenzellen überein. Das Protoplasma der i. N.-Z. hat in toluidinblaufärbten Präparaten einen mit den peripher gelegenen Nervenzellen völlig übereinstimmenden Bau, d. h. Nissl-Körnchen kommen in großer Menge vor und sind intensiv gefärbt, und auch Neurofibrillen sind in diesen Zellen nachgewiesen worden.

Erwachsenes Tier (2 Exemplare wurden untersucht). Das Ependym ist einreihig und besteht aus zylindrischen Zellen. Der Z.-K. zeigt hinsichtlich seines Lumens große Verschiedenheiten; an einigen Stellen kommen Erweiterungen, an anderen Verengungen vor, wieder an anderen besteht die Tendenz zu Verwachsungen. Zahlreiche i. N.-Z. kommen vor, deren Verteilung im Ependym des Z.-K. in der Hauptsache mit der bei dem 3 Wochen alten Tier übereinstimmt — ich habe jedoch gelegentlich auch eine mehr gleichförmige Verteilung dieser Zellen im Querschnitt des Z.-K. gefunden. Die i. N.-Z. bei den erwachsenen Tieren liegen mit ihrem kernführenden Abschnitt in verschiedenen Höhenlagen; sie können vor allem bedeutend weiter peripher vom Ependym liegen als es bei dem 3 Wochen alten Tiere der Fall war, andererseits können vereinzelte i. N.-Z. auch völlig intraependymal liegen. Der zentral gerichtete Ausläufer, besonders der ventral liegenden i. N.-Z., ragt auf ein längeres Stück in das Lumen des Z.-K. hinein als bei jüngeren Individuen und endet hier mit einer langausgezogenen, umgekehrt birnförmigen Bildung. Nissl-Körnchen und Neurofibrillen konnten in der Regel in diesen Nervenzellen nachgewiesen werden.

Cavia cobaya. (Hierzu Abb. 76, Taf. XIV.) Das Ependym variiert zwar etwas in der Höhe, ist im allgemeinen aber als recht hoch zu bezeichnen. Gewöhnlich besteht es aus zylindrischen Zellen, deren Kerne in mehreren Reihen angeordnet sind, an einigen Stellen (dorsal und ventral) jedoch aus kubischen Ependymzellen.

Die Kerne der Ependymzellen sind recht groß und von ovaler, abgerundeter bis unregelmäßiger Form. In toluidinblaugefärbten Präparaten trat die in Abb. 76 wiedergegebene Chromatinstruktur auf. Intraependymal liegende Zellen mit ausgeprägtem nervösen Charakter kommen vor, jedoch ist deren Zahl in meinem Material äußerst gering. Unter den Hunderten von neurofibrillen-imprägnierten und toluidinblaugefärbten Präparaten dieses Tieres konnte ich nicht mehr als die bei *c* in Abb. 76 abgebildeten Zellen finden, die jedoch mit absoluter Sicherheit zu der Gruppe der i. N.-Z. zu rechnen sind. Es ist wohl wahrscheinlich, daß auch die bei *b* in derselben Abbildung wiedergegebenen Zellen zu den i. N.-Z. gehören, jedoch gelang es mir nicht, einen zentral gerichteten Ausläufer von diesen Zellen bis zum Lumen des Z.-K. zu verfolgen. Ich konnte zwar noch einige weitere derartige Zellen, die wie die bei *b* in Abb. 76 wahrscheinlich i. N.-Z. sind, in meinem Material nachweisen, da ich jedoch den von diesen Nervenzellen ausgehenden zentral gerichteten Ausläufer nicht bis zum Lumen des Z.-K. verfolgen konnte, so ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß es sich hier um Nervenzellen handelt, die ihre Verbindung mit dem Lumen des Z.-K. aufgegeben und sich zu subependymal oder vielleicht noch weiter peripher gelegenen Nervenzellen entwickelt haben. Ein anderer Typ intraependymal gelegener Zellen, die einen gewissen Nervenzellencharakter zeigen, ist bei *a* in Abb. 76 abgebildet. Der Kern dieser Zellen ist nicht immer bläschenförmig, hat aber eine geringe Chromatinmenge und einen großen Nucleolus. Das Protoplasma der Zellen dieses Typs besitzt nur Spuren von Nissl-Körnchen und die Neurofibrillen-Imprägnationen ergaben ebenfalls nur Andeutungen für das Vorkommen von Neurofibrillen in diesen intraependymal gelegenen Zellen. Trotzdem neige ich zu der Auffassung, daß auch dieser Zelltyp zu den i. N.-Z. zu rechnen ist. Aber auch dann sind die i. N.-Z. bei dieser Spezies nur sehr spärlich vorhanden. Setzt man voraus, daß alle 3 Typen bei Abb. 76 mit Sicherheit i. N.-Z. sind, so liegen diese mit ihrem kernführenden Abschnitt direkt peripher vom Ependym, haben 2 bis mehrere Ausläufer und einen mit einem großen Nucleolus versehenen chromatinarmen Kern. Der zentral gerichtete Ausläufer reicht bis zum Lumen des Z.-K., wo er in Höhe der inneren Oberfläche des Ependyms endigt, ohne eine Verdickung zu bilden — zum mindesten ist das die Regel. Die peripher gerichteten Ausläufer haben verschiedenartigen Verlauf. Die kleinsten Formen dieser Zellen stehen hinsichtlich ihrer Größe in der Mitte zwischen einer gewöhnlichen Ependymzelle und der i. N.-Z. bei *c* in Abb. 76. Die größten angetroffenen Formen sind bei *b* Abb. 76 abgebildet. Außer diesen teilweise intraependymal gelegenen Nervenzellen kommen — wenn auch spärlich — solche vor, die unmittelbar peripher vom Ependym liegen, und deren Ausläufer man nicht bis in das Ependym verfolgen kann. Möglich ist, daß einige dieser Nervenzellen zu der amacrinen Zellgruppe gehören.

Phoca Vitulina, (Hierzu Abb. 74 u. 75 Taf. XIV.) Die Höhe des Ependyms ist verschieden. Es besteht aus ein- bis mehrreihig angeordneten Ependymzellen (s. Abb. 74 u. 75), die im allgemeinen größer sind und voluminösere Kerne enthalten, wenn das Ependym einreihig ist. Die Form der Kerne ist verschieden; sie kann sowohl oval als auch rundlich sein. I. N.-Z. kommen ziemlich selten vor; sie variieren in der Größe sehr bedeutend, besonders große i. N.-Z. kommen jedoch nicht vor. In der Regel sind sie etwas größer als die eigentlichen Ependym-

zellen, es finden sich aber auch Formen von i. N.-Z., die gleichgroß, ja sogar kleiner sind als die Ependymzellen. Ein Beispiel für eine derartige kleinere Form der i. N.-Z. ist links bei Abb. 74 wiedergegeben. Die Lage des kernführenden Abschnitts der i. N.-Z. variiert etwas. Manchmal liegt er — wie Abb. 74 und 75 zeigen — peripher zwischen den Ependymzellen, oft aber ein Stück peripher vom Ependym. Auch sehr weit peripher — bis zu $60\ \mu$ vom Ependym entfernt — habe ich Nervenzellen angetroffen, bei denen der größere Teil des Körpers zentral vom Kerne liegt. Von diesem Zellteil aus sieht man einen Ausläufer dem Ependym zustreben. Es ist mir jedoch niemals geglückt, in den untersuchten Schnitten ($10\ \mu$ dick) diesen Ausläufer der so weit peripher gelegenen Nervenzellen bis zu den Ependymzellen und zwischen diese hinein zu verfolgen. Bei einigen anderen Nervenzellen, die mit ihrem Zellkörper direkt peripher vom Ependym liegen, ist dies indessen gelungen, und diese sind also sicher i. N.-Z. Außer diesen Zelltypen kommen auch einige andere, subependymal gelegene Nervenzellen vor, die sicher keinen Ausläufer bis zum Lumen des Z.-K. senden. Ein Teil von ihnen gehört wahrscheinlich zu den sog. amacrinen Zellen. Die i. N.-Z. sind bi- bis multipolar. Von ihren Ausläufern geht einer bis zum Lumen des Z.-K., wo er entweder in Höhe der inneren Fläche des Ependyms endet oder eine Strecke weit in das Lumen des Z.-K. sich hineinerstreckt. Nur selten habe ich eine Verdickung am freien Ende dieses Ausläufers nachweisen können. Die peripher gerichteten Ausläufer haben verschiedenen Verlauf. Die Kerne der i. N.-Z. sind bläschenförmig, chromatinarm und haben einen relativ sehr großen Nucleolus. In den meisten i. N.-Z. habe ich Nissl-Körnchen nachgewiesen, in einigen von ihnen auch Neurofibrillen.

Lynx lynx. (Hierzu Abb. 72 u. 73, Tafel XIV.) Längs des ganzen Z.-K. kommen i. N.-Z. vor, die in Form und Größe bedeutend variieren. In Abb. 72 sind bei *a* und *b* 2 Beispiele für das Aussehen der Ependymzellen in ein und demselben Querschnitt des Z.-K. wiedergegeben. Die Zellen bei *a* liegen ventrolateral und die bei *b* dorsolateral. Auch viele andere Formen von Ependymzellen kommen in demselben Querschnitt vor. Abb. 73 zeigt das auf einem angrenzenden Querschnitt des Z.-K. dorsal und etwas lateral gelegene Ependym. Diese echten Ependymzellen haben dunkle, chromatinreiche Kerne von sehr variierender Form. Außer den in Abb. 72 und 73 abgebildeten kommen auch chromatinreiche Ependymzellkerne von sphärischer Form neben anderen Kernen von der gleichen Form vor, die wegen einer geringeren Chromatinmenge recht hell sind. Die Chromatinstruktur in diesen letzterwähnten Kernen erinnert sehr an die der oben beschriebenen, sie ähnelt aber nicht der der Nervenzellkerne. Wahrscheinlich gehören diese Kerne zu Keimzellen, die im Ependym zurückgeblieben sind. Außer diesen Zellen kommen, wenn auch spärlich, teils zwischen den Ependymzellen teils direkt peripher von diesen, echte Nervenzellen vor. Die intraependymal gelegenen Nervenzellen sind bi- bis multipolar. Unter den subependymal gelegenen Nervenzellen (Abb. 72 *b*) sind nicht nur bi-, sondern auch multipolare Formen nachgewiesen. Bei den multipolaren Formen habe ich in einigen Fällen auch Neuriten gefunden. Es ist möglich, daß ein Teil dieser subependymal gelegenen Nervenzellen zu dem Typ gehört, den ich in Golgi-Präparaten von *Squalus* gefunden und oben beschrieben habe (s. Abb. 29 u. 30); ein Teil von ihnen wird

aber wahrscheinlich mit den oben beschriebenen amacrinen Nervenzellen identisch sein. Die i. N.-Z. haben durchgängig bläschenförmige, chromatinarme Kerne mit einem großen Nucleolus. In den Neurofibrillen-imprägnierten Präparaten, die den Abb. 72 und 73 zugrunde liegen, ist die neurofibrilläre Struktur dieser Zellen zwar schwach, aber immerhin deutlich hervorgetreten. Von den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten sind Nissl-Körnchen in den größeren Formen der i. N.-Z. nachgewiesen worden. Von den Ausläufern der i. N.-Z. geht der eine in der Richtung gegen das Lumen des Z.-K. Dieser Ausläufer kann in Höhe der inneren Fläche des Ependyms, im Grunde einer Ausbuchtung des Z.-K. (s. Abb. 73 = Kunstprodukt?) oder etwas innerhalb des Lumens des Z.-K. enden. In allen Fällen kann der Ausläufer mit oder ohne Verdickung enden.

Felis domestica. Bei diesem Tiere wurden wie bei dem unten angeführten Hunde das Material eines neugeborenen und eines erwachsenen Individuums untersucht. Die Ergebnisse hiervon stimmen in der Hauptsache mit dem vom Hund überein. Ich habe jedoch den Eindruck, daß die i. N.-Z. bei der erwachsenen Katze etwas zahlreicher sind als beim erwachsenen Hunde. Die den Kern führenden Zellabschnitte der i. N.-Z. scheinen bei der erwachsenen Katze fast regelmäßig etwas peripher vom Ependym zu liegen. — Mit ihrem kernführenden Abschnitt ganz intraependymal liegende Nervenzellen habe ich bei der erwachsenen Katze nicht nachweisen können. Betreffs der Lage des kernführenden Teiles stimmen diese Nervenzellen gut mit den in Abb. 90 für den erwachsenen Hund wiedergegebenen überein. Nur bei der neugeborenen Katze liegen die i. N.-Z. wie beim neugeborenen Hunde ganz intraependymal. Die nachgewiesenen i. N.-Z. bei der Katze haben Nissl-Körnchen und Neurofibrillen, die letzteren sind jedoch nur schwer gut imprägniert zu erhalten. Es finden sich auch einige intraependymal gelegene Nervenzellen, die mit ihrem zentral gerichteten Ausläufer das Lumen des Z.-K. nicht erreichen.

Mustela erminea. (Hierzu Abb. 70 u. 71, Tafel XIV.) Das Ependym ist im allgemeinen recht hoch und besteht aus langen, schmalen Zellen, deren ovale bis runde Kerne in mehrere Reihen geordnet sind. Längs des ganzen Z.-K. kommen zahlreiche i. N.-Z. vor, deren Zahl zwar von Schnitt zu Schnitt variiert, die aber eine bestimmte Gruppierung, wie bei einigen anderen Vertebraten, nicht erkennen lassen; ihre Verteilung wird am geeignetsten wohl als diffus bezeichnet. Bei allen nachgewiesenen Formen dieser Zellen liegt der kernführende Abschnitt in der Regel direkt peripher vom Ependym (nur selten weiter peripher) und nur ihr zentral gerichteter Ausläufer intraependymal. Die i. N.-Z. variieren bedeutend in Form und Größe. Ein Teil von ihnen ist rundlich, ein anderer kantig und ein anderer wieder im großen und ganzen oval. Die Richtung der Längsachse dieser letztgenannten Formen schwankt zwischen radiärer Stellung (Abb. 70) und tangentieller Lage zum Ependym. Alle nachgewiesenen Formen der i. N.-Z. sind größer als die Ependymzellen. Zu den kleinsten i. N.-Z., die bei diesem Tiere gefunden wurden, gehören die in Abb. 71 abgebildeten; deren kernführender Abschnitt mißt ca. $5 \times 6 \mu$. Die größte nachgewiesene Zelle dieser Art hatte einen ovalen Zellkörper und maß $69 \times 36 \mu$ (Gl. I 1. R. 3. Schnitt v. r.); sie lag direkt peripher vom Ependym, und ihre Längsachse war parallel zur freien Oberfläche des Ependyms gerichtet. 2 dickere Ausläufer gingen von

den Polen der Nervenzelle in entgegengesetzter Richtung ab und verliefen eine Strecke weit parallel zum Ependym. Ein feiner Ausläufer drang ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein. Das Verhalten dieses Zellausläufers erinnert etwas an das Golgi-Bild der Abb. 30 von *Squalus*. Gegenüber den extremen Größenverhältnissen der erwähnten beiden Zellen nimmt die große Zelle der Abb. 70 nur eine Mittelstellung ein. Diese i. N.-Z. mißt $32 \times 23 \mu$ und liegt, wie aus der Abbildung hervorgeht, mit ihrer Längsachse radiär. Es kommen nicht nur bi-, sondern auch multipolare Formen dieser Zellen vor. Nach meinem Material zu urteilen, sind die multipolaren Formen mindestens ebenso zahlreich wie die bipolaren. Der zentral gerichtete Ausläufer reicht oft ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein und endet hier gelegentlich mit einer kleinen Auftreibung. Meine Präparate zeigen, daß diese Ausläufer bisweilen auch in Höhe der inneren Fläche des Ependyms enden können. Die peripher gerichteten Ausläufer haben sehr variablen Verlauf. Die Kerne dieser Zellen scheinen mir völlig den Kernen derjenigen Nervenzellen zu gleichen, die mehr peripher im Rückenmark liegen. Ihre Lage ist, wie aus obiger Schilderung hervorgeht, peripher vom Ependym. Tigroidschollen (Nissl-Körnchen) wurden in allen gefundenen Formen der i. N.-Z. nachgewiesen, dagegen konnten diese Gebilde in den Auftreibungen an den freien Enden der zentral gerichteten Ausläufer nicht gefunden werden. Neurofibrillen-Imprägnationen i. N.-Z. dieses Tieres sind mir nicht gelungen. Indessen haben die fraglichen Zellen im übrigen so typischen Nervenzelloarakter, daß ein Zweifel über ihre nervöse Natur ausgeschlossen ist.

Lutra lutra. Untersucht wurde das Rückenmark von einem vollerenwachsenen Tier und von einem 6,5 cm langen Embryo. Das von dem erwachsenen Tiere gewonnene Material war nicht von guter Qualität und gab nur Wahrscheinlichkeitsbilder von dem Vorhandensein der i. N.-Z. Das Material des Embryo dagegen war recht gut und bewies deren Vorhandensein. Das Ependym ist hier mehrreihig und erreicht seine größte Höhe ventral und bilateral vom Z.-K. Einige Neuroblasten (mit dem Protoplasmateil des Zellkörpers peripher vom Kerne) finden sich sowohl im Ependym als auch dicht peripher von ihm. Außerdem kommen im Ependym einige Nervenzellen vor, deren Protoplasmakörper vorzugsweise zentral vom Kern, also nach dem Z.-K. zu, liegen; in mehreren Fällen konnte ich einen Ausläufer solcher Zellen bis zum Lumen des Z.-K. verfolgen. Es gibt auch i. N.-Z., deren Zellkörper zum Teil peripher vom Ependym liegt. Die i. N.-Z. sind bi- bis multipolar. Der zentral gerichtete Ausläufer erstreckt sich zuweilen ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein und ist dann oft an seinem Ende etwas verdickt, bisweilen endet er in Höhe der inneren Fläche des Ependyms. Die Kerne sind bläschenförmig und chromatinarm und haben einen großen Nucleolus.

Canis familiaris. (Hierzu Abb. 88, 89 u. 90, Tafel XV.) 2 Tage alter Hund. Das Ependym ist hoch und besteht aus langen, zylindrischen Zellen, deren Kerne in mehreren Reihen geordnet und klein, rund, oval bis unregelmäßig geformt sind. Längs des ganzen Z.-K. kommen zahlreiche i. N.-Z. vor. Diese Zellen scheinen nicht diffus verteilt zu sein, sondern kommen in einigen unmittelbar auf einander folgenden Schnitten bedeutend zahlreicher vor als in anderen. Bei der Untersuchung einer recht beträchtlichen Anzahl von Präparaten aus verschied-

denen Regionen habe ich den bestimmten Eindruck gewonnen, daß die i. N.-Z. am zahlreichsten in der Thorakalregion und am spärlichsten am kranialen Ende der Cervicalregion (in Höhe des 1. Cervicalsegments) vorkommen. Die fraglichen Nervenzellen liegen in der Regel ganz intraependymal und ihr kernführender Zellabschnitt gewöhnlich in Höhe der peripheren Kerne der Ependymzellen (s. Abb. 89 a); seltener kommt eine mehr zentral vorgeschobene Lage vor, wie sie Abb. 88 zeigt. Alle nachgewiesenen i. N.-Z. sind bedeutend größer als die wahren Ependymzellen; eine der größten Formen, die gefunden wurden, zeigt Abb. 88. Sie sind bi- bis tripolar, nur in Ausnahmefällen sind multipolare Formen nachgewiesen. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein; er endet in der Regel ohne Verdickung. Nicht selten ist es unmöglich gewesen, den zentral gerichteten Ausläufer bis zum Lumen des Z.-K. zu verfolgen. Dieses Verhalten beruht in mehreren Fällen mit Sicherheit darin, daß der fragliche Ausläufer im Schnitte nicht mehr getroffen war, andere Beobachtungen sprechen jedoch deutlich dafür, daß der Ausläufer seine Verbindung mit dem Lumen des Z.-K. infolge Rückbildung verloren hat (s. die untere Nervzelle bei b in Abb. 89). In meinem Material von diesem Tiere finden sich außerdem zahlreiche Übergangsstadien von derartigen intraependymal gelegenen Nervenzellen bis zu den peripher vom Ependym gelegenen Nervenzellen, die sicher keine Verbindung mit dem Lumen des Z.-K. haben. Dieses zeigt, daß beim neugeborenen Hunde nicht alle intraependymal gelegenen Nervenzellen mit ihren zentral gerichteten Ausläufern das Lumen des Z.-K. erreichen. Die Kerne dieser Zellen sind groß, bläschenförmig und chromatinarm und mit einem großen und einem, zuweilen 2 kleineren Nucleolen versehen. Alle hier erwähnten Nervenzellen haben Nissl-Körnchen von verschiedener Größe, in einigen von ihnen wurden auch Neurofibrillen nachgewiesen. Wahrscheinlich ist wohl, daß vollständig gelungene Imprägnationen in allen diesen i. N.-Z. Neurofibrillen hätten erscheinen lassen.

Erwachsener Hund, 5 Jahre alt. Das Ependym ist hier recht niedrig; es besteht aus kurzen, zylindrischen Zellen mit voluminösen, runden, ovalen bis unregelmäßig geformten Kernen. Längs des ganzen Z.-K. finden sich i. N.-Z., sie sind jedoch auffallend spärlich. Selbst wenn man die beim erwachsenen Tiere vorhandene größere Flächenausbreitung des Ependyms und die daraus folgende Verteilung der i. N.-Z. auf ein größeres Gebiet berücksichtigt, so sind sie trotzdem beim erwachsenen Tiere bedeutend spärlicher als bei dem 2 Tage alten Hunde. Ein zahlreicheres Vorkommen von i. N.-Z. in einer bestimmten Region der Medulla spinalis habe ich nicht mit absoluter Sicherheit nachweisen können, obwohl gewisse Beobachtungen für ein dem der jungen Hunde analoges Verhältnis sprechen. Beim erwachsenen Hunde liegen die i. N.-Z. mit ihrem kernführenden Zellabschnitte durchgehends peripher vom Ependym. Die am weitesten peripher liegende Nervenzelle, von der ich einen Ausläufer bis zum Lumen des Z.-K. habe verfolgen können, gibt Abb. 90 wieder. Es wurden auch noch weiter peripher gelegene Zellen mit einem gegen den Z.-K. gerichteten Ausläufer nachgewiesen, jedoch ist es nie gelungen, ihren zentral gerichteten Ausläufer bis in das Ependym hinein zu verfolgen. Wahrscheinlich gehören aber auch diese Zellen zu den i. N.-Z. Der kernführende Abschnitt der am weitesten zentral gelegenen i. N.-Z. befand sich unmittelbar peripher vom Ependym. Die nachgewiesenen i. N.-Z.

sind zwar größer als die Ependymzellen, jedoch nicht von nennenswerter Größe. Die in Abb. 90 abgebildete Nervenzelle gehört zu den größten Formen, die ich nachweisen konnte. Im übrigen habe ich nur bipolare Formen dieser Zellen gefunden. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckte sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, ohne daß eine nennenswerte Verdickung an seinem freien Ende nachgewiesen werden konnte. Der Kern ist bläschenförmig, chromatinarm und mit einem großen Nucleolus versehen. Nissl-Körnchen und Andeutungen von Neurofibrillen konnten nachgewiesen werden. Sehr selten kommen peripher vom Ependym gelegene Nervenzellen vor, die an die oben beschriebenen amacri- nen Zellformen erinnern.

Eine Gegenüberstellung der beschriebenen Verhältnisse beim jungen und beim erwachsenen Hunde zeigt außer großen postfötalen Veränderungen im Ependym auch bedeutende Verschiebungen und Veränderungen in der Frequenz der i. N.-Z. Die Verschiebungen sind so groß, daß die kernführenden Abschnitte der i. N.-Z. beim erwachsenen Hunde ganz subependymal liegen, während sie beim jungen Tiere ganz intraependymal liegen. Die wesentlich geringere Frequenz der *intra*-ependymal gelegenen Nervenzellen beim erwachsenen Tier ist so in die Augen springend, daß, obgleich keine quantitative Bestimmung angestellt worden ist, der deutliche Eindruck entsteht, daß ein großer Teil dieser Zellen während des postfötalen Lebens peripher gewandert ist. Daß es sich hierbei in erster Linie um peripher gewanderte Zellen von dem Typ handelt, der in Abb. 89 bei *b* (Neuroblasten) wiedergegeben ist, liegt auf der Hand. Ob einige i. N.-Z. vom Typ *a* der Abb. 89 sekundär ihre Verbindung mit dem Lumen des Z.-K. verlieren und peripher wandern, kann ich nicht mit absoluter Sicherheit angeben. Obwohl einige Beobachtungen in meinen Präparaten darauf deuten könnten, daß dies der Fall ist, sprechen andere Verhältnisse, vor allem die Entwicklung der i. N.-Z., gegen eine solche Annahme. Weiteres hierüber siehe weiter unten und Agduhr¹⁾.

Canis lupus. (Hierzu Abb. 87, Tafel XV.) Das Ependym besteht aus verhältnismäßig breiten, kubischen bis zylindrischen Zellen, deren Kern voluminös, abgerundet bis unregelmäßig geformt ist. Diese Kerne können in ihrer Höhenlage etwas variieren, bilden aber in der Regel nicht mehrere Reihen.

I. N.-Z. kommen vor, finden sich aber an den verschiedenen Stellen nicht gleichmäßig zahlreich. So habe ich z. B. in meinen Präparaten gelegentlich in 6 aufeinanderfolgenden Schnitten von 10 μ Dicke nicht einmal eine Andeutung einer i. N.-Z. feststellen können. Ein andermal wieder kann man in einem und demselben Schnitt eine ganze Anzahl derartiger i. N.-Z. sehen. Sie liegen mit ihrem Zellkörper nur ausnahmsweise ganz intraependymal; andererseits sind die Fälle, wo der kernführende Zellabschnitt weit peripher vom Ependym liegt, ebenfalls ungewöhnlich. Gewöhnlich ist die Lage der i. N.-Z. so, wie sie Abb. 87 wiedergibt. Alle wahrgenommenen i. N.-Z. sind größer als Ependymzellen. Eine der kleinsten Formen wird bei *a* in Abb. 87 abgebildet. Die größte Form, die ich bei diesem Tier angetroffen habe, zeigt *b* in Abb. 87. Die Größenunterschiede dieser i. N.-Z. sind also nicht beträchtlich. Es kommen bi- und multipolare Formen dieser Nervenzellen vor, ohne daß festgestellt werden könnte, daß die eine oder andere Form an Zahl überwiegt. Von den Ausläufern gelangt einer zwischen den Ependymzellen bis an oder mitunter in das Lumen des Z.-K., wo er entweder

ohne oder mit einer kleinen, etwas unregelmäßig geformten Verdickung endet. Bei *b* in Abb. 87 kann der zentral gerichtete Ausläufer nicht deutlich bis zum Lumen des Z.-K. verfolgt werden; wahrscheinlich ist ein Teil dieses Ausläufers in diesem Schnitte nicht getroffen. Die peripher gerichteten Ausläufer variieren sehr in ihrem Verlaufe. Die Kerne dieser i. N.-Z. zeigen ganz den Charakter derjenigen Kerne, die zu weiter peripher gelegenen Ganglienzellen gehören. Bemerkenswert groß kann zuweilen der Nucleolus dieser Kerne sein, wie aus *b* in Abb. 87 hervorgeht, in anderen Fällen wieder ist er von gleicher Größe wie in den weiter peripher liegenden Nervenzellen von entsprechender Größe. Tigroid-substanz wurde in allen Formen der fraglichen Nervenzellen nachgewiesen, Neurofibrillen nachzuweisen gelang mir jedoch nur bei den größeren Formen dieser Zellen, was wahrscheinlich nur von einer weniger gelungenen Imprägnation abhängt. Ein Teil subependymal gelegener Nervenzellen sendet keinen Ausläufer bis zum Lumen des Z.-K., so daß einige von diesen Zellen wahrscheinlich amacrine Formen sind.

Canis aureus. (Hierzu Abb. 86, Tafel XV.) Es wurde ein etwa 5 cm langes Stück des Cervicalmarks in Höhe des 2. und 3. Halssegments untersucht. Die Ependymzellen sind hier in nur einer Reihe angeordnet und variieren ein wenig in ihrer Form. Gewöhnlich kommen kubische bis niedrig-zylindrische Formen vor, aber auch schmal-zylindrische Zellen finden sich hier und da. Von den gewöhnlich chromatinreichen Ependymzellkernen unterscheiden sich in den mit Hämatoxylin oder Toluidinblau gefärbten Präparaten einige durch ihre hellere Farbe. Die mit diesen helleren Kernen versehenen Zellen weichen auch hinsichtlich des Verhaltens ihres Zellkörpers von den eigentlichen Ependymzellen ab und sind wahrscheinlich liegengebliebene Keimzellen. Außerordentlich spärlich kommen im Ependym Zellen mit Nervenzellcharakter vor. Diese i. N.-Z. liegen mit ihrem Zellkörper in der Regel peripher von den Ependymzellen, und ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo er in der Regel mit einer Verdickung endet. Hier vorkommende i. N.-Z. haben große, bläschenförmige und chromatinarme Kerne, die einen großen Nucleolus besitzen. Außerdem haben diese Zellen gewöhnlich Nissl-Körnchen und Neurofibrillen. Bi- bis multipolare i. N.-Z. sind beim Schakal nachgewiesen. Abb. 86 gibt eine solche i. N.-Z. wieder, die 9 μ breit ist und einen Ausläufer in das Lumen des Z.-K. sendet, wo er mit einer unregelmäßig kugelförmigen Verdickung endet. Von einem peripher gerichteten Ausläufer konnte nur eine Andeutung nachgewiesen werden. Dicht zentral vom Kern hat die Zelle, die Abb. 86 zeigt, ein helleres Feld im Protoplasma, das 2 schwach gefärbte Körperchen einschließt. Diese stimmen hinsichtlich Lage und Aussehen recht gut mit den Zentralkörperchen überein, wie sie in den mit *Heidenhains* Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbten Präparaten vorkommen; solche Zentralkörperchen wurden bei mehreren i. N.-Z. nachgewiesen. Die Abb. 86, die genau nach einem mit Toluidinblau gefärbten Präparat gezeichnet ist, zeigt ferner deutliche Nissl Körnchen in dem zentral vom Kern gelegenen Teil der i. N.-Z. Der Kern dieser i. N.-Z. zeigt insofern ein interessantes Verhalten, als der Nucleolus mittels eines kompakten Chromatinbandes dem schwach eingebuchteten freien Rande des Kernes anliegt. Dicht peripher vom Ependym finden sich einige Nervenzellen von der

gewöhnlichen multipolaren Form. Oftmals sieht man, daß einer der Ausläufer der Nervenzelle in Richtung auf den Z.-K. zustrebt. Nur ausnahmsweise aber habe ich einen solchen Ausläufer bis zum Lumen des Z.-K. verfolgen können. In einigen Fällen habe ich i. N.-Z. wahrgenommen, deren zentral gerichtete Ausläufer Anzeichen von Atrophie zeigten. Sie waren äußerst fein, verliefen geschlängelt und traten recht unscharf gezeichnet hervor. Diese Tatsachen scheinen mir darauf hinzudeuten, daß ein Teil derartiger i. N.-Z. sekundär ihre Verbindung mit dem Ependym und dem Lumen des Z.-K. verlieren kann.

Equus caballus. (Hierzu Abb. 84, die nach einem Neurofibrillen-imprägnierten und Abb. 85, die nach einem Nissl-gefärbten Präparat gezeichnet ist, Tafel XV.) Die Ependymzellen längs des Z.-K. variieren etwas in ihrer Form, wie aus Abb. 84 und 85 hervorgeht, sind durchgehends schmal (im allgemeinen haben sie eine Breite von $2-6\ \mu$) und haben ziemlich schmale und langgestreckte, chromatinreiche Kerne. Unter den peripheren Ependymzellen und dicht peripher vom Ependym finden sich Zellen mit bläschenförmigen und im allgemeinen runden, chromatinarmen Kernen. Wenigstens ein Teil dieser Zellen sind in der Ependymregion liegende Keimzellen.

Außer den bereits erwähnten Zellen sieht man in der Ependymregion ziemlich konstant Zellen, die schon in den mit Hämatoxylin gefärbten Präparaten an echte Nervenzellen erinnern. Diese Zellen liegen nicht nur intra-, sondern auch subependymal. Die Neurofibrillen-Imprägnation und die Nissl-Färbung geben durchaus beweiskräftige Bilder von der Identität dieser Zellen mit Nervenzellen. Die Neurofibrillen-imprägnierten Präparate zeigen ferner, daß unter den subependymal gelegenen Nervenzellen einige einen Ausläufer in das Lumen des Z.-K. hineinsenden und also i. N.-Z. sind. Diese Präparate machen es auch sehr wahrscheinlich, daß einige andere subependymal gelegene Nervenzellen keinen Ausläufer in das Ependym senden und wahrscheinlich zu den amacrinen Zellen zu rechnen sind.

Die i. N.-Z. sind fast ohne Ausnahme größer als die Ependymzellen; die meisten Formen erreichen eine Breite von $15-20\ \mu$. Ihr Zellkörper variiert bedeutend hinsichtlich seiner Lage. Nur ausnahmsweise liegen die Körper der i. N.-Z. zwischen den peripheren Ependymzellen. In der Regel herrscht die Lage vor, die die Abb. 84 und 85 wiedergeben, sie können aber auch bedeutend weiter peripher liegen. In einigen Fällen habe ich einen Abstand von $60-90\ \mu$ zwischen den peripheren Ependymzellkernen und den Kernen der i. N.-Z. feststellen können. Die i. N.-Z. variieren an Zahl. In einer lückenlosen Serie $10\ \mu$ dicker Schnitte von einem Stück Lendenmark habe ich in den meisten Schnitten wenigstens vereinzelte i. N.-Z. gefunden; andererseits wurden bis zu 8 Stück derartiger Zellen in ein und demselben Schnitt angetroffen. Die i. N.-Z. sind bi- bis multipolar. Von den Ausläufern setzt sich einer in zentraler Richtung bis in das Lumen des Z.-K. hinein fort, wo er im allgemeinen mit einer Verdickung von variabler Form endet. Die peripher gerichteten Ausläufer bis zu ihrem Endapparat zu verfolgen, ist mir nie gelungen. Golgi-Imprägnationen, die mangels embryonalen Materials an Material von erwachsenen Tieren ausgeführt worden sind, haben keine gelungenen Bilder von den peripheren Ausläufern der fraglichen Zellen ergeben.

Die Kerne der i. N.-Z. variieren in ihrer Lage in derselben Art, wie oben für die Lage der eigentlichen Zellkörper angegeben ist. Die Kerne sind ähnlich wie die der typischen Nervenzellen gebaut und haben auch einen bemerkenswert großen Nucleolus. In den gelungenen Neurofibrillen-imprägnierten Präparaten tritt bei den i. N.-Z. eine deutlichere und dichtere Neurofibrillenstruktur hervor. Unter den Ausläufern hat gewöhnlich der zentral gerichtete die zahlreichsten Neurofibrillen. Das freie Ende dieses Ausläufers ist bei der genannten Imprägnation gewöhnlich etwas inkrustiert. Bei schwacher Imprägnation entsteht der Eindruck, daß die Neurofibrillen innerhalb der etwas verdickten freien Enden lockerer angeordnet sind.

In gut gefärbten Nissl-Präparaten treten in den meisten i. N.-Z. bei diesem Tiere Tigroidschollen sehr schön hervor.

Equus asinus (ausgetragener Foetus). Form und Anordnung der Ependymzellen und das Aussehen ihrer Kerne erinnern sehr an die Verhältnisse beim Pferde. In den untersuchten Präparaten habe ich zahlreiche i. N.-Z. nachgewiesen, die bereits in den mit Hämatoxylin gefärbten Präparaten von den gewöhnlichen Ependymzellen leicht, u. a. durch ihre mehrfache Breite, zu unterscheiden sind. Die i. N.-Z. haben große, bläschenförmige, chromatinarme Kerne mit wenigstens einem großen Nucleolus. Die Kerne liegen in verschiedener Höhe, bisweilen in Höhe der Kerne der Ependymzellen, in der Regel jedoch peripher, ja mitunter weit von ihnen entfernt. Es kommen bi- bis multipolare Formen der i. N.-Z. vor. Einer ihrer Ausläufer erstreckt sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo sein freies Ende eine mehr oder weniger deutliche Auftreibung zeigt. Bei den meisten Formen der i. N.-Z. habe ich Nissl-Körnchen nachgewiesen, die in den meisten Fällen ebenso intensiv gefärbt sind wie in den peripheren Nervenzellen. Auch Neurofibrillen sind in den fraglichen Zellen nachgewiesen. Direkt peripher vom Ependym wurde eine Anzahl Nervenzellen festgestellt, von denen ein Ausläufer bis in das Ependym hinein nicht verfolgt werden konnte. Bestimmte Anzeichen, u. a. der tangentielle Verlauf der Ausläufer, sprechen dafür, daß diese Zellen mit den oben beschriebenen, subependymal gelegenen amacrinen Nervenzellen analog sind.

Bos taurus. (Hierzu Abb. 82, 83, 91—103, Tafel XV—XVII.) Da mir von dieser Tierart sehr reichliches Material zur Verfügung stand, und zwar sowohl von Embryonen als auch von geborenen Tieren verschiedenen Alters, war ich in der Lage, hier eingehender als bei den anderen untersuchten Tierarten die morphologischen Verhältnisse der fraglichen Zellen zu untersuchen.

Abb. 97 gibt eine Abbildung eines in Hämatoxylin gefärbten Präparates vom Ependym des Lendenmarks eines erwachsenen Tieres. Die Ependymzellen sind sehr schmal und langgestreckt. Ihre ebenfalls langgestreckten Kerne von eigentümlicher Form liegen in einer recht breiten Zone des Ependyms in verschiedener Höhe angeordnet. Im allgemeinen findet sich die langgestreckte, schmale Form der Kerne mehr konstant bei den bilateral gelegenen Ependymzellen als bei den dorsal und ventral gelegenen. Die Kerne der erstgenannten Zone haben eine zwischen $2,5$ und $3,7 \mu$ variierende Breite und eine Höhe, die zwischen $7,5$ und 21μ variiert. Dorsal und ventral variieren die Kerne der Ependymzellen noch mehr in Form und Größe; nicht nur ovale, sondern auch

runde Kerne sind hier vorhanden. Der Durchmesser der runden Kerne schwankt zwischen 3 und 6 μ . Die langgestreckt-ovalen Kerne kommen in sehr verschiedenen Größen vor und erreichen im Maximum eine Breite von 5 und eine Länge von 17 μ . Alle diese oblongen Zellkerne zeigen die Eigentümlichkeit, daß in einem und demselben Kern 2—6 Nucleoli in einer Reihe geordnet vorkommen. Die Nucleoli sind oftmals queroval bis unregelmäßig geformt. Außerdem haben die Kerne in der Regel Einschnürungen, die teils in Höhe der Nucleoli, teils zwischen diesen liegen. Daraus ergibt sich, daß, bei einer gewissen Einstellung wenigstens, die eigentlichen Ependymzellkerne eine perlschnurähnliche Form aufweisen. Einige intraependymal liegende Zellen mit rundem Kern zeigen einen Bau, der an den von jüngeren, generationsfähigen Zellen erinnert. Derartige Zellen kommen, obwohl spärlich, bilateral im Ependym vor und sind wahrscheinlich im Ependym liegende Keimzellen, die durch Teilung — beim erwachsenen Tiere durch Amitose — peripher wandernde Zellen bilden können. Hierüber s. näheres bei *Agduhr*¹⁾. In Abb. 97 sieht man links eine derartige Zelle. Diese Zellen liegen in verschiedener Höhe des Ependyms; mehrmals habe ich in ihnen Teilungsfiguren nachweisen können. Die eigentlichen Ependymzellen haben nahe dem freien Ende ihres zentral gerichteten Ausläufers je 2 Zentralkörperchen, die im Neurofibrillen-imprägnierten oder mit Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbten Präparat (s. Abb. 91) schön hervortreten. In den mit Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbten Präparaten sieht man außerdem deutlich, daß einige Ependymzellen verschiedene Sekretionsstadien zeigen. Auch typische, blasenähnliche Sekretion findet man hier (s. Abb. 97).

Außer den bereits beschriebenen 2 Zelltypen kommen im Ependym des Rindes mehrere Zellen mit deutlichem nervösem Charakter oder sog. i. N.-Z. vor. Diese Zellen sind sowohl durch ihre Größe als auch durch ihre Form und Struktur von den oben beschriebenen Zelltypen leicht zu unterscheiden. Abb. 99 zeigt im Ependym des Z.-K. eine Stelle, wo 2 i. N.-Z. nahe beieinander liegen. In dem Schnitte, der der Abb. 99 zugrunde liegt, sind 10 i. N.-Z. vorhanden. Die eine i. N.-Z., links in Abb. 99, ist bipolar, die andere rechts ist multipolar. Diese Zellen haben langgestreckte und relativ schmale Zellkörper. In Abb. 98 sehen wir eine andere i. N.-Z., deren Zellkörper birnförmig ist und die einen zentral und 2 peripher gerichtete Ausläufer besitzt. Der erstere endet ohne Verdickung in Höhe der inneren Fläche des Ependyms. Abb. 91 ist eine Zeichnung (nach einem Neurofibrillen-imprägnierten Präparat) der linken i. N.-Z. in dem Mikrophotogramm der Abb. 99. Diese Abbildung, die bei stärkster Vergrößerung und unter Benutzung der bestmöglichen optischen Hilfsmittel gezeichnet ist, zeigt u. a., daß die Neurofibrillen besonders dicht um den Kern herum und zum größten Teil in dem zentral vom Kern gelegenen Teil des Zellkörpers liegen. Vom zentralen Ende dieses eben erwähnten Abschnittes zieht in dem zentral gerichteten Ausläufer außer locker angeordneten Neurofibrillen ein in der Achse des Ausläufers gelegenes dichtes Bündel nach dem Lumen des Z.-K. Dieses dichte Bündel scheint sich in Höhe der inneren Fläche des Ependyms diffus auszubreiten. Der Ausläufer indessen setzt sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein fort und ist hier etwas verdickt. In diesem verdickten Ende sind die Neurofibrillen recht locker geordnet. In dem peripher gerichteten Ausläufer finden sich 2 deut-

liche argentophile Züge — wahrscheinlich Neurofibrillenbündel —, die sich in die beiden Gabeläste des Ausläufers fortsetzen.

In den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten ähnelt die Färbung der i. N.-Z. derjenigen, die die peripher gelegenen typischen Nervenzellen aufweisen. Größere Formen der i. N.-Z. haben auch gut gefärbte Tigroidschollen (s. Abb. 92). Die in Abb. 92 abgebildete Zelle hat der Schnitt so getroffen, daß nur ein kleiner Kugelabschnitt des Kernes in der abgebildeten Zelle sichtbar ist. Die Kerne der i. N.-Z. sind bläschenförmig und chromatinarm und haben einen bis mehrere Nucleoli. Ihre Lage ist gewöhnlich peripher, mitunter weit peripher von den Kernen der Ependymzellen. Nur ausnahmsweise sieht man — vor allem bei jüngeren Zellen — die Kerne der i. N.-Z. in Höhe der Kerne der Ependymzellen liegen. Das freie Ende des zentral gerichteten Ausläufers liegt nur ausnahmsweise in Höhe der inneren Fläche des Ependyms. Denn gewöhnlich erstreckt es sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein und ist hier etwas verdickt. Flimmerhaare, Sinneshaare oder Zuspitzung habe ich am freien Ende des zentral gerichteten Ausläufers der i. N.-Z. niemals feststellen können. Die Ependymzellen dagegen haben, besonders im Golgi-Präparat, ein schön hervortretendes Haar, das sich etwas in das Lumen des Z.-K. hineinerstreckt.

Um die peripher sich fortsetzenden Ausläufer der i. N.-Z. besser studieren zu können, bediente ich mich der Golgi-Chromsilbermethode. Es galt zunächst festzustellen, ob sich der peripher gerichtete Ausläufer der i. N.-Z. auf peripher gelegene Zellen umkoppelt oder nicht. In Präparaten von Tieren verschiedenen postfötalen Alters ist es mir niemals gelungen, mit dieser Methode vollständige Imprägnationen der i. N.-Z. zu erhalten. Dies ist mir aber mit fötalem Material gelungen. Aber auch bei Embryonen scheinen mir die i. N.-Z. bedeutend schwerer zu imprägnieren zu sein als Ependymzellen und peripher gelegene Nervenzellen. Die besten Ergebnisse mit dieser Methode erhielt ich bei Embryonen von 20 bis 35 cm Scheitel-Steißlänge. Das Rückenmark zahlreicher derartiger Embryonen ist Gegenstand der Golgi-Imprägnation gewesen, und ich habe mehrere außerordentlich schöne Imprägnationen erhalten. Trotzdem habe ich in meiner Präparatensammlung nicht mehr als etwa 20 vollendet gelungene Imprägnationen, die zeigen, wie die peripheren Ausläufer der i. N.-Z. sich auf die Ausläufer von peripher gelegenen Nervenzellen umkoppeln. Diese Ergebnisse gehen also weiter, als ich mit dieser oder einer anderen Methode bei den übrigen untersuchten Tierarten erreicht habe. Das ist sicher darauf zurückzuführen, daß ich bei den anderen Tierarten keine Individuen geeigneten Alters zur Verfügung hatte. Diese Tatsache trifft vor allem zu für die für geeignetes Material besonders empfindliche Golgi-Methode.

Nun möchte ich zunächst einige Golgi-Bilder der fraglichen i. N.-Z. erläutern.

Abb. 102 zeigt eine multipolare i. N.-Z. eines 23 cm langen Rindsfoetus. Zu beachten sind hier vor allem die zahlreichen feinen Fäden, in die sich der dicke, aber kurze peripher gerichtete Ausläufer teilt. Mehrere dieser feinen Fäden scheinen innerhalb des Ependyms bereits zu enden. Dies hindert jedoch die fraglichen Fäden nicht, sich auf intraependymal gelegene Dendriten peripher liegender Nervenzellen umzukoppeln. An zahlreichen Stellen meiner Präparate habe ich

nämlich Ausläufer von peripher gelegenen, recht großen Nervenzellen bis an und in das Ependym verfolgen können.

Die Abb. 101 gibt links eine Ependymzelle und rechts eine i. N.-Z. vom Rückenmark eines 14 cm langen Rinderfoetus wieder. Die Ependymzelle trägt an dem freien Ende ihres zentral gerichteten Ausläufers das bei Golgi-Imprägnation beinahe konstant hervortretende Haar, das ein Stück in das Lumen des Z.-K. sich hineinerstreckt, während das freie Ende der i. N.-Z. abgerundet und etwas aufgetrieben ist. Die beiden auf dem Bilde rechts gelegenen Ausläufer der i. N.-Z. scheinen, der Abbildung nach zu urteilen, ziemlich weit zentral vom Zellkörper abzugehen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß dieser Ursprung nur scheinbar ist, und daß der wahre Ursprung wie bei den meisten anderen Zellen peripher am Zellkörper sich findet; wahrscheinlich verläuft der Ausläufer zunächst an der Unterfläche des inkrustierten Teiles des Zellkörpers eine Strecke weit zentral und biegt dann am zentralen Ende des Zellkörpers nach rechts und schließlich peripher um.

Die Mikrophotographie der Abb. 100 zeigt eine i. N.-Z. eines 24 cm langen Embryo, die einen kurzen zentral gerichteten und zahlreiche peripher verlaufende Ausläufer besitzt. Dieses Bild mit den zugehörigen Nervenfasern ist vergrößert und etwas schematisiert in Abb. 94 wiedergegeben. Bei *a* in Abb. 94 ist eine Nervenfasern zu sehen, die ventral vom Z.-K. über die Medianebene hinaus eine Strecke weit auf die andere Seite verfolgt werden kann; es handelt sich hier also um eine Commissurenfasern. Bei *b* steht *a* wenigstens in Kontakt mit dem Nervenfasern *c*, und der letztere steht bei *d* wenigstens in Kontakt mit einem Ausläufer der i. N.-Z. Die Nervenfasern bei *d* und *b* sind nicht inkrustiert, sondern nur dunkelbraun gefärbt; daraus erhellt, daß man hierbei nicht mit einem Kunstprodukt zu rechnen hat. Bei *c* ist indessen eine Inkrustierung vorhanden; daher läßt sich nicht entscheiden, ob es sich hierbei um eine Nervenzelle, um einen Teil einer solchen oder nur um eine Varicosität handelt. Handelt es sich nicht um eine Nervenzelle oder einen Teil von ihr, so kann *c* möglicherweise eine Kollaterale zur Nervenfasern *a* sein. Eine weitere Möglichkeit bestände darin, daß *c* ein fortlaufender Zweig der fraglichen i. N.-Z. ist. Diese letztere Möglichkeit scheint mir indessen am wenigsten wahrscheinlich, wenn man die näheren Verhältnisse des Präparates berücksichtigt, weil die Verbindung bei *d* äußerst fein ist. Ob nun *c* eine bipolare Nervenzelle oder eine Kollaterale zu *a* ist, so dürfte jedenfalls das Ganze kaum anders gedeutet werden können als eine Umkopplung der i. N.-Z.

Die Zeichnung der Abb. 95 gibt bei geringer Vergrößerung eine Umkopplung einer i. N.-Z. auf den Ausläufer einer großen peripheren Nervenzelle von einem 24 cm langen Foetus wieder. Das Gebiet innerhalb der Linie *l* ist in Abb. 103 vergrößert wiedergegeben. Im Präparat, das der Abb. 103 zugrunde liegt, finden sich nebeneinander 2 imprägnierte i. N.-Z., von denen die links liegende in Abb. 103 der Übersicht halber nur punktiert wiedergegeben ist. Diese beiden i. N.-Z. scheinen in nahe Verbindung mit einer subependymal gelegenen Nervenzelle zu treten, die keinen imprägnierten Ausläufer in der Richtung zum Lumen des Z.-K. sendet. Nach dem Präparate zu urteilen, vermittelt die subependymal gelegene Nervenzelle die Umkopplung der beiden i. N.-Z. auf einen Dendriten einer peripher liegenden großen Nervenzelle (s. Abb. 95). Da hier keine Inkrustie-

rung vorliegt, sondern die Imprägnation die eingezeichneten Zellen nur intensiv dunkelbraun gefärbt hat, so dürfte diese Golgi-Abbildung beweisen, daß die i. N.-Z. sich auf die Dendriten von peripher gelegenen großen Nervenzellen unkoppeln und sich hierbei subependymal gelegener Nervenzellen bedienen können.

Abb. 82 stammt von einem imprägnierten Präparat vom Rückenmark eines 28 cm langen Rinderfoetus. Die links gelegene i. N.-Z. ist unvollständig imprägniert. Rechts dagegen liegt eine vollständig imprägnierte bipolare i. N.-Z. Der peripher gerichtete Ausläufer dieser Zelle koppelt sich auf den einen Dendriten einer lateral vom Z.-K. gelegenen Nervenzelle um, die einen weiteren Dendriten bis zum Ependym sendet. Feine Zweige dieses letztgenannten Ausläufers können ein beträchtliches Stück in das Ependym hinein verfolgt werden. Die rechts gelegene große Nervenzelle sendet ebenfalls einen Ausläufer bis in das Ependym hinein, wo dieser gleichfalls intraependymale Verzweigung erkennen läßt. Diese Abbildung gibt also — außer einem weiteren Beweis für die Umkopplung einer i. N.-Z. auf einen Ausläufer einer peripher liegenden Nervenzelle — ein Beispiel dafür, daß Zweige einer peripher gelegenen Nervenzelle das Ependym erreichen und sich teilweise intraependymal ausbreiten können. Diese Tatsachen scheinen mir sehr interessant zu sein. Die letztgenannten Zweige sind, nach meinem Präparat zu urteilen, keine Neuriten peripher gelegener Nervenzellen und können also keine sekretorische Innervation verursachen. Man kann sich dagegen vorstellen, daß diese intraependymal verlaufenden Nervenfasern wie in der Epidermis zwischen oder an den Epithelzellen enden. Wenn die Nervenfasern an oder in den im Ependym gelegenen Zellen enden, so dürften diese Zellen als gleichwertige sekundäre Sinneszellen aufzufassen sein. Denken könnte man sich ferner, daß die fraglichen Bildungen unvollständige Imprägnationen von Nervenendigungen sind, die den unten beschriebenen eigentümlichen Nervenendigungen in der Fossa rhomboidea bei *Squalus* oder im Ependym des Z.-K. bei *Rana* entsprechen. Am wahrscheinlichsten scheint mir jedoch zu sein, daß es sich hier um Nervenfasern handelt, von denen sich wenigstens ein Teil auf die innerhalb des Ependyms gelegenen Ausläufer von i. N.-Z. unkoppelt. Daß i. N.-Z. mit innerhalb des Ependyms sich verzweigenden Ausläufern vorkommen, ist ja bereits oben beschrieben (s. Abb. 101 und 102). Außerdem sind innerhalb des Ependyms erfolgende Umkopplungen schon nachgewiesen (s. Abb. 93). Ohne jeden Zweifel als Neuriten anzusprechende Gebilde, die von diesen peripher gelegenen großen Nervenzellen ausgehen, habe ich in den untersuchten Querschnitten nicht nachweisen können, obwohl diese Schnitte bis zu 200 μ dick waren. Bei später vorgenommenen Kontrolluntersuchungen an Golgi-imprägnierten Stücken vom Rückenmark von Rinderföten, von denen ich Längsschnitte anfertigte, habe ich ähnliche Zellen und Umkopplungen nachgewiesen; es ist mir aber auch in diesen Präparaten nie gelungen, Neuriten der fraglichen großen Nervenzellen nachzuweisen.

Bemerken möchte ich noch, daß die peripheren Ausläufer der großen peripheren Nervenzellen, auf deren zentral gerichtete Ausläufer sich i. N.-Z. umgekoppelt haben, im Rückenmark weit peripher, in einigen Fällen sogar bis zu den Meninges, verfolgt werden können.

Die Zeichnung der Abb. 96 stammt von einem Präparat mit gelungener Imprägnation des Rückenmarks eines 34 cm langen Foetus. Hier werden 3 i. N.-Z. vom bipolaren Typ und 2 etwas lateral vom Z.-K. gelegene Nervenzellen abgebildet. Die i. N.-Z. gehören zu den kleinsten Formen, die ich bei diesem Tier angetroffen habe, und haben eine bemerkenswert große Verdickung am freien Ende ihres zentral gerichteten Ausläufers. Die peripher gerichteten Ausläufer gehen in dunkelbraungefärbte Auftreibungen über, die mit Zweigen der peripher gelegenen Nervenzellen in Verbindung stehen. Die Auftreibung des peripher gerichteten Ausläufers der am weitesten links gelegenen i. N.-Z. steht in Verbindung mit Zweigen von 2 peripher gelegenen Nervenzellen. Die beiden rechts gelegenen i. N.-Z. zeigen insofern durchaus entgegengesetztes Verhalten, als sie sich auf ein und denselben Ausläufer der rechten von den beiden peripher gelegenen Nervenzellen umkoppeln. Der fragliche Ausläufer hat an seinem freien Ende zwei aufeinander folgende, braungefärbte Auftreibungen, eine für jede der beiden i. N.-Z. Von der dem Ependym am nächsten gelegenen Auftreibung geht nach links ein Nervenfasern *a* ab; zwischen ihm und dem in dieselbe Auftreibung gehenden peripheren Ausläufer der rechts gelegenen i. N.-Z. konnte ich eine Verbindung innerhalb der Auftreibung nicht nachweisen. Die linke der beiden rechts gelegenen i. N.-Z. geht mit ihrem peripheren Ausläufer unter gleichmäßiger Ausbreitung in die weniger weit zentral gelegene der erwähnten beiden Auftreibungen über. Diese 3 Umkopplungen haben also das gemeinsam, daß die Umkopplungsstellen durch Auftreibungen hervortreten; sie unterscheiden sich aber vor allem dadurch, daß die beiden linken Umkopplungen durch eine i. N.-Z. und 2 periphere Nervenzellen und daß die rechte Umkopplung durch 2 i. N.-Z. und eine periphere Nervenzelle zustandekommen. Neuriten von den beiden peripheren Nervenzellen habe ich nicht mit Sicherheit nachweisen können.

Abb. 83 zeigt eine gelungene Golgi-Imprägnation von Nervenzellen eines 25 cm langen Rindsfoetus. Hier tritt u. a. im Ependym eine bipolare i. N.-Z. auf, deren zentral gerichteter Ausläufer abgerundet und gleichbreit in Höhe der inneren Fläche des Ependyms endet. Ihr peripher gerichteter Ausläufer zeigt ein besonderes Verhalten. Etwas lateral vom Ependym sendet er bei *a* einen kurzen, an seinem freien Ende abgerundeten Fortsatz aus, der sich in eine rinnenförmige Verdickung am zentralen Ende eines Dendriten einschiebt, der von einer weiter lateral liegenden großen Nervenzelle stammt. Diese schön imprägnierte Kontaktbildung ist meines Erachtens nicht die einzige Umkopplung dieser i. N.-Z. Der periphere Ausläufer dieser i. N.-Z. setzt sich nämlich noch weiter ventral fort (in der Abbildung nach rechts), und es ist wahrscheinlich, daß eine noch besser gelungene Imprägnation noch eine oder mehrere Umkopplungen dieser i. N.-Z. hervorgebracht hätte. Es scheint mir also Grund zu der Annahme zu bestehen, daß es sich hier um eine i. N.-Z. handelt, die sich außer auf den Dendriten der imprägnierten Nervenzelle noch auf die Ausläufer mehrerer peripher liegender Nervenzellen umkoppelt. Das prinzipielle Vorkommen eines derartigen Verhaltens ist bereits durch das Präparat bewiesen, das der vorhergehenden Abbildung zugrundeliegt. Einen Neuriten zu den peripher gelegenen großen Nervenzellen habe ich in den mehr als 200 μ dicken Querschnitten nicht nachweisen

können, jedoch konnte ihr peripherer Ausläufer im Querschnitt des Rückenmarks weit peripher verfolgt werden.

Abb. 93 zeigt eine gelungene Imprägnation vom Rückenmark eines 28 cm langen Embryo. Bei *a* liegt eine bipolare Nervenzelle, die sich intraependymal auf den peripher gerichteten Ausläufer einer i. N.-Z. umkoppelt. Wie sich das freie Ende des zentral gerichteten Ausläufers dieser i. N.-Z. verhält, habe ich nicht mit Sicherheit feststellen können, weil das Lumen des Z.-K. zu dunkel imprägniert ist. Der periphere Ausläufer der bipolaren Nervenzelle kommt bei *b* in große Nähe zu der Nervenfasern *c*. Ob *b* als ein Kontakt oder als eine Umkoppelung der Nervenzelle *a* auf die Nervenfasern *c* zu betrachten ist, kann ich nicht bestimmt angeben. Eine imprägnierte Verbindung der beiden Nervenfasern (bei *b*) existiert jedenfalls nicht. Die Nervenfasern *c* verläuft im Schnitt sehr geschlängelt und reicht noch nach rechts über die Medianebene. Rechts in der Abbildung liegt eine Ependymzelle, die mit ihrem peripher gerichteten Ausläufer die Medianebene überschreitet.

Bison bonasus. (Hierzu Abb. 104, 108 u. 109, Tafel XVIII.) Das Ependym wird von zylindrischen Ependymzellen aufgebaut, die mit ihren peripher gerichteten Ausläufern oft in Gruppen geordnet sind. Die Kerne dieser Ependymzellen liegen in einer oder in mehreren Reihen. Sie variieren sehr in ihrer Form, ein Teil ist rund, andere sind oval, länglich-oval bis beinahe bandförmig. Indessen fand ich sie niemals so langgestreckt und schmal wie beim Rinde. Dagegen erinnert die Chromatinstruktur in den Ependymzellkernen etwas an die Verhältnisse beim Rinde. Ein Teil der Ependymzellen trägt Flimmerhaare. In den mit Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbten oder in Ag-imprägnierten Präparaten treten 2 Zentralkörperchen in dem zentral gerichteten Ausläufer nahe seinem freien Ende in einem hellen Hofe hervor.

In den untersuchten Präparaten habe ich i. N.-Z. nachgewiesen, deren Frequenz sehr variabel ist, die aber im allgemeinen nur spärlich vorzukommen scheinen. In der Regel liegen die kernführenden Abschnitte dieser Zellen wenigstens teilweise intraependymal (s. Abb. 108 u. 109). Seltener kommen solche i. N.-Z. vor, die den in Abb. 104 wiedergegebenen ähneln. Diese Nervenzellen scheinen, meinen Präparaten nach zu urteilen, in ihrer Größe nicht bedeutend zu variieren, auch ihre kleinsten Formen sind größer als die Ependymzellen. Abb. 104, 108 und 109 zeigen die kleinsten und die größten Formen, die wahrgenommen wurden. Die fraglichen Zellen sind in der Regel bipolar, nur ausnahmsweise habe ich mehrere periphere Ausläufer von einer i. N.-Z. ausgehen sehen. Der zentral gerichtete Ausläufer erstreckt sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo er gewöhnlich eine Auftreibung aufweist. Die stärkste derartige Auftreibung, die ich bei diesem Tiere gefunden habe, zeigt Abb. 108. Diese Auftreibung schließt auch einige kleinere Nissl-Körnchen ein. Die peripher gerichteten Ausläufer haben einen variablen Verlauf. Die Kerne der i. N.-Z. liegen gewöhnlich in gleicher Höhe mit den Kernen der peripheren Ependymzellen oder dicht peripher von diesen, nur selten liegen sie weiter peripher, wie Abb. 104 zeigt. Gleichwie bei den meisten anderen Vertebraten, so treten diese Kerne auch hier durch ihre Größe, Bläschenform, geringe Chromatinmenge und ihre großen, in der Regel scharf konturierten Nucleoli hervor. Neurofibrillen konnte ich nur bei einigen

i. N.-Z. vom Bison nachweisen. Tigroidschollen dagegen wurden bei allen Größen dieser Zellen nachgewiesen. Außer den eben beschriebenen i. N.-Z. kommen noch einige andere Nervenzellen vor, die unmittelbar peripher vom Ependym liegen. Von diesen Zellen bis zum Lumen des Z.-K. gehende Ausläufer habe ich nicht gefunden, was natürlich nicht die Möglichkeit ausschließt, daß trotzdem solche Ausläufer vorhanden sind. Der nachgewiesene Ausläufer einiger dieser Zellen scheint mir für die amacrine Natur dieser Zellen zu sprechen.

Capra hircus. (Hierzu Abb. 105—107, 110 und 111, Tafel XVIII.) Das Ependym besteht aus zylindrischen Zellen, deren Kerne in einer oder in mehreren Reihen angeordnet sind. Die Form der Kerne variiert von runden, ovalen, länglich-ovalen bis zu unregelmäßig geformten Kernen. In Ag-imprägnierten oder den mit Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbten Präparaten treten in den Ependymzellen je 2 Zentralkörperchen innerhalb eines ovalen, lichten Feldes auf, das nahe dem freien Ende des zentral gerichteten Ausläufers liegt. Hier und da zeigen die Ependymzellen Andeutungen von Flimmerhaaren. Es kommen zahlreiche i. N.-Z. vor, deren Zahl in verschiedenen Schnitten bedeutend zu variieren scheint. In mehreren nacheinander folgenden Schnitten fehlen sie ganz, in anderen wiederum sind sie recht zahlreich vorhanden. Diese Zellen liegen gewöhnlich ganz intraependymal. In seltenen Fällen nur liegt ihr kernführender Abschnitt etwas peripher vom Ependym, wobei nur der zentral gerichtete Ausläufer eine intraependymale Lage hat. Die Größe der fraglichen i. N.-Z. variiert bedeutend. Die Abb. 105—107, 110 und 111 zeigen Beispiele der gefundenen größten und kleinsten Formen dieser Zellen. Wie aus diesen Abbildungen hervorgeht, können die wahrgenommenen i. N.-Z. nicht nur kleiner, sondern auch bedeutend größer als die eigentlichen Ependymzellen sein. Die i. N.-Z. sind gewöhnlich bipolar, jedoch wurden auch tri- und multipolare Formen gefunden. Ihr zentral gerichteter Ausläufer, der je nach Lage und Größe des Zellkörpers eine verschiedene Form und Dicke hat, erstreckt sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo sein freies Ende — soweit aus meinem Material hervorgeht — konstant eine Verdickung aufweist. Diese Verdickung variiert bedeutend in Form und Größe. Zuweilen kann sie eine recht bedeutende Größe erreichen (s. Abb. 105). Die peripher gerichteten Ausläufer haben variablen Verlauf. Die Kerne dieser Zellen sind groß und bläschenförmig und haben ovale bis runde Form. Sie liegen mit wenigen Ausnahmen in Höhe der Kerne der Ependymzellen. Die Ausnahmen beziehen sich auf diejenigen Zellen, die nach dem oben Gesagten mit ihrem Körper peripher vom Ependym liegen. Die intraependymal gelegenen Kerne liegen, wie aus den Abbildungen hervorgeht, in verschiedener Höhe, entweder in Höhe der am weitesten zentral oder in Höhe der am weitesten peripher liegenden Ependymzellkerne. Sie sind chromatinarm und infolgedessen heller als die Kerne der Ependymzellen und schließen einen nicht besonders großen Nucleolus ein, der durch anliegendes Chromatin unscharfe Konturen zu haben scheint. Gelungene Neurofibrillen-Imprägnationen haben Neurofibrillen in den i. N.-Z. hervortreten lassen. Es ist mir jedoch niemals gelungen, in diesen Zellen so intensiv und elektiv gefärbte Neurofibrillen zu erhalten wie in den peripheren Nervenzellen. Nissl-Körnchen sind in allen wahrgenommenen Formen der i. N.-Z. dieses Tieres nachgewiesen worden. Ein besonders interessantes Verhältnis

zeigt Abb. 105, in der die große Auftreibung am freien Ende des zentral gerichteten Ausläufers eine große Zahl von Nissl-Körnchen variierender Größe einschließt. Auch in mehreren anderen Fällen wurden Nissl-Körnchen in größeren derartigen klumpenförmigen Endbildungen nachgewiesen. Außer diesen beschriebenen i. N.-Z. finden sich auch direkt peripher vom Ependym eine Anzahl anderer, großer Nervenzellen. Von mehreren dieser Nervenzellen gehen Ausläufer ab, die nach dem Ependym streben, es ist mir jedoch in diesen dünnen Schnitten nicht gelungen, diese Ausläufer bis zum Lumen des Z.-K. zu verfolgen. Wahrscheinlich gehören mehrere von diesen Nervenzellen zur Gruppe der i. N.-Z. Unter den subependymal gelegenen Nervenzellen kommen auch einige solche Zellen vor, die wahrscheinlich amacrinier Natur sind.

Ovis aries. (Hierzu Abb. 113 u. 114, Tafel XVIII.) Die Ependymzellen sind langgestreckt und mehr oder weniger keilförmig. Ihre Kerne sind rund bis oval und liegen an einigen Stellen in ein und derselben Reihe, gewöhnlich sind sie jedoch in mehreren Reihen angeordnet (s. Abb. 113). Ein Teil der Ependymzellen hat Flimmerhaare. Im Ag-imprägnierten Präparat haben die meisten Ependymzellen in einem ovalen, hellen Felde 2 deutlich hervortretende Zentralkörperchen, die nahe dem freien Ende des zentral gerichteten Ausläufers liegen. Zahlreiche i. N.-Z. kommen im Rückenmark dieses Tieres vor, deren bis zu 17 in ein und demselben 20μ dicken Querschnitt gezählt wurden. Soviel aus meinem Material hervorgeht, liegen die i. N.-Z. ganz intraependymal und sind, wie aus Abb. 113 und 114 deutlich hervorgeht, bei verschiedenen Färbungsmethoden von gewöhnlichen Ependymzellen leicht zu unterscheiden. In den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten unterscheiden sie sich gegen die Ependymzellen vor allem durch die intensiv blaufärbten Nissl-Körnchen und ihren großen, hellen Kern. In gelungenen Neurofibrillen-imprägnierten Präparaten treten die Neurofibrillen deutlich hervor, besonders in dem zentral vom Kerne gelegenen Teil der Nervenzellen. Auch in diesen Präparaten sind die Kerne der i. N.-Z. heller als die der Ependymzellen. Die i. N.-Z. sind bi- bis multipolar. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein und hat an seinem freien Ende eine klumpenförmige Auftreibung, die in Form und Größe etwas variiert. Ihre peripher gerichteten Ausläufer haben variierenden Verlauf, zuweilen gehen sie direkten Weges peripher, in anderen Fällen können sie ein Stück längs des Ependyms verfolgt werden. Die Kerne der i. N.-Z. sind bläschenförmig und chromatinarm und haben in der Regel nur einen Nucleolus, zum Unterschied von den Kernen der Ependymzellen, die gewöhnlich mehrere besitzen. Der Nucleolus des Kerns einer i. N.-Z. ist nicht so groß wie der einer peripher liegenden Nervenzelle von entsprechender Größe und auch nicht so scharf konturiert (in toluidinblaufärbten Präparaten). Dieses Verhalten des Nucleolus der i. N.-Z. erinnert also an die Verhältnisse bei den anderen Wiederkäuern, unterscheidet sich aber deutlich von den schon erwähnten Verhältnissen z. B. bei Insectivora und Carnivora. Die Kerne der i. N.-Z. sind durchgehends bedeutend größer als in den Ependymzellen. Ihre Lage variiert etwas, sie liegen aber in der Regel innerhalb des Ependyms. Die Größe der i. N.-Z. beim Schafe schwankt bemerkenswert wenig im Vergleich zu anderen Tieren. Eine große Anzahl Schnitte wurden durchgesehen, ohne daß eine bedeutendere Variation

in der Größe dieser Zellen festgestellt werden konnte, als aus den Abb. 113 und 114 hervorgeht.

Rangifer tarandus. (Hierzu Abb. 112, Tafel XVIII.) Die Ependymzellen rund um den Z.-K. sind in der Regel langgestreckt und schmal. Ihre Breite variiert gewöhnlich zwischen 4 und 8 μ . Ihre langgestreckten, ovalen bis runden Kerne liegen in einer bis mehreren Reihen geordnet. Zahlreiche i. N.-Z. kommen vor, die mit dem Zellkörper zum Teil intraependymal, zum Teil subependymal liegen. Beide Typen variieren sehr in der Größe. Die Breite der kleinsten Formen nähert sich derjenigen der Ependymzellen, während die größten bis zu 15 μ breit sind. Abb. 112 zeigt 2 Beispiele von sehr großen Zellen aus der Gruppe der ganz intraependymal gelegenen Nervenzellen. Diese Zellgröße können erreichen oder sogar noch übertreffen diejenigen i. N.-Z., die mit ihrem Zellkörper peripher vom Ependym liegen. Unter den letztgenannten i. N.-Z. finden sich solche, die mit ihren Kernen bis zu 60 μ peripher von den Kernen der Ependymzellen liegen. Die Kerne der i. N.-Z. haben Bläschenform, geringe Chromatinmenge und im allgemeinen nur einen großen Nucleolus (s. Abb. 112). Die Zellen sind bi- bis multipolar. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich in der Regel ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein und ist hier oft etwas verdickt. Er kann jedoch auch ohne Auftreibung im Lumen des Z.-K. enden. Die i. N.-Z. haben in gelungenen Neurofibrillen-impregnierten Präparaten eine gut hervortretende Neurofibrillenstruktur. Auch Tigroidschollen wurden in mehreren dieser Zellen nachgewiesen. Außer diesen i. N.-Z. ist eine Anzahl subependymal gelegener, wahrscheinlich amacrinier Nervenzellen gefunden worden.

Alces alces. Die Ependymzellen sind langgestreckt und schmal und haben ovale, länglich-ovale bis bandförmige Kerne, die eine an die Verhältnisse beim Rind erinnernde Chromatinstruktur aufweisen. Diese Kerne sind gewöhnlich nicht ganz so langgestreckt, wie sie beim Rinde sein können. In einer oder der anderen Ependymzelle sieht man Zeichen von Sekretion. Die meisten Ependymzellen tragen Flimmerhaare mit deutlichen Basalkörperchen; die letzteren kann man z. B. beim Rinde nicht sehen. Direkt unter dem Basalkörperchen sieht man ein helles, ovales Feld mit 2 Zentralkörperchen.

Bei diesem Tiere scheinen die i. N.-Z. — soviel aus meinem Material hervorgeht — bedeutend spärlicher als beim Rinde vorzukommen und sind wegen ihrer großen Besonderheiten, die bereits in z. B. mit Hämatoxylin gefärbten Präparaten deutlich werden, leicht von gewöhnlichen Ependymzellen zu unterscheiden. Von den i. N.-Z. liegen einige mit dem kernführenden Abschnitt ihres Zellkörpers ganz intraependymal, andere mehr oder weniger weit peripher vom Ependym. Die i. N.-Z., die bereits beim Rinde relativ langgestreckte und schmale Form aufwiesen, sind beim Elch in noch höherem Grade langgestreckt und schmal. Sie sind bi- bis multipolar und senden einen Ausläufer ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo dieser mit einer Auftreibung von wechselnder Form endet. Der oder die peripheren Ausläufer haben variierenden Verlauf. Die Kerne der i. N.-Z. haben die obenerwähnte Lage und ovale Form bis Bläschenform und lassen eine an die beim Rinde erinnernde Struktur (s. Abb. 91) erkennen. Sie haben also geringe Chromatinmenge und einen Nucleolus, der zwar groß, aber gewöhnlich nicht so groß ist, wie einer der großen Nucleolen in den Ependymzellkernen. Der

erwähnte Nucleolus ist dagegen mehr regelmäßig gerundet als die in den Kernen von Ependymzellen. Neurofibrillen und Nissl-Körnchen wurden in einigen dieser i. N.-Z. nachgewiesen. Auch subependymal gelegene Nervenzellen kommen hier und da vor, von denen wenigstens einige amakriner Natur sein dürften.

Capreolus capreolus. Die Verhältnisse beim Reh erinnern etwas an die oben beschriebenen beim Renntier. In den untersuchten Präparaten sind indessen die Ependymzellen etwas länger als bei diesem Tier, und ihre ovalen bis runden Kerne liegen zumeist nur in einer Reihe. Die i. N.-Z. kommen verhältnismäßig zahlreich, jedoch nicht so zahlreich wie bei *Rangifer tarandus* vor und haben eine ähnliche Form wie beim Renntier, sind aber durchgehends etwas kleiner. Neurofibrillen und Tigroidschollen wurden bei einigen größeren Formen gefunden, treten aber im allgemeinen weniger schön hervor als beim Renntier. Auch einige subependymal gelegene Nervenzellen sind nachgewiesen. Meine Präparate sprechen dafür, daß ein Teil von diesen mit den oben beschriebenen amacrinen Zelltypen analog ist.

Dama dama. Es wurde ein nahezu ausgetragener Embryo untersucht. Das Ependym ist mehrreihig. Von den gefundenen Nervenzellen liegt ein Teil mit dem Zellkörper subependymal, die Mehrzahl aber ganz intraependymal.

Sus scrofa domestica. (Hierzu Abb. 115—118, Tafel XVIII.) Die eigentlichen Ependymzellen variieren hinsichtlich der Größe, sind aber in der Regel lang und zylindrisch und besitzen ovale bis runde Kerne, die in eine bis mehrere Reihen geordnet sind. Bei diesen Zellen wurden Flimmerhaare und Sekretionserscheinungen festgestellt.

I. N.-Z. kommen längs des ganzen Z.-K. vor. Ihre Zahl variiert zwar von Schnitt zu Schnitt, sie sind aber im allgemeinen recht zahlreich und können mit ihrem kernführenden Abschnitt nicht nur intra-, sondern auch subependymal liegen. Nach meinem Material zu urteilen, sind die subependymal gelegenen zahlreicher (s. Abb. 115, 117 u. 118). Die i. N.-Z. sind durchgehends größer als Ependymzellen. Die Abb. 115—118 zeigen die gefundenen größten und kleinsten Zellformen. Die größten Formen dieser Nervenzellen sind oft sehr langgestreckt (s. Abb. 115 u. 118). Ich habe indessen bei diesem Tier auch direkt peripher vom Ependym gelegene i. N.-Z. nachweisen können, die kurze und breite Zellkörper haben. Die i. N.-Z. sind gewöhnlich bipolar, doch wurden auch einige tri- bis multipolare Formen gefunden. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich in der Regel ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein, wo sein freies Ende eine oft recht kleine Auftreibung besitzt. Der periphere Ausläufer hat einen variierenden, anfangs aber in der Regel radiär gerichteten Verlauf. Die ovalen Kerne der i. N.-Z. sind chromatinarm und bläschenförmig und haben eine wechselnde Lage zum Ependym, wie aus den Abb. 115—118 hervorgeht; ihre Längsachse ist parallel bis senkrecht zur Längsachse des Zellkörpers gerichtet. Der Nucleolus dieser Kerne ist scharf begrenzt und gewöhnlich (wenigstens relativ) etwas größer als beim Rinde, jedoch nicht so groß wie bei Carnivora und Insectivora. In den i. N.-Z. wurden, besonders bei den größeren Formen, deutliche Neurofibrillen gefunden, die besonders gut in der in Abb. 118 abgebildeten großen Zelle hervortreten. Diese Abbildung ist eine Rekonstruktion von Teilen der fraglichen Nervenzelle aus 2 aufeinanderfolgenden Schnitten. Die Zelle hat nur 2 Ausläufer.

Bemerkenswert ist der kräftige Neurit im Vergleich zu dem zart gebauten Dendriten. Nissl-Körnchen sind bei diesem Tiere in allen Größen der i. N.-Z. gefunden worden.

Cynocephalus babuin. (Hierzu Abb. 119, Tafel XVIII.) Das Ependym ist mittelhoch, stellenweise sehr hoch und besteht aus zylindrischen Zellen mit ovalen bis runden Kernen, die gewöhnlich in einer, nur ausnahmsweise in zwei bis mehreren Reihen liegen. Die i. N.-Z. kommen recht zahlreich vor. Ihr kernführender Abschnitt variiert sehr in seiner Lage. Er kann ganz intraependymal, aber auch verschieden weit vom Ependym entfernt liegen; in einem Falle maß dieser Abstand 60μ . Die fraglichen Zellen sind stets größer als Ependymzellen (die in Abb. 119 abgebildete Zelle zeigt einen mittelgroßen Typ), ihr Größenunterschied ist aber nicht bedeutend, so daß die größte Zelle nur wenig größer und die kleinste nur unbedeutend kleiner ist als die in Abb. 119 abgebildete Zelle. Es kommen bi- und multipolare Formen vor. Soviel aus meinem Material hervorgeht, sind die bipolaren Zellen in der Mehrzahl. Ihr zentral gerichteter Ausläufer erstreckt sich ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein und hat dort oft eine kleine Auftreibung an seinem freien Ende, es gibt aber auch solche ohne Auftreibung. Die peripher gerichteten Ausläufer haben variierenden Verlauf. Die Kerne der i. N.-Z. haben alle den typischen Charakter der Nervenzellkerne. Nissl-Körnchen und Neurofibrillen konnten nachgewiesen werden.

Macacus rhesus. (Hierzu Abb. 120, Tafel XVIII.) Das Ependym variiert in der Höhe. Gewöhnlich wird es von sehr hohen zylindrischen Zellen aufgebaut, deren oft langgestreckte und schmale Kerne in einer bis mehreren Reihen angeordnet sind. Die Chromatinstruktur der Kerne erinnert an die beim Rinde. Zwischen den Ependymzellen kommen hier und da verstreut i. N.-Z. vor, die weder selten noch besonders zahlreich sind und keine besondere Gruppierung, weder in der Längs- noch in der Querrichtung des Z.-K., erkennen lassen. Die gewöhnliche Lage der i. N.-Z. zeigt Abb. 120. Nur in Ausnahmefällen habe ich derartige Zellen etwas peripher vom Ependym gefunden. Ihren zentral gerichteten Ausläufer konnte ich in einigen Fällen bis in das Ependym, aber nie bis in das Lumen des Z.-K. verfolgen. Meines Erachtens müßte man jedoch in genügend dicken Schnitten diesen Ausläufer bis in das Lumen des Z.-K. verfolgen können. Nach meiner Erfahrung sind bei diesem Tiere die i. N.-Z. ohne Ausnahme bedeutend größer als Ependymzellen (Abb. 120 zeigt die größten und die kleinsten wahrgenommenen Formen). Aus der Abbildung geht also deutlich hervor, daß die i. N.-Z. nur unbedeutend in der Größe variieren. Bi- und tripolare Formen sind nachgewiesen. Der größere Teil des Zellkörpers liegt zentral vom Kern und geht hier in den zentral gerichteten Ausläufer über, der in der Regel kräftiger als die peripheren Ausläufer ist (eine Ausnahme hiervon zeigt Abb. 120 bei *c*) und meistens ohne Verdickung in Höhe der inneren Fläche des Ependyms endet. Die peripher gerichteten Ausläufer habe ich nicht nennenswert weit verfolgen können. Der Kern der i. N.-Z. ist bläschenförmig, chromatinarm und mit einem großen Nucleolus versehen. Seine Größe variiert bei gleichgroßem Zellkörper. Nissl-Körnchen kommen in allen nachgewiesenen Formen der i. N.-Z. vor. Diese Körnchen erscheinen entweder schwach blaugefärbt in rosagefärbtem Protoplasma (*a* und *c* in Abb. 120) oder intensiv blaugefärbt in hellem (ungefärb-

tem) Protoplasma. Obwohl die Ag-Imprägnation nicht gut gelungen ist, treten doch die Neurofibrillen etwas hervor. Subependymal gelegene Nervenzellen sind sehr spärlich, und ich kann nicht bestimmt sagen, ob unter ihnen sich amacrine Zellen finden oder nicht.

Cercopithecus mona. Dieses Tier zeigt hinsichtlich der i. N.-Z. mit *Macacus* recht übereinstimmende Verhältnisse. Ohne exakte Zählungen angestellt zu haben, habe ich doch das Gefühl, daß die ganz intraependymal liegenden Nervenzellen etwas spärlicher und die mit ihrem Zellkörper peripher vom Ependym liegenden Zellen etwas zahlreicher als bei *Macacus* vorkommen.

Homo sapiens. (Hierzu Abb. 121 u. 122, Tafel XVIII.) Zur Untersuchung diente das Rückenmark von Foeten von 25, 31 und 35 cm Scheitel-Steißlänge und einiger geborener Individuen. Bei allen Foeten habe ich im Rückenmark intraependymal liegenden Nervenzellen nachweisen können. Diese Zellen kommen ohne Zweifel bei dem 25 cm langen Embryo zahlreicher als bei dem 35 cm langen Embryo vor. Ja, bei dem letztgenannten Foetus sind sie sogar spärlich. Eine solche Zelle von dem 35 cm langen Foetus zeigt Abb. 121. Die meisten gefundenen Zelltypen dieser Art scheinen in recht jungen Entwicklungsstadien zu stehen. Ihr kernführender Abschnitt liegt gewöhnlich ganz intraependymal; die Kerne variieren zwar in der Lage, befinden sich aber in der Regel in Höhe der Kerne der am weitesten peripher gelegenen Ependymzellen. Andererseits habe ich aber auch mit ihrem kernführenden Abschnitt subependymal liegende Zellen dieser Art wahrgenommen. Die Größe der intraependymal liegenden Nervenzellen variiert nicht beträchtlich, die Zellen sind aber durchgängig größer als Ependymzellen. Bipolare und wenige multipolare Formen dieser Zellen sind nachgewiesen. Ihr zentral gerichteter Ausläufer konnte nur in einer geringen Zahl von Fällen bis zum Lumen des Z.-K. deutlich verfolgt werden. Wo mir das gelungen ist, scheint er in Höhe der inneren Fläche des Ependyms ohne deutliche Verdickung zu enden. Die Kerne der fraglichen Zellen sind groß, bläschenförmig, chromatinarm und mit einem gut begrenzten, aber nicht besonders großen Nucleolus versehen. Nissl-Körnchen sind in diesen Zellen nachgewiesen. Die Neurofibrillen-Imprägnation hat nicht besonders gute Ergebnisse geliefert, zeigt jedoch, daß die fraglichen Zellen auch Neurofibrillen haben. Ein Vergleich zwischen den Präparaten des jüngsten und des ältesten Embryo macht es wahrscheinlich, daß ein Teil der bei dem jungen Embryo relativ zahlreichen intraependymal gelegenen Zellen nervöser Art, von denen die meisten wahrscheinlich Neuroblasten sind (in den mit Toluidinblau gefärbten Präparaten ist es nicht immer leicht, Neuroblasten von wirklichen i. N.-Z. zu unterscheiden), peripher wandert. Nur ein Teil bleibt intraependymal liegen: sie sind die typischen i. N.-Z.

Vom Rückenmark eines 14 Jahre alten Knaben wurde eine große Anzahl Schnitte untersucht. In einer lückenlosen Serie von über 400 je 10μ dicken Schnitten, die mit Toluidinblau gefärbt sind, ist folgendes festgestellt worden. Das Material war gut konserviert. Dorsal und ventral liegen die Ependymzellen in dichter, mehrreihiger Anordnung, bilateral dagegen lockerer und erwecken dort den Eindruck, als ob sie in medialer Richtung wachsen. Die mikroskopischen Bilder erinnern an die Verhältnisse bei den Tieren, bei denen der Z.-K. im Begriff zu

verwachsen ist. Ventral ist das Ependym etwa 24μ und bilateral etwa 60μ hoch. In der genannten Schnittserie habe ich trotz genauester Durchmusterung nur 3 Zellen gefunden, die sich hinsichtlich ihrer Struktur von den gewöhnlichen Ependymzellen unterscheiden. Sie liegen sämtlich lateral im Ependym, aber nur eine von ihnen ist eine typische i. N.-Z. (s. Abb. 122 n). Diese Nervenzelle hat einen bläschenförmigen, chromatinarmen Kern, der mit einem großen Nucleolus versehen ist. Der größte Protoplasmateil des Zellkörpers liegt wie bei den typischen i. N.-Z. zentral vom Kern. Die Nervenzelle sendet 2 Ausläufer aus, von denen der zentral gerichtete gleichwie bei typischen i. N.-Z. der kräftigere ist. Es ist mir nicht gelungen, diesen Ausläufer bis zum Lumen des Z.-K. zu verfolgen, was bei der angewandten Färbemethode auch kaum zu erwarten war. Im Protoplasma des Zellkörpers liegen gut gefärbte Tigroidschollen. Die beiden anderen intraependymal gelegenen Zellen sind bedeutend größer (mehr als doppelt so groß) als die bei n in Abb. 122 wiedergegebene Nervenzelle. Sie haben große, bläschenförmige, chromatinarme Kerne, die einen außerordentlich kleinen Nucleolus haben. In ihrem Protoplasma finden sich Andeutungen von Tigroidschollen. Diese Schollen sind weder so intensiv gefärbt, noch so scharf begrenzt wie die in den peripher liegenden typischen Nervenzellen oder wie in der Zelle bei n in Abb. 122. Die Zellen zeigen keine Degenerationserscheinungen. Ihr morphologisches Verhalten deutet, soweit die mit Toluidinblau gefärbten Präparate es gestatten, auf ein Zwischenstadium zwischen Glia- und Nervenzellen hin.

Vom Rückenmark eines 30 Jahre alten Mannes wurde ein 16 cm langes Stück in Höhe der caudalen Thorakal- und kranialen Lumbalregion untersucht. Der Z.-K. war an den meisten Stellen völlig verwachsen, keine einzige Nervenzelle wurde in dem Zellstrang gefunden, der die Lage des Z.-K. andeutet. Auch nicht unmittelbar peripher von diesem Zellstrang konnte ich Nervenzellen nachweisen.

β) Die Entwicklung der intraependymalen Nervenzellen.

In der Keimschicht rund um den Z.-K. liegende junge Nervenzellen — Neuroblasten —, die mit einem zentral gerichteten Ausläufer das Lumen des Z.-K. erreichen, bildet *Held*³⁰⁾ ab bei einem 1 cm langen Schweinsembryo (Abb. 39 und 219) und bei einem jungen Embryo von *Lacerta agilis* mit noch offener Linsengrube (Abb. 142). *Helds* Abb. 115 gibt einen innerhalb des Ependyms liegenden bipolaren Neuroblasten von 16—19 Tage alten Embryonen von *Petromyzon Planeri* wieder. Dieser Neuroblast zeigt einen kräftigen zentral gerichteten Ausläufer, der nicht deutlich bis zum Lumen des Z.-K. verfolgt werden kann. Der peripher gerichtete Ausläufer desselben Neuroblasten ist nach *Held* eine motorische Nervenfaser, da sie zu einem Myotom in intime Beziehung tritt. Vergleiche ich *Helds* Abbildungen und Beschreibung mit den Verhältnissen, die meine Präparate zeigen, so läßt sich annehmen, daß sich alle die von *Held* abgebildeten Neuroblasten zu Nervenzellen entwickeln, die im vollentwickelten Rückenmark peripher vom Ependym liegen. Die Entwicklung der i. N.-Z. wird also durch die verdienstvollen Untersuchungen *Helds* nicht klargelegt, und, soweit mir bekannt, existieren auch in der einschlägigen Literatur keine exakten Angaben über die Entwicklung der fraglichen Nervenzellen. Von einigen Spekulationen sehe ich dabei ab.

Meine eigenen Untersuchungen umfassen eine sehr große Anzahl Embryonen und Foeten von *Bos taurus* und *Lepus cuniculus* und einzelne Exemplare von *Homo* (25, 31 und 35 cm Scheitel-Steißlänge), *Sus* (10 cm), *Alces* (75 cm), *Capra* (10 cm), *Dasypus* (8 cm), *Spinax* (6–12 cm), *Squalus* (18–22 cm) und *Ammocoetes* (2,5–16 cm). Die Resultate gründen sich auf Neurofibrillen-imprägnierten Präparaten der genannten Tiere.

Die beweiskräftigsten und vollständigsten Ergebnisse stammen von *Kaninchenembryonen*. Diese Spezies eignete sich für diese Untersuchungen ganz besonders auch deshalb, weil das erwachsene Tier, wie oben ausgeführt wurde, eine starke Anhäufung von i. N.-Z. ventral im Ependym des Z.-K. erkennen läßt. Man darf wohl deshalb a priori annehmen, daß auch beim Embryo eine größere Menge Bildungsmaterial dieser Zellen in der Keimschicht ventral im Z.-K. vorhanden ist.

Bei einem Kaninchenembryo von 12 mm Länge fanden sich bilateral im Z.-K. in der Keimschicht zahlreiche Neuroblasten. Sie lagen mit ihren kernführenden Zellabschnitten vorzugsweise zentral von den übrigen Zellkernen (s. Abb. 51). Alle diese Neuroblasten hatten recht große, bläschenförmige Kerne, und ihre peripheren Ausläufer, soweit sie bereits entwickelt waren, erschienen recht kräftig (s. Abb. 51). Diese Abbildung zeigt eine der größten Formen der so weit zentral gelegenen Neuroblasten dieses Embryo. Neuroblasten innerhalb des ventralen Ependymkeils konnten nicht nachgewiesen werden. Ebenso wenig konnte ich innerhalb der Keimschicht liegende junge Nervenzellen finden, bei denen der zentral gerichtete Ausläufer lang und kräftig war, und bei denen gleichzeitig der periphere Ausläufer fehlte oder schwach entwickelt war.

Das Rückenmark eines Kaninchenembryos von 13 mm Länge zeigte im Querschnitt das Bild, das in der schematischen Abb. 50 wiedergegeben ist. In der Keimschicht, rund um den Z.-K., finden sich zahlreiche Neuroblasten, besonders bei *a*. Diese Neuroblasten haben gewöhnlich die in der Abb. 54 angegebene Form und Lage. Einige derartige Neuroblasten kommen auch bilateral und ventral von *a* vor, allerdings nur in sehr geringer Menge. In Höhe des ventralen Ependymkeiles lagen zentral von den Kernen der Ependymzellen einige Zellen mit recht großem, bläschenförmigen Kern (s. Abb. 56). Diese Zellen erinnern stark an gewöhnliche Neuroblasten, unterscheiden sich aber von ihnen vor allem dadurch, daß ihr Protoplasma eine weniger argentophile Faserstruktur besitzt und ferner dadurch, daß sie trotz eines gut entwickelten zentral gerichteten Ausläufers nicht mehr als eine minimale Andeutung eines beginnenden, feinen peripheren Ausläufers aufweisen. Der zentral gerichtete Ausläufer endet in Höhe der inneren Fläche des ventralen Ependymkeils. Derartige Zellen wurden bei diesem Embryo lediglich in dem ventralen Ependymkeil und in seiner unmittelbaren Nähe gefunden. Auf Grund des relativ langen zentral gerichteten Ausläufers, den die fraglichen Zellen im ventralen Ependymkeil haben, halte ich es für wahrscheinlich, daß sich die früheste Anlage dieser Zellen bereits in einem noch früheren Entwicklungsstadium findet, trotzdem diese vermutete Anlage bei meinem Material aus diesem Stadium nicht deutlich festzustellen war. Ventral im Lumen des Z.-K. befand sich hier eine freie Zelle. Derartige freie Zellen kommen hier sehr selten vor.

Bei einem 16 mm langen Kaninchenembryo finden sich zahlreiche Neuroblasten in der Keimschicht des Z.-K. Eine besonders große Anzahl Neuroblasten habe ich in dem Gebiete, das der Zone *a* in Abb. 50 bei dem 13 mm langen Embryo entspricht, nicht feststellen können. In Höhe des ventralen Ependymkeils finden sich auch hier zahlreiche Anlagen der sog. intraependymalen Nervenzellen. Von diesen haben einige einen zentral gerichteten Ausläufer, der unbedeutend länger ist als bei dem 13 mm langen Embryo (Abb. 56); jedoch wurden bei dem 16 mm langen Embryo andererseits auch Zellformen gefunden, bei denen der zentral gerichtete Ausläufer kürzer ist als bei den Zellen, die Abb. 56 wiedergibt. Im übrigen unterscheiden sich die fraglichen Zellen von den typischen Neuroblasten in derselben Art, wie oben für den 13 mm langen Embryo angegeben wurde.

Ein 18 mm langer Kaninchenembryo besitzt in der ganzen Keimschicht des Z.-K. Neuroblasten. In dem ventralen Ependymkeil und bilateral in seiner unmittelbaren Nähe finden sich eine Anzahl Entwicklungsformen von i. N.-Z. Diese haben zumeist bedeutend längere zentral gerichtete Ausläufer als die vorher erwähnten Embryonen. Diese Ausläufer enden ohne Verdickung in Höhe der inneren Fläche der Keimschicht. Ein deutlicher peripher gerichteter Ausläufer ist bei diesen Anlagen der i. N.-Z. noch nicht entwickelt. Die Faserstruktur des Protoplasmas ist in diesen Zellen auch bei diesem Embryo weniger argentophil als in den typischen Neuroblasten.

Ein ähnliches Verhalten wie der letztgenannte Embryo hinsichtlich der Entwicklungsstadien der i. N.-Z. zeigen Kaninchenembryonen von 22, 25, 27 und 35 mm Länge.

Bei einem 38 mm langen Kaninchenembryo hatten einzelne Entwicklungsformen der i. N.-Z. eine kleine Verdickung am freien Ende des zentral gerichteten Ausläufers. Einige dieser Verdickungen ragten unbedeutend in das Lumen des Z.-K. hinein.

Sehr deutlich treten diese Verdickungen bei einem 42 mm langen Kaninchenembryo in Erscheinung, von dem Abb. 53 einen Ausschnitt aus dem ventralen Ependymkeil zeigt. Hier liegen ganz zentral 4 Entwicklungsformen von i. N.-Z. Diese haben sämtlich einen kräftig entwickelten zentral gerichteten Ausläufer, dessen freies Ende eine deutliche Verdickung aufweist. Diese Verdickung erstreckt sich, wie aus Abb. 52 und 53 hervorgeht, um so weiter in das Lumen des Z.-K. hinein, je kräftiger sie entwickelt ist. Der peripher gerichtete Ausläufer ist noch sehr wenig entwickelt. Ein Vergleich des Aussehens der peripheren Enden der i. N.-Z. im ventralen Ependymkeil zwischen dem 42 und dem 13 mm langen Embryo (Abb. 53 u. 56) scheint zu zeigen, daß die Kerne dieser Zellen bei dem größeren Embryo relativ größer sind und weiter peripher liegen, wodurch die argentophile Protoplasmazone seitlich und peripher vom Kern in diesen Zellen relativ kleiner ist als bei dem 13 mm langen Embryo. Andererseits hat bei dem 42 mm langen Embryo die argentophile Faserstruktur im Protoplasma der i. N.-Z. einen weniger dunklen Farbton als in typischen Neuroblasten und in peripher liegenden Nervenzellen (s. Abb. 52).

Bei 48, 56 und 67 mm langen Kaninchenembryonen unterscheiden sich die i. N.-Z. eigentlich nur durch ihre Größe von denen bei dem 42 mm langen Embryo.

Bei diesen größeren Embryonen sieht man auch einige Entwicklungsformen von i. N.-Z., die mehr dorsal im Ependym liegen. Bei einem 80 mm langen Kaninchenembryo und bei einem neugeborenen Kaninchen waren die peripheren Ausläufer recht deutlich entwickelt.

Aus Obengesagtem dürfte also hervorgehen, daß *die sog. i. N.-Z. beim Kaninchen Bildungen sui generis sind und mit intraependymal gelegenen Neuroblasten oder Entwicklungsformen der echten Nervenzellen nicht zu verwechseln sind*, die gewöhnlich parallel mit ihrer Entwicklung peripher wandern.

Bei frühen Entwicklungsstadien von *Rinderembryonen* ist es mir nicht gelungen, gute Imprägnationen in Entwicklungsformen von den in der Keimschicht des Z.-K. gelegenen i. N.-Z. und Neuroblasten zu erhalten. Nur bei etwa 3, 4, 5, 8 und 10 cm langen Rindsembryonen ist dies bei einzelnen Stücken des Rückenmarks geglückt. Bei diesen Embryonen (besonders bei dem 5 cm langen Embryo) kann man deutlich zwischen Entwicklungsstadien der i. N.-Z. und der eigentlichen Neuroblasten unterscheiden. Wie bei den Kaninchenembryonen haben hier die i. N.-Z. einen kräftig entwickelten zentral gerichteten Ausläufer und auf derselben Entwicklungsstufe einen kaum angedeuteten peripheren Ausläufer. Die argentophile Faserstruktur in diesen Zellen ist weniger imprägniert als in den Neuroblasten und den weiter peripher gelegenen Nervenzellen. Eine bestimmte Gruppierung der i. N.-Z. ist nicht so deutlich hervorgetreten wie bei Kaninchenembryonen. Doch scheinen die i. N.-Z. in der Keimschicht des Z.-K. ventral und bilateral in größerer Anzahl vorhanden zu sein als dorsal.

Die Abb. 55 zeigt eine Stelle in der Keimschicht ventral im Z.-K. von einem 10 cm langen Rindsembryo. Hier scheinen unter den Ependymzellen außer einigen Neuroblasten, die mit ihrem zentral gerichteten Ausläufer das Lumen des Z.-K. nicht erreichen, auch mehrere Entwicklungsformen der i. N.-Z. vorzukommen. Diese erstrecken sich bereits in diesem Stadium mit dem freien Ende ihres zentral gerichteten Ausläufers ein Stück in das Lumen des Z.-K. hinein. Das freie Ende der Ausläufer ist hier gleichmäßig dick. Wie aus Obengesagtem hervorgeht, ist das oft auch der Fall bei vollentwickelten Formen dieser Zellen. Der periphere Ausläufer der i. N.-Z. ist bei diesem Embryo nur angedeutet. Ich habe oben ausgeführt, daß es mir mit der Golgi-Chromsilbermethode gelungen ist, bei Rinderembryonen von 20–37 cm Scheitel-Steißlänge einige recht lange, aber äußerst feine periphere Ausläufer der i. N.-Z. nachzuweisen. In anderen Fällen derselben Embryonen dagegen waren die peripheren Ausläufer kurz, dick und reichlich verzweigt. Ein Teil von ihnen scheint sich innerhalb des Ependyms zu verzweigen. Die Zahl der peripheren Ausläufer einer und derselben Zelle variiert zwischen 1 und mehreren. Bei geborenen Tieren scheinen die peripheren Ausläufer der i. N.-Z. hinsichtlich Verzweigung, relativer Größe und Form mit denen der Embryonen von der zuletzt angegebenen Größe übereinzustimmen.

Mehrere Beobachtungen in meinen Präparaten sprechen übereinstimmend dafür, daß einige i. N.-Z. nicht nur während des fötalen Lebens, sondern auch in den ersten Wochen nach der Geburt des Tieres neugebildet werden. So zeigt z. B. das Mikrophotogramm in Abb. 57 von einem etwa 14 Tage alten Kalbe das Ependym um den Z.-K. mit 2 verschiedenen Entwicklungsstadien der

i. N.-Z. Bei *b* sehen wir eine derartige Keimzelle, die im Präparat einen kräftigen zentral gerichteten Ausläufer besitzt; dieser Ausläufer kann bis zum Lumen des Z.-K. verfolgt werden, wo er in Höhe der lumenseitigen Fläche des Ependyms endet. Der peripher gerichtete Ausläufer ist kaum angedeutet. Außerdem deutet auch die Lage des Kernes weit zentral im Ependym daraufhin, daß die Zelle sich in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Auch die Zelle *b*¹ (Abb. 57) ist eine Entwicklungsform einer i. N.-Z., jedoch etwas älter als *b*. Sie hat einen kräftigen zentral gerichteten Ausläufer, der in der lumenseitigen Fläche des Ependyms endet. Ein peripherer Ausläufer ist nur angedeutet. Bei einzelnen Embryonen von *Homo*, *Sus*, *Alces*, *Capra*, *Dasypus*, *Spinax* und *Squalus* wurden Entwicklungsformen der i. N.-Z. nachgewiesen, ohne daß das verhältnismäßig geringe Material dieser Tiere eine systematische Untersuchung dieser Zellen erlaubt hätte. Auch bei diesen Embryonen kann man in Neurofibrillen imprägnierten Präparaten die Entwicklungsformen der i. N.-Z. wegen ihres helleren Farbtons von echten Neuroblasten leicht unterscheiden.

Bei den untersuchten Exemplaren von *Ammocoetes* wurden im Ependym des Z.-K. zahlreiche Entwicklungsformen der i. N.-Z. wahrgenommen. Sehr frühe derartige Entwicklungsformen zeigen Abb. 11 und 13 bei *n bl.* Wie aus den Abbildungen hervorgeht, sind diese Zellen völlig rund. In der Zelle Abb. 13 liegt die Neurofibrillenanlage zentral vom Kern, in der entsprechenden Zelle Abb. 11 dagegen peripher von diesem. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die verschiedene Lage der Neurofibrillenanlage für die weitere Entwicklung der Zellen von Bedeutung ist. Die Zelle in Abb. 13 ist vielleicht ein Entwicklungsstadium einer i. N.-Z. und die in Abb. 11 ein Vorstadium einer peripher wandernden Nervenzelle. Aus den Abb. 9—16 und 18 geht deutlich hervor, daß die i. N.-Z. dieses Tieres zentral vom Kern bedeutend mehr Neurofibrillen haben als peripher von ihm. Einige Wahrnehmungen bei anderen Vertebraten und einzelne Präparate von *Ammocoetes* sprechen beinahe für ein umgekehrtes Verhalten bei den peripher wandernden Neuroblasten. Ich halte es demnach für wahrscheinlich, daß bereits dieses Lageverhältnis der Neurofibrillenanlage zum Kern die voraussichtliche Weiterentwicklung der Zelle zu einer i. N.-Z. oder zu einer peripher im Rückenmark gelegenen Nervenzelle andeuten kann. Da ich jedoch die Entwicklung der peripher im Rückenmark gelegenen Nervenzellen bei diesem Tiere nicht verfolgt habe, so kann ich kein abschließendes Urteil über diese Frage abgeben. Bei *Ammocoetes* und *Amphioxus* imprägnieren sich die Neurofibrillen der i. N.-Z. gleich intensiv wie die der peripher im Rückenmark gelegenen Nervenzellen. Man kann also bei diesen Tieren wie bei den übrigen Vertebraten die i. N.-Z. auf Grund eines in neurofibrillen-imprägnierten Präparaten hervortretenden helleren Farbtons von den Vorstadien der peripher wandernden Nervenzellen nicht unterscheiden.

C. Medulla oblongata.

α) Vorkommen und Morphologie der intraependymalen Nervelemente.

Ammocoetes besitzt zahlreiche i. N.-Z. ventral und bilateral im Ependym der Fossa rhomboidea. Diese Nervenzellen gehören zu den beiden Zellarten, die oben bereits im Ependym des Z.-K. bei diesem Tiere beschrieben wurden (s. Abb. 14).

Hier finden sich also teils große, multipolare Nervenzellen, die mit ihrer einen Seite zur Begrenzung des Ventriculus quartus (Rhombencephali) beitragen, ohne einen Ausläufer in diesen zu senden, teils die gewöhnlichen bipolaren i. N.-Z., die mit einem zentral gerichteten Ausläufer das Lumen erreichen und bisweilen etwas in dieses hineinragen. Diese letztgenannten Zellen (s. Abb. 123) sind bedeutend größer als die i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. desselben Tieres und besitzen kräftige periphere Ausläufer, die eine reiche Verzweigung zeigen. In gelungenen Golgi-Präparaten kann man diese Zweige sehr weit peripher in der Medulla oblongata verfolgen — sogar vielleicht bis zu ihrer Oberfläche (Meninx).

Bei *Petromyzon fluviatilis* verhalten sich die Nervenelemente im Ependym der Fossa rhomboidea genau wie bei *Ammocoetes*.

Raja batis, radiata und clavata. Bei diesen Tieren habe ich bisher keine so gelungenen Imprägnationen der Nervenelemente im Ependym der Fossa rhomboidea bekommen können wie bei *Squalus* (s. unten). Die erhaltenen Resultate kann ich infolgedessen nicht zu einer endgültigen Beschreibung benutzen. Sie zeigen nur, daß im Ependym der Fossa rhomboidea auch bei diesen Tieren im Prinzip ähnliche Nervenendigungen wie bei *Squalus* vorkommen können. So habe ich mehrere derartige Nervenendigungen nachweisen können, wie sie teils in Abb. 135, teils in Abb. 133 rechts wiedergegeben sind. Diese Nervenendigungen liegen sämtlich in Gegenden, die *v. m.* der Abb. 125 entsprechen. Meine Präparate machen es jedoch mehr als wahrscheinlich, daß besser gelungene Imprägnationen, als ich bei diesen Tieren bisher erhalten habe, mehrere Typen zum Vorschein bringen würden, ja vielleicht alle die Formen, die mir bei *Squalus* nachzuweisen gelang.

Squalus acanthias. (Hierzu Abb. 124—137, Tafel XIX—XXI.) Am kranialen Ende des Z.-K., wo dieser sich zu erweitern beginnt, um in die Fossa rhomboidea überzugehen, werden die i. N.-Z. spärlicher, und dasselbe gilt auch für das Ependym der Fossa rhomboidea. An diesen Stellen sind dagegen die intraependymal verlaufenden Nervenfasern, die man auch im Ependym des Z.-K. sehen konnte, bedeutend zahlreicher. Ein Teil von ihnen bildet hier sub- und intraependymal gelegene, eigentümliche Plexus, von denen auf eigenartige Weise endigende Nervenfasern abgehen*). Ich gebe nunmehr eine kurze Beschreibung von einigen Abbildungen dieser Nervenendigungen.

Abb. 130 zeigt eine Stelle ventrolateral im Ependym der Fossa rhomboidea (bei *v. m.* in Abb. 126). Die hier abgebildeten Nerven und Nervenendigungen liegen in verschiedenen Ebenen eines 20 μ dicken Schnittes. Man sieht hier u. a. einige intraependymal verlaufende Nervenfasern, die in schalenförmigen Bildungen endigen. Von diesen Endplatten gehen ein bis mehrere Nervenfasern ab, die man oft bis zu anderen derartigen Bildungen verfolgen kann. Hierdurch entstehen teilweise veritable Netzbildungen der intraependymalen Nervenfasern. An den Verzweigungsstellen dieser Netzwerke liegen bisweilen schalenförmige Neurofibrillenplatten (s. Abb. 127, 128, 130—132). Diese Endplatten liegen anderseits in der Regel an den freien Enden von mehr oder weniger langen Nervenfasern. Gemein-

*) Eine eingehendere Beschreibung dieser Nervenendigungen bei *Squalus* veröffentliche ich in *Acta zoologica* 1922 (Stockholm, Albert Bonniers Verlag) unter dem Titel „Einige wahrscheinlich bisher unbekannte, teils im Ependym gelegene, teils in der Fossa rhomboidea hineinragende Nervenendigungen“.

sam für die Nervenendigungen von diesem Typ ist ihre Lage in der Wandung von Hohlräumen, die in einer und derselben Ebene oft rund aussehen. Bei der Einstellung in verschiedenen Ebenen sieht man jedoch, daß diese Hohlräume mehr oder weniger ausgedehnt sind und Kanäle bilden. In mehreren Fällen — an 3 Stellen des der Abb. 130 zugrunde liegenden Präparates — ist es mir gelungen, einen solchen Kanal bis in das Lumen des Z.-K. oder der Fossa rhomboidea zu verfolgen.

Wie aus Abb. 127 hervorgeht, begegnen sich 3 Nervenfasern intraependymal in einer plattenförmigen Neurofibrillenausbreitung. Diese Platte liegt, dem Präparat nach zu urteilen, nicht in der Wand eines Kanals oder eines anderen Hohlraums. Die eine Nervenfaser setzt sich gegen das Lumen der Fossa rhomboidea fort und endigt mit einer unregelmäßigen oder klumpenförmigen Auftreibung ihrer neurofibrillären Masse, die zum größeren Teil frei im Lumen der Fossa rhomboidea liegt.

Abb. 132 zeigt eine intraependymal gelegene, besonders dicke Nervenfaser, von der ein feiner Zweig in der Richtung zur Fossa rhomboidea abgeht. Etwas weiter zentral bildet diese feine Nervenfaser eine plattenförmige Auflockerung ihrer neurofibrillären Masse. Von dieser Platte gehen in zentraler Richtung 2 feine Nervenfasern ab. Die eine geht in einen innerhalb eines $10\ \mu$ dicken Schnittes gelegenen eiförmigen Endapparat über. Diese Nervenendigung, die durch eine direkte Fortsetzung der Nervenfaser gebildet wird, ragt mit ihrer Spitze etwas in die Fossa rhomboidea hinein. Soviel aus dem der Abb. 132 zugrunde liegenden relativ dünnen Schnitt hervorgeht, liegt diese Nervenplatte nicht in der Wand eines Kanals oder einer Ausbuchtung der Fossa rhomboidea. Die fragliche Nervenendigung liegt wie die vorhergehende in Höhe der visceral-motorischen Region (Abb. 125 u. 126 *v. m.*).

Die in Abb. 131 abgebildeten Nerven und Nervenendigungen liegen in verschiedenen Ebenen eines $20\ \mu$ dicken Schnittes. Hier finden sich Nervenendigungen von den in den vorhergehenden Abbildungen wiedergegebenen Typen. Vom Lumen der Fossa rhomboidea gehen bei *a* und *b* 2 Recessus in peripherer Richtung ab, die an ihrem Ende sich auf ein kurzes Stück gabeln. Am Grunde des Recessus sieht man bei *a* eine Nervenplatte von der Form einer tiefen Schale, von deren Fundusteil 2 Nervenfasern abgehen; von diesen verläuft die eine nach links und die andere nach rechts. Am Grunde der doppelten Ausbuchtung bei *b* finden sich ebenfalls derartige Nervenendigungen, die durch eine Nervenfaserverbindung miteinander verbunden sind. Besonders bemerkenswert scheint mir zu sein, daß durch das Lumen des Recessus bei *b* eine spiralförmig gedrehte Nervenfaser verläuft. Diese Nervenfaser hat während ihres Verlaufes durch das Lumen des Recessus 2 plattenförmige Auftreibungen und bildet in der Fossa rhomboidea einen umgekehrt kegelförmigen Endapparat, der im Präparat teilweise von koaguliertem Ventrikelinhalt umgeben ist. Ohne Frage ist diese weit in das Lumen des 4. Ventrikels gelangte freie Nervenendigung sehr interessant. Diese Nervenendigungen haben in der Fossa rhomboidea eine entsprechende Lage wie die eben beschriebenen — liegen also in der Region *v. m.* Abb. 125 u. 126.

Abb. 129 zeigt ein Mikrophotogramm einer Nervenendigung, die der eben beschriebenen annähernd ähnlich ist. Diese Nervenendigung liegt im Ependym

an der Grenze zwischen der visceral-motorischen (*v. m.* Abb. 125) und der visceral-sensiblen (*v. s.* Abb. 125) Region der Fossa rhomboidea.

Außer einigen schräg und tangential verlaufenden intraependymalen Nervenfasern findet sich in dem der Abb. 128 zugrunde liegenden Präparat ein Nervenfasern, der unter Spiralwindung zwischen den Ependymzellen bis in die Fossa rhomboidea verläuft. Dieser Nervenfasern hat in Höhe der Kerne der Ependymzellen eine plattenförmige Auffaserung, von der 2 feine Nervenfasern in Richtung des 4. Ventrikels abgehen. Die linke Nervenfasern ist abgeschnitten, während die rechte sich in das Lumen fortsetzt, wo sie in ein birnförmiges Endorgan übergeht. Ob dieser Endapparat nur eine Auflockerung der Nervenfasern ist oder ob es sich um seine sekundäre Bildung handelt, die sich um die Nervenfasern gelegt hat, ist in diesem Präparat nicht leicht mit Sicherheit zu entscheiden. Der Endapparat ist blaßrosa gefärbt und zeigt stellenweise deutliche Faserstruktur. Wegen einer unmittelbar vor dem Übergang der Nervenfasern in den Endapparat vorhandenen scharfen Biegung der Nervenfasern ist es in diesem Falle nicht möglich gewesen zu entscheiden, ob die Nervenfasern sich nur in den Endapparat hinein fortsetzt oder ihn bildet. Für die letztere Ansicht sprechen mehrere Wahrnehmungen bei anderen ähnlichen, blaßrosa gefärbten Nervenendigungen dieser Gegend. Ich habe in mehreren Fällen mit Sicherheit nachweisen können, daß intensiv schwarz imprägnierte Nervenfasern, wenn sie sich zu Endapparaten auflockern, ihre dunkle Imprägnation anscheinend verlieren und blasse Rosafärbung annehmen. Mehrere Wahrnehmungen in Hämatoxylin- bzw. Eisenalaun-Hämatoxylinpräparaten bestätigen weiterhin diese Verhältnisse und geben — soweit ich darüber Erfahrungen besitze — keine Stütze für die Ansicht, die man aus Abb. 128 gewinnen kann, nämlich, daß Nervenfasern in Endkörper übergehen sollten, die einen anderen Ursprung als aus der zuführenden Nervenfasern haben. In den fraglichen Endapparaten (Abb. 128) finden sich 2 intensiv imprägnierte Bildungen, von denen die im zentralen Ende des Endkörpers gelegene Faserform hat, während die andere punktförmig ist. Soweit ich es feststellen konnte, sind diese Bildungen lokale Anhäufungen von Neurofibrillen des Endapparats. Auch diese Nervenendigung liegt in der visceral-motorischen Region.

Die nächstfolgende Abb. 134 zeigt 3 Nervenendigungen. Von diesen sind die beiden seitlich gelegenen Neurofibrillenplatten, die am Boden oder an Ausbuchtungen von Kanälen liegen. Von diesen Kanälen kommuniziert der rechte im Schnitt mit der Fossa rhomboidea. Die mittlere Nervenendigung zeigt eine tellerförmige Ausbreitung und endet frei in dem Hohlraum, der wahrscheinlich in benachbarten Schnitten mit dem 4. Ventrikel kommuniziert. Diese tellerförmige Nervenendigung hat an ihrer zentral gewandten Fläche 2 Schichten, eine kranzförmige und eine kuppelförmige, die beide verschieden stark imprägniert sind. Ob diese Bildungen neurofibrillärer Art sind, habe ich nicht mit Sicherheit entscheiden können.

Ein Übersichtsbild in geringerer Vergrößerung gibt Abb. 137. Hier sieht man nicht weniger als 6 Nervenendigungen, die in verschiedenen Ebenen eines und desselben 20μ dicken Schnittes liegen. Das in dieser Abbildung gezeichnete Gebiet umfaßt nur einen Teil des im Gesichtsfelde liegenden Ependyms und liegt dorsolateral vom Calamus scriptorius — dicht kranial von der in Abb. 124 wieder-

gegebenen Stelle der Medulla oblongata. Von den Nervenendigungen, die Abb. 137 zeigt, liegen 2 von plattenähnlichem Aussehen innerhalb des Ependyms, während die übrigen 4 mehr oder weniger weit in das Lumen der Fossa rhomboidea hineinragen. Die innerhalb des Ependyms gelegenen Nervenendigungen liegen im Präparat nicht an den Zellkernen, wie aus der Abbildung scheinbar hervorgeht, sondern zwischen den Ependymzellen — soweit es überhaupt möglich ist, ihre genaue Lage in den Ag-imprägnierten Präparaten mit Sicherheit zu entscheiden. Es ist nicht ausgeschlossen, daß diese Nervenendigungen im Wachstum gegen das Lumen der Fossa rhomboidea begriffen sind, denn Ausbuchtungen der Fossa rhomboidea, die sich bis zu diesen Nervenendigungen erstrecken, habe ich nicht nachweisen können. Von den in das Lumen des 4. Ventrikels hineinragenden Nervenendigungen hat die am weitesten links gelegene eine Form, die an eine sich eben öffnende Blütenknospe erinnert, während die nach rechts sich anschließende Galläpfelform hat. Von den am weitesten rechts gelegenen Nervenendigungen hat die eine Eiform, während die andere einen am freien Ende etwas verdickten Faden darstellt.

Abb. 133 zeigt außer einigen intraependymal liegenden Nervenfasern 2 Nervenendigungen. Von diesen gehört die rechte zu dem bereits oben beschrieben und in Abb. 130 abgebildeten Typ, ist also eine Neurofibrillenplatte, die am Boden einer mit der Fossa rhomboidea kommunizierenden Kaverne liegt. Die in der Abbildung links gelegene Nervenendigung besteht, soweit es mir möglich war, Genaueres zu entscheiden, aus einer intracellulären Ausbreitung von Neurofibrillen des zuführenden Nervenfadens. Diese Neurofibrillenbildung liegt direkt peripher vom Kern einer Zelle und hat die in der Abbildung wiedergegebene Form. Diese Wahrnehmung läßt also vermuten, daß es im Ependym auch Neuroepithelzellen gibt. Diese mächtige Nervenende als eine sekretorische Nervenendigung zu bezeichnen, scheint mir dagegen sehr gewagt zu sein. Meine Vermutung, daß sich im Ependym auch Neuroepithelzellen oder sekundäre Sinneszellen finden, wird außer anderen Wahrnehmungen auch durch das Präparat bestätigt, das der Abb. 136 zugrunde liegt. Man sieht hier eine Zelle, deren Kern den eigentümlichen Charakter einer Nervenzelle nicht aufweist. In dem gegen die Fossa rhomboidea gerichteten Ausläufer habe ich Neurofibrillen nicht feststellen können. An der Basis der Zelle endigt dagegen unter trichterförmiger Ausbreitung ein mächtiger Nervenfaden. Da zudem das fragliche Präparat außerordentlich distinkt imprägniert ist, scheinen mir Fehlbeobachtungen ausgeschlossen zu sein.

Chimaera monstrosa. Aus denselben Gründen wie bei Raja ist es mir auch bei diesem Tiere nicht gelungen, mehr als eine geringe Anzahl Nervenendigungen im Ependym der Fossa rhomboidea nachzuweisen. Diese Nervenendigungen erinnern etwas an diejenigen, die Abb. 133 und 135 wiedergeben. Auch diese Nervenendigungen liegen in den Gegenden, die v. m. Abb. 125 entsprechen.

Salmo trutta fario. In Toluidinblaupräparaten treten bei diesem Tiere bilateral in der Fossa rhomboidea zahlreiche Zellen hervor, die an i. N.-Z. erinnern. Völlig gelungene Neurofibrillen-Imprägnationen dieser wahrscheinlich intraependymalen Nervelemente habe ich nicht erhalten können. Die Resultate ergaben jedoch sowohl einige schalenförmige Nervenendigungen am Boden intraependymaler Krypten, als auch einige Nervenendigungen, die an die der Abb. 135

erinnern und ventrolateral im Ependym der Fossa rhomboidea liegen. Nach meinen Erfahrungen dürften diese Nervenendigungen auch bei durchaus gelungenen Neurofibrillen-Imprägnationen nur spärlich in Präparaten dieser Regionen hervortreten.

Osmerus eperlanus. (Hierzu Abb. 138 u. 139, Tafel XXI.) Bei diesem Tiere habe ich mit der Golgi-Chromsilbermethode eine große Anzahl Nerven Elemente bilateral im Ependym der Fossa rhomboidea nachgewiesen. Außer spärlichen i. N.-Z. kommen Nervenendigungen von prinzipiell demselben Typ vor wie oben bei *Squalus acanthias* beschrieben wurden, d. h. sie sind teils schalenförmige Nervenendigungen am Boden intraependymaler Krypten, teils freie Nervenendigungen, die mehr oder weniger weit in das Lumen der Fossa rhomboidea oder einer ihrer Ausbuchtungen hineinragen.

Die Abb. 139 zeigt lateral im Ependym der Fossa rhomboidea 3 i. N.-Z. und eine schalenförmige Nervenendigung. Der zentral gerichtete Ausläufer der i. N.-Z. oben und unten in der Abbildung endet am Boden intraependymaler Krypten, während das freie Ende des zentral gerichteten Ausläufers der mittleren Zelle eine plattenförmige Ausbreitung in Höhe der inneren Fläche des Ependyms bildet. Diese letztere Bildung erinnert ja ohne Frage an die Nervenendigungen links in Abb. 135, während die Endigungen der i. N.-Z., deren zentral gerichteter Ausläufer am Boden intraependymaler Krypten endet, in gewisser Beziehung an die schalenförmigen Nervenendigungen erinnert. Diese Verhältnisse könnten vermuten lassen, daß die Unterschiede zwischen i. N.-Z. und den fraglichen Nervenendigungen nicht so groß wären. Sind die letzteren Bildungen vielleicht nur die zentral gerichteten Ausläufer von i. N.-Z., die während der Entwicklung vom Ependym aus peripher gewandert sind? Meine Erfahrungen hinsichtlich Färbung, Verzweigung, Plexusbildungen usw. der fraglichen Nervenfasern und Nervenendigungen (Abb. 127—137) weisen jedoch daraufhin, daß man diese Bildungen scharf von den i. N.-Z. trennen muß.

Die eigentümliche Bildung, die Abb. 138 zeigt, ist eine der größten unter mehreren ähnlichen Bildungen, die im Lumen der Fossa rhomboidea bei *Osmerus* angetroffen worden sind. Wie aus der Abbildung hervorgeht, liegt intraependymal ein kräftiger Faden, der eine in das Lumen der Fossa rhomboidea hineinragende Anschwellung besitzt. Von dieser Anschwellung setzt sich ein feiner, aber immerhin noch dicker Faden gegen die Mitte des Lumens fort, wo er in caudaler Richtung umbiegt. Dieser Faden verläuft dann unter wiederholten Windungen und Teilungen caudal. Die letzte Teilung läßt 2 Fäden entstehen, die in birnförmige Endapparate übergehen. Die Form der Windungen und Teilungen der Fäden und die Form der Endapparate scheinen mir für Bildungen nervöser Natur zu sprechen. Wahrscheinlich müssen die hier abgebildeten und andere ähnliche Bildungen zu der Gruppe von freien Nervenendigungen in der Fossa rhomboidea gerechnet werden, die oben bei *Squalus* beschrieben wurde.

Alburnus alburnus zeigt hinsichtlich der Nerven Elemente im Ependym der Fossa rhomboidea ähnliche Verhältnisse wie *Osmerus*.

Merlucius merlucius. Hier konnte ich in einigen Fällen die Ausläufer von großen, etwas peripher vom Ependym gelegenen Nervenzellen (mit einem Durchmesser von etwa $21 \times 27 \mu$) zwischen den Ependymzellen bis zum Lumen des

Ventriculus quartus (ventrolateral in der Fossa rhomboidea) mit Sicherheit verfolgen. Von Nervenendigungen der Art, die oben bei *Squalus* beschrieben wurde, konnten bei diesem Tier in den nicht besonders gelungenen Neurofibrillen-imprägnierten Präparaten nur Andeutungen nachgewiesen werden.

Gadus pollachius. Bei diesem Tiere fand ich bilateral im Ependym der Fossa rhomboidea einzelne i. N.-Z., einige schalenförmige Nervenendigungen, die am Boden intraependymaler Krypten lagen, und freie Nervenendigungen, die mehr oder weniger weit in das Lumen der Fossa rhomboidea hineinragten.

Gadus luscus besitzt im Ependym der Fossa rhomboidea eine Anzahl i. N.-Z. Dagegen konnte ich weder schalenförmige noch freie Nervenendigungen nachweisen. Dies schließt natürlich nicht die Möglichkeit aus, daß auch bei diesem Tiere Nervenendigungen der fraglichen Art vorkommen.

Pleuronectes limanda hat zahlreiche Nervenendigungen bilateral im Ependym der Fossa rhomboidea. Unter diesen finden sich nur wenige schalenförmige, die am Boden intraependymaler Krypten liegen. Die meisten von ihnen gehören zu den sog. freien Nervenendigungen, die teils in Höhe der inneren Fläche des Ependyms liegen, teils etwas in das Lumen hineinragen.

Anarrhichas lupus hat einige i. N.-Z. und bilateral im Ependym der Fossa rhomboidea spärliche schalenförmige und freie Nervenendigungen.

Lacerta vivipara hat in meinen Präparaten bilateral und ventral im Ependym der Fossa rhomboidea eine Anzahl Nervenendigungen, die an der inneren Fläche des Ependyms liegen, und einige schalenförmige Nervenendigungen am Boden intraependymaler Krypten.

Regulus regulus hat am vorderen Ende des Z.-K. bzw. dicht caudal vom Calamus scriptorius eine Anzahl Nervenendigungen im Ependym, von denen einige an die erinnern, die in Abb. 131 für *Squalus* abgebildet sind. In Höhe der Fossa rhomboidea ist es mir nicht gelungen, derartige Nervenendigungen nachzuweisen — wahrscheinlich ist dies auf weniger gelungene Imprägnationen zurückzuführen.

Parus major hat, nach meinen Präparaten zu urteilen, sehr spärliche Nervenendigungen im Ependym der Fossa rhomboidea; nur einige wenige Nervenendigungen wurden ventrolateral nachgewiesen, die annähernd denen ähneln, die rechts in Abb. 135 abgebildet sind. Nur eine einzige am Boden einer intraependymalen Krypte gelegene Nervenendigung konnte festgestellt werden. Bei diesem Tiere findet sich an einigen Stellen ventral im freien Lumen — also zentral vom Ependym — eine Anzahl Bündel nackter Nervenfasern. Diese verlaufen longitudinal und nur auf kurze Strecken zentral vom Ependym; darnach treten sie in die Tiefe und verlaufen subependymal. Derartige frei im Lumen der Fossa rhomboidea verlaufende Nervenfasern sind oft zu Bündeln von Fasern verschiedener Dicke vereinigt.

Ähnliche eigentümliche Verhältnisse fand *Marburg*^{61a}) beim Menschen. Er schreibt hierüber u. a.: „Es findet sich also vom obersten Cervicalmark bis in die Hypoglossusgegend in vorliegendem Falle ein Fasersystem, das z. T. in der Substantia gelatinosa, z. T. aber anscheinend im Z.-K. selbst gelegen ist, Fasciculus substantiae gelatinosae centralis et Fasciculus canalis centralis, wie sie nach ihrer Lage genannt seien.“

Nach meinen Präparaten von *Parus major* besteht für mich nicht der geringste Zweifel, daß die fraglichen Nervenfasern frei im Lumen der Fossa rhomboidea liegen, denn meine Präparate hiervon sind so distinkt und schön, wie man es sich nur irgend wünschen kann. Über die Bedeutung der fraglichen Bildungen möchte ich mich zur Zeit noch nicht aussprechen.

Corvus cornix hat ventrolateral im Ependym der Fossa rhomboidea zahlreiche Nervenfasern. Außerdem kommen vereinzelt einige am Dache des Ventrikels vor. Von diesen Nervenfäden geht eine geringe Zahl in schalenförmige Bildungen über, die am Boden intraependymaler Krypten liegen und stark an die in Abb. 133 rechts abgebildeten erinnern. Die meisten Nervenendigungen dagegen sind fadenförmig und haben eine allmählich auftretende, unbedeutende Auftreibung. Sie erinnern stark an die am weitesten rechts in Abb. 137 liegende Nervenendigung. Diese Nervenendigungen liegen teils ganz intraependymal, teils ragen sie ein Stück in das Lumen der Fossa rhomboidea hinein.

Sorex minutus. Das Material von diesem Tiere wurde mit Hämatoxylin gefärbt. Bereits diese Färbung läßt eine Anzahl im Ependym der Fossa rhomboidea gelegener i. N.-Z. hervortreten.

Lepus cuniculus hat weit ventrolateral im Ependym der Fossa rhomboidea in der Nähe der Taenia ventriculi quarti eine Anzahl zumeist subependymal gelegener feiner Nervenfasern, die mehrere Plexus bilden. Einige derartige Plexus liegen ganz intraependymal. Von ihnen gehen feine Nervenfasern ab, die zwischen den Ependymzellen verlaufen und annähernd wie die in Abb. 133 rechts abgebildeten Nervenfasern enden. Die meisten Nervenfasern enden indessen mit kleinen, knopfförmigen Auftreibungen; diese liegen entweder zwischen den Ependymzellen oder in Höhe der inneren Fläche des Ependyms oder erstrecken sich ein Stück in das Lumen des 4. Ventrikels hinein. Die Verhältnisse der Nervenendigungen bei *Lepus* erinnern demnach stark an die von *Squalus*. Die am meisten hervortretenden Besonderheiten sind die kleinen Dimensionen der fraglichen Nervelemente bei *Lepus*.

Bos taurus (ausgetragener Foetus). Bilateral und ventral im Ependym der Fossa rhomboidea wurden einige Nervenendigungen von ähnlichem Typ wie bei *Squalus* wahrgenommen. Die schalenförmigen Nervenendigungen am Boden intraependymaler Krypten sind sehr spärlich. Die freiliegenden Nervenendigungen tragen an ihrem freien Ende gewöhnlich in die Länge gezogene oder abgerundete kleine Verdickungen. Diese Nervenfasern mit Endbildungen haben wie bei *Lepus* relativ kleine Dimensionen.

Rangifer tarandus. Bei diesem Tiere wurden im Gebiet der Ala cinerea, besonders in der Nähe der Taenia ventriculi quarti, subependymal gelegene Nervenplexus nachgewiesen, von denen zahlreiche Nervenfasern in das Ependym eintreten und vorzugsweise mit kleinen Verdickungen enden; diese liegen entweder in Höhe der inneren Fläche des Ependyms oder erstrecken sich ein Stück in das Lumen der Fossa rhomboidea hinein. Nur einige wenige Nervenendigungen am Boden intraependymaler Krypten konnten nachgewiesen werden.

D. Über den sogenannten Reissnerschen Faden.

Um mir eine Auffassung von der Bedeutung und der Aufgabe der intrapendymalen Nervenzellen und anderer Nervenbildungen im Ependym verschaffen zu können, erschien es mir notwendig, u. a. auch den sog. *Reissnerschen Faden**) zu untersuchen.

Mit R.-F. ist der von *Reissner* zuerst beschriebene Faden gemeint, der den Z.-K. durchzieht. Spätere Forscher haben festgestellt, daß der Faden am Tectum opticum beginnt, den Aquaeductus Sylvii, die Fossa rhomboidea und den Canalis centralis durchzieht und an dessen caudalem Ende endigt. In der Literatur finden sich Angaben, daß der R.-F. im Bindegewebe caudal vom Z.-K. endigen soll. Dieser Faden ist seit seiner Entdeckung Gegenstand zahlreicher, mehr oder weniger vollständiger Untersuchungen gewesen, ohne daß man heute sagen könnte, daß Vorkommen, Morphologie, Entwicklung und Bedeutung des R.-F. hinreichend klargelegt ist.

a) Literaturübersicht.

1860 beschrieb *Reissner*⁷²⁾ bei *Petromyzon fluviatilis* „einen Strang, der große Ähnlichkeit mit einem Achsenzylinder besitzt“. 5 Jahre später wurde diese Wahrnehmung von *Kutschin*⁵⁹⁾ und *Owsiannikow* — *Kutschin* nannte diese Bildung „*Reissnerschen Faden*“ — bestätigt. Im Jahre 1868 fand *Stieda*⁸⁷⁾ die entsprechende Bildung im Z.-K. einiger Knochenfische. *Stieda* kommt zu der Auffassung, daß der R.-F. ein Produkt des bei der Fixierung koagulierten Inhalts des Z.-K. ist. *Sanders* berichtet 1878⁷⁸⁾, 1886⁷⁷⁾ und 1894⁷⁸⁾ u. a. von einigen interessanten Wahrnehmungen über den R.-F. bei Teleostei, Plagiostomata und *Myxine glutinosa*. *Sargent* gibt 1886 an, daß er den R.-F. bei Plagiostomata nicht gefunden hat. *Studnicka*, 1899⁸⁰⁾, der den R.-F. bei mehreren Vertebraten nachgewiesen hat, gibt an, daß der R.-F. ein Sekretionsprodukt ist. Er schreibt über den R.-F. u. a.: „Er entsteht in dem Z.-K. etwa so, wie ein Kristallstiel in dem Magendivertikel der Lamellibranchiaten.“ Diese Auffassung beruht jedoch nicht auf direkten embryologischen Untersuchungen. *Studnicka* gibt ferner an, daß der Faden im postfötalen Leben entstehen soll. Im Jahre 1900 bringt *Sargent*⁷⁹⁾ einige Beweise dafür, daß der R.-F. eine präformierte Bildung ist. Er hat den R.-F. in gut fixiertem Material von allen Wirbeltierklassen gefunden. Er ändert jedoch seine Beschreibung durch ein Postscriptum, in dem er geltend macht, daß der R.-F. nicht, wie *Studnicka* meint, ein Sekretionsprodukt ist, „but a nervous structure.“ Im nächstfolgenden Jahre bringt *Sargent*⁸⁰⁾ eine vorläufige Mitteilung, der 1904⁸¹⁾ eine vollständigere Abhandlung folgt. Hier berichtet er über phylo- und ontogenetische Untersuchungen des R.-F. und seiner Funktion. Unter den Tieren, die einen besonders deutlichen R.-F. haben, hebt er *Squalus acanthias* hervor. Die Entwicklung des R.-F. sollte nach *Sargent* mit der einer Nervenfasern völlig analog sein. Über die Funktion sagt *Sargent*, daß der R.-F. zu einem optischen Reflexapparat gehört. *Kolmer* 1905⁵⁵⁾ stimmt *Studnicka* und *Ruzicka* zu, daß der R.-F. ein Sekretionsprodukt ist. *Wolff* (1907)¹⁰¹⁾ gibt S. 226 an, daß der R.-F. auch bei *Amphioxus* vorkommt. *Ayers*⁸⁾

*) Dieser Faden wird im folgenden durch R.-F. abgekürzt.

weist 1908 daraufhin, daß der R.-F. sich auch in den Hirnventrikeln von Myxine und Bdellostoma vorkommt. *Horsley* (1908)⁴¹⁾, der den R.-F. bei einem lebenden *Macacus* durchschnitten hat, hat durch eine genügend lange Zeit nach der Operation erfolgende morphologische Untersuchung gefunden, daß der R.-F. nicht wie eine gewöhnliche Nervenfasern degeneriert, denn irgendwelche Degenerationserscheinungen konnten nicht festgestellt werden. *Dendy* (1909)¹⁷⁾ meint, „that *Reissners fibre* and the subcommissural organ („Ependymal-Groove“) may form part of an apparatus for regulating flexure of the body“. *Dendy* und *Nicholls* (1910)¹⁸⁾ haben Maus, Katze und Schimpanse auf das subcommissurale Organ hin untersucht, das sie als mit dem R.-F. in funktionellem Zusammenhang stehend ansehen. Unter „Subcommissuralorgan“ wird die Epithel- (Ependym-) Bekleidung verstanden, die unter der Commissura posterior liegt. Hinsichtlich des R.-F. schreiben sie u. a.: „Moreover, one of us (*Nicholls*) has been able recently to demonstrate beyond question that at its posterior end (in the lamprey and various teleosts) the fibre is not connected with ‚canal cells‘ in the canalis centralis of the spinal cord, as maintained by *Sargent*, but is connected through a terminal foramen in the neural tube with the surrounding connective tissue.“ 1912 beschreibt *Nicholls*⁶⁷⁾ experimentelle Untersuchungen über die Funktion des R.-F. Hierbei gibt er an, daß er experimentell Beweise für die Richtigkeit der Theorie von *Dendy* (1909) hat erbringen können. Die Experimente bestanden darin, daß *N.* bei lebenden Rochen den R.-F. in der Nähe seines hinteren Endes abschnitt. Hierbei reagierten die Tiere auf bestimmte Weise, und zwar u. a. durch Dorsalbeugung des Schwanzes. Über die Entwicklung des R.-F. schreibt *Nicholls*: „It appears to arise in embryonic or larval life as a number of long, extremely fine, cilia-like processes which grow out from the cells of the subcommissural organ and unite in the iter to form a single thread.“ *Nicholls* glaubt also, daß das Wachstum des R.-F. in caudaler Richtung durch Anlagerung zahlreicher, cilienähnlicher Fortsätze von Ependymzellen des Z.-K. zustande kommen soll. Durch das Wachstum der Cilien in Spiralen sollen die spiraligen Windungen entstehen, die man gelegentlich am R.-F. beobachten kann. *Nicholls* gibt ferner an, daß der R.-F. auch bei stärkster Vergrößerung strukturlos zu sein scheine. *Tretjakoff*⁹⁹⁾ schreibt 1913, daß der R.-F. konstant bei *Petromyzon* vorkommt. Im Jahre 1917 schreibt *Studnicka*⁹⁶⁾ u. a.: „Es gibt schließlich, wie ich an anderer Stelle zeigte, auch umfangreiche, extracelluläre Gebilde und Strukturen, die man nicht anders als wieder mit dem Begriffe des extracellulären Protoplasmas deuten kann, Gebilde z. B., an deren Bildung sich ganze Gruppen von Zellen beteiligen, und die man in Anbetracht ihrer Genese, komplizierten Struktur, oft auch ihrer Funktion, nicht für passive Zellprodukte halten kann, wie es die bisherige Histologie tat. Die manchmal äußerst feine Strukturen enthaltenden ‚Otosomen‘ der Gehörorgane bzw. statischer Organe, verschiedene Glaskörper und Linsen der Evertebratenaugen, der R.-F. der Wirbeltiere*) usw., sind dieser Art; gewiß gehören auch manche pathologischen Gebilde und Gewebe hierher.“ *Jordan*⁴⁰⁾ hat Teleostier hauptsächlich hinsichtlich Entwicklung und Funktion des R.-F. untersucht. *Jordan* schließt seine Abhandlung, die den Eindruck einer vorläufigen Mitteilung macht, mit etwa folgenden Worten: „It seems to

*) Von mir kursiviert.

me that evidence which I have thus far secured points toward the conclusion that *Reissners* fibre is ependymal in origin and that it plays no important part in the reactions of the fish.“ *Jordan*, der die Operation *Nicholls* wiederholt, hat vollständig ähnliche Reaktionen erhalten, auch wenn die Schnitte bei der Operation weder die *Medulla spinalis* noch den R.-F. trafen, und er ist der Meinung, daß der R.-F. weder direkt (*Sargent*) noch indirekt (*Dendy* und *Nicholls*) als Nervenapparat fungiert.

*Kappers*⁵³⁾ schreibt 1920 über den R.-F. bei *Cyclostomata*: „Es handelt sich dabei um ein nicht nervöses Gebilde, dem wir meines Erachtens auch keine sekundäre Rolle in dem Reizleitungssystem jener Tiere zuschreiben dürfen.“ Über die Theorien von *Dendy* und *Nicholls* betreffend Funktion des R.-F. schreibt *Kappers* u. a.: „Diese Deutung ist vorläufig unkontrollierbar.“

Meine eigenen Untersuchungen beabsichtigen, die Färbbarkeit, das Vorkommen, die Struktur, die Entwicklung, das Wachstum und die Bedeutung des R.-F. zu studieren.

b) Über das Vorkommen, die Färbbarkeit und die Morphologie des Reissnerischen Fadens.

Es wurde bereits erwähnt, daß die Annahme *Stiedas* u. a., der R.-F. sei nicht eine präformierte Bildung, sondern ein durch Koagulation des Inhalts des Z.-K. infolge der Fixierung entstandenes Produkt, durch die Untersuchungen mehrerer der oben angeführten Forscher widerlegt ist. Die Resultate meiner Untersuchungen bestätigen durchaus die Auffassung, daß der R.-F. eine präexistierende Bildung ist.

Da in mehreren Arbeiten über den R.-F. dessen kraniale und caudale Befestigung eingehend beschrieben ist, habe ich nur bei wenigen Tierarten diese Angelegenheit nachgeprüft. Bei diesen Tieren habe ich die Wahrnehmungen der zitierten Forscher insoweit voll bestätigen können, als der R.-F. am *Tectum opticum* beginnt und sich in caudaler Richtung bis zum caudalen Ende des *Ventriculus terminalis* fortsetzt. Ob der R.-F. sich hier befestigt, und in diesem Falle, wie er sich befestigt, ist nicht Gegenstand eingehenderer Untersuchungen von mir gewesen. Daß der R.-F. indessen Verbindungen mit dem *Tectum opticum* eingeht, darauf deuten meine Längsschnittserien des *Encephalon* mehrerer Vertebraten durchgehends hin. Die caudale Anheftung dagegen scheint mir nicht so sicher zu sein.

In der Literatur findet man oft hervorgehoben, daß der R.-F. keine Affinität zu einer bestimmten Farbe habe. Das trifft jedoch nach meinen Erfahrungen nicht zu. Im allgemeinen erhielt ich intensive Färbungen mit Toluidinblau, ja, der R.-F. zeigte zu dieser Farbe sogar größere Affinität als ein gewöhnlicher Nervenfaden. Auch mit Neurofibrillen-Imprägnationen erhielt ich mitunter in diesem Faden kräftige Färbungen. Die Abb. 159 gibt ein Beispiel einer Ag-Imprägnation des R.-F. beim Pferde. Hier zeigt dieser indessen einen besonderen Farbton, indem sein zentraler Teil gelb gefärbt und sein peripherer Teil heller, beinahe ungefärbt ist. Wenn der R.-F. bei Ag-Imprägnationen überhaupt imprägniert ist, so erscheint er gewöhnlich kohlschwarz, jedenfalls dunkler als eine gewöhnliche Nervenfasern in demselben Präparat. Obwohl diese beiden

Reaktionen in gewisser Beziehung für den nervösen Charakter des R.-F. sprechen, so beweisen sie doch tatsächlich noch nichts für diese Annahme. Es sprechen nämlich, wie unten näher ausgeführt wird, mehrere Faktoren gegen eine solche Annahme. Auch mit *Ehrlichs* Hämatoxylin und Eosin oder mit *M. Heidenhains* Eisenalaun-Hämatoxylin und Eosin tritt der R.-F. deutlich hervor. Auch bei Anwendung von Eisenalaun-Hämatoxylin und Eosin läßt der R.-F. bei Säugetieren nicht selten einen dunkleren (dichteren) zentralen und einen helleren peripheren Teil erkennen (s. Abb. 161 vom Rinde). Er zeigt also hier ein Verhalten, das an das durch Ag-Imprägnation des Rückenmarks vom Pferde erhaltene erinnert (s. oben).

Mit Hilfe der erwähnten Färbemethoden ist es mir gelungen, bei den meisten untersuchten Tierarten, von denen gut fixiertes Material vorhanden war und genaue Untersuchungen in dieser Richtung angestellt wurden, mit voller Sicherheit den R.-F. nachzuweisen. Es kann aber gelegentlich vorkommen, daß der R.-F. bei der Schnittbehandlung ausfällt. Man muß daher bei Tieren, bei denen man bisher den R.-F. im Z.-K. nicht nachweisen konnte, zur Entscheidung der Frage, ob der R.-F. vorhanden ist oder nicht, sich der Celloidin-Einbettung bedienen. Man bettet zu diesem Zwecke ein längeres Stück des Rückenmarks in Celloidin ein und fertigt dann vom mittleren Teil dieses Präparates Längsschnitte an. Oft genügt es aber auch, in Paraffin eingebettete Stücke vom Rückenmark in Längsschnitte zu zerlegen, um positive Resultate zu erhalten, auch in Fällen, bei denen der R.-F. auf Querschnitten nicht gefunden worden war.

Nach *Wolff*¹⁰¹⁾ (S. 226) ist der R.-F. beim *Lanzettfische* vorhanden. Mir ist es jedoch nie gelungen, je auch nur eine Spur des R.-F. bei *Amphioxus* nachzuweisen, trotzdem mehrere lückenlose Längs- und Querschnittserien von sehr gut fixierten Lanzettfischen verschiedener Größe genau untersucht worden waren. Es ist zwar Tatsache, daß man im Querschnitt vom Lanzettfisch im Z.-K. fadenähnliche Bildungen finden kann, die auf den ersten Eindruck an einen R.-F. erinnern; werden diese Bildungen aber näher geprüft, so findet man hier nicht die scharfen Konturen und den festen Bau, die der R.-F. aufweist, und kann leicht genug diese Fadenbildungen auf koagulierten Inhalt des Z.-K., also auf Sekret zurückführen. Ein Durchmustern von Längsschnittserien dieser Regionen bestätigt völlig die fraglichen Verhältnisse. Zieht man weiter in Betracht, daß *Wolff*, wie oben erwähnt wurde, mit schlecht (in Formalin) fixiertem Material gearbeitet hat, so hat man Grund zu der Annahme, daß die Angaben *Wolffs* nicht mit den wirklichen Verhältnissen übereinstimmen.

Bei *Cyclostomata* kommt der R.-F. konstant vor, auch bei den kleinsten der untersuchten Formen von *Ammocoetes*. Eine Struktur des Fadens war in meinem Material von diesem Tiere nie zu erkennen. Der R.-F. war gewöhnlich gleichmäßig dick und zeigte die in der Tabelle (s. unten) angegebenen Durchmesser.

Von den *Elasmobranchii* konnte ich mit Ausnahme von *Hexanchus* den R.-F. bei allen untersuchten Arten nachweisen. Das Material des letztgenannten Tieres war jedoch nicht von bester Beschaffenheit, andererseits hatte ich aber nicht die Möglichkeit, anderes Material für genauere Untersuchungen zu erhalten.

Der sehr weite Z.-K., den Hexanchus besitzt (s. die Tabelle), bietet sehr wohl die Möglichkeit, den R.-F. ausfallen zu lassen. Man muß deshalb mit diesem Material besonders vorsichtig umgehen, um negative Ergebnisse als Beweise für das Nichtvorhandensein des R.-F. bei diesem Tier anführen zu können. Die Dicke des R.-F. bei den verschiedenen Knorpelfischen geht aus der Tabelle hervor, die weiter auch angibt, daß der Faden bei einem und demselben Tier an Mächtigkeit an verschiedenen Stellen variieren kann. Die größten Schwankungen zeigte *Raja radiata*, bei der der R.-F. an einigen Stellen doppelt so großen Durchmesser wie an anderen Stellen zeigte. Der R.-F. ist bei den Knochenfischen in der Regel strukturlos; ausnahmsweise konnte indessen gelegentlich eine gewisse Struktur nachgewiesen werden. So war z. B. der R.-F. in einigen Präparaten von *Chimaera* von einer homogenen Hülle umgeben, innerhalb derer eine grobfaserige Struktur zu erkennen war. In Ag-imprägnierten Präparaten von *Squalus* ließ der R.-F. in einigen Fällen eine dunklere Hülle und einen ungefärbten zentralen Teil erkennen. Aus der Tabelle geht hervor, daß der R.-F. auf Querschnitten nicht immer kreisrund ist, sondern daß der Horizontaldurchmesser gelegentlich größer oder kleiner als der Vertikaldurchmesser ist.

Bei Teleostomi konnte mit einer einzigen Ausnahme der R.-F. nachgewiesen werden. Die Ausnahme bildet der *Goldfisch*, der wahrscheinlich aber ebenfalls einen R.-F. besitzt, obgleich dieser in meinen Präparaten nicht vorhanden war. Den dicksten R.-F. fand ich bei *Lucioperca* und *Acipenser*, während *Gobius flavescens* und *Cyclotone* die dünnsten Fäden aufwiesen. Gewöhnlich ist der R.-F. auf Querschnitten kreisrund und in ganzer Länge gleichmäßig dick. Ausnahmen kommen jedoch vor (s. Tabelle). Eine konstant wiederkehrende Struktur des R.-F. habe ich nicht feststellen können. Ab und zu sieht man aber eine Doppelkonturierung — sie tritt ein besonders bei Färbung mit Eisenalaun-Hämatoxylin, gelegentlich aber auch bei gewöhnlicher Hämatoxylinfärbung, bei *Bielschowsky*-Imprägnation oder bei geeignet abgepaßter Differenzierung nach Färbung mit Toluidinblau. Auch eine Faserstruktur — gleichdicke Fasern verlaufen parallel nebeneinander — wurde im R.-F. mitunter, besonders bei Embryonen und jugendlichen Tieren, wahrgenommen. Die Faserstruktur ist in der Regel am deutlichsten im kranialen Teil des Fadens, dicht bevor er in die Fasern sich auflöst, die am Tectum opticum sich anheften. *Hippoglossoides platessoides* besaß, wie oben bereits erwähnt wurde, im Lumen des Z.-K. große Ganglienzellen. Der R.-F. verlief allem Anscheine nach an diesen Zellen vorbei, ohne mit ihnen in Verbindung zu treten.

Bei allen untersuchten Amphibien ist der R.-F. vorhanden. Er ist hier sehr dünn und gleichmäßig dick. Die genauen Maße gehen aus der Tabelle hervor. Wie die Tabelle ferner zeigt, ist der R.-F. in der Regel rund, nur bei *Bufo bufo* war Bandform angedeutet. Struktur konnte bei diesem Material nicht nachgewiesen werden.

Auch bei sämtlichen untersuchten Reptilien wurde der R.-F. nachgewiesen. Wie aus der Tabelle hervorgeht, ist er am dicksten bei *Testudo* und am dünnsten bei *Anguis*. Auch bei *Chrysemys*, *Emys* und *Alligator* ist der R.-F. verhältnismäßig dick. Eine Struktur des R.-F. habe ich in diesem Material nicht nachweisen können.

Bei den meisten untersuchten Vögeln konnte der R.-F. bereits in Querschnitten nachgewiesen werden. Er fehlte jedoch anscheinend in Querschnitten von *Columba*, *Dryobates*, *Parus*, *Emberiza*, *Passer montanus* und *Linota*. Da ich keinen Anlaß zu der Vermutung hatte, daß der R.-F. bei diesen Tieren wirklich fehlt, so wurden keine besonderen Untersuchungen, z. B. Längsschnitte des Rückenmarks durch den Z.-K., ausgeführt, um das Vorkommen des R.-F. festzustellen. Wie aus der Tabelle (s. unten) hervorgeht, ist der R.-F. bei Vögeln im allgemeinen recht dünn; er kann zwar auch bei ihnen an verschiedenen Stellen eines und desselben Tieres an Dicke variieren — bei Vorhandensein einer Faserstruktur zeigt er gewöhnlich auch größeren Querdurchmesser — in der Regel aber ist er gleichmäßig dick und strukturlos. Bei den 3 letztgenannten Tieren war der Z.-K. teilweise verwachsen, und es ist nicht ausgeschlossen, daß der R.-F. bei diesen Tieren wirklich fehlte — daß eine Tatsache also vorliegt, die bei anderen Vertebraten mit verwachsenem Z.-K., bei denen eingehende Untersuchungen ausgeführt worden sind, die Regel ist.

Von den untersuchten Säugetieren konnte der R.-F. *nicht* nachgewiesen werden bei *Ornithorhynchus*, *Erinaceus*, *Sorex*, *Talpa*, *Vespertilio*, *Synotis*, *Vesperugo*, *Lutra* (6,5 cm langer Embryo), *Alces*, *Dama* und *Homo*. Die Ursache hierfür ist wahrscheinlich, was das Schnabeltier, den Elch und Damhirsch betrifft, in weniger guter Beschaffenheit des Materials zu suchen. Bei *Erinaceus* wurde im Material von bester Beschaffenheit im Z.-K. ein Faden nachgewiesen, der aber weder besondere Affinität zu Toluidinblau zeigte, noch die Form eines R.-F. erkennen ließ. Er war zwar durchgehends homogen, zeigte aber in Längsschnitten variierende Dicke, die kaum die Annahme zuläßt, diese Bildung sei ein Kunstprodukt, weil der Faden gleichzeitig auch sehr scharfe Konturen erkennen ließ. Da ich indessen den Faden nicht in seiner ganzen Ausdehnung verfolgt habe, vor allem auch seine Anheftung am Tectum opticum nicht festgestellt habe, dürfte es nicht berechtigt sein, ihn wegen der wahrgenommenen Besonderheiten mit dem R.-F. zu analogisieren.

Durch neuerdings ausgeführte Kontrolluntersuchungen an zwei kürzlich gefangenen Exemplaren von *Erinaceus*, bei denen das zentrale Nervensystem in *Zenkerscher* Lösung fixiert wurde, wurde ich erneut in der Auffassung bestärkt, daß der R.-F. bei diesem Tiere fehlt. Das zentrale Nervensystem vom Tectum opticum an bis zum Ventriculus terminalis war Gegenstand eingehendster systematischer Untersuchung, ohne daß auch nur eine Spur vom R.-F. wahrgenommen werden konnte. [Dagegen wurden zahlreiche i. N.-Z. nachgewiesen. Auch in dem dünnen Dach des weiten Ventriculus terminalis (Abb 141) konnten große, intraependymal liegende Ganglienzellen nachgewiesen werden (s. Abb. 141 bis 143). Das mikroskopische Bild dieser Zellen erinnert sehr an das von Nervenzellen in Spinalganglien. Sie waren sämtlich bipolar, und es ist wahrscheinlich, daß es sich hier um Spinalganglienzellen handelt, die in ihren normalen peripheren Wanderungen aufgehalten worden sind. Wahrscheinlich ist das ein Beweis dafür, daß auch bei den Säugetieren die sogenannten *Rohon-Beardschen* Zellen vorhanden sind, die, wie man früher glaubte, nur bei Anamniern vorkommen sollten (s. auch *Schaffer*³²) S. 258 u. 277). Bemerkenswert ist ja auch die Kürze

des Rückenmarks bei *Erinaceus*, das schon in Höhe des 3. oder 4. Brustwirbels endet (auch *Dubson*²¹).]

Bei *Sorex minutus* (nur ein Exemplar konnte untersucht werden) fehlte der Z.-K. Er ist sicher bereits in einem sehr frühen Stadium verwachsen, vielleicht schon im embryonalen Leben. Es fand sich nämlich nicht die geringste Andeutung einer späten Verwachsung, z. B. in Form von Zellsträngen oder Zellanhäufungen, die man ja bei *Homo* und einigen anderen Vertebraten findet, bei denen der Z.-K. spät verwächst. Wahrnehmungen über das vollkommene Fehlen des Z.-K. bei erwachsenen Exemplaren von Cetaceen wurden bereits im Jahre 1885 von *Guldberg*²⁸) gemacht und 1903 von *Rawitz*⁷¹) bestätigt. Einen Literaturhinweis über das Fehlen des Z.-K. bei *Sorex* habe ich nicht finden können, weder bei den angeführten Autoren noch bei *Biach*⁸), der später den Z.-K. der Säugetiere — jedoch mit Ausnahme von *Sorex* — untersucht hat. In meinem Material von *Sorex* war auch das Ventrikelsystem des Gehirns schwach entwickelt. Die Fossa rhomboidea begann erst in der vorderen Hälfte (Drittel) der Medulla oblongata. Weder hier noch im *Aquaeductus Sylvii* konnte der R.-F. nachgewiesen werden. Da das Material außerordentlich gut fixiert war, dürfte dieses Resultat das Fehlen des R.-F. bei diesem Tiere beweisen.

In gut fixiertem Material von *Talpa* und von einigen untersuchten Formen von *Chiroptera* ist es mir nicht gelungen, im Z.-K. den R.-F. nachzuweisen. Da ich jedoch die Fossa rhomboidea und den *Aquaeductus Sylvii* auf ihren Inhalt hin nicht untersucht habe, lasse ich die Frage nach dem Vorkommen des R.-F. bei diesen Tieren unbeantwortet.

Bei den übrigen untersuchten Säugetieren, bei denen der R.-F. nachgewiesen worden ist, variierte diese Bildung bei den einzelnen Arten sehr an Mächtigkeit. Am dicksten war der Faden bei *Equus*, *Bos* und *Bison* und am dünnsten bei *Sciurus* und *Mus*. Beim erwachsenen *Pferde* war der R.-F. rund (mit einem Durchmesser von $18\ \mu$) und zeigte sowohl in Neurofibrillen-impregnierten als auch in den mit Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbten Präparaten von mehreren Tieren oft eine Doppelkonturierung (s. Abb. 159). Bei einem 6 Monate alten Fohlen war der R.-F. (die ganze Pars cervicalis wurde untersucht) außerordentlich dick, der Durchmesser des runden Fadens schwankte zwischen 30 und $40\ \mu$. Die Mächtigkeit des R.-F. beruhte in diesem Falle darauf, daß der Faden aus einer großen Anzahl während des ganzen Verlaufes gleichmäßig dicker und im übrigen gleichdicker Fasern bestand, die parallel nebeneinander angeordnet waren (siehe Abb. 160). Auch bei erwachsenen *Kaninchen* wurde eine derartige Auffaserung des R.-F. wahrgenommen. Der Durchmesser des R.-F. betrug in diesem Falle $24\ \mu$. Diese Struktur des R.-F. (neben der Struktur, die der Faden in einigen Fällen bei einzelnen Knorpel- und Knochenfischen und bei einigen Präparaten von Vögeln gezeigt hat) zusammen mit seinem Verhalten am kranialen Ende, wo er sich in mehrere, an verschiedenen Stellen des Tectum opticum sich anheftende Fäden teilt, gibt einen gewissen Einblick in den Bau des R.-F. Dieses Verhalten scheint auf die Zusammensetzung des R.-F. aus einzelnen Fäden hinzudeuten, die bis zum caudalen Ende des Z.-K. sich fortsetzen und normaliter so dicht aneinander liegen und so homogen sind, daß Grenzen zwischen ihnen in der Regel auch bei stärkster Vergrößerung nicht wahrgenommen werden können. Jedoch habe ich

mitunter bei Anwendung von stärkster Vergrößerung und intensiver Beleuchtung in Querschnitten des R.-F. eine Struktur aus dicken Fasern feststellen können, während der R.-F. bei schwächerer Vergrößerung homogen erschien. Die oben erwähnte Doppelkonturierung, die der R.-F. bei einigen erwachsenen Pferden zeigte, wurde auch in mehreren Präparaten von einigen anderen Tieren nachgewiesen. So z. B. zeigt Abb. 161 einen deutlich doppelkonturierten R.-F. bei einem etwa 16 Jahre alten *Rinde*. Überhaupt habe ich bei Rindern verschiedenen Alters und auch bei Rinderembryonen gute derartige Bilder des R.-F. erhalten. Am besten tritt diese Doppelkonturierung bei Lackfärbung mit *M. Heidenhains* Eisenalaun-Hämatoxylin hervor.

e) Über die Entwicklung des Reissnerschen Fadens.

Es wurden bereits oben die Ansichten früherer Forscher über die Entwicklung des R.-F. erwähnt, und aus dem Gesagten geht hervor, daß diese Ansichten sehr weit auseinandergehen; die einen sprechen von einem Kunstprodukt, andere von einer in die Länge wachsenden Cilie oder einem Zellausläufer, die dritten von der Entwicklung eines Nervenfadens. Schon diese Andeutungen zeigen deutlich, daß die Lösung des Problems von der Entwicklung des R.-F. zu den schwierigeren Kapiteln der Embryologie gehört. Ohne behaupten zu wollen, mit meinem Beiträge dieses Problem endgültig lösen zu können, möchte ich doch in möglichster Kürze von den erlangten Ergebnissen auf Grund eines recht reichen Materials berichten.

Dieses Material besteht aus Sagittal- und Querschnittserien von 11 Embryonen von *Squalus acanthias* (8–20 mm lang), 8 Embryonen und einigen geborenen Tieren von *Mus musculus var. albus* (mit einer Nacken-Steißlänge von 12–33 mm), 5 Embryonen von *Lepus cuniculus* (4,2–5,7 cm) und von 38 Embryonen von *Bos taurus* (10–58 cm lang).

Für dieses Material erwies sich als geeignetes Fixierungsmittel *Zenkersche* und *Flemmingsche* Lösung, während Formalinfixierung sich als ungeeignet herausstellte. Bei größeren Embryonen wurde das zentrale Nervensystem nach der Freilegung fixiert. Bei der Fixierung des Encephalon wurden nur die Teile genommen, die den 3. und 4. Gehirnventrikel und den Aqueductus Sylvii umgeben.

Squalus acanthias, 8 mm langer Embryo, Querschnitte. Im Lumen des Z.-K. wurden vereinzelte Zellen in weiten Abständen voneinander nachgewiesen. Von diesen Zellen gehen äußerst feine Fasern ab. Bis zu den Hirnventrikeln konnten diese Fasern nicht verfolgt werden, ebenso konnte ein entwickelter R.-F. nicht wahrgenommen werden.

Squalus acanthias, 8 mm langer Embryo, Sagittalschnitte. Im Lumen des Z.-K. kommen spärliche Zellen vor. Einige von ihnen senden Ausläufer in der Längsrichtung des Z.-K. Ein entwickelter R.-F. konnte nicht wahrgenommen werden.

Squalus acanthias, zwei 12 mm lange Embryonen, Querschnitte. Im Lumen des Z.-K. fand sich ein äußerst feiner (etwa $0,1 \mu$ dicker) R.-F., der jedoch nicht bis zu den Hirnventrikeln verfolgt werden konnte. Eigentümlicherweise hatte der R.-F. stets dieselbe Lage, und zwar etwa an der Grenze zwischen erstem und

zweitem ventralen Fünftel des Lumens des Z.-K. Bei genauer Prüfung des Fadens (mit stärkster Vergrößerung und geeigneter Beleuchtung) findet man, daß er in regelmäßigen Abständen kleine Verdickungen besitzt. Im Lumen des Z.-K. wurden nur Zelltrümmer, keine vitalen Zellen gefunden.

Squalus acanthias, 12,5 mm langer Embryo, Sagittalschnitt. Der R.-F. ist angelegt und mißt im Durchmesser etwa $0,15\ \mu$. Längs des R.-F. kommen spärlich einige Zellen vor, die sich etwas reichlicher im caudalen Abschnitt finden. Auch Zellen mit Kernzerfall sind vorhanden. Bei genauer Prüfung findet man bei diesem Embryo deutlicher als bei dem vorhergehenden kleine, knotenförmige Verdickungen längs des R.-F. Diese Knotenbildungen liegen zwar in variierendem Abstand voneinander, jedoch nicht näher als der Querdurchmesser des Z.-K. beträgt. Löst man diese knotenförmigen Verdickungen im Mikroskop genügend auf, so kann man von ihnen einen feinen Faden bis zu ventral im Ependym liegenden Zellen verfolgen. Diese Verbindungsfäden erklären die fixe Lage des R.-F. ventral im Lumen des Z.-K., und es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie für die Entwicklung des R.-F. von Bedeutung sind.

Squalus acanthias, 15 mm langer Embryo, Querschnitte. Der R.-F. ist angelegt und mißt etwa $0,3\ \mu$ im Querdurchmesser. Auch hier liegt der R.-F. gut fixiert ventral im Lumen des Z.-K. Zellen im Lumen des Z.-K. konnten nicht nachgewiesen werden.

Squalus acanthias, 16,5 mm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. ist angelegt, hat einen Durchmesser von etwa $0,2\ \mu$ und liegt wie bei dem 12,5 mm langen Embryo an Ausläufern von Zellen, die ventral im Ependym des Z.-K. gelegen sind. Auch hier konnte ich den R.-F. nicht bis zum Dache des 3. Ventrikels verfolgen. Freie Zellen konnten im Lumen des Z.-K. nicht nachgewiesen werden.

Squalus acanthias, 17 mm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. verhält sich im wesentlichen wie bei dem 16,5 mm langen Embryo. Freie Zellen konnten im Lumen des Z.-K. nicht nachgewiesen werden.

Squalus acanthias, 17,5 mm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. verhält sich wie bei dem 17 mm langen Embryo. Einige Zellreste, zerfallene Kerne und derartiges liegen im Lumen des Z.-K.

Squalus acanthias, 18 mm langer Embryo, Querschnitte. Der R.-F. hat einen Durchmesser von etwa $0,4\ \mu$ und verhält sich im übrigen wie bei dem 17,5 mm langen Embryo.

Squalus acanthias, 20 mm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. hat einen Durchmesser von etwa $0,5\ \mu$ und auch hier eine ähnliche Lage und Fixierung ventral im Z.-K. wie bei den vorher erwähnten Embryonen. Er konnte ein Stück in den 4. Ventrikel hinein verfolgt werden, wo er sich wegen seiner Lage in einer Sekretanhäufung der weiteren Beobachtung entzog.

Mus musculus var. albus. 12 mm langer Embryo, Querschnitte. Der R.-F. fehlt, einige freie Zellen sind jedoch im Lumen des Z.-K. vorhanden. Die meisten von ihnen liegen an dem Ependym, das die Wand des Z.-K. bildet.

Mus musculus var. albus, 15 mm langer Embryo, Querschnitte. Der R.-F. fehlt. Zellen von derselben Art wie bei dem vorhergehenden Embryo, die bei diesem wandständig lagen, liegen hier in einer Reihe mitten im Lumen des Z.-K.

Mus musculus var. *albus*, 18 mm langer Embryo, Querschnitte. Der R.-F. ist angelegt und hat einen Durchmesser von etwa $0,3\ \mu$. Einzelne Zellen liegen verstreut längs dieses Fadens, von ihnen sind einige in Degeneration begriffen.

Mus musculus var. *albus*, 20 mm langer Embryo, Querschnitte. Der R.-F. hat einen Durchmesser von etwa $0,5\ \mu$. Zellen oder Zellreste konnte ich im Lumen des Z.-K. nicht nachweisen.

Mus musculus var. *albus*, 4 geborene Individuen, davon 2 neugeboren, eines $5\frac{1}{2}$, eines $7\frac{1}{2}$ Tage alt, 25, 29, 31 und 33 mm lang, Sagittal- und Querschnitte. Bei allen war der R.-F. entwickelt und hatte einen Durchmesser von $0,5-1\ \mu$. Vitale Zellen konnte ich im Lumen des Z.-K. nicht nachweisen, dagegen wurden einige Zerfallsprodukte von Zellen gefunden.

Lepus cuniculus, 4,2 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Spärliche Zellen liegen längs der Ependymauskleidung des Z.-K. Einige von ihnen sind im Begriff, sich von einer intimeren Verbindung mit dem Ependym zu lösen. Der R.-F. ist noch nicht angelegt.

Lepus cuniculus, 4,4 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Längs der Ependymauskleidung des Z.-K. liegen sehr viele Zellen; von ihnen nähern sich einige der Mitte des Lumens des Z.-K. *An diesen freien Zellen wurden einige Mitosen nachgewiesen.* Die Anlage eines R.-F. ist nicht wahrzunehmen.

Lepus cuniculus, 4,6 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Mehrere Zellen liegen zentral im Lumen des Z.-K., andere am Ependym. Bei näherer Prüfung findet man alle Übergangsstadien zwischen solchen Zellen, die fast noch zentral im Ependym liegen, und solchen, die bereits frei im Lumen des Z.-K. liegen. Das zeigt also, daß wenigstens ein Teil der fraglichen Zellen sich aus dem inneren Teil der Keimschicht rund um den Z.-K. entwickelt. Der R.-F. ist noch nicht angelegt.

Lepus cuniculus, 5,7 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. ist noch nicht angelegt. Die öfters erwähnten freien Zellen bilden hier eine kontinuierliche Reihe zentral im Lumen des Z.-K.

Lepus cuniculus, 7 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. ist angelegt. Einzelne Zellen liegen längs an ihm. Im Lumen des Z.-K. wurden Reste von zerfallenen Zellen gefunden.

Bos taurus (hierzu Abb. 140, 144—158; Tafel XX—XXIII), zwei 10 cm lange Embryonen, Sagittalschnitte. Das Lumen des Z.-K. ist stellenweise mit Sekret beinahe angefüllt. Einige Zellen haben sich von den zentralen Teilen des Ependyms gelöst und liegen an dessen innerer Fläche. Bei einem anderen 10 cm langen Embryo deuten meine Präparate auf eine ähnliche Auswanderung von Zellen vom Tectum opticum aus hin. Der R.-F. ist noch nicht angelegt.

Bos taurus, 10,5 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. ist noch nicht angelegt. Im Lumen des Z.-K. finden sich Sekret und spärliche Zellen.

Bos taurus, 11 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. ist nicht angelegt. Einzelne Zellen liegen im Lumen des Z.-K. an der inneren Fläche des Ependyms.

Bos taurus, 12,5 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. ist nicht angelegt. Im Lumen des Z.-K. findet sich Sekret; eingewanderte Zellen konnte ich dagegen nicht nachweisen.

Bos taurus, drei 15 cm lange Embryonen, Sagittalschnitte. Bei 2 Embryonen finden sich außer Sekret einige freie Zellen längs der Wand des Z.-K. Bei dem dritten Embryo wurden außer Sekret und einigen freien Zellen auch andere Bildungen wahrgenommen, die in hämatoxylingefärbten Präparaten oft als Scheiben mit einer dunkelgefärbten, breiten peripheren Zone und einem helleren zentralen Gebiet hervortreten. Die dunkle periphere Zone zeigt nicht selten radiäre Segmentierung. Diese Bildungen sind um ein Vielfaches größer, als rote Blutkörperchen. In das Lumen des 3. Ventrikels hineinragende Ausläufer von Zellen des Tectum opticum konnte ich nicht nachweisen.

Bos taurus, zwei 16 cm lange Embryonen, Sagittalschnitte. Bei dem einen Embryo fand ich einen feinen R.-F. im Lumen des Z.-K. Diesem Faden liegen in ganzer Ausdehnung Zellen an. Bei dem anderen Embryo fand sich im Lumen des Z.-K. kein R.-F., dagegen kamen hier Zellen vor, die in einer Reihe angeordnet das Lumen des Z.-K. in ganzer Länge durchzogen. Im Gebiete des Tectum opticum sah man deutlich einige Zellen, die einen Ausläufer in das Lumen des 3. Ventrikels sandten. An und um diese Ausläufer liegen die obenerwähnten freien Zellen im Lumen des Ventrikels. Die Zellen ordnen sich in Reihen an, die vom Tectum opticum bis zum Aqueductus Sylvii reichen. Es finden sich mehrere derartige Reihen solcher Zellen (sogenannter Wanderzellen).

Bos taurus, 2 Embryonen von 17 cm Länge, Sagittalschnitte. Der R.-F. ist nicht angelegt. Sekret und Zellen kommen im Lumen des Z.-K. vor.

Bos taurus, 18 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Im Lumen des Z.-K. kommt außer einigen freien Zellen eine große Anzahl der bereits bei dem 15 cm langen Embryo erwähnten Bildungen vor. Der R.-F. ist nicht angelegt.

Bos taurus, 19 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Im Lumen des Z.-K. kommen ähnliche Bildungen wie bei dem 18 cm langen Embryo vor.

Bos taurus, 6 Embryonen von 21 cm Länge, Quer- und Sagittalschnitte. Bei dem einen Embryo ist der R.-F. nicht angelegt. Im Lumen des Z.-K. finden sich aber Bildungen, von denen einige in den Abb. 156 und 158 bei *a* deutlich zu sehen sind. Diese Bildungen könnten in Querschnitten auf den ersten Eindruck als R.-F. aufgefaßt werden, eine nähere Prüfung zeigt aber, daß dieser Eindruck täuscht. Sie sind rund bis längsoval, bilden also keinen Faden. In ihrem Zentrum besitzen sie 1—6 dichtere, dunklere Partien und peripher davon eine hellere Hülle. Nur einzelne freie Zellen konnten im Lumen des Z.-K. nachgewiesen werden. Bei einem anderen Embryo, von dem nur ein Stück des Rückenmarks untersucht wurde, kamen ähnliche Bildungen im Lumen des Z.-K. vor. Diese Bildungen (Abb. 157 *a*) lagen zu mehreren nebeneinander. Sie haben sämtlich einen ovalen bis runden, dunkler gefärbten zentralen Teil und eine peripher davon gelegene hellere Hülle. Der R.-F. war nicht vorhanden, nur einzelne freie Zellen kamen im Lumen des Z.-K. vor. Ein dritter Embryo besaß keinen R.-F. An der inneren Fläche des Ependyms fanden sich längs des ganzen Z.-K. mehrere freie Zellen (s. Abb. 144 u. 145), von denen einige noch in intimer Verbindung mit dem Ependym stehen. Bei einem vierten Embryo war ebenfalls ein R.-F. nicht entwickelt. Im Lumen des Z.-K. kamen zahlreiche freie Zellen vor, die hier zentral in einer Reihe angeordnet waren. Bei einem fünften Embryo war der R.-F. entwickelt. An mehreren Stellen lagen einige der obenerwähnten Zellen dem

R.-F. dicht an. Am caudalen Ende der Fossa rhomboidea hat der R.-F. Faserstruktur und einen Durchmesser von etwa 3μ . Kurz bevor der R.-F. das Tectum opticum erreicht, teilt er sich in viele feine Fasern, die sich an verschiedenen Stellen des Tectums anheften. Die Abb. 140 zeigt eine derartige Anheftungsstelle. Man sieht hier, wie ein Zweig des R.-F. gegen das Ependym verläuft und sich hier in mehrere feinste Fasern auflöst, die sich am Ependym des Tectums anheften. Ein Teil dieser Fasern konnte bis in einige Zellen des hohen Ependyms des Tectum opticum verfolgt werden. Wie aus der Abb. 140 hervorgeht, liegen einige der obenerwähnten, freien Zellen teils längs des R.-F., teils in ihm. Auch Reste zerfallener Zellen sieht man hier und da längs des R.-F. Bei einem sechsten Embryo von derselben Länge fand sich im Lumen des Z.-K. kein R.-F., dagegen zahlreiche Bildungen von der Art, die Abb. 157 zeigt.

Bos taurus, 5 Embryonen von 22 cm Länge, Sagittalschnitte. Bei einem solchen Embryo sieht man zahlreiche freie, vitale Zellen, die in einer schön geordneten Reihe (1—2 Zellen nebeneinander) zentral im Lumen des Z.-K. liegen (s. Abb. 146) und in denen einzelne Mitosen nachgewiesen wurden. Im kranialen Ende des Z.-K. sieht man stellenweise, wie sich ein etwa 2μ dicker Faden längs und aus dieser Zellreihe zu bilden scheint. Am Tectum opticum finden sich einige Fäden, die sich caudal von diesem zum R.-F. zusammenlegen. Einen Teil dieser Fäden konnte ich bis in das Tectum verfolgen, während das bei anderen (nicht abgeschnittenen) nicht möglich war. Alle diese Fäden haben teils an ihrer Seite, teils in ihrem Innern Zellen von dem obenerwähnten Typ. Das Protoplasma dieser Zellen scheint wenigstens stellenweise den Faden ganz zu umgeben. Bemerkenswert ist ferner, daß derartige Zellen nur im Zusammenhang mit dem R.-F. oder seinen Zweigen gefunden wurden, und daß einige Zellen im Ependym des Tectum opticum in das Lumen des 3. Ventrikels Ausläufer senden, die an ihrem freien Ende knötchenförmige Verdickungen tragen. Ob diese Ausläufer eine Bedeutung für die Entwicklung des R.-F. haben, geht aus meinen Präparaten nicht genügend deutlich hervor.

Bei 2 anderen Embryonen von 22 cm Länge war der R.-F. entwickelt und hatte einen Durchmesser von etwa 2μ . Nur wenige Zellen lagen dem R.-F. dicht an. Mehrere zerfallene Zellen dieser Art wurden im Lumen des Z.-K. gefunden.

Bei einem vierten Embryo von derselben Größe ist der R.-F. angelegt. Im Rückenmark ist er stellenweise nicht mehr als 1μ dick, in der Fossa rhomboidea dagegen hat er einen Durchmesser von $2-4\mu$. Hier und da kommen längs dieses Fadens Zellen des erwähnten Typs vor. Der größere Durchmesser, den der R.-F. stellenweise zeigt, beruht auf einer Auflockerung seiner Struktur.

Bei einem fünften Embryo dieser Gruppe ist kein R.-F. entwickelt, dagegen kommen hier zahlreiche Bildungen im Lumen des Z.-K. vor, die allem Anscheine nach die Derivate hier vorhandener freier Zellen sind (s. Abb. 147). Auch völlig intakte Zellen finden sich hier. Einige Präparate dieses Materials machen den Eindruck, daß der R.-F. angelegt gewesen, aus unbekannter Ursache aber wieder zugrunde gegangen ist. Die dunkle, große Bildung im Lumen des Z.-K., die Abb. 147 zeigt, hat nämlich eine Struktur, die darauf hindeutet.

Bos taurus, 5 Embryonen von etwa 25 cm Länge, Sagittalschnitte. Bei 2 Embryonen, die einen gut entwickelten R.-F. haben, beträgt sein Durchmesser

etwa 4μ . Freie Zellen im Lumen des Z.-K. konnte ich nicht nachweisen. Bei einem anderen Embryo derselben Größe war der R.-F. ebenfalls gut entwickelt und hatte einen Durchmesser von $3,5\mu$. Hier fanden sich längs des R.-F. einige freie Zellen. Ein weiterer Embryo derselben Gruppe hatte einen gut entwickelten, doppelt konturierten R.-F. von 5μ Durchmesser. Hier kamen nur zerfallene freie Zellen vor. Bei einem anderen Embryo von 25 cm Länge hatte der R.-F. einen Durchmesser von etwa 5μ . Er war im Z.-K. von einer dicken Schicht Sekret umgeben, dessen Fixierung nicht durchgängig gut war; stellenweise war das Sekret großblasig — wie es oft bei Formalinfixierung dieses Materiales vorkommt —, wobei der R.-F. keine scharfen Konturen aufwies, sondern diffus in das großblasige Sekret überging. An anderen Stellen wiederum, an denen das Sekret mehr homogen war — wie es gewöhnlich in diesem Material bei guter Zenker- und Flemming-Fixierung der Fall ist —, hatte der R.-F. scharfe Konturen und trat sehr deutlich hervor.

Bos taurus, 26 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. ist etwa 5μ dick. Freie Zellen im Lumen des Z.-K. konnten nicht nachgewiesen werden.

Bos taurus, 5 Embryonen von etwa 28 cm Länge, Sagittalschnitte. Bei 2 Embryonen finden sich Andeutungen eines R.-F. Die Abb. 148—155 stammen von diesem Material. Abb. 149 zeigt eine Reihe freier Zellen im Lumen des Z.-K. Unten in dieser Abbildung sieht man in der Mitte dieser Zellreihe einen in der Entwicklung befindlichen Faden; in der Mitte der Abbildung treten Fadenbildungen in der Zellreihe nicht hervor, was dagegen unten in der Abbildung der Fall ist. Das Gebiet zwischen den Linien in der Abb. 149 ist in der Abb. 153 vergrößert wiedergegeben. Man sieht hier, daß der Faden in intimer Beziehung zu den vorhandenen freien Zellen steht. Das Gebiet zwischen den Linien in Abb. 150 wird in Abb. 152 vergrößert wiedergegeben. Hier sieht man, wie eine sog. freie Zelle innerhalb einer Längsspalte des R.-F. liegt. Das Protoplasma der fraglichen Zelle ist anscheinend zum größten Teil verbraucht und der liegengebliebene Kern zeigt beginnenden Zerfall. Die Abb. 148, 151, 154 und 155 zeigen derartige Zellen in intimmem Zusammenhang mit dem in der Entwicklung begriffenen R.-F.

Bei 3 anderen Embryonen dieser Gruppe ist der R.-F. bereits entwickelt. Bei zweien hatte der R.-F. einen Durchmesser von 4μ und bei dem dritten einen Durchmesser von 6μ . Freie Zellen konnten längs des R.-F. oder an anderen Stellen des Z.-K. nicht nachgewiesen werden.

Bos taurus, 30 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. ist entwickelt und hat einen Durchmesser von 7μ . Freie Zellen sind im Lumen des Z.-K. nicht vorhanden.

Bos taurus, 45 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. ist doppelt konturiert und hat einen Durchmesser von 7μ . Seine zentrale dunkle Zone hat einen Durchmesser von 3μ . Freie Zellen im Lumen des Z.-K. fehlen.

Bos taurus, 58 cm langer Embryo, Sagittalschnitte. Der R.-F. ist entwickelt und hat einen Querdurchmesser von 8μ . Freie Zellen konnten im Lumen des Z.-K. nicht nachgewiesen werden.

α) Zusammenstellung und Kritik der Ergebnisse.

Bei einer Zusammenstellung und Kritik der Ergebnisse der oben mitgeteilten Untersuchungen über die Entwicklung des R.-F. bei Embryonen der angeführten Tierarten scheinen mir die freien Zellen im Lumen des Z.-K. Anspruch auf besondere Beachtung zu haben.

Im Lumen der Fossa rhomboidea hat *Antoni*⁴⁾ in dem Entwicklungsstadium, in dem die Dachplatte sich zu verdünnen beginnt, freiliegende Zellen wahrgenommen. Diese Zellen stammen nach *Antoni* von dem intramedullaren Teil der Ganglienleiste her. Die Struktur und Lage dieser Zellen lassen das deutlich erkennen. In ihrem Protoplasma weisen sie Körnchen auf, die durch Hämatoxylin tief-blauviolett und durch Eisenalaun-Hämatoxylin tiefschwarz gefärbt werden sollen. Das Vorkommen einzelner derartiger Zellen im Lumen des Medullarrohrs kann ich für frühe Entwicklungsstadien der Embryonen von Rind und Kaninchen völlig bestätigen. Meine Präparate sprechen aber dafür, daß diese Zellen, wie *Antoni* hervorhebt, degenerieren und verschwinden. Die frei im Lumen des Medullarrohrs liegenden Zellen, die ich oben mit der Entwicklung des R.-F. in Zusammenhang gebracht habe, haben weder hinsichtlich Struktur noch Herkunft mit den von *Antoni* beschriebenen Zellen etwas zu tun. Diese Zellen haben nämlich in ihrem Protoplasma weder mit Hämatoxylin noch mit Eisenalaun-Hämatoxylin färbbare Körnchen. Ihr Protoplasma hat eine äußerst feinkörnige und teilweise alveoläre Struktur. Mit größter Wahrscheinlichkeit stammen sie auch nicht von einem liegengebliebenen intramedullaren Teil der Medullarleiste ab, sondern trennen sich vom inneren Teil der Keimschicht des Medullarrohrs in einem wesentlich späteren Entwicklungsstadium als die grobkörnigen Zellen. Die Teilungsfiguren der freien Zellen, ihre größere Frequenz zu Beginn der Anlage des R.-F., ihre Anordnung in Reihen, ihr Auftreten nur in intimer Verbindung mit der Anlage des R.-F., ihre Lagebeziehung zu der frühen Anlage des R.-F. und ihr Verschwinden unter Degenerationserscheinungen, wenn der R.-F. einen gewissen Grad der Entwicklung erreicht hat, sind einige der wichtigen Faktoren, die meiner Meinung nach deutlich dafür sprechen, daß diese Zellen für die Entwicklung des R.-F. von Bedeutung sind. Worin diese Bedeutung besteht, ob die Zellen nur sogenannte Leitzellen sind, entlang derer der R.-F. wächst, oder ob sie an der Entwicklung der Substanz des R.-F. auch aktiv teilnehmen, ist schwer definitiv zu entscheiden. Die Bilder in meinem Material sprechen dafür, daß beide angegebenen Funktionen dieser Zellen möglich sind. Diese Tatsachen und dazu die weitere Tatsache, daß Ausläufer einiger im Tectum opticum gelegener Zellen in das Lumen des 3. Ventrikels hineinwachsen (bei *Squalus* möglicherweise auch Ausläufer von Zellen, die ventral im Ependym des Z.-K. liegen und deren Ausläufer mit der Anlage des R.-F. in Verbindung treten), sind die hauptsächlichsten Ergebnisse meiner Untersuchungen über die Art der Entstehung des R.-F. Man könnte sich in diesem Zusammenhang denken, daß die freien Zellen die Kittsubstanz und die im Tectum opticum (bzw. die ventral im Ependym des Z.-K. bei *Squalus*) gelegenen Zellen die Faserstruktur bilden, die nicht selten im R.-F. deutlich hervortritt (s. Abb. 160). Die Doppelkonturierung, die der R.-F. gelegentlich, besonders aber bei Lackfärbung zeigt, braucht auf

nicht mehr als auf eine dichtere Anordnung der Substanz im Innern des R.-F. hinzudeuten.

Von den früheren Forschern auf diesem Gebiet ist *Sargent*^{80) 81)} der einzige, der den freien Zellen eine Bedeutung für die Entwicklung des R.-F. zugesprochen hat, während die übrigen Forscher, die diese Zellen erwähnt haben, sie zu der Gruppe der Wanderzellen rechnen. Nach *Sargent* gehört der R.-F. zu einem optischen Reflexapparat. Der Faden müßte also ein Nervenfaden sein und die freien Zellen, die den Faden nach *Sargent* bilden, Neuroblasten (*Sargent* schließt sich also der Kettentheorie an). Meine Resultate vermögen in keinem Punkte die Ansicht *Sargents* zu stützen. Diese Zellen andererseits als Wanderzellen zu bezeichnen, ist nicht durchaus falsch, aber welche Zellen des Embryo verändern ihre Lage nicht?! Werden aber unter „Wanderzellen“ Leukocyten oder andere Formelemente, wie sie im Blut vorkommen, verstanden, dann kann ich einer solchen Ansicht nicht zustimmen. Auch Formelemente des Blutes können gelegentlich im Lumen des Z.-K. wahrgenommen werden, sie haben aber nicht das geringste mit den fraglichen freien Zellen zu tun.

*Studnička*⁹⁰⁾ hebt betreffs der Entwicklung des R.-F. hervor, daß er mit der gewöhnlichen Gerinnung des Inhalts des Z.-K. nichts zu tun hat. Er konnte doch, wenn man alle Umstände erwägt, nicht anders als durch Ausscheidung aus den Zellen der Wand des Z.-K. entstanden sein. *Studnička* meint, daß der Faden in dem Z.-K. etwa so entsteht wie ein Krystallstiel in dem Magendivertikel der Lamellibranchiaten. Dies stimmt recht schlecht mit meinen oben mitgeteilten Wahrnehmungen überein, und wie aus *Studničkas* Abhandlung hervorgeht, ist seine Meinung kaum auf systematischen embryologischen Untersuchungen gegründet. Ebenso wenig kann ich *Kolmers*⁵⁵⁾ Ansicht beipflichten, wenn er schreibt: „Viel eher möchte ich ihn (den R.-F.) mit *Ruzicka* für ein Sekretionsprodukt der Epithelzellen halten, und zwar in jenem Sinne, wie etwa die Cupula in den Ampullen der Vertebraten.“ Für diese letztgenannte Frage liefert *Held*³¹⁾ nähere Tatsachen. Auch *Schaffers*⁸²⁾ Meinung kann ich nicht beistimmen, wenn er schreibt: „Der *Reissnersche* Faden könnte vielleicht als eine cuticulare Differenzierung dieses Sinnesepithels und allenfalls noch anderer im Ependym eingestreuter Sinneszellen, ähnlich der Cupula terminalis in den Ampullen, aufgefaßt werden.“

Zu der Frage, wann in der Entwicklung der R.-F. zuerst auftritt, möchte ich folgendes anführen. *Studnička*⁹⁰⁾ teilt mit, daß bei einer 1 cm langen Larve von *Petromyzon* der R.-F. fehlt. *Schaffer*⁸²⁾ bildet in seiner Abb. 142 den R.-F. bei einem 7 mm langen Exemplar von *Ammocoetes* ab. *Sargent*⁸⁰⁾ zeigt in seiner Abb. 6 einen Sagittalschnitt durch das hintere Ende des Z.-K. bei einem 20 mm langen Embryo von *Squalus acanthias*. Die Abbildung läßt nur freie Zellen im Lumen des Z.-K., aber keinen R.-F. erkennen. In einer späteren Arbeit gibt *Sargent*⁸¹⁾ an, daß er Serien von *Squalus acanthias* „from embryos 10 mm long to the adult“ untersucht hat. „In embryos from 10 to 30 mm in length, no trace of the fibre of *Reissner* is to be found . . .“

Meine Resultate von Embryonen von *Squalus acanthias* stimmen mit den Angaben *Sargents* gar nicht überein. Wie oben erwähnt wurde, konnte ich einen gut entwickelten R.-F. bereits bei einem Embryo von 12 mm Länge nachweisen, während er bei einem Embryo von 8 mm Länge noch fehlte. Die erste Anlage

des R.-F. dürfte also bei Embryonen von 8—12 mm Länge auftreten. Da mein embryonales Material besonders gut fixiert ist und die Zellen keine Schrumpfererscheinungen erkennen lassen, können Schrumpfungen nicht die Verschiedenheiten in meinen und *Sargents* Wahrnehmungen erklären. Auch haben spätere Kontrolluntersuchungen an einem größeren Material meine genannten Resultate bestätigt. Wenn also *Sargents* Maße seines embryonalen Materials richtig sind, so müßte schon in der Entwicklungszeit des R.-F. bei Haiembryonen ein Unterschied zwischen Haien der Westküste Schwedens und denen der Ostküste Amerikas bestehen.

Bei Säugetierembryonen tritt die erste Anlage des R.-F. erst bedeutend später auf. (Meinem Material nach zu urteilen, erfolgt sie bei *Mus musculus* var. *albus* bei etwa 15 mm Nacken-Steißlänge, bei *Lepus cuniculus* in einem Entwicklungsstadium von 5,7—7 cm Länge.) Die Embryonen von *Bos taurus* haben eine große Verschiedenheit hinsichtlich der Zeit der Entwicklung des R.-F. gezeigt. Gestützt auf die einzelnen Resultate des oben erwähnten reichlichen Materials glaube ich jedoch, daß die im folgenden vertretene Auffassung der Wahrheit nahekommt. Die erste Anlage des R.-F. tritt gewöhnlich bei 16 cm langen Rinderembryonen auf. Diese Anlagen können mitunter aus der einen oder anderen Ursache verzögert (oder zerstört) werden, wonach ein (neuer) R.-F. erst in einem späteren Stadium entwickelt wird, z. B. bei Embryonen von 28 cm Länge. Bei größeren Embryonen ist der R.-F. konstant vorhanden*).

d) Über das Wachstum des Reissnerschen Fadens.

Wenn der R.-F. einmal angelegt und längs des ganzen Z.-K. vorhanden ist, scheint sein Wachstum nicht nur in der Länge, sondern auch in der Dicke parallel mit dem Wachstum des Tieres zu erfolgen. (Bekanntlich kann er sogar schneller als das Tier wachsen und sich, besonders im *Ventriculus terminalis*, in Windungen legen.) In diesem Zusammenhange möchte ich an die oben erwähnten Angaben für *Squalus acanthias* erinnern, bei dem der Durchmesser des R.-F. bei einem 12 mm langen Embryo etwa $0,1\ \mu$, bei 18 mm $0,4\ \mu$, bei 20 mm $0,5\ \mu$, bei 150 bis 220 mm (s. die Tabelle) $3 \times 4\ \mu$ und bei erwachsenen Tieren $4 \times 6\ \mu$ betrug. Ähnliche Resultate erhält man auch bei Prüfung der Einzelergebnisse (s. oben und die Tabelle) von *Bos taurus* u. a. Ein Vergleich des Dickenwachstums des R.-F. bei niederen und bei höheren Vertebraten zeigt dabei, daß der R.-F. von der Entwicklung an bis zu dem Verhalten beim ausgewachsenen Tiere bei niederen Vertebraten um das 60 fache (*Squalus acanthias* $0,1—6\ \mu$) und bei höherstehenden Vertebraten nur um das 7—8 fache (*Bos taurus* $2—15\ \mu$) zunimmt. Einige Wahrnehmungen sprechen auch dafür, daß der R.-F. in höherem Alter an Dicke abnimmt. Diese Resultate zeigen also, daß der R.-F. betreffs der Dickenveränderungen, die parallel mit den verschiedenen Alters- und Wachstumsperioden des Tieres vor sich gehen, an eine Nervenzelle oder einen Nervenfasern erinnert. (Hinsichtlich der Größenveränderungen von Nervenzellen und Nervenfasern s. meine Arbeit über die postfötale Neuronenentwicklung¹).

*) Kontrolluntersuchungen über das Vorkommen des R.-F. wurden auf Stücke des Rückenmarks von weiteren 11 Rinderembryonen mit einer Länge von 28—57 cm ausgeführt.

e) Über die Bedeutung des Reissnerschen Fadens.

Hinsichtlich der Ansicht früherer Forscher über die Bedeutung des R.-F. möchte ich auf die zu Beginn der Ausführungen gegebene Literaturübersicht hinweisen. Um mir selbst eine Meinung über die Bedeutung des R.-F. zu bilden, habe ich einige Experimente ausgeführt. Ich verwandte dazu 12 Exemplare von *Petromyzon fluviatilis* und 100 Exemplare von *Osmerus eperlanus*. Die Experimente beabsichtigten, die nach der Durchschneidung des R.-F. möglicherweise eintretenden Veränderungen bzw. funktionellen Störungen zu studieren. Als Instrument für die Durchschneidung des R.-F. diente eine feine Nähnadel, deren Spitze abgekniffen und die dann meißelförmig so zugeschliffen wurde, daß sie einen langgestreckten Keil mit einer Schneide an seinem freien Ende darstellte. Die Operation wurde bei *Petromyzon* an der Grenze zwischen dem caudalen 1. und 2. Viertel der Medulla spinalis und bei *Osmerus* in Höhe des caudalen Endes der Medulla oblongata in der Art ausgeführt, daß die Nadel mit der quergestellten Schneide in vertikaler Richtung durch die Mitte der Medulla auf die fraglichen Stellen geführt wurde. Es ist ohne weiteres klar, daß die Operation auch da, wo sie völlig gelang, nicht nur den R.-F., sondern auch die direkt dorsal und ventral vom Z.-K. gelegenen Leitungsbahnen zerstören mußte. Eine Funktionsstörung lediglich wegen der Zerstörung des R.-F. konnte bei diesem Experiment also von vornherein nicht erwartet werden, vielmehr mußte man a priori auf einen Symptomenkomplex infolge der Operation an sich und infolge der Zerstörung des R.-F. und einiger Leitungsbahnen gefaßt sein. Besonders geeignet für diese Experimente war *Osmerus* wegen der Durchsichtigkeit der dorsal von den Wirbelkörpern belegenen Partien. Wenn das Tier einige Zeit vor der Operation in sauerstoffarmem Wasser (ruhigstehendes Wasserleitungswasser) gehalten wurde, dann trat die Rückenpartie noch blasser hervor, so daß bei dem intakten Tiere das zentrale Nervensystem sehr deutlich zu sehen war. Daher war die Operation bei *Osmerus* äußerst einfach, da man nur die zugerichtete Nadel in das sichtbare zentrale Nervensystem von oben her einzustechen brauchte. Bei *Petromyzon* andererseits würde ein derartiges Verfahren nicht so sicher zum Ziele geführt haben. Bei diesem Tiere geschah die Operation so, daß zuerst der Wirbelkanal geöffnet wurde, bevor die Operation an dem freigelegten Rückenmark ausgeführt wurde.

Von den für die experimentelle Untersuchung bestimmten 12 Exemplaren von *Petromyzon* wurden 2 als Kontrolltiere (Gruppe 1) intakt gelassen, alle übrigen wurden operiert. Das betreffende Tier wurde in ein trockenes Handtuch eingewickelt und von einem Assistenten dicht vor und dicht hinter der Operationsstelle fixiert. Darauf wurde der Wirbelkanal an der erwähnten Stelle durch einen etwa 2 cm langen Schnitt dorsal in der Medianebene geöffnet. Sobald das Rückenmark bloßgelegt war, wurde die Operation in der oben angegebenen Weise ausgeführt. Bei 2 operierten Tieren verursachte die Operation fast gar keine Blutung (diese Tiere bilden die Gruppe 2), bei den übrigen war die Blutung größer und bei 2 von diesen recht beträchtlich. Bei 2 Tieren, bei denen die Öffnung des Wirbelkanals nur mittelmäßige Blutung zur Folge hatte, wurde das Rückenmark bloßgelegt, *ohne* daß die eigentliche Operation am Rückenmark ausgeführt

wurde (Gruppe 3). Danach wurde die Wunde vernäht. Diese beiden Tiere waren bestimmt, eine zweite Kontrollgruppe zu bilden. Bei den übrigen 6 Tieren wurde die Operation vollständig ausgeführt. Von diesen Tieren hatten 4 mittelmäßige Blutungen (Gruppe 4) und 2 starke Blutungen gehabt (Gruppe 5). Die Tiere der Gruppe 5 zeigten unmittelbar nach der Operation keine deutlichen Bewegungsstörungen, erst in den nächsten Tagen nach der Operation traten solche Störungen deutlich hervor und wurden täglich größer. Am 5. Tage nach der Operation wurden diese Tiere getötet. Kurz vor dem Töten konnten diese Tiere den caudal von der Operationsstelle gelegenen Teil ihres Körpers kaum bewegen. Bei der Sektion erwies sich die Operationsstelle stark gerötet und auch im Wirbelkanal fanden sich größere Blutungen. Alle übrigen Tiere wurden 20 Tage lang nach der Operation beobachtet. Die Tiere der Gruppen 3 und 4 zeigten am Ende der Beobachtungszeit eine gewisse Trägheit in der Bewegung der caudal von der Operationsstelle gelegenen Körperpartie. Bei 2 Tieren der Gruppe 4 war die Bewegungsstörung eher geringer als gleich groß wie bei einem Tiere der Gruppe 3. Bei den Tieren der Gruppe 2 war eine deutliche Bewegungsstörung weder kurz nach der Operation noch 20 Tage danach bemerkbar. Im Aquarium, in dem die durch ihr Äußeres leicht kenntlichen Tiere zusammen mit den Kontrolltieren der Gruppe 1 gehalten wurden, konnte keine Verschiedenheit in der Bewegung wahrgenommen werden. Bei keinem der operierten Tiere konnten Sehstörungen durch drohende Manipulationen nachgewiesen werden.

Vom Rückenmark der Tiere der Gruppe 2 wurde ein 2 cm langes Stück in Höhe der Operationsstelle in eine lückenlose Serie von Horizontalschnitten aufgelegt. Aus diesen Präparaten ging hervor, daß bei dem einen Tier in Höhe der Operationsstelle die Leitungsbahnen dorsal und ventral vom Z.-K., der Z.-K. selbst und sein Inhalt, also auch der R.-F., völlig zerstört waren; dagegen waren nur sehr wenige Leitungsbahnen bilateral vom Z.-K. beschädigt. Bei dem anderen Tiere dagegen war der Operationsschnitt einige μ weiter nach der einen Seite gegangen, was zur Folge hatte, daß auch einige Leitungsbahnen lateral vom Z.-K. auf dieser Seite beschädigt waren. Auch hier war der R.-F. durchschnitten. Die durch die Operation durchschnittenen Enden des R.-F. waren nicht aufgewunden, sondern gerade, und nur an dem caudalen Teil war das Ende etwas zurückgezogen.

Von den zur Operation bestimmten Exemplaren von *Osmerus eperlanus* wurden etwa 60 operiert, während die übrigen als Kontrolltiere intakt blieben. Von den operierten Tieren zeigten einige recht interessante Lagestörungen. Ein paar von ihnen nahmen im Aquarium eine vertikale Stellung mit dem Kopfe nach oben ein, einige andere hatten ebenfalls vertikale Stellung, der Kopf war aber nach unten gerichtet. Wieder andere nahmen eine Stellung mit dem Rücken nach unten ein, einige lagen auf der rechten Seite, einige auf der linken. Da diese Lagestörungen wahrscheinlich darauf zurückzuführen waren, daß bei der Operation auch die unter der Operationsstelle gelegenen statischen Organe beschädigt worden waren, so wurden diese Tiere aus der Versuchsserie eliminiert. Von den übrigen etwa 35 operierten Tieren wurden 8 noch entfernt, weil bei ihnen größere Blutungen durch die Operation hervorgerufen worden waren. Bei den übrigen bleibenden, mehr als 20 Tieren war die Operation vollständig gelungen, soweit sich dies makroskopisch feststellen ließ. Nach ein paar Tagen war keine andere

makroskopisch nachweisbare Spur der Operation zu sehen als dorsal ein Loch im Schuppenüberzug. Diese letztgenannten Tiere zeigten keine einzige Funktionsstörung, weder Seh- noch Bewegungsstörung. 10 Tage nach der Operation wurden alle operierten Tiere getötet. Bei 6 von ihnen wurde das operierte Gebiet der Medulla oblongata in lückenlose Serien von Horizontalschnitten aufgelegt. Die Untersuchung zeigte, daß die Operation bestens geglückt war. Nur wenige Leitungsbahnen bilateral vom Z.-K. waren beschädigt. In keinem Falle war der R.-F. aufgerollt. Er schien eher spröde zu sein, denn er war etwas kranial und caudal von der Operationsstelle in kleine Stückchen zerfallen.

Die Resultate meiner Experimente sind also keine Stütze für *Sargents* Theorie, daß der R.-F. am Aufbau eines optischen Reflexapparates beteiligt sei, denn Sehstörungen wurden in keinem einzigen Falle festgestellt. Die Experimente haben andererseits auch keine Stütze für *Dendys* Theorie ergeben, nach der der R.-F. ein Teil eines Apparates zur Regulierung oder Kontrollierung der Beugebewegungen des Körpers sein sollte; sie haben vielmehr gezeigt, daß der Körper so reichliche Nervelemente für diese Aufgabe besitzt, daß nicht nur der R.-F., sondern auch die Leitungsbahnen des Rückenmarks dorsal und ventral vom Z.-K. beschädigt werden können, ohne daß eine deutlich hervortretende Bewegungsstörung bemerkbar wird. Andererseits beweisen meine Ergebnisse offenbar auch nicht, daß *Dendys* Theorie unrichtig ist. Die Möglichkeit besteht ja, daß der Faden eine Bedeutung in der angegebenen Richtung hat, obgleich die Funktion so gering ist, daß er eliminiert werden kann, ohne daß eine Störung der Körperbewegungen hervorgerufen wird. Derartige Beispiele finden sich ja auch sonst im Organismus. Ich möchte dafür ein Beispiel von der Innervation der Extremitäten anführen. In mehreren Fällen habe ich bei der Katze einen der Segmentalnerven, deren ventrale Äste den Plexus brachialis bilden, durchschnitten, ohne daß nach der Heilung der Wunde eine Bewegungsstörung hätte festgestellt werden können. Dieses Verhalten wird völlig geklärt durch meinen Nachweis der plurisegmentellen Innervation einzelner Muskelfasern³⁾. Wenn es auch nicht möglich gewesen ist zu beweisen, daß der R.-F. *keine* Bedeutung für die Regulierung der Körperbewegungen hat, so ist es doch andererseits ebenso unmöglich zu beweisen, daß er *große* Bedeutung hat. Sicher aber finden sich kräftige Nervenapparate, die völlig ausreichen, die Bewegungen (ohne Vorhandensein eines R.-F.) zu regulieren. Denn es gibt ja mehrere Individuen mit komplizierten Körperbewegungen, die den R.-F. entbehren, so z. B. Amphioxus, Cetaceen [*Guldberg*²⁸⁾, *Rawitz*⁷¹⁾], Erinaceus, Sorex und Homo. Es ist aber auch möglich, daß der R.-F. bei den Tieren, bei denen die i. N.-Z. lange, zugespitzte Ausläufer in das Lumen des Z.-K. senden, z. B. bei einigen Reptilien und Vögeln, auf die i. N.-Z. als Irritant in der einen oder anderen Richtung wirken kann.

Auch auf andere Art suchte ich die Funktion zu prüfen, die der R.-F. als Reizursache für die intraependymalen Nervelemente haben könnte. Bei einigen Vertebraten (z. B. bei Rundmäulern, Knorpelfischen und Säugetieren) erstreckt sich der zentral gerichtete Ausläufer der i. N.-Z. gewöhnlich nur ein kurzes Stück in das Lumen des Z.-K. hinein. Sein freies Ende ist in der Regel abgerundet und oft etwas verdickt (bis kugelförmig aufgetrieben bei mehreren

Säugetieren — s. Capra). Falls der R.-F. bei einer Biegung des Körpers überhaupt einen Reiz auf die i. N.-Z. ausüben könnte, müßte er wenigstens mit den zentralen Endapparaten der i. N.-Z. in Kontakt kommen, mit anderen Worten: Der R.-F. müßte bei einer Biegung des Körpers seine Lage zentral im Lumen des Z.-K. verändern und der dem Krümmungsmittelpunkt näher gelegenen Ependymwand anliegen.

Um entscheiden zu können, ob der R.-F. bei einer Beugung des Körpers dieser Ependymwand anliegt bzw. mit den hier gelegenen intraependymalen Nervelementen in Kontakt kommt, wurde bei einigen Vertretern mehrerer Wirbeltierklassen unmittelbar nach dem Töten entweder das ganze Tier oder nur die freipräparierte Wirbelsäule in Zusammenhang mit dem Kopf und mit Einschluß des zentralen Nervensystems in situ bei Beugung in verschiedenen Ebenen fixiert. Das Material, bei dem Wirbelsäule und Kopf frei präpariert worden waren, wurde in scharfen Biegungen fixiert, ganze Tiere dagegen ließen sich natürlich nur weniger stark biegen.

Wenn der R.-F. gespannt im Zentralkanal liegen würde, so müßte man feststellen können, daß er der dem Krümmungsmittelpunkt näher gelegenen Ependymwand des Z.-K. anliegt.

In den Schnittserien des zentralen Nervensystems, das in der angegebenen Weise fixiert war, konnte ich in keinem einzigen Falle nachweisen, daß der R.-F. der Ependymwand anlag. In einigen Fällen war der R.-F. lediglich aus seiner zentralen Lage im Lumen des Z.-K. nach der dem Krümmungsmittelpunkt nähergelegenen Ependymwand etwas verschoben, es konnte andererseits aber auch das genaue Gegenteil festgestellt werden. In den meisten Fällen jedoch liegt der R.-F. recht genau zentral im Z.-K., vor allem auch an solchen Stellen, wo man eine Verschiebung des R.-F. nach dem Krümmungsmittelpunkt hin bestimmt hätte erwarten sollen, also an den Orten stärkster Beugung. — Man möchte daher fast meinen, daß der Z.-K. in seiner annähernd zentralen Lage fixiert sei.

Auch diese Experimente haben also keine Stütze für die Annahme erbringen können, daß der R.-F. bei Körperbewegungen als besondere Reizursache für die i. N.-Z. dienen kann.

E. Zusammenfassung und Diskussion.

Sinnesorgan. Als ich in der Überschrift meiner Abhandlung hinter das Wort Sinnesorgan ein Fragezeichen setzte, beabsichtigte ich damit anzudeuten, daß die Zusammenstellung der Bildungen, die ich beschreiben wollte, zu *einem* Sinnesorgan nicht ohne weiteres klar war. Denn diese Bildungen können ebensogut Teile mehrerer Sinnesorgane wie Teile eines und desselben Sinnesorgans sein, und solange ihre Funktion nicht mit Sicherheit feststeht, kann man sich ja nur in Vermutungen bewegen. Ein Vergleich mit dem Hautsinn läßt uns vermuten, daß wir in diesem „Ependymsinnesorgan“ vielleicht mehrere Spezialfunktionen zu suchen haben. Jedenfalls nimmt die funktionelle Seite der Angelegenheit, so wichtig sie an sich ist, eine untergeordnete Stellung hier ein, wo es sich vor allem darum handelt, die morphologischen und onto- und phylogenetischen Verhältnisse dieser Bildungen zu studieren.

Zusammenwachsen des Z.-K. Von den Teilen der ependymbekleideten Hohlräume des zentralen Nervensystems, die nicht seit langem bekannte „Sinnesorgane“ [Parietalorgane, s. *Studnička*⁹²⁾] einschließen, kommen im Z.-K. und in der Fossa rhomboidea intraependymale Nervenzellen am zahlreichsten vor. Von diesen beiden Hohlräumen ist die Fossa rhomboidea bei den von mir untersuchten Tierarten immer vorhanden, der Z.-K. dagegen variiert in dieser Beziehung. Das Rückenmark eines 30 Jahre alten Mannes hatte einen an den meisten Stellen völlig verwachsenen Z.-K., sein Vorkommen war nur durch einen Zellstrang (von Ependymzellen) angedeutet — an einigen Stellen dagegen war noch eine Andeutung eines Lumens vorhanden. Bei einem 14 Jahre alten Knaben war der Z.-K. im allgemeinen weit, nur an 2 Stellen fanden sich Erscheinungen, die vielleicht als Andeutungen einer beginnenden Verwachsung gedeutet werden können. Die Verwachsung des Z.-K. im Laufe der Jahre ist eine beim Menschen seit langem bekannte Tatsache.

Verwachsung des Z.-K. kommt aber auch bei anderen Säugetieren vor. So erwähnt *Guldberg*²⁸⁾ im Jahre 1886, daß der Z.-K. bei Bartenwalen verwachsen ist, und das wird im Jahre 1903 von *Rawitz*⁷¹⁾ bestätigt.

In meinem Material von Vertebraten wurden Beobachtungen über vollständige oder beginnende Verwachsung des Z.-K. außer beim Menschen bei *Sorex*, *Lepus timidus*, *Accipiter*, *Haematopus*, *Totanus* und *Heptanchus* gemacht.

Wie auch aus meiner Spezialbeschreibung hervorgeht, ist die Verwachsung des Z.-K. am vollständigsten bei *Sorex*, dem in meinen Präparaten auch die geringste Andeutung eines Z.-K. fehlt. Wahrscheinlich hat hier die Verwachsung des Z.-K. auf einem frühen embryonalen Stadium stattgefunden. *Totanus* und *Accipiter* zeigten verschiedene Grade von Verwachsung, während *Lepus timidus*, *Haematopus* und *Heptanchus* nur stellenweise beginnende Verwachsung erkennen ließen. Meine Präparate von diesen Tieren hinterließen den allgemeinen Eindruck, daß die intraependymalen Nervelemente bei beginnender Verwachsung des Z.-K. an Zahl abnehmen. An den Stellen, wo der Z.-K. vollständig verwachsen war, habe ich weder intraependymale Nervenzellen noch mit Sicherheit Nervenendigungen nachweisen können. In einzelnen Fällen wurden Nervenfasern nachgewiesen, die die liegengebliebenen Ependymzellstränge kreuzten. Wo der Z.-K. noch nicht völlig verwachsen war, aber bereits Anzeichen einer beginnenden Verwachsung erkennen ließ — wie bei [*Homo* (14 Jahre),] *Lepus timidus*, *Totanus*, *Accipiter*, *Haematopus* und *Heptanchus* u. a. —, fanden sich noch intraependymale Nervelemente an den in Verwachsung begriffenen Stellen. Ein besonders interessantes Verhalten zeigt der Z.-K. bei *Amphioxus*, bei dem er bei jungen Individuen spaltförmig ist; später verwächst sein dorsaler Teil, während der ventrale Teil offen bleibt und wahrscheinlich dem Z.-K. bei höheren Vertebraten entspricht.

Intraependymale Nervelemente. Vom morphologischen Standpunkt aus werden die intraependymal liegenden Nervelemente am besten in 2 Gruppen geteilt, und zwar in

A. intraependymale Nervenzellen und

B. intraependymal verlaufende Nervenfasern mit den zugehörigen Endorganen.

Beweis für die nervöse Natur der intraependymalen Nervenzellen. Wie aus der Literaturübersicht zu Anfang meiner Ausführungen hervorgeht, ist die nervöse Natur der bei *Petromyzon fluviatilis* vorhandenen intraependymalen Zellelemente in Zweifel gezogen worden. Meine Resultate u. a. von *Petromyzon* haben gezeigt, was *Retzius* in seinen Präparaten nicht fand, nämlich zahlreiche i. N.-Z. mit peripher gerichteten Ausläufern und einer Neurofibrillenstruktur, die auch in den zentralen Teilen dieser Zellen vorhanden ist. Meine Untersuchungen von 206 Tierarten zeigten ferner, daß i. N.-Z. wohl in der ganzen Wirbeltierreihe vorkommen. Nicht bei einer einzigen der untersuchten Spezies habe ich die Abwesenheit intraependymaler Nervenzellen feststellen können.

Als weiteren Beweis für die nervöse Natur dieser intraependymalen Zellen möchte ich noch anführen, daß sie gewöhnlich Nissl-Körnchen und Neurofibrillen haben und daß sich ihre peripheren Ausläufer auf weiter peripher im Rückenmark gelegene recht große Nervenzellen umkoppeln können. Mehrere derartige Umkoppelungen konnte ich mit Sicherheit in embryonalem Material von *Bos taurus* nachweisen. Dieses Tier zeichnet sich weder durch besonders große noch durch besonders zahlreiche i. N.-Z. aus.

Auf die nervöse Natur der intraependymalen Zellelemente deutet ferner die Struktur ihrer Kerne hin. Bei den meisten Tierarten erinnern sowohl die Form als auch die Chromatinmenge und der Nucleolus dieser Kerne völlig an die der peripher gelegenen Nervenzellen. Als besonders charakteristisches Unterscheidungsmerkmal der i. N.-Z. von den peripher im Rückenmark liegenden Nervenzellen möchte ich noch anführen, daß (mit Ausnahme von *Amphioxus*, *Ammocoetes* und *Petromyzon*) die neurofibrilläre Struktur der i. N.-Z. gewöhnlich weniger intensiv imprägniert wird als die der peripheren Nervenzellen. Meine Erfahrungen lehrten mich, daß dieses Verhältnis nicht auf technischen Ursachen beruht, sondern daß es sich hierbei tatsächlich um besondere Merkmale der i. N.-Z. handelt. Bei *Amphioxus*, *Ammocoetes* und *Petromyzon* dagegen finden sich keine solchen besonderen Eigenschaften der i. N.-Z., sondern sie imprägnieren sich wie die weiter peripher gelegenen Nervenzellen.

Einteilung der i. N.-Z. Die i. N.-Z. können in geeigneter Weise in 2 Gruppen eingeteilt werden, und zwar in

1. i. N.-Z., die keinen Ausläufer bis in das Lumen des Z.-K. senden, und
2. i. N.-Z., die in das Lumen des Z.-K. einen Ausläufer senden.

Zu der ersten Gruppe rechne ich die bei *Erinaceus* im Dache des *Ventriculus terminalis* gefundenen und wahrscheinlich den *Rohon-Beardschen Zellen* gleich zu achtenden Zellen, die, wie die Abb. 141—143 zeigen, mit ihren Körpern weit in das Lumen des *Ventriculus terminalis* hineinragen, und die bei *Cyclostomata* (Abb. 14 u. a.), *Cyclotone* und einigen anderen Knochenfischen nachgewiesenen großen, multipolaren Nervenzellen, die mit einer ihrer Seiten zur Begrenzung des Lumens des Z.-K. beitragen. Zu diesen Zellen gehören auch die großen multipolaren i. N.-Z., die bei *Ammocoetes* und *Petromyzon* ventrolateral im Ependym der *Fossa rhomboidea* nachgewiesen worden sind.

Unter den i. N.-Z. der Gruppe 2 finden sich folgende Typen:

a) Große multipolare Zellen, deren Zellkörper subependymal liegt und deren periphere Ausläufer in der Querebene der *Medulla spinalis diagonal* verlaufen

und ventral vom Z.-K. Commissuren bilden (s. Abb. 29 u. 30 bei *Squalus*). Diese Ausläufer können in der Medulla spinalis außerordentlich weit peripher verfolgt werden. Von diesen Nervenzellen erstreckt sich andererseits ein feiner zentral gerichteter Ausläufer bis in das Lumen des Z.-K., wo er gleich zentral von der inneren Fläche des Ependyms mit einer kleinen Auftreibung endet. Zu dieser Gruppe gehören mehrere subependymal gelegene Nervenzellen (bei verschiedenen Vertebraten), u. a. die größten der beschriebenen Formen der i. N.-Z. bei *Mustela erminea*.

b) Die sogenannten Kolossalzellen bei *Amphioxus* (Abb. 1 u. 2). Von diesen Zellen gehen mehrere Dendriten ab, von denen man einen zuweilen bis zum Lumen des Z.-K. verfolgen kann. Die übrigen Dendriten dieser Zellen habe ich nicht bis zum Lumen des Z.-K. verfolgen können und ihr Verlauf, soweit ich ihn verfolgen konnte, läßt keine Andeutung erkennen, daß die Dendriten direkt oder indirekt anderswo das Lumen des Z.-K. erreichen. Über den Verlauf der peripheren Ausläufer s. oben das Zitat von *Retzius*. Das morphologische Verhalten dieser Kolossalzellen läßt also vermuten, daß sie mit dem rezipierenden Eindruck vom Z.-K. auch Reizungen von anderen Stellen aufnehmen.

c) Eine vom morphologischen Standpunkte besondere Gruppe bilden die großen bipolaren Nervenzellen, die bei *Ammocoetes* und *Petromyzon* ventrolateral im Ependym der Fossa rhomboidea liegen (s. Abb. 123). Außer durch ihre Größe zeichnen sich diese Zellen auch durch ihre kräftigen peripheren Ausläufer aus, die sich reichlich verzweigen und weit peripher, ja bis zu den Meninges verfolgt werden können.

d) Eine vierte Gruppe bilden die großen multipolaren i. N.-Z., die oben bei *Merlucius* im Ependym der Fossa rhomboidea beschrieben wurden. Die Hauptmerkmale dieser Zellgruppe sind die Größe des Zellkörpers, dessen weit peripher befindliche Lage und zahlreiche, in verschiedenen Richtungen verlaufende periphere Ausläufer, die sämtlich bedeutend feiner sind als der zentral gerichtete Ausläufer. Der Zellkörper selbst zeigt in jeder Beziehung große Übereinstimmung mit den peripher gelegenen Nervenzellen.

e) Zu dieser Gruppe rechne ich die meisten i. N.-Z., die sich u. a. durch einen kräftigen zentralen und mehrere, in der Regel schwache periphere Ausläufer auszeichnen. Wie aus oben Gesagtem näher hervorgeht, kann der Zellkörper dieser Zellen eine zum Ependym sehr variierende Lage haben; er kann ganz intraependymal bis weit peripher vom Ependym liegen. Der zentral gerichtete Ausläufer kann bei den verschiedenen Vertebraten sehr verschieden enden. Sein freies Ende kann in Höhe der inneren Fläche des Ependyms liegen und hier gleich dick oder mit einer Auftreibung versehen sein, es kann sich aber auch oft ein Stück in das Lumen des Z.-K. oder der Fossa rhomboidea hinein erstrecken und dann ein sehr variierendes Verhalten zeigen. Bei einigen Tieren (besonders bei Fischen, Amphibien und Sauropsiden) ist sein freies Ende zugespitzt, während es bei Säugetieren in der Regel verdickt ist. Die stärkste Verdickung unter den von mir untersuchten Tierformen kam bei der Ziege vor, bei der man sehr oft in dieser Verdickung Nissl-Körnchen nachweisen konnte. Die peripheren Ausläufer (einer bis mehrere) sind verschieden kräftig, je nach der verschiedenen weit peripheren Lage der Umkopplungsstelle. Liegt die Umkopplungsstelle ganz

intraependymal oder direkt peripher vom Ependym, so ist der Ausläufer in der Regel recht kräftig. Liegt diese dagegen weit peripher, so ist der periphere Ausläufer in der Regel sehr dünn. Bei einigen Tierformen (besonders bei Rundmäulern und Knorpelfischen) habe ich diesen Ausläufer weit peripher im Rückenmark verfolgen können. Dies trifft jedoch nicht für alle Nervenzellen im Ependym dieser Tiere zu, sondern einige dürften sich in der Nähe des Z.-K. umkoppeln. So beweisen z. B. meine Präparate von *Bos taurus*, daß die peripheren Ausläufer wenigstens einiger i. N.-Z. sich auf Ausläufer von weit peripher im Rückenmark gelegenen Nervenzellen umkoppeln. Von diesen letztgenannten Nervenzellen gehen Ausläufer fast bis zur Peripherie des Rückenmarks, dagegen konnte ein longitudinal verlaufender Ausläufer dieser Zellen (ein Neurit) nicht wahrgenommen werden. Diese Verhältnisse deuten also darauf hin, daß die i. N.-Z., wenigstens bei höherstehenden Vertebraten, den von ihnen im Z.-K. empfangenen Reiz zu weiter peripher gelegenen Stellen im Rückenmark weiterleiten. Die genannten Umkopplungsstellen liegen entweder intra- oder subependymal. Die Zellgröße bei dieser Gruppe von i. N.-Z. variiert sehr; gewöhnlich sind diese i. N.-Z. jedoch bedeutend größer als die gewöhnlichen Ependymzellen; Ausnahmen kommen natürlich vor. So z. B. waren die fraglichen Zellen bei *Gadus minutus*, *Meleagris*, *Accipiter*, *Milvus*, *Pandion*, *Parus*, *Sitta* und *Motacilla* kleiner als die Ependymzellen oder gleichgroß und nur in seltenen Fällen etwas größer.

Diese i. N.-Z. besitzen Kerne, die oft denen in typischen Nervenzellen ähneln. In ihrem Protoplasma kommen oft Nissl-Körnchen vor, in mehreren Fällen wurden auch Neurofibrillen nachgewiesen.

I. N.-Z. dieser Gruppe wurden bei beinahe allen untersuchten Tieren nachgewiesen. Sie finden sich also vom Lanzettfisch bis zum Menschen. Ihre Frequenz variiert bei verschiedenen Tierarten sehr, im allgemeinen finden sie sich jedoch recht zahlreich bei allen Wirbeltierklassen. Diese Nervenzellen sind im Ependym des Z.-K. gewöhnlich zahlreicher als in dem der Fossa rhomboidea. Einzelne Exemplare wurden auch im Ependym der Hirnventrikel nachgewiesen (s. Abb. 37 von *Gobius flavescens*).

Die Phylogenie der i. N.-Z. Sichere Stützen, die eine Entscheidung gestatten, ob die i. N.-Z. Teile eines phylogenetisch neuen oder eines in Rückbildung begriffenen Sinnesorgans sind, geben meine Präparate nicht. Es ist zwar Tatsache, daß die i. N.-Z. beim Menschen nur spärlich vorkommen; sie sind aber auch bei einigen niedrigstehenden Säugetieren sehr spärlich, wie z. B. bei *Sorex*, Cetaceen u. a. Andererseits kommen sie recht zahlreich bei den untersuchten Affen vor. Bei einigen niedrigstehenden Vertebraten, z. B. einigen Knorpel- und Knochenfischen, können diese Nervenzellen an Zahl sehr variieren.

Anordnung der i. N.-Z. Die Annahme liegt nahe, daß die i. N.-Z. eine bestimmte Anordnung, z. B. im Ependym des Z.-K. zeigen sollten und daß man auf Grund dessen einen Hinweis auf ihre Funktion erhalten könnte. Infolgedessen habe ich mein Material genau durchmustert und gefunden, daß die fraglichen Nervenzellen bei den meisten untersuchten Tieren im Ependym des Z.-K. diffus verteilt sind; das gilt sowohl in der Längsrichtung als auch im Umriß des Z.-K. Mehrere deutliche Ausnahmen hiervon kommen jedoch vor. Von diesen sollen hier nur einige erwähnt werden.

Bei *Amphioxus*, *Cyclostomata* und einigen Vögeln, u. a. *Pandion*, sind die i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. bilateral zahlreicher als dorsal und ventral. Bei *Squalus acanthias* waren an einigen Stellen die i. N.-Z. dorsal zahlreicher als ventral und bilateral, an anderen Stellen waren dagegen diese Zellen mehr diffus verteilt. Entschieden größere Frequenz der i. N.-Z. ventral im Z.-K. zeigten *Spinachia*, *Gadus esmarkii* und *luscus*, *Merlucius*, *Hippoglossus hippoglossus*, *Zoarces* (*Callionymus*, *Labrus berggylta*, *exoletus* und *melops* haben nur unbedeutend größere Frequenz ventral), *Labrus mixtus*, *Anser anser*, *Sciurus vulgaris* und *Lepus timidus* und *cuniculus*. Ganz besonders deutlich trat die größere Frequenz der i. N.-Z. ventral im Ependym des Z.-K. bei *Lepus cuniculus* hervor.

Am zahlreichsten ventral und bilateral im Ependym des Z.-K. waren die i. N.-Z. u. a. bei *Syrnium*, *Pica* und *Corvus*.

Diese Ausnahmen von der diffusen Verteilung der i. N.-Z. sind jedoch so bedeutend, daß man an ihnen nicht ohne weiteres vorbeigehen kann, und ich komme unten bei der Diskussion der Bedeutung dieser Zellen noch einmal hierauf zurück.

Entwicklung der i. N.-Z. Die Bildungszellen der i. N.-Z. kommen bereits auf einem sehr frühen Entwicklungsstadium vor. So z. B. konnte ich junge Entwicklungsformen dieser Zellen bereits in der Keimschicht des Z.-K. eines 13 mm langen Kaninchenembryos nachweisen. Diese Entwicklungsformen lagen sämtlich nahe dem Lumen des Z.-K. innerhalb des ventralen Ependymkeils. Erst später treten diese Zellen auch lateral im Ependym auf. Bereits auf diesem Entwicklungsstadium unterscheiden sich diese Zellen von den gewöhnlichen Neuroblasten durch eine weniger intensiv gefärbte Faserstruktur ihres Protoplasmas.

Auch bei einigen anderen Embryonen, z. B. von *Squalus* und *Bos taurus*, scheinen Vorstadien dieser i. N.-Z. zahlreicher ventral (innerhalb des ventralen Ependymkeils) als an anderen Stellen vorzukommen.

Diese Tatsachen sprechen ja beinahe dafür, daß die i. N.-Z. in der Nahtlinie des Urmundes entstehen.

Über das Vorkommen intraependymaler Nervenfasern und ihrer Endorgane. Außer Nervenzellen finden sich im Ependym des Z.-K. (Abb. 46) (besonders an seinem kranialen Ende) und des 4. Ventrikels (Abb. 127—139) einige Nervenfasern mit eigentümlichem Verlauf und eigenartiger Endigung. Unter allen untersuchten Vertebraten waren diese Bildungen am zahlreichsten, am kräftigsten entwickelt und am leichtesten nachzuweisen bei *Squalus acanthias*. Sie liegen hier innerhalb des Gebiets der *Fossa rhomboidea* dorsal im caudalen Teil ihres Ependyms und weiter nasal bilateral und ventral in Höhe von *v. m.* in Abb. 125 u. 126.)

Die Nervenfasern bilden oft sub- und intraependymal gelegene Plexus, bevor sie in ihren Endapparat übergehen.

Hinsichtlich ihrer Lage können die Endapparate in 2 Hauptgruppen eingeteilt werden, und zwar

1. in solche, die frei im Lumen der *Fossa rhomboidea* oder ihrer intraependymalen Recessus liegen, und

2. in solche, die in der Wand oder am Boden der intraependymalen Recessus liegen.

Die zu der letztgenannten Gruppe gehörenden Endbildungen sind mehr oder weniger deutlich schalenförmig, während die erstgenannten in ihrer Form bedeutend variieren. Näheres hierüber s. oben und *Agduhr*²⁾.

Im Prinzip ähnliche Nervenfasern und Endapparate wurden auch bei einigen Vertretern von Knochenfischen, Amphibien, Reptilien, Aves und Mammalia nachgewiesen. Diese Endapparate haben bei den höherstehenden Vertebraten im Verhältnis zu denen von *Squalus* kleinere Dimensionen. Auch hier liegen sie vorzugsweise in dem Ependym, das die Fossa rhomboidea und das kraniale Ende des Z.-K. auskleidet. Im Ependym der Fossa rhomboidea liegen sie wie bei *Squalus* beinahe ohne Ausnahme bilateral, bei den Säugetieren haben sie ihre Lage in der Nähe der Taenia ventriculi quarti. Die Fortsetzung dieser Nervenfasern in peripherer Richtung geht nicht deutlich aus meinen Präparaten hervor. Die Menge von Nervenfasern, in die sie sich verlieren, macht es unmöglich, ihren Verlauf weiter zu verfolgen.

Die oben beschriebenen morphologischen Verhältnisse dürften also die Ansicht völlig motivieren, daß das Ependym gleich wie die äußere Haut für Reizungen sehr empfindlich ist. Man könnte sich da fragen, was für Irritantien finden sich in diesen Hohlräumen mitten im zentralen Nervensystem? Der Inhalt der Hohlräume, Cerebrospinalflüssigkeit und der R.-F., sind ja die zunächst in Frage kommenden Bildungen, die als Reizursachen für die intraependymalen Nervelemente aufzufassen sind.

Man kann sich denken, daß die Cerebrospinalflüssigkeit durch ihren Druck und ihre Strömung auf die ependymale Wand Reize ausübt. Daß der R.-F. eine besondere Art Druck auszuüben imstande sein sollte, leuchtet mir nicht ein.

Die wichtigsten Resultate der Versuche, in das Problem des R.-F. einzudringen, sollen hier in aller Kürze zusammengefaßt werden.

Vorkommen des R.-F. Der R.-F. kommt bei den meisten Vertebraten vor; er fehlt jedoch den am niedrigsten und den am höchsten stehenden Formen, die gewohnheitsmäßig als die extremen Formen der Wirbeltierreihe angesehen werden, nämlich bei Lanzettfisch und Mensch. Er fehlt außerdem bei der Spitzmaus und dem Igel, wahrscheinlich auch bei den Walen. Obwohl das Fehlen des R.-F. mit der Verwachsung des Z.-K. zusammentreffen *kann* (*Sorex* und erwachsener Mensch), so fehlt er doch andererseits gelegentlich auch bei Individuen, die einen weit offenen Z.-K. besitzen, z. B. *Amphioxus*, *Erinaceus* und Mensch im frühen Alter.

Vorkommen des R.-F. im Vergleich zu dem Vorkommen intraependymaler Nervelemente. Die Abwesenheit des R.-F. ist nicht begleitet vom Fehlen intraependymaler Nervelemente (i. N.-Z. und Nervenfasern) im Z.-K. (soweit dieser nicht verwachsen ist) oder in der Fossa rhomboidea (z. B. *Amphioxus*, *Sorex*, *Erinaceus* und *Homo*). Dagegen sprechen meine Beobachtungen dafür, daß das subcommissurale Organ*) [s. auch *Dendy* und *Nicholls*¹⁸⁾ und *Bauer-Jokl*¹⁷⁾] fehlt oder rudimentär ist, wenn der R.-F. nicht vorhanden ist.

Verlauf und Anheftung des R.-F. Der R.-F. verbindet sich gewöhnlich mit den Zellen des Subcommissuralorgans. Die von diesem ausgehenden Fasern

*) Unter „Subcommissuralorgan“ wird die hohe Ependymbekleidung verstanden, die am Tectum opticum liegt. Dieses bildet zugleich die Anheftungsstelle des R.-F.

treten zum R.-F. zusammen, der durch den Aquaeductus Sylvii und gewöhnlich durch die Fossa rhomboidea verläuft und sodann den ganzen Z.-K. bis zum caudalen Ende des Ventriculus terminalis durchzieht. Im Ventriculus terminalis zeigt der R.-F. an seinem Ende entweder eine Verdickung oder eine knäueiförmige Aufwindung. Auch während seines Verlaufes sieht man gelegentlich Windungen, Krümmungen oder spiralförmige Drehungen des Fadens. Eine Anheftung des caudalen Endes des Fadens scheint mir nicht so sicher zu sein wie die an seinem kranialen Ende.

Die Struktur des R.-F. Sowohl in Sagittal- als auch in Querschnitten des Rückenmarks in Höhe des Z.-K. kann man oft keine eigentliche Struktur in dem R.-F. erkennen. Mitunter sieht man jedoch eine deutliche Struktur hervortreten, die entweder den Eindruck einer Doppelkonturierung des Fadens macht (s. Abb. 159 u. 161), oder mehrere feine, gleich starke Fasern nebeneinander erkennen läßt (s. Abb. 160).

Die Doppelkonturierung tritt besonders schön bei Färbungen mit *Heidenhains* Eisenalaun-Hämatoxylin hervor; man kann sie aber gelegentlich auch bei anderen Färbemethoden feststellen.

Die Faserstruktur sieht man ab und zu; sie äußert sich als Auffaserung einer sonst homogenen Materie; hieraus folgt auch die Vergrößerung des Querdurchmessers des R.-F. an den Stellen, wo er eine Struktur erkennen läßt. Dieses Verhalten spricht ohne Frage dafür, daß der R.-F. in Wirklichkeit aus einer Anzahl gleichdicker Fasern besteht, die gewöhnlich dicht aneinanderliegen und so fest miteinander verbunden sein können, daß die Grenzen zwischen den einzelnen Fasern nicht deutlich hervortreten. Zwischen dieser Auffassung und der Meinung, daß der R.-F. nur aus Ausläufern im Tectum opticum gelegener Zellen aufgebaut ist, braucht kein weiter Schritt zu sein. Die Entwicklung des Fadens spricht jedoch nicht dafür, daß dies der Fall ist.

Die Entwicklung des R.-F. Der R.-F. wird bei niedrigstehenden Vertebraten verhältnismäßig früher entwickelt als bei höherstehenden. Seine erste Anlage erfolgt bei *Squalus* schon bei Embryonen von 8—12 mm Länge und bei *Bos taurus* erst bei Embryonen von 160—280 mm Länge. Seine Entwicklung wird eingeleitet durch eine vor allem bei Embryonen von den untersuchten Säugetieren besonders reichliche Zellimmigration in die betreffenden Hohlräume des zentralen Nervensystems. Diese Zellen ordnen sich hier in einer in der Längsachse des Tieres verlaufenden Reihe an und sind ohne Frage von Bedeutung für die Entwicklung des R.-F. Ob sie nur als Leitzellen aufzufassen sind oder aber zum Teil die Substanz des R.-F. bilden, ist nicht leicht mit Sicherheit zu entscheiden. Jedoch scheinen meine Präparate von Rinderembryonen eine mehr aktive Beteiligung dieser Zellen an der Entwicklung des R.-F. anzudeuten (s. Abb. 140, 144—155). Sie zeigen außerdem, daß wenigstens ein Teil der Fasern, die zum R.-F. zusammentreten, erst sekundär eine Verbindung mit dem Tectum erhält. Vor der Anlage des R.-F. sieht man zuweilen einzelne Mitosen in den fraglichen Zellen. Wenn der R.-F. angelegt ist, erkennt man in der Regel Degenerationserscheinungen in den zurückbleibenden Teilen der Zellen, die zur Bildung des R.-F. beigetragen haben, und kurz darauf sind diese Zellen sogar ganz verschwunden. Die einwandernden Zellen entwickeln sich ihrerseits aus den zen-

tralen Teilen der die betreffenden Hohlräume auskleidenden Ependymkeimschicht. Meine Präparate von Haiembryonen sprechen dafür, daß die zentral gerichteten Ausläufer von einigen Zellen, die den Z.-K. ventral begrenzen, eine Bedeutung für die Entwicklung des R.-F. haben (s. oben).

Eine spätere Einwanderung von ähnlichen Zellen, nachdem der R.-F. angelegt und seine Weiterentwicklung sichergestellt ist, habe ich in meinen Präparaten nie feststellen können.

Fötales und postfötales Dickenwachstum des R.-F. Nach seiner Anlage zeigt der R.-F. im fötalen und postfötalen Leben beträchtliches Dickenwachstum. Dieses Wachstum scheint bei niederen Vertebraten beträchtlicher zu sein als bei höherstehenden. Denn der R.-F. maß bei einem 12 mm langen Embryo von *Squalus* etwa $0,1 \mu$ im Durchmesser und bei erwachsenen Tieren etwa $4-6 \mu$. Bei Embryonen von *Bos taurus* hatte er (beim Anlegen) einen Querdurchmesser von $2-5 \mu$ und beim erwachsenen Tiere von $14-15 \mu$. Vereinzelte Beobachtungen über die Dicke des R.-F. bei sehr alten Tieren sprechen für eine allmähliche Abnahme seines Querdurchmessers in höherem Alter. Der R.-F. scheint also hinsichtlich seines Wachstums mit einem gewöhnlichen Nervenfasern übereinzustimmen. Er kann demnach schwerlich als Sekretionsprodukt aufgefaßt werden und man erhält für das Verständnis dieser Bildung eine gute Hilfe durch die Theorie *Studnička's* über das extracelluläre Protoplasma (s. oben und ⁹⁶).

Die Bedeutung des R.-F. als direktes oder indirektes Reizleitungsorgan. Alle die obenerwähnten Experimente an lebenden Tieren und die Untersuchungen, die festzustellen bezweckten, ob der R.-F. als direktes (optisches Reflexorgan — *Sargent*) oder indirektes Reizleitungsorgan (Reflexorgan für die Kontrollierung der Körperbewegungen — *Dendy, Nicholls, Tretjakoff* u. a.) eine Bedeutung hat, haben negative Resultate erbracht.

Daß der R.-F. nicht als Reizmittel in der oben angegebenen Richtung für die im Ependym des Z.-K. und der Fossa rhomboidea gelegenen Nerven-elemente aufgefaßt werden darf, scheinen mir folgende Tatsachen zu beweisen:

1. Bei einigen Tieren mit besonders ausgeprägten Körperbewegungen und -beugungen fehlt der R.-F., ohne daß gleichzeitig die intraependymalen Nerven-elemente fehlen (z. B. *Amphioxus*, *Sorex*, *Erinaceus* und *Homo*).

2. Die zahlreichen Nerven-elemente im Ependym der Fossa rhomboidea können auch bei stärkster Beugung des Körpers kaum mit dem R.-F. in Berührung kommen.

3. Die fraglichen Nerven-elemente zeigen bei einer Anzahl Tieren im Ependym des Z.-K. eine bestimmte Gruppierung, die nicht durch besondere Bewegungsformen dieser Tiere erklärt werden kann.

4. Der R.-F. ist im Lumen des Z.-K. nicht immer ausgestreckt und wahrscheinlich nie gespannt. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, daß man gelegentlich im Lumen des Z.-K. Windungen und Biegungen des R.-F. beobachten kann bei Individuen, bei denen der R.-F. intakt und das ganze Nervensystem in situ fixiert ist. Außerdem kann man feststellen, daß bei Tieren, die normalerweise starke Biegungen der Wirbelsäule haben und bei denen das ganze Nervensystem in situ fixiert wurde, niemals der R.-F. an den Stellen stärkster Biegung dem Ependym anliegt.

5. Die obenerwähnten Versuche, bei denen die Wirbelsäule in Zusammenhang mit dem Kopf und mit Einschluß des gesamten zentralen Nervensystems in verschiedenen scharfen Biegungen in mehreren Ebenen fixiert wurde, haben in keinem einzigen Falle gezeigt, daß an den Orten stärkster Beugung oder anderwärts der R.-F. mit der Ependymwand in Kontakt kommt. Wäre die Ansicht einer funktionellen Zusammengehörigkeit zwischen R.-F. und den i. N.-Z. richtig, so müßte ein solcher Kontakt oder eine solche Druckwirkung wenigstens bei der großen Anzahl Vertebraten erwartet werden, bei denen das freie Ende des zentral gerichteten Ausläufers der i. N.-Z. abgerundet oder keulenförmig verdickt ist und sich nicht so weit in das Lumen des Z.-K. erstreckt. Bei den anderen Tieren dagegen, bei denen der fragliche Ausläufer weit in das Lumen des Z.-K. hineinschießt und an seinem freien Ende zugespitzt ist, könnte ja an einen Reizeffekt gedacht werden, ohne daß sich der R.-F. der eigentlichen Ependymwand so weit zu nähern brauchte. Jedenfalls wird aber auch hier kein wirklicher Beweis für die Wirkung des Fadens in oben angegebenem Sinne geliefert.

6. Eine derartige Funktion würde weiterhin undenkbar sein bei allen den Vertebraten, bei denen der Wirbelkanal und damit das Rückenmark und der Z.-K. mehrere wenig oder gar nicht veränderliche Biegungen besitzt, z. B. Os lumbosacrale bei den Vögeln, Brust-Lenden- und Lenden-Kreuz-Biegung bei den Säugetieren.

Die oben erwähnten Resultate betreffs der Funktion des R.-F. stützen in gewisser Beziehung die von *Jordan* und *Kappers* bereits vertretene Auffassung (s. oben). Meine Resultate geben also keinen Anhaltspunkt dafür, daß man berechtigt ist, den R.-F. mit den intraependymalen Nervelementen des Z.-K. und der Medulla oblongata zu einem Sinnesorgan zusammenzustellen. Auch wenn man bei der Durchsicht der Präparate einzelner Tiere eine derartige Zusammenstellung für ansprechend halten könnte, so wird doch eine derartige Auffassung zweifelhaft, ja unmöglich, wenn man die Resultate von mehreren Tieren einander gegenüberstellt und die Verhältnisse eingehender prüft und überlegt. Die eigentliche Funktion des R.-F. ist mir daher immer noch unklar, auch wenn meine Untersuchungen nicht den Beweis dafür erbracht haben, daß der R.-F. bei keinem Wirbeltier in dem obenerwähnten Sinne fungieren kann. Damit will ich natürlich nicht gesagt haben, daß der R.-F. nicht ebenso wie der übrige Inhalt des Z.-K. die intraependymalen Nervelemente reizen könnte.

Über die Funktion der intraependymalen Nervelemente. Was andererseits die Funktion der intraependymalen Nervelemente betrifft, ob diese sämtlich in gleicher Weise fungieren, so kommen doch der Druck und die Verschiebung des Inhalts der Hohlräume des zentralen Nervensystems hierfür in Frage. Die Verschiebungen haben dabei vielleicht für die Individuen nicht so große Bedeutung wie der intracerebrale Druck. Außerdem muß man zugeben, daß sowohl bei vielen untersuchten Vertebraten die freien Enden der zentral gerichteten Ausläufer i. N.-Z. als auch die Endorgane der übrigen, oben beschriebenen intraependymalen Nervelemente der Form nach sehr geeignet sind, auf einen derartigen Druck zu reagieren. Die Tatsache, daß in gelungenen Golgi-Präparaten die peripheren Ausläufer der i. N.-Z., entweder direkt oder nach einer Umkoppelung, in der Medulla spinalis weit peripher, ja sogar bis zu den Meninges verfolgt werden können, scheint

mir sehr wichtig zu sein für die Deutung der Funktion der intraependymalen Nervelemente als Rezipienten eines Organs für die Regulierung des intracerebralen Druckes. Die Vermutung liegt nahe, das Ende der peripheren Ausläufer derjenigen Nervenzellen, deren zentrale Ausläufer die besonders für *Squalus* im Ependym der Fossa rhomboidea obenbeschriebenen Nervenendigungen bilden, im Gebiet der Plexus choriodei zu suchen.

Ich neige also zu der Ansicht, daß diese intraependymalen Nervelemente zusammen mit den u. a. von *Stöhr*^{88 u. 88a}) beschriebenen Nervelementen an den Blutgefäßen der Pia mater und des Plexus choriodeus ein Organ vor allem für die Regulierung des intracerebralen Druckes bilden.

F. Nachschrift zum Manuskript.

Am Ende des letztvergangenen Jahres (1921), als meine Untersuchungen bereits abgeschlossen und der schwedische Text der vorliegenden Abhandlung nahezu fertig war, erschien eine Abhandlung von *Kolmer*, betitelt „Das Sagittalorgan der Wirbeltiere“*), die einen Teil der von mir oben behandelten Probleme berührt. Da meine Resultate in vieler Beziehung von denen *Kolmers* abweichen, erscheint es angebracht, diese etwas näher zu prüfen.

Kolmers Untersuchungen umfassen 89 Tiere von verschiedenen Arten der verschiedenen Wirbeltierklassen. Im Text wird bei 19 Tieren angedeutet, daß i. N.-Z. vorhanden sind. Bei 5 von diesen, nämlich bei *Petromyzon*, *Myxine*, *Passer domesticus*, *Lacerta agilis* und *Capra hircus*, wird das Vorkommen derartiger Zellen durch Abbildungen wahrscheinlich gemacht. Ein eingehenderes Studium von Text und Abbildungen zeigt aber, daß, abgesehen von *Petromyzon* (Abb. 5), hauptsächlich die Form dieser Zellen es ist, die *Kolmer* veranlaßt, diesen Zellen nervöse Natur zuzusprechen. Nur bei *Passer domesticus* wird das Vorkommen von Körpern angedeutet, die „möglicherweise Nissl-Körper“ sind. *Kolmer*, der mit *Cajals* und *Bielschowskys* Imprägnationsmethoden gearbeitet hat, erwähnt im Texte nichts von der Neurofibrillenstruktur der i. N.-Z., und in seinen Abbildungen kann man eine solche höchstens annähernd vermuten — von Abb. 5 bei *Petromyzon* abgesehen. In dieser Abbildung sieht man Neurofibrillenstruktur bei 4 i. N.-Z., von denen aber nur eine einzige einen peripheren Ausläufer hat. Wenn man diesen Angaben *Kolmers* die schöne Abhandlung *Gustaf Retzius*^{74b u. 75}) gegenüberstellt, der bei *Petromyzon* die nervöse Natur der i. N.-Z. in Zweifel zieht, so scheint mir, daß man die Resultate *Kolmers* nicht als Beweis für das Vorkommen von i. N.-Z. bei den Vertebraten gelten lassen kann.

Aus meinen oben mitgeteilten Untersuchungen geht jedoch hervor, daß *Kolmers* Auffassung richtig ist, obwohl er keine wirklichen Beweise dafür erbracht hat. Denn diese Zellen sind tatsächlich Nervenzellen und wirklich in der ganzen Wirbeltierreihe vorkommende Bildungen. Für den Igel schreibt *Kolmer* u. a.: „Auch im Zentralkanal des Rückenmarks fand ich bei diesem Tiere keinerlei Zellen, welche den Charakter der birnenförmigen Sinneszellen tragen.“ Diese Angabe *Kolmers* paßt hervorragend zu seiner Ansicht über die Bedeutung des R.-F., daß nämlich die i. N.-Z. fehlen, sobald der R.-F. nicht vorhanden ist,

*) Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. 60. 1921.

denn *Kolmer* konnte bei diesem Tiere keinen R.-F. nachweisen. Daß der R.-F. dem Igel fehlt, kann ich bestätigen, dagegen habe ich bei recht vielen untersuchten Individuen von *Erinaceus* zahlreiche i. N.-Z. nachweisen können, auch solche mit Birnenform.

Meine Erfahrungen über das Vorkommen des R.-F. bewegen sich in derselben Richtung wie *Kolmers* Angaben, d. h. der R.-F. ist eine in der ganzen Wirbeltierreihe vorkommende Bildung. Das gilt auch für das subcommissurale Organ, das ich bei meinen Untersuchungen weniger berücksichtigt habe als *Kolmer*.

Hinsichtlich der Anheftung des R.-F. an das subcommissurale Organ kann ich mich weder der Auffassung von *Nicholls* und *Jordan* ganz anschließen, daß der R.-F. von Cilien der Zellen im subcommissuralen Organ gebildet wird und dadurch mit dem Epithel zusammenhängt, noch kann ich der Ansicht *Kolmers* beistimmen, wenn er etwa sagt: „Der R.-F. geht entweder kontinuierlich in einen zarten, oberflächlichen und strukturlosen Belag über, in anderen Fällen hingegen sehen wir ihn am gleichen Orte sich in ein System getrennter Fäden auflösen, welche einzeln den Köpfen der Epithelien anliegen.“ In einigen Fällen habe ich nämlich bei Embryonen von *Bos taurus* Zweige des R.-F. bis zwischen die Ependymzellen des subcommissuralen Organs deutlich verfolgen können, und in einem Falle war es mir sogar möglich, einige Zweige des R.-F. in die zentralen Ausläufer von tief in der hohen Ependymschicht liegenden langgestreckten Zellen übergehen zu sehen.

Kolmer diskutiert eingehend das Problem der Entwicklung des R.-F., ohne zu einem eigentlichen Resultat zu kommen. Ja, jeder, der sich mit der Entwicklung des R.-F. beschäftigt hat, wird zugeben müssen, daß der Entwicklungsmodus etwas mystisch ist, besonders wenn man, wie *Kolmer*, den bereits von *Sargent* u. a. nachgewiesenen und auch von mir studierten und oben beschriebenen freien Zellen jede Bedeutung für die Entwicklung des R.-F. abspricht. *Kolmer* hält es für wahrscheinlich, daß der R.-F. „seinem Wesen und wahrscheinlich auch seiner Genese nach eine weitgehende Analogie mit den Cuticulargebilden des Labyrinths aufweist“.

Gegenüber dem Ausspruche *Kolmers*, daß der „R.-F. sich fast immer mehr oberflächlich färbt“, möchte ich meine Erfahrungen über das Verhalten des Fadens zu Toluidinblau, die mehrmals obenerwähnte intensivere Färbung des zentralen Teils gegenüber dem peripheren Teil usw. hervorheben. Meine Erfahrungen stimmen aber völlig mit denen *Kolmers* überein, daß der Faden keine elastischen Eigenschaften zu haben scheint (er ist bisweilen eher spröde), daß er nicht nervöser Art ist und daß der Faden keine eigentliche caudale Anheftung hat. Zu der letzt-erwähnten Angabe möchte ich hinzufügen, daß bei den obenerwähnten operierten Individuen von *Osmerus* der R.-F. sowohl hinter als auch vor der Operationsstelle den gewöhnlichen (bei intakten Individuen vorhandenen) gestreckten Verlauf zeigte — abgesehen von den der Operationsstelle zunächstliegenden Stellen.

Die Angabe *Dendys*, daß dort, wo sich das Rückenmark regeneriert, wie bei *Lacerta*, der R.-F. in dem regenerierten Stück ebenfalls angespannt vorgefunden wird, wird von *Kolmer* durchaus bestätigt und damit begründet, daß die Spannung des Fadens durch die Flimmerkräfte des Ependyms erfolgt. Trifft dies zu, so ist *Kolmers* Ansicht nicht leicht zu vereinbaren mit der bereits bei *Osmerus* oben hervorgehobenen Tatsache, daß mehrere Tage nach der Durchschneidung des Fadens das kraniale Ende des caudal verlaufenden Fadens sich nicht nennenswert von der Operationsstelle in caudaler Richtung zurückgezogen hat. Voraus-

gesetzt, daß *Kolmers* Ansicht vom Effekt der Flimmerbewegung richtig ist, so muß also der Effekt der Flimmerhaare im Z.-K. bei *Osmerus* sehr gering sein und mit einer sehr geringen Biegbarkheit des R.-F. zusammentreffen. Flimmerbewegungen der Cilien am Ependym des Z.-K. konnte ich nie beobachten, dagegen war es nicht schwer, solche Bewegungen am Ependym der Hirnventrikel nachzuweisen (s. auch S. 705 bei *Kolmer*).

Gestützt auf das oben genannte Material und auf die wenigen Wahrnehmungen über das Vorkommen der i. N.-Z. schreibt *Kolmer* in seiner Zusammenfassung: „Bei allen Wirbeltieren gelingt es, in der Auskleidung des Rückenmarkskanals, etwa vom Beginn der trichterförmigen Verengung am Calamus scriptorius angefangen, bei manchen bis zum caudalen Ende, Sinneszellen durch ihre bauchige Form, ihren flaschenförmigen Halsteil unterhalb der Insertion in das als Membrana reticularis oder limitans interna zu bezeichnende Mosaik des Ependyms charakterisiert, nachzuweisen. Es finden sich diese Zellen bei manchen Tieren sehr reichlich, in anderen Fällen sind sie sehr vereinzelt. Man vermißt sie vollständig bei jenen Tieren, welche keinen R.-F. besitzen (*Phocoena*, Mensch, Igel) und die gleichzeitig auch ein mehr oder weniger rudimentäres S.C.O. besitzen. Das darf als weiterer Beweis dafür angesehen werden, daß die Sinneszellen, der Faden und das S.C.O. Dinge von einer gemeinsamen Bedeutung sind, da sie sich gemeinsam entwickeln oder gemeinsam zurückgebildet sind.“

Selbst wenn man sich verpflichtet fühlt, sich gegen *Kolmers* Art aufzulehnen, der auf Grund so weniger und dabei so wenig haltbarer Detailobservationen so weitgehende Schlüsse über das Vorkommen der i. N.-Z. zieht, so muß ich doch in Hinsicht auf meine oben niedergelegten ausführlichen Untersuchungen gestehen, daß *Kolmer* im Prophezeien des allgemeinen Vorkommens der i. N.-Z. glücklich gewesen ist. Denn die i. N.-Z. sind tatsächlich in der ganzen Wirbeltierreihe ganz allgemein vorkommende Bildungen. Ja, sie kommen sogar, im Gegensatz zu *Kolmers* Angaben, auch bei solchen Individuen vor, bei denen der R.-F. fehlt, der Z.-K. aber vorhanden ist, wie z. B. *Homo* — d. h. bei jungen Individuen, bei denen der Z.-K. noch nicht verwachsen ist —, Igel und *Amphioxus*. Beim Igel sind die i. N.-Z. stellenweise sogar recht zahlreich. Verhältnismäßig noch zahlreichere i. N.-Z. hat *Amphioxus*, dem ebenfalls gleichzeitig der R.-F. fehlt. Die i. N.-Z. treten auch — ontogenetisch betrachtet — wesentlich früher auf als der R.-F.; so waren sie z. B. bereits bei einem 13 mm langen Kaniichenembryo vorhanden, während der R.-F. bei diesem Tiere erst bei 60—70 mm langen Embryonen auftritt. Außerdem treten zahlreiche i. N.-Z. im Ependym der Fossa rhomboidea auf bei Tieren, denen der Z.-K. fehlt (z. B. *Sorex*), oder bei denen der Z.-K. zwar vorhanden ist, sein Ependym aber nur spärliche i. N.-Z. aufweist (z. B. *Salmo trutta fario*). Derartige bilateral im Ependym der Fossa rhomboidea vorkommende i. N.-Z. können kaum als Rezipienten für Reizungen aufgefaßt werden, die vom R.-F. ausgehen. Die bedeutsamsten Beweise *Kolmers* für die Zusammengehörigkeit des R.-F. und der i. N.-Z. sind also nicht stichhaltig. Dagegen scheint, wie bereits früher von mehreren Forschern hervorgehoben wurde, die Zusammengehörigkeit des S.C.O. mit dem R.-F. mehr begründet zu sein.

Weiter ist zu erwähnen, daß man, nur gestützt auf die Charaktere, die *Kolmer* für die i. N.-Z. hervorhebt: „... durch ihre bauchige Form, ihren

flaschenförmigen Halsteil unterhalb der Insertion . . .“, sicher nicht bei so vielen Tieren i. N.-Z. finden würde, die aber tatsächlich i. N.-Z. besitzen. Daß mehrere Tiere i. N.-Z. haben, die keine bauchige Form und keinen flaschenförmigen Halsteil besitzen, und betreffs ihrer Form von gewöhnlichen Ependymzellen nicht wesentlich abweichen, geht aus meinen Ausführungen zur Genüge hervor. Bei diesen Tieren müssen Nissl-Färbungen und verschiedene Imprägnationsmethoden herangezogen werden, um das Vorkommen von i. N.-Z. mit Sicherheit feststellen zu können.

Kolmer sieht eine Stütze für die Meinung, daß der R.-F. und die i. N.-Z. auf dem Wege eines Reflexes eine Korrektur der Bewegung der Wirbelsäule veranlassen, in der Wahrnehmung, daß Schlangen besonders zahlreiche i. N.-Z. in Höhe des Calamus scriptorius haben. *Kolmer* meint also, daß die Anordnung der i. N.-Z. so erfolgt, daß sie für die individuelle Bewegungsform des betreffenden Tieres am besten geeignet ist. Daß man aber in der mehr oder weniger hohen Frequenz der i. N.-Z. in der Längs- oder Querrichtung des Z.-K. eine Stütze für die Funktion dieser Zellen in der von *Kolmer* angegebenen Richtung nicht erhalten kann, geht u. a. auch daraus hervor, daß die fraglichen Zellen bei einigen Vögeln zahlreicher im Gebiete des unbeweglichen Teils der Wirbelsäule sind, während bei anderen Vögeln gerade das umgekehrte Verhältnis zutrifft. Außerdem kommen in der Verteilung so viele individuelle und Artverschiedenheiten vor, daß allgemeine Schlüsse über die Funktion der Zellen aus ihrer Anordnung nicht gezogen werden können.

Was weiterhin den von *Kolmer* gewählten Namen „Sagittalorgan“ für diese verschiedenen Bildungen (R.-F., S.C.O. und i. N.-Z.) betrifft, so schließt das nicht aus, daß diese Bildungen zu den von *Studnička* „Parietalorgan“ genannten zentralen Sinnesorganen gehören. Wenn man schon durchaus für „Parietalorgan“ einen anderen Ausdruck wählen will, dann würde die Bezeichnung „Medianorgan“ die Lage der Bildungen besser kennzeichnen, denn sie liegen ja in einer Sagittalebene, die tatsächlich die Medianebene ist. Mir scheint jedoch die Bezeichnung Medianorgan im wesentlichen nur für S.C.O. und R.-F. zuzutreffen, denn die i. N.-Z. sind ja keine für den Z.-K. spezifische Bildungen und scheinen mit dem R.-F. wenig zu tun zu haben. So hat ja bereits Ammocoetes besonders kräftig entwickelte i. N.-Z. im Ependym der Fossa rhomboidea, und auch bei den meisten anderen Vertebraten kommen i. N.-Z. hier mehr oder weniger zahlreich vor. Dieses stimmt nicht ganz überein mit der Meinung *Kolmers* (S. 712): „ . . . In den übrigen Partien vermissen wir derartige Elemente (gemeint sind die Sinneszellen des Z.-K.) vollkommen.“ Ja, nach meinen Wahrnehmungen finden sich i. N.-Z. vereinzelt auch im Ependym der Hirnventrikel (s. Abb. 37). Es scheint mir eher, als ob die ganze Ependymbekleidung der Hohlräume des zentralen Nervensystems als eine sensible Fläche aufzufassen ist, die mit verschiedenen zahlreichen rezipierenden Nervelementen an verschiedenen Stellen ausgestattet ist. Denn die Anordnung der i. N.-Z. variiert ja nicht nur bei Tieren verschiedener Art, sondern auch individuell recht deutlich. Ob diese sensible Fläche möglicherweise die vom R.-F. ausgehenden Reize rezipieren kann oder nicht, lasse ich dahingestellt; Beweise für eine derartige Annahme sind jedenfalls noch nicht erbracht. Daß diese Theorie auf den ersten Eindruck sehr anspricht, hat veranlaßt, daß mehrere Forscher sie gutgeheißen haben. Bei näherer Prüfung erweist sie sich jedoch unhaltbar. Ausführlicheres hierüber s. in der Zusammenfassung.

G. Tabelle.

Diese Tabelle zeigt das Vorkommen des *Reissnerschen Fadens* (R.-F.), seine Mächtigkeit in μ (in horizontaler und vertikaler Richtung), das Vorkommen und die Größe (Horizontal- und Vertikaldurchmesser in μ) des Zentralkanal (Z.-K.), einige mehr hervortretende Variationen dieser Bildung und das Vorkommen von intraependymalen Nervenzellen (i. N.-Z.)

	Durchmesser (in μ) des		Variationen des Durchmessers (in μ) des		I. N.-Z. sind nachge- wiesen	Anmerkungen
	R.-F.	Z.-K.	R.-F.	Z.-K.		
<i>Amphioxus lanceolatus</i>	—	10×9^1	—	$9^1 \times 6^2$ — 12×9	1	{ Die Maße stammen von einem 7,5 cm langen Lanzettfisch.
<i>Myxine glutinosa</i> . . .	3×3^1	12×22	—	—	1	
<i>Ammocoetes</i> (2,5—16 cm Länge)	1×1	14×9	—	8×4 — 16×10	1	{ 12 cm langes Indi- viduum.
<i>Petromyzon fluviatilis</i> .	3×3	12×24	—	10×15	1	
<i>Myliobatis aquila</i> . . .	7×6	75×60	—	—	1	
<i>Trygon pastinaca</i> . . .	4×4	39×75	—	59×81	1 (—) ³⁾	
<i>Trygon violacea</i>	3×3	36×63	—	—	1	
<i>Raja batis</i>	3×3	40×32	—	—	1	
<i>Raja radiata</i>	3×3	45×9	6×6	36×9 — 90×33	1	
<i>Raja clavata</i>	4×4	27×60	3×3	30×9 — 54×36	1	
<i>Spinax niger</i>	8×8	60×39	—	54×50	1	
<i>Spinax niger</i> -Embryo- nen 6—12 cm Länge	3×3	54×96	4×4	30×108 — 84×120	1	
<i>Centrophorus granulosus</i>	4×4	105×180	—	132×210	1 (—)	
<i>Squalus acanthias</i> . . .	4×6	36×60	—	45×36	1	
<i>Squalus acanthias</i> -Em- bryonen 15—22 cm .	3×4	24×60	3×3 — 5×6	21×24 — 60×66	1	
<i>Squalus acanthias</i> -Em- bryonen 20 mm . . .	$0,5 \times 0,5$	30×324	—	—	(?) ⁴⁾	
<i>Notidanus cinereus</i> (<i>Heptanchus</i>)	3×3	156×90	—	108×75 — 186×96	1	
<i>Notidanus griseus</i> (<i>He- xanchus</i>)	(?) ¹⁾	435×900	—	—	1	
<i>Mustelus laevis</i>	9×7	42×78	10×7	51×24	1 (—)	
<i>Sphyrna zygaena</i> . . .	6×6	36×36	—	—	1	
<i>Galeus canis</i>	6×6	44×51	—	42×45	1 (—)	
<i>Chimaera monstrosa</i> . .	4×9	25×15	—	33×42	1	
<i>Acipenser sturio</i> . . .	7×4	45×30	6×5	33×33 — 27×45	1	
<i>Cyclotone microdon</i> . .	$0,5 \times 0,5$	6×6	—	5×2 — 2×8	1	
<i>Cyclotone signata</i> . . .	$1 \times 0,3$	2×5	—	—	1	
<i>Clupea harengus</i>	2×2	21×24	—	18×27 — 24×27	(?) ⁴⁾	
<i>Clupea sprattus</i>	2×2	20×18	—	—	(?)	
<i>Coregonus lavaretus</i> . .	3×3	28×30	—	42×96	(?)	
<i>Argentina sphyraena</i> . .	4×4	60×141	—	120×210	1	

¹⁾ Die erste Zahl, z. B. bei 10×9 gibt den Horizontaldurchmesser und die zweite Zahl den Vertikaldurchmesser in μ an. Dasselbe trifft auch für die Kolonnen unter R.-F. zu.

²⁾ Die Bezeichnung 9×6 — 12×9 gibt an, daß der Durchmesser des Lumens des Z.-K. bei dem untersuchten Material zwischen 9×6 und 12×9 schwankt. Das gilt auch im Prinzip für R.-F. Ist nur eine Angabe, z. B. 10×15 oder 59×81 , vorhanden, so deutet dieses darauf hin, daß entweder ein sehr kleines oder ein sehr großes Lumen wahrgenommen wurde. Das gilt auch im Prinzip für R.-F.

³⁾ Die Bezeichnung 1 (—) gibt an, daß die i. N.-Z. in dem untersuchten Material sehr spärlich vorhanden waren.

⁴⁾ Die Bezeichnung (?) deutet darauf hin, daß meine Resultate weder das Vorkommen noch das Fehlen der fraglichen Bildungen völlig zu beweisen imstande sind.

	Durchmesser (in μ) des		Variationen des Durchmessers (in μ) des		I. N.-Z. sind nachge- wiesen	Anmerkungen
	R.-F.	Z.-K.	R.-F.	Z.-K.		
<i>Osmerus eperlanus</i> . . .	2×2	27×12	—	7×39—30×18	1	
<i>Salmo trutta fario</i> . . .	2×2	21×24	—	12×27	1	
<i>Salmo salar</i>	3×3	38×62	—	72×34	1	
<i>Esox lucius</i>	2×2	26×69	—	66×48	1	
<i>Silurus glanis</i>	3×4	33×51	—	27×63—33×81	1	
<i>Abramis brama</i>	2×3	30×33	—	21×45—60×24	1	
<i>Alburnus alburnus</i> . . .	2×2	12×18	—	9×9—30×15	1 (—)	
<i>Leuciscus rutilus</i> . . .	2×2	10×32	—	—	1	
<i>Tinca tinca</i>	2×2	60×42	—	—	1	
<i>Cyprinus auratus</i> . . .	(?)	84×60	—	—	1	
<i>Cyprinus carassius</i> f. <i>gibelio</i> Bloch	1×1	6×10	—	4×7—20×28	1	
<i>Cyprinus carassius</i> . . .	2×2	12×15	—	—	1	
<i>Anguilla anguilla</i> . . .	3×3	39×30	—	30×15	1	
<i>Exocoetus volitans</i> . . .	3×3	18×24	—	15×18	1	
<i>Nerophis aequoreus</i> . . .	1×1	15×14	—	6×15—21×27	1	
<i>Nerophis ophidion</i> . . .	1×1	7×16	—	—	1	
<i>Siphostoma typhle</i> . . .	1,5×1	6×14	—	—	1	
<i>Syngnathus acus</i>	2×2	10×13	—	5×24—7×39	1	
<i>Spinachia spinachia</i> . . .	2×2	24×33	—	15×36—39×30	1	
<i>Gasterosteus pungitius</i> . .	1×1	18×7	—	—	1	
<i>Gasterosteus aculeatus</i> . .	1×1	14×8	—	—	1	
<i>Gaidropsarus mustela</i> . .	3×3	10×20	—	7×24—12×30	1	
<i>Gaidropsarus cimbrius</i> . .	2×2	14×18	—	—	1	
<i>Lota lota</i>	3×3	36×40	—	—	1	
<i>Molva molva</i> (15 cm Länge)	3×3	18×21	—	15×27	1	R.-F. liegt in Schlingen.
<i>Molva molva</i> (65 cm Länge)	6×6	24×30	—	18×39—39×30	1	
<i>Merluccius merluccius</i> . .	3×3	36×24	5×5	21×27—105×111	1	R.-F. hat Scheiden!
<i>Gadus esmarkii</i>	3×3	18×39	—	—	1	
<i>Gadus pollachius</i>	5×5	24×21	—	12×30	1	
<i>Gadus virens</i>	4×4	24×15	—	18×9	1	
<i>Gadus callarius</i>	3×2	21×36	—	18×39—39×30	1	
<i>Gadus minutus</i>	3×3	21×24	—	—	1	
<i>Gadus luscus</i>	4×4	15×15	—	—	1	
<i>Gadus merlangus</i>	3×3	12×18	—	8×15—24×18	1	
<i>Pleuronectes limanda</i> . . .	3×3	24×27	—	12×30—21×4	1	
<i>Pleuronectes platessa</i> . .	3×3	20×32	—	40×8	1	
<i>Pleuronectes kitt</i>	2×2	33×18	—	—	1	
<i>Arnoglossus laterna</i> . . .	1×1	9×24	—	7×10—39×78	1	
<i>Hippoglossoides plates-</i> <i>soides</i>	3×3	12×27	—	18×21—60×159	(?)	
<i>Hippoglossus hippogloss.</i>	2×3	17×23	—	—	1	
<i>Lycodes gracilis</i>	3×3	18×37	—	18×57	1	
<i>Zoarces viviparus</i>	2×2	18×12	—	9×36—5×30	1	
<i>Pholis gunellus</i>	2×2	9×30	3×3	9×24—30×30	1	
<i>Anarrhichas lupus</i>	2,5×2,5	19×24	4×4—3×1,5	15×30—21×30	1	
<i>Callionymus lyra</i>	2×2	20×51	4×5	25×27—27×36	1	
<i>Trigla gurnardus</i>	3×3	27×33	—	42×30	1 (—)	
<i>Cottus bubalis</i>	2×2	36×15	—	5×36—18×60	1	

	Durchmesser (in μ) des		Variationen des Durchmessers (in μ) des		L. N.-Z. sind nachge- wiesen	Anmerkungen
	R.-F.	Z.-K.	R.-F.	Z.-K.		
<i>Cottus scorpius</i>	3×3	25×51	—	18×42—44×78	1	
<i>Sebaster viviparus</i> . . .	2×3	27×15	2×2—6×4	24×12—54×33	1	
<i>Gobius flavescens</i> . . .	0,3×0,3	15×18	—	16×15	1	
<i>Gobius niger</i>	2×2	18×21	—	12×18	1	
<i>Gobius pictus</i>	1×1	16×16	—	—	1	
<i>Scomber scomber</i>	2×2	18×45	—	10×33—51×33	1	
<i>Trachurus trachurus</i> . .	3×3	51×17	—	48×16—45×23	1	
<i>Lucioperca lucioperca</i> . .	8×7	51×30	—	63×36	1	
<i>Perca fluviatilis</i>	4×3	27×39	—	30×66	1	
<i>Labrus exoletus</i>	3×3	24×9	—	7×120	1	
<i>Labrus melops</i>	3×3	27×51	—	19×60—45×39	1	
<i>Labrus rupestris</i>	3×3	30×30	—	12×24—30×42	1	
<i>Labrus mixtus</i>	3×3	21×30	—	27×40	1	
<i>Labrus berggylta</i>	3×3	14×48	—	9×36	1	
<i>Ceratodus Forsteri</i> . . .	4×6	21×111	6×6	81×216	1 (—)	
<i>Amblystoma mexicanum</i> . .	2×2	19×24	—	24×27	1	
<i>Molge vulgaris</i>	1×1	18×27	—	16×16	1	
<i>Molge palustris</i>	1×1	6×30	—	—	1	
<i>Salamandra maculosa</i> . . .	2×2	10×18	—	—	1	
<i>Rana arvalis</i>	2×2	36×24	—	24×24	1	
<i>Rana temporaria</i> (3 cm)	2×2	18×30	—	15×40	1	
<i>Rana esculenta</i>	2×2	27×42	—	18×38	1	
<i>Hyla arborea</i>	2×2	40×38	—	—	1	
<i>Bufo calamita</i>	2×2	20×32	—	—	1	
<i>Bufo viridis</i>	2×2	40×15	—	—	1	
<i>Bufo bufo</i>	1×3	27×46	—	—	1	
<i>Lacerta vivipara</i>	3×2	15×12	—	10×9—22×30	1	
<i>Lacerta agilis</i>	2×2	9×4	—	12×6	1	
<i>Ascalabotes fascicularis</i> .	2×2	8×12	—	—	(?)	Das Material ist nicht gut konserviert.
<i>Anguis fragilis</i>	1×1	8×14	—	—	1	
<i>Vipera berus</i>	2×2	15×15	—	8×20	1	
<i>Coronella austriaca</i> . . .	2×2	14×8	—	17×4	1	
<i>Tropidonotus natrix</i> . . .	2×2	15×6	—	36×7	1	
<i>Chrysemys marginata</i> . . .	4×5	24×57	—	33×27—30×84	1	
<i>Emys europaea</i>	4×4	30×48	—	—	1	
<i>Testudo graeca</i>	5×5	66×45	—	—	(?)	Das Material ist weniger gut.
<i>Alligator mississippiensis</i> .	4×4	45×39	—	36×30	1	
<i>Uria troille</i>	3×3	40×28	—	15×24—56×48	1	
<i>Sterna hirundo</i>	1,5×1,5	15×12	2×2	9×27—36×15	1	
<i>Sterna minuta</i>	2×2	7×30	—	—	1	R.-F. ist in einigen Präparaten schwarz imprägniert.
<i>Larus argentatus</i>	2×2	15×29	—	9×18—21×21	1	
<i>Larus ridibundus</i>	2×2	18×33	—	8×42—45×39	1	Die Weite des Z.-K. variiert stark.
<i>Anser anser</i>	3×3	33×33	—	—	1	
<i>Cygnus olor</i>	2×2	10×24	—	9×18—33×6	1	
<i>Anas platyrhyncha</i>	2×2	12×12	—	15×24	1	
<i>Somateria molissima</i> . . .	2×2	8×24	—	7×21—10×36	1	
<i>Scelopax rusticola</i>	2×1	12×24	3×3	—	1	
<i>Totanus totanus</i>	2×2	9×18	—	4×24—15×10	1	
<i>Numenius phaeopus</i> . . .	2×2	2×30	1×1	1×21—45×90	1	
<i>Numenius arquatus</i> . . .	3×3	26×24	2×2	18×21—21×30	1	

	Durchmesser (in μ) des		Variationen des Durchmessers (in μ) des		I. N.-Z. sind nachge- wiesen	Anmerkungen
	R.-F.	Z.-K.	R.-F.	Z.-K.		
Haematopus ostralegus	3×2	12×33	3×4	12×27—24×27	1	
Lyrurus tetrax	2×2	12×24	—	18×24	1	
Meleagris gallopavo	3×3	30×33	2×4—4×3	28×30—36×51	1	
Gallus domesticus	3×3	63×16	—	19×45—27×24	1	
Perdix perdix	2×2	14×33	—	—	1	
Columba aenas	(?)	5×15	—	1×8—15×27	1	
Circus aeruginosus	2×2	34×58	—	9×27—50×78	(?)	
Accipiter nisus	2×3	9×24	—	9×12—18×13	1	
Milvus milvus	2×2	84×24	—	—	1	
Pandion haliaetus	2×2	18×18	—	12×4—27×21	1	
Buteo buteo	4×3	18×30	—	—	1	
Falco subbuteo	3×3	39×69	—	36×45—54×96	1	
Falco merula	2×2,5	51×87	2×2—7×7	18×24—63×93	1	
Falco peregrinus	3×3	15×39	—	33×12—42×27	1	
Syrnium aluco	2×2	12×33	3×3	12×9—33×33	1	
Asio accipitrinus	2×2	27×48	—	5×27—21×60	1	
Asio otus	2×2	13×16	—	12×9—15×18	1	
Dryobates major	(?)	12×36	—	12×12—15×30	1	
Picus viridis	2×2	12×12	—	10×8—540×300	(?)	An einer Stelle findet sich eine starke Er- weiterung des Z.-K.
Eustephanus galeritus	2×1	6×24	—	4×27	1	
Dendralagus rubecula	1×1	12×12	—	2×18—12×18	1	
Turdus pilaris	4×4	21×27	—	27×72	1	
Regulus regulus	1×1	2×15	—	—	1	
Parus caeruleus	(?)	3×12	—	—	1	
Parus palustris	(?)	5×12	—	—	1	
Parus major	(?)	6×8	—	—	1	
Sitta europaea	1×1	2×10	—	—	1	
Motacilla alba	1×1	2×21	—	1×9	1	Z.-K. ist teilweise verwachsen.
Emberiza hortulana	(?)	6×8	—	—	1	
Passer domesticus	2×2	9×12	—	7×15—15×33	1	
Passer montanus	(?)	2×6	—	—	1 (—)	dgl.
Chloris chloris	1×1	7×10	—	6×9—6×12	1	
Linota cannabina	(?)	6×24	—	—	1	dgl.
Carduelis carduelis	1×1	27×18	—	—	1	
Pyrrhula pyrrhula	1×1	15×18	—	4×6—39×24	1	
Pinicola enucleator	1×1	12×12	—	12×4—8×14	1	
Serinus canaria	1×1	15×17	—	—	(?)	
Pica pica	3×2	18×30	—	—	1	
Coloeus monedula	2×2	16×18	—	2×12	1	Es wurden zahlreiche gut fixierte Längs- schnitte untersucht, ohne daß der R.-F. nachgewiesen werd. konnte. An einigen Stellen war das Se- kret deutlich faden- förmig.
Corvus cornix	2×2	30×48	—	4×9—81×96	1	
Ornithorhynchus anatin.	(?)	20×60	—	33×30	(?)	
Didelphys virginiana	4×4	39×45	—	45×51—21×63	1	
Halimastur Benetti	6×6	15×51	—	18—48	1	
Erinaceus europaeus	(?)	10×120	—	24×102	1	
Sorex minutus	—	—	—	—	1	I. N.-Z. im Ependym der Fossa rhomboid.
Talpa europaea	(?)	5×102	—	—	1	
Vespertilio mystacinus	(?)	6×26	—	3×66	1	
Synotis barbastellus	(?)	3×30	—	—	1	
Vesperugo pipistrellus	(?)	3×34	—	—	1	

	Durchmesser (in μ) des		Variationen des Durchmessers (in μ) des		I. N.-Z. sind nachge- wiesen	Anmerkungen
	R.-F.	Z.-K.	R.-F.	Z.-K.		
Dasyptes setosus (Em- bryo 8 cm lang) . . .	3×3	60×150	—	—	1	
Sciurus vulgaris . . .	1,5×1,5	36×51	2×3	60×81	1	
Mus musculus	1,5×1,5	18×30	—	6×40—8×52	1	
Mus musculus var. al- bus	1,5×1,5	18×51	1×1	3×45—4×96	1	
Mus decumanus	2×2	33×93	3×2	33×84	1	
Mus norvegicus	2×2	25×62	—	—	1	
Mus rattus	2×2	40×82	—	—	1	
Lepus timidus (neuge- geboren)	4×4	159×86	—	135×18	1	
Lepus cuniculus (er- wachsen)	3×6	72×180	3×9—24×24	45×105—249×189	1	
Lepus cuniculus (3 Wo- chen alt)	4×4	105×276	—	15×180—165×273	1	
Lepus cuniculus (neu- geboren)	3×3	66×150	—	51×165—90×165	1	
Lepus cuniculus (Em- bryo 4,5 cm lang) . .	—	45×270	—	—	1	
Lepus cuniculus (Em- bryo 5,3 cm lang) . .	—	57×135	—	—	1	
Cavia cobaya	3×3	111×75	—	—	1	
Phoca vitulina	4×4	18×135	—	27×250—207×270	1	
Lynx lynx	4×4	195×90	—	280×105	1	
Felix domestica (er- wachsen)	9×6	234×156	—	139×249	1	
Felix domestica (neu- geboren)	9×6	21×120	—	18×105—24×120	1	
Mustela erminea . . .	2×2	18×117	—	15×120—30×114	1	
Lutra lutra (Embryo 6,5 cm lang)	(?)	21×45	—	33×48	1	
Canis familiaris (er- wachsen)	6×6	270×390	—	—	1	
Canis familiaris (neu- geboren)	5×5	15×105	—	12×135	1	
Canis lupus	6×5	270×81	—	321×21	1	
Canis aureus	5×5	360×420	—	540×90	1	
Equus caballus (er- wachsen)	18×18	200×309	—	135×240	1	
Equus caballus (6 Mo- nate alt)	16×16	—	12×12—40×40	—	1	
Equus asinus	8×8	234×114	6×6	222×132	1	Ausgetragen. Foetus.
Bos taurus (erwachs.) .	14×14	264×96	10×10	54×204	1	
Bos taurus (neugebor.)	15×15	150×81	—	185×91	1	
Bos taurus (Embryo 21 cm)	—	63×66	—	—	1	
Bos taurus (Embryo 22 cm)	—	68×70	—	—	1	
Bos taurus (Embryo 25 cm)	6×6	75×80	—	—	1	R.-F. ist doppelt konturiert.
Bison bonasus	10×15	140×200	—	135×160—160×200	1	

	Durchmesser (in μ) des		Variationen des Durchmessers (in μ) des		I. N.-Z. sind nachge- wiesen	Anmerkungen
	R.-F.	Z.-K.	R.-F.	Z.-K.		
Capra hircus	5×5	180×102	—	183×78	1	Längsschnitte.
Capra hircus (Embryo 10 cm lang).	—	—	—	—	1	
Ovis aries	5×5	160×120	—	170×82	1	
Rangifer tarandus . . .	8×8	300×240	—	—	1	
Alces alces	(?)	102×195	—	—	1	
Alces alces (Embryo 75 cm lang).	(?)	141×420	—	—	1	Z.-K. ist zum größten Teil verwachsen.
Capreolus capreolus . .	7×7	6×330	—	18×90	1	
Dama dama	(?)	90×165	—	—	1	
Sus scrofa domestica . .	8×8	42×195	—	33×9—78×200	1	
Sus scrofa domestica (Embryo 10 cm lang)	2×2	57×42	—	—	1	
Cynocephalus babuin . .	3×3	36×30	—	180×90	1	
Macacus rhesus	5×5	170×190	—	150×75—105×180	1	
Cercopithecus mona . .	4×4	126×216	—	—	1	
Homo, 30 Jahre alt . . .	—	—	—	—	1	
Homo, 14 Jahre alt . . .	—	75×90	—	—	1	
Homo (Embryo 35 cm lang)	—	120×36	—	—	1	
Homo (Embryo 31 cm lang).	—	69×111	—	90×120	1	
Homo (Embryo 25 cm lang)	—	50×82	—	84×70	1	

Literaturverzeichnis.

¹⁾ Agduhr, Erik, Studien über die postembryonale Entwicklung der Neuronen und die Verteilung der Neuriten in den Wurzeln der Spinalnerven. Journ. f. Psychol. u. Neurol. **25**, Erg.-Heft 2. 1920. — ²⁾ Agduhr, Erik, Einige wahrscheinlich bisher unbekannte, teils im Ependym gelegene, teils in die Fossa rhomboidea hineinragende Nervenendigungen. Acta zoologica. Stockholm 1922. — ³⁾ Agduhr, Erik, Über die plurisegmentelle Innervation der einzelnen quergestreiften Muskelfasern. Anatomischer Anzeiger **52**. 1919. — ⁴⁾ Antoni, N. R. E., Über Rückenmarkstumoren und Neurofibrome. (Studien zur pathologischen Anatomie und Embryogenese.) München 1920. — ⁵⁾ Askanazy, M., Zur Physiologie und Pathologie der Plexus chorioidei. Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. **25**, Erg.-Heft; S. 85. 1914. — ⁶⁾ Ayers, H., The ventricular Fibres of the Brain of Myxinoidea. Anatomischer Anzeiger **32**. 1908. — ⁷⁾ Bauer-Jokl, Über das sogenannte Subkommissuralorgan. Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wien. Univ. 1917, S. 41. — ⁸⁾ Biach, P., Vergleichend anatomische Untersuchungen über den Bau des Zentralkanal bei den Säugetieren. Arb. neurol. Inst. Wien. Univ. **13**. 1907. — ⁹⁾ Boeck, J., Die Bedeutung des Infundibulums in der Entwicklung der Knochenfische. Anatomischer Anzeiger **20**. 1901. — ¹⁰⁾ Boeck, J., Über das Homologon des Infundibularorgans bei Amphioxus lanceolatus. Anatomischer Anzeiger **21**. 1902. — ¹¹⁾ Boeck, J., Das Infundibularorgan im Gehirn des Amphioxus. Anatomischer Anzeiger **32**. 1908. — ¹²⁾ Bonne, Note sur le mode d'obliteration partielle du canal épendymaire embryonnaire. Revue neurologique. Année **7**. 1899. — ¹³⁾ Bonne, Développement des cellules épendymaires. Bibliographie anatomique. Tom. 7. 1899, b. — ¹⁴⁾ Ciaccio, C., und Scaglione, S. Beitrag zur cellularen Physiopathologie der Plexus chorioidei. Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. **55**. 1912. — ¹⁵⁾ Dammermann, K., Der Saccus vasculosus der Fische ein Tiefenorgan. Zeitschr. f. wiss. Zool. **96**. 1910. — ¹⁶⁾ Dendy, A., On a pair of ciliated Grooves in the Brain of the Ammocoetes. Proc. of the roy. soc. of London.

- Vol. 69. 1902. — ¹⁷⁾ *Dendy, A.*, The Function of Reissner's Fibre and the ependymal groove. Nature, Vol. 82. 1909. — ¹⁸⁾ *Dendy, A.*, and *Nicholls, G. E.*, On the Occurrence of a Mesocoelic Recess in the Human Brain and its Relation to the Sub-Commissural Organ of Lower Vertebrates; with special reference to the Distribution of Reissner's Fibre in the Vertebrate Series and its possible Funktion. Proceedings of the Royal Society. Ser. B, Vol. 82. 1910. — ¹⁹⁾ *Dixon, W. E.*, und *Halliburton, W. D.*, The cerebrospinal fluid. I. Secretion of the fluid. Journ. Phys. T. 47, Nr. 3. 1914. — ²⁰⁾ *Dogiel, A.*, Das periphere Nervensystem des Amphioxus (*Branchiostoma lanceolatum*). Anat. Hefte, Abt. I, Heft 66 (21). 1902. — ²¹⁾ *Dubson, G. E.*, Monograph of the insectivora. Systematic and anatomical Part. I. 1882. — ²²⁾ *Edinger, L.*, Einiges vom „Gehirn“ des Amphioxus. Anatomischer Anzeiger 28. 1906. — ²³⁾ *Edinger, L.*, Vorlesungen über den Bau der nervösen Zentralorgane des Menschen und der Tiere 2. 1908. — ²⁴⁾ *Franz, V.*, Beitrag zur Kenntnis des Ependyms im Fischgehirn. Biol. Zentralbl. 32. 1912. — ²⁵⁾ *v. Frisch, K.*, Beiträge zur Physiologie der Pigmentzellen in der Fischhaut. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. 138. 1911. — ²⁶⁾ *Fuchs, Hugo*, Über das Ependym. Verhandl. d. Anat. Ges., 16. Vers. in Halle 1902. — ²⁷⁾ *Fuchs, Hugo*, Über die Spinalganglienzellen und Vorderhornganglienzellen einiger Säuger. Anat. Hefte, I. Abt., Heft 66, 21, Heft 1. 1903. — ²⁸⁾ *Guldberg, G. A.*, Über das Zentralnervensystem der Bartenwale. In Forhandlingar i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar 1885. Christiania 1886. — ²⁹⁾ *Heidenhain, Martin*, Plasma und Zelle. 1. Abt. Jena 1907. — ³⁰⁾ *Held, Hans*, Die Entwicklung des Nervengewebes bei den Wirbeltieren. Leipzig 1909. — ³¹⁾ *Held, Hans*, Untersuchungen über den feineren Bau des Ohrlabyrinthes der Wirbeltiere. Abh. d. Kgl. Sächs. Ges. d. Wissensch. Math. Phys. Klasse 28. — ³²⁾ *Herms, E.*, Über die Bildungsweise der Ganglienzellen im Ursprungsgebiet des N. acustico-facialis bei Ammonoetes. Sitzungsber. d. math.-phys. Klasse d. Akad. d. Wiss. in München 14. 1884. — ³³⁾ *Hesse, R.*, Untersuchungen über die Organe der Lichtempfindung bei niederen Tieren. IV. Die Sehorgane des Amphioxus. Zeitschr. f. wiss. Zool. 63. 1898. — ³⁴⁾ *Holmgren, Emil*, Lärobok i histologie. Stockholm 1920. — ³⁵⁾ *Holmgren, Nils*, Zur Anatomie des Gehirns von Mxyine. Svenska Vet. ak. Handl. Bd. 60, Nr. 7. 1919. — ^{36a)} *Holmgren, Nils*, Zur Frage der Epiphyseninnervation bei Teleostiern. Folia Neuro-biologica 10. 1918. — ³⁶⁾ *Holmgren, Nils*, Zum Bau der Epiphyse vom *Squalus acanthias*. Arch. f. Zool. 11, Nr. 23. 1918. — ³⁷⁾ *Holmgren, Nils*, Zur Kenntnis der Parietalorgane von *Rana temporaria*. Ebenda 11, Nr. 24. 1918. — ³⁸⁾ *Holmgren, Nils*, Über die Epiphysennerven von *Clupea sprattus* und *harengus*. Ebenda 11, Nr. 25. 1918. — ³⁹⁾ *Holmgren, Nils*, Zur Innervation der Parietalorgane von *Petromyzon fluviatilis*. Zool. Anz. 50. 1918. — ⁴⁰⁾ *Holmgren, Nils*, Zur Anatomie und Histologie des Vorder- und Zwischenhirns der Knochenfische (hauptsächlich nach Untersuchungen an *Osmerus eperlanus*). Acta zoologica 1920. — ⁴¹⁾ *Horsley, V.*, Note on the Existence of Reissner's Fibre in Higher Vertebrates, Brain, Vol. 31. 1908. — ⁴²⁾ *Johnston, The* Brain of Acipenser. Zool. Jahrb. Abt. f. Anat. u. Ontog. 15. 1901. — ⁴³⁾ *Johnston, The* Brain of Petromyzon. Journ. of compar. Neurology, Vol. XII. 1902. — ⁴⁴⁾ *Johnston, The* cranial and spinal ganglia and the visceromotor roots in Amphioxus. Biol. Bull. 9. 1905. — ⁴⁵⁾ *Johnston, The* Morphology of the Vertebrate Head from the Viewpoint of the Functional Divisions in the Nervous system. Journ. of comp. neurol. Vol. XV. 1905. — ⁴⁶⁾ *Johnston, The* central Nervous system of vertebrates. Ergebn. u. Fortschr. d. Zool. 11. 1910. — ⁴⁷⁾ *Johnston, A* comment upon recent contributions on the brain of Petromyzonts. Anatomischer Anzeiger 37. 1910. — ⁴⁸⁾ *Johnston, The* morphologie of the forebrain vesicle in Vertebrates. Journ. of comp. Neurol. u. Physiol. 19. 1909. — ⁴⁹⁾ *Jordan*, Concerning Reissners Fibre in Teleosts. Journ. of comp. neurol. 30. 1919. — ⁵⁰⁾ *Joseph, H.*, Über eigentümliche Zellstrukturen im Zentralnervensystem von Amphioxus. Verhandl. d. Anat. Ges., 18. Vers., S. 16—26. 1904. — ⁵¹⁾ *Joseph, H.*, Die epidermoidalen Sinneszellen des Amphioxus. Anatomischer Anzeiger 32. 1908. — ⁵²⁾ *Kappers, Ariëns C. U.*, Untersuchungen über das Gehirn der Knochen-ganoiden. *Amia calva* und *Lepidosteus osseus*, Abh. d. Senckenberg. Ges. in Frankfurt a. M. 30. 1907. — ⁵³⁾ *Kappers, Ariëns C. U.*, Die vergleichende Anatomie des Nervensystems der Wirbeltiere und des Menschen. I. Abschnitt. Haarlem 1920. — ⁵⁴⁾ *Kölliker*, Handbuch der Gewebelehre. 2. Aufl. Leipzig 1854. — ⁵⁵⁾ *Kolmer, W.*, Zur Kenntnis des Rückenmarks von Ammonoetes. Anat. Hefte 29. 1905. — ⁵⁶⁾ *Kolmer, W.*, Ein rätselhafter Organkomplex der Wirbeltiere. Zentralbl. f. Physiol. 33, 1. 1919. — ⁵⁷⁾ *Kolster*, Über Zentralge-bilde in Vorderhornzellen der Wirbeltiere. Anat. Hefte, Heft 50, 16, Heft 1. 1901. — ⁵⁸⁾ *von*

Kupffer, K., Die Morphogenie des Zentralnervensystems, in *Hertwigs Handb. der vergl. u. experim. Entwicklungslehre der Wirbeltiere*. Jena 1906. — ⁵⁹⁾ *Kutschin*, Über die mikroskopische Struktur des Rückenmarks von *Petromyzon fluviatilis*. Gelehrte Nachrichten der Universität Kasan. Inaug.-Dissert. 1865. — ⁶⁰⁾ *Leunis, J.*, Synopsis der Tierkunde 1883. — ⁶¹⁾ *Lönnberg, E.*, Sveriges ryggradsdjur. Stockholm 1915. — ^{61a)} *Marburg*, Neurol. Centralbl. **25**. 1906. — ⁶²⁾ *Mawas, J.*, Note sur la structure et la signification glandulaire probable des cellules névrologiques du système nerveux central des vertébrés. C. R. Soc. biol. Paris; T. 69, S. 45—46. 1910. — ⁶³⁾ *Mourre, C.*, Sur la variation des corpuscules de Nissl dans diverses conditions physiologiques. C. R. Soc. biol. Paris. T. 56, S. 907—908. 1904. — ⁶⁴⁾ *Müller, Erik*, Studien über Neuroglia. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwickl. **55**. 1899. — ⁶⁵⁾ *Müller, Erik*, Låroboki ryggradsdjurens jämförande anatomi. Stockholm 1916. — ⁶⁶⁾ *Nicholls, G. E.*, Reissner's Fibre in the Frog. Nature, Vol. 82. 1908. — ⁶⁷⁾ *Nicholls, G. E.*, An experimental Investigation on the Function of Reissner's Fibre. Anatomischer Anzeiger **40**. 1912. — ⁶⁸⁾ *Paladino, G.*, La dottrina della continuità nell'organizzazione del neurasse nei vertebrati ed i mutui ed intimi rapporti tra neuroglia e cellule e fibre nervose. Rendic. R. Accad. Sc. fis. e mot. Napoli, Fasc. 7, 8, 9, Agosto e Settembre 1911, S. 25. Ann. Neurologia Anno 1911, Fasc. 4; S. 139—152. — ⁶⁹⁾ *Pensa*, Boll. de Soc. Med. Chirurg. di Pavia 1903, S. 158—160. — ⁷⁰⁾ *Purkinje*, Über Flimmerbewegungen im Gehirn. Müllers Arch. f. Anat. u. Physiol. 1836. — ⁷¹⁾ *Rawitz, Bernhard*, Das Zentralnervensystem der Cetaceen. I. Das Rückenmark von *Phocaena communis*, Cuv. und das Cervicalmark von *Balanoptera rostrata*, Fabr. Arch. f. mikr. Anat. **62**. 1903. — ⁷²⁾ *Reissner, E.*, Beiträge zur Kenntnis vom Bau des Rückenmarks von *Petromyzon fluviatilis*. L. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1860. — ⁷³⁾ *Renaut*, Recherches sur les centres amyeliniques. I. La Neuroglie et l'Ependyme. Arch. de Physiol. normal. et pathologique Ser. II; T. 9. — ⁷⁴⁾ *Retzius, Gustaf*, Biologische Untersuchungen; Neue Folge II. Stockholm 1891. — ^{74a)} *Retzius, Gustaf*, Några bidrag till kännedom om ependym-och neurocellernas struktur i cyklostomernas ryggmärg. Svenska Läkarsällskapets handlingar **42**, Heft 2. 1916. — ⁷⁵⁾ *Retzius, Gustaf*, Einige Beiträge zur Kenntnis der Struktur der Ependym- und Nervenzellen im Rückenmark der Cyklostomen. a) Die Frage über das Vorkommen von „inneren Sinneszellen“ im Ependym des Rückenmarks. Biologische Untersuchungen, Neue Folge **19**. 1921. Nach dem Tode Gustaf Retzius' herausgegeben von Prof. Dr. Carl M. Fürst. — ⁷⁶⁾ *Sanders, A.*, Contributions to the Anatomy of the Central nervous system of Teleosts. Philos. Trans. Roy. Soc. London, Vol. 169. 1878. — ⁷⁷⁾ *Sanders, A.*, Contributions to the Anatomy of the Central Nervous System of Plagiostomes. Ebenda, Vol. 177. 1886. — ⁷⁸⁾ *Sanders, A.*, Researches in the Nervous System of *Mixine glutinosa* London 1894. — ⁷⁹⁾ *Sargent, Porter E.*, Reissner's Fibre in the canalis centralis of Vertebrates. Anatomischer Anzeiger **17**. 1900. — ⁸⁰⁾ *Sargent, Porter E.*, The Development and Function of Reissner's Fibre, and its cellular connections. Proc. Americ. Acad., Arts and Sc., Vol. 36. 1901. — ⁸¹⁾ *Sargent, Porter E.*, The Optic Reflex Apparatus of Vertebrates for Shortcircuit Transmission of Motor reflexes through Reissner's Fibre; its Morphology, Ontogeny, Phylogeny and Function. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, Vol. 45. 1904. — ⁸²⁾ *Schaffer, Josef*, Lehrbuch der Histologie und Histogenese. Leipzig 1922. — ⁸³⁾ *Schiefferdecker, P.*, und *Leschke, E.*, Über die embryonale Entstehung von Höhlen im Rückenmark mit besonderer Berücksichtigung usw. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. **20**, Heft 1, S. 1—107. 1913. — ⁸⁴⁾ *Sherrington*, The Integrative Action of the Nervous System 1906, S. 329. — ⁸⁵⁾ *Sjövall, E.*, Über Spinalganglienzellen und Markscheiden. Anat. Hefte, 1. Abt., **91**. Heft (30. Band, Heft 2). — ⁸⁶⁾ *Stendell, W.*, Zur Histologie des Rückenmarks vom Amphioxus. Anatomischer Anzeiger **46**. 1914. — ⁸⁷⁾ *Stieda, L.*, Studien über das zentrale Nervensystem der Knochenfische. Zeitschr. f. wiss. Zool. **18**. 1868. — ⁸⁸⁾ *Stöhr*, Zur Innervation der Pia mater und des Plexus chorioideus des Menschen. Verhandl. d. Anat. Ges. 1921. Anatomischer Anzeiger **54**, Erg.-Heft. — ^{88a)} *Stöhr*, Über die Innervation der Pia mater und des Plexus chorioideus des Menschen. Habilitationsschr. Berlin 1922. — ⁸⁹⁾ *van der Stricht, Nestor*, La sphère attractive dans les cellules nerveuses des mammifères. Bull. de l'Acad. royale de Méd. 1906. — ⁹⁰⁾ *Studnička, F. K.*, Der Reissnersche Faden im Zentralkanal des Rückenmarks und sein Verhalten in dem Ventriculus terminalis. Sitzungsber. d. Kgl. Böhm. Ges. d. Wiss. in Prag 1899. — ⁹¹⁾ *Studnička, F. K.*, Untersuchungen über den Bau des Ependyms der nervösen Zentralorgane. Anat. Hefte **15**. 1900. — ⁹²⁾ *Studnička, F. K.*, Die Parietalorgane in Oppels Lehrbuch der vergleichenden

mikroskopischen Anatomie der Wirbeltiere. Jena 1905. — ⁹³⁾ Studnička, F. K., Über die Entwicklung und die Bedeutung der Seitenaugen von Ammocoetes. Anatomischer Anzeiger **41**. 1912. — ⁹⁴⁾ Studnička, F. K., Smyslové ústroje Amphioxu a obratlovců. I. Biologické Listy. 1912, S. 25—32. — ⁹⁵⁾ Studnička, F. K., Smyslové ústroje Amphioxu a obratlovců. II. Lékařských Rozhledů „Časopisu lékařův českých“, r. 1912. — ⁹⁶⁾ Studnička, F. K., Die Übereinstimmung und der Unterschied in der Struktur der Pflanzen und der Tiere. Sitzungsber. d. Kgl. Böhm. Ges. d. Wiss. f. d. Jahr 1917. II. Kl. 1917. — ⁹⁷⁾ Tretjakoff, D., Das Nervensystem von Ammocoetes. I. Das Rückenmark. Arch. f. mikroskop. Anat. **73**. 1909. — ⁹⁸⁾ Tretjakoff, D., Das Nervensystem von Ammocoetes. II. Das Gehirn. Arch. f. mikroskop. Anat. **74**. 1909. — ⁹⁹⁾ Tretjakoff, D., Die zentralen Sinnesorgane bei Petromyzon. Arch. f. mikroskop. Anat. **83**. 1913. — ¹⁰⁰⁾ Wenzel, J. und C., De penitiori structura cerebri hominis et brutorum. Tubingae 1812. Zit. nach Studnička. — ¹⁰¹⁾ Wulff, Max, Bemerkungen zur Morphologie und zur Genese des Amphioxus-Rückenmarkes. Biol. Zentralbl. **27**. 1907.

Erklärung der Abbildungen auf den Tafeln VI—XXIII.

Unten sind außer den in den einzelnen Abbildungen verwandten folgende Abkürzungen gebraucht:

Z.-K. = Zentralkanal.

i. N.-Z. = intraependymale Nervenzellen.

S. C. O. = Subcommissuralorgan.

R.-F. = Reissnerscher Faden.

Tafel VI.

- Abb. 1—5 sind Mikrophotogramme von Querschnitten durch den Z.-K. bei *Amphioxus lanceolatus*. Abb. 1 hat eine Vergrößerung von 750 : 1, Abb. 2—5 eine Vergrößerung von 370 : 1. Abb. 1 ist eine Vergrößerung des Gebietes um den Z.-K. in Abb. 2.
Abb. 1—3 stammen von formalinfixiertem und neurofibrillenimprägniertem Material, während die
Abb. 4 und 5 von Benda-fixiertem und mit Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbtem Material stammen.
c. k. = Zentralkanal; k = Commissurenzelle; k. c. = Kolossalzelle.

Tafel VII.

- Abb. 6—10 sind Mikrophotogramme und haben eine Vergrößerung von etwa 500 : 1 (Abb. 6—8) oder etwa 1200 : 1 (Abb. 9 und 10).
Abb. 6 und 7 sind Querschnitte durch das Rückenmark eines 20 mm langen *Lanzettfisches*.
Abb. 8 ist ein Medianschnitt durch ein Stück Rückenmark eines 20 mm langen *Lanzettfisches*. Die Abb. 6—8 stammen von Zenker-fixiertem und mit Hämatoxylin gefärbtem Material.
Abb. 9 und 10 sind Horizontalschnitte durch den Z.-K. von Ammocoetes und stammen von neurofibrillenimprägniertem Material.
a = dorsal vom Z.-K. gelegene Commissur; b = eine kanalähnliche Ausbuchtung des Z.-K., die in dorsaler Richtung abgeht.

Tafel VIII.

- Abb. 11—19 sind Zeichnungen von i. N.-Z. bei Ammocoetes in etwa 1080 facher Vergrößerung. Von den Abbildungen sind die Abb. 17 und 19 nach Golgi-Cajalimprägnierten Präparaten gezeichnet, während die übrigen von Präparaten stammen, die nach meiner Modifikation der Bielschowsky-Methode imprägniert waren.
a = eine i. N.-Z., deren auch zentral vom Kern gelegene Neurofibrillen in einen (oder mehrere) peripheren Ausläufer übergehen; b = eine i. N.-Z., die zentral vom Kern quergetroffen ist; c = Nervenzelle ohne gefärbte Neurofibrillen im peripheren Ausläufer; n. bl. = Neuroblast, der nahe dem Lumen des Z.-K. liegt; R. F. = Reissnerscher Faden; a₁, b₁ und c₁ = Golgi-imprägnierte i. N.-Z. mit Ausläufern; d₁ = Ependymzellen bei Ammocoetes.

Tafel IX.

Abb. 20—28 sind Zeichnungen.

Abb. 20 und 21 zeigen das Ependym und i. N.-Z. rund um den Z.-K. von *Petromyzon fluviatilis* in etwa 1000facher Vergrößerung.

Abb. 22 zeigt entsprechende Bildungen von einer anderen Stelle des Z.-K. von *Petromyzon* in etwa 700facher Vergrößerung. Die Präparate sind neurofibrillenimprägniert.

Abb. 23 und 24 zeigen Ependym und i. N.-Z. von Nissl-gefärbten bzw. neurofibrillenimprägnierten Präparaten von *Myxine glutinosa*. Abb. 23 ist ein Querschnitt und Abb. 24 ein Längsschnitt durch das Ependym des Z.-K. in Vergrößerung 470 : 1.

Abb. 25 und 26 zeigen Golgi-imprägnierte i. N.-Z. von *Spinax niger* in Vergrößerung 370 : 1.

Abb. 27 zeigt einen Querschnitt durch den Z.-K. von *Chimaera monstrosa* bei etwa 1000facher Vergrößerung. Das Material ist neurofibrillenimprägniert.

Abb. 28 zeigt Ependym mit i. N.-Z. dorsal im Z.-K. von *Squalus acanthias* in Vergrößerung 1000 : 1. Das Material ist neurofibrillenimprägniert.

Tafel X.

Abb. 29—37 sind Zeichnungen.

Abb. 29 und 30 zeigen u. a. Golgi-imprägnierte Nervenzellen im Querschnitt des Rückenmarks (Abb. 30) von einem 22 cm langen Embryo von *Squalus acanthias* und (Abb. 29) von einem erwachsenen Haje. Vergrößerung 270 : 1. *c. k.* = Zentralkanal; *e. k.* = Ependymkeil; *v. s.* = Substantia alba.

Abb. 31 zeigt Golgi-imprägnierte i. N.-Z. (*a*, *b* und *e*) und Ependymzellen (*c* und *d*) von *Squalus acanthias*. Vergrößerung etwa 1000 : 1.

Abb. 32 und 33 zeigen Nissl-gefärbte i. N.-Z. vom Ependym des Z.-K. von *Acipenser sturio*. Vergrößerung 1080 : 1.

Abb. 34 zeigt Nissl-gefärbte i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. von *Spinachia spinachia*. Vergrößerung 1080 : 1.

Abb. 35 zeigt Nissl-gefärbte i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. von *Gaidropsarus mustela*. Vergrößerung 1080 : 1.

Abb. 36 zeigt eine Nissl-gefärbte i. N.-Z. im Ependym von *Zoarces viviparus*. Vergrößerung 1080 : 1.

Abb. 37 zeigt Golgi-imprägnierte i. N.-Z. im Ependym der Seitenventrikel des Gehirns von *Gobius flavescens*. Vergrößerung 270 : 1.

Tafel XI.

Abb. 38—46 sind Zeichnungen in etwa 1000facher Vergrößerung, außer Abb. 39, die eine Vergrößerung von 270 : 1 hat.

Abb. 38, 40—43 sind nach Nissl-gefärbten Präparaten vom Rückenmark gezeichnet, während Abb. 39 nach neurofibrillenimprägnierten und Abb. 44—46 nach Golgi-imprägnierten Präparaten vom Rückenmark gezeichnet sind.

Abb. 38 zeigt i. N.-Z. von *Merluccius merluccius*.

Abb. 39 zeigt einen Querschnitt vom Rückenmark mit i. N.-Z. bei *Cyclotone microdon*.

Abb. 40 Querschnitt vom Z.-K. mit i. N.-Z. und R.-F. bei *Gaidropsarus cimbrius*. Die dorsale Seite ist in der Abbildung oben.

Abb. 41 Querschnitt durch den Z.-K. mit i. N.-Z. und R.-F. bei *Labrus berggylta*.

Abb. 42 zeigt das Ependym mit i. N.-Z. ventral im Z.-K. bei *Gadus minutus*.

Abb. 43 zeigt das Ependym mit i. N.-Z. ventral im Z.-K. bei *Labrus mixtus*.

Abb. 44 und 45 zeigen i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. von *Gadus virens*.

Abb. 46 zeigt Nervenfasern und Nervenendigungen im Ependym des Z.-K. von *Rana esculenta*.

Tafel XII.

Abb. 47—49, 51 und 56 sind Zeichnungen in etwa 1000facher Vergrößerung. Abb. 57 ist ein Mikrophotogramm mit 700facher Vergrößerung. Querschnitte des Z.-K. und Neurofibrillenimprägnation.

- Abb. 47 zeigt i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. von *Alligator mississippiensis*.
 Abb. 48 zeigt i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. von *Anguis fragilis*.
 Abb. 49 zeigt i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. von *Meleagris gallopavo*.
 Abb. 50 zeigt ein Schema eines Querschnittes durch das Rückenmark eines 13 mm langen Embryos von *Lepus cuniculus*.
 Abb. 51 zeigt einen Neuroblast im Ependym, das lateral den Z.-K. auskleidet, von einem 12 mm langen Embryo von *Lepus cuniculus*. Die innere freie Fläche des Ependyms liegt nach oben in der Abbildung.
 Abb. 52 zeigt i. N.-Z. und einen Neuroblast im Ependym ventrolateral im Z.-K. bei einem 42 mm langen Embryo von *Lepus cuniculus*.
 Abb. 53 zeigt den ventralen Ependymkeil mit i. N.-Z. bei demselben Embryo wie in Abb. 52.
 Abb. 54 zeigt Neuroblasten in Höhe von *a* im Schema Abb. 50. Die freie Fläche des Ependyms ist in der Abb. oben.
 Abb. 55 zeigt i. N.-Z. und Neuroblasten im Ependym des Z.-K. bei einem 10 cm langen Rinderembryo.
 Abb. 56 zeigt i. N.-Z. aus dem ventralen Ependymkeil des Rückenmarks bei einem 13 mm langen Embryo von *Lepus cuniculus*.
 Abb. 57 zeigt bei *b* ein frühes und bei *b*₁ ein etwas älteres Entwicklungsstadium der i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. bei einem 15 Tage alten Kalb.

Tafel XIII.

Abb. 58 und 59 sind Mikrophotogramme in 900- bzw. 700facher Vergrößerung. Abb. 60—69 sind Zeichnungen in etwa 1000facher Vergrößerung von i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. bei:

- Abb. 58 *Anser anser*.
 Abb. 59 *Pandion haliaëtus*.
 Abb. 60 *Pica pica*.
 Abb. 61 *Syrnium aluco*.
 Abb. 62 *Pica pica*.
 Abb. 63 *Corvus cornix*.
 Abb. 64 *Erinaceus europaeus*.
 Abb. 65 *Didelphis virginiana* und
 Abb. 66—69 *Talpa europaea*.

Tafel XIV.

- Abb. 70—81 zeigen i. N.-Z. (Vergrößerung 1000 : 1) bei
 Abb. 70 und 71 *Mustela erminea*.
 Abb. 72 und 73 *Lynx lynx* (*a* und *b* zeigen u. a. Beispiele verschiedener Formen der Ependymzellen im Z.-K.).
 Abb. 74 und 75 *Phoca vitellina*.
 Abb. 76 *Cavia cobaya*.
 Abb. 77 und 78 *Lepus timidus* (Abb. 78 stammt aus der Gegend ventral im Z.-K.).
 Abb. 79a und b *Mus musculus* var. *albus*, c *Mus decumanus*.
 Abb. 80 *Lepus cuniculus*.
 Abb. 81 *Sciurus vulgaris* (*a*, *b*, *c* und *d* s. Text S. 277).

Tafel XV.

- Abb. 82—90 sind Zeichnungen von i. N.-Z. und ihren Umkoppelungen. Die Abb. 82 und 83 sind nach Golgi-imprägnierten, Abb. 84 nach neurofibrillenimprägnierten und Abb. 85—90 nach toluidinblaufärbten Präparaten gezeichnet.
 Abb. 82 zeigt i. N.-Z. und ihre Umkoppelungen auf Ausläufer von peripher vom Z.-K. gelegenen großen Ganglienzellen bei einem 28 cm langen Embryo von *Bos taurus*. Die Abbildung zeigt ferner, daß andere Ausläufer derselben peripher liegenden Ganglienzellen eine teilweise intraependymale Verzweigung und wahrscheinlich auch intraependymale Endigung haben. Vergrößerung 540 : 1

Abb. 83 zeigt dieselben Verhältnisse wie Abb. 82 bei einem 35 cm langen Embryo von *Bos taurus*. *a* = eine im Präparat sehr schön hervortretende Umkoppelung, die insofern von Interesse ist, als nur ein Zweig eines peripheren Ausläufers einer i. N.-Z. hier sich umzukoppeln scheint. Vergrößerung 540 : 1.

Abb. 84 und 85 zeigen Ag-impr. bzw. toluidinblaufärbte i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. von *Equus caballus*. Vergrößerung 1000 : 1.

Abb. 86 zeigt eine i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. von *Canis aureus*. Vergrößerung 1000 : 1.

Abb. 87 zeigt i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. bei *Canis lupus*. Vergrößerung 1000 : 1.

Abb. 88 und 89 zeigen i. N.-Z. und junge Nervenzellen im Ependym des Z.-K. bei einem 2 Tage alten Individuum von *Canis familiaris*. Vergrößerung 1000 : 1.

Abb. 90 zeigt eine i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. von einem 5 Jahre alten Hunde. Vergrößerung 1000 : 1.

Tafel XVI.

Abb. 91—96 sind Zeichnungen von i. N.-Z. und ihren Umkoppelungen im Rückenmark und sind nach neurofibrillenimprägnierten (Abb. 91), toluidinblaufärbten (Abb. 92) und Golgi-imprägnierten (Abb. 93—96) Präparaten ausgeführt.

Abb. 91 zeigt eine große i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. bei einem 1 Jahr alten Individuum von *Bos taurus*. Vergrößerung 1400 : 1.

Abb. 92 zeigt eine i. N.-Z. mit Nissl-Körnchen im Ependym des Z.-K. von *Bos taurus*. Vergrößerung 1400 : 1.

Abb. 93 zeigt vom Ependym des Z.-K. rechts eine Ependymzelle, links bei *a* eine Nervenzelle, die sich auf einen Ausläufer einer i. N.-Z. umkoppelt und bei *b* in nahem Kontakt mit dem Nervenfasern *c* steht. Das Präparat stammt vom Rückenmark eines 28 cm langen *Rindsembryos*. Vergrößerung 540 : 1.

Abb. 94 zeigt eine i. N.-Z. und ihre Umkoppelung bei einem 24 cm langen *Rindsembryo*. Vergrößerung 540 : 1. Die Abbildung zeigt etwas schematisiert die Nerven-elemente des Mikrophotogramms Abb. 100.

Abb. 95 zeigt eine i. N.-Z., eine subependymale Nervenzelle und eine etwas peripher vom Z.-K. gelegene große Ganglienzelle bei einem 24 cm langen *Rindsembryo*. Vergrößerung 117 : 1. *n* = Neurit? *l* = das Gebiet innerhalb dieser Linie wird vergrößert wiedergegeben in Abb. 103.

Abb. 96 zeigt i. N.-Z. und ihre Umkoppelungen auf peripher vom Z.-K. gelegene Nervenzellen bei einem 34 cm langen Embryo von *Bos taurus*. Vergrößerung 540 : 1.

Tafel XVII.

Abb. 97—100 sind Mikrophotogramme und Abb. 101—103 sind Zeichnungen von i. N.-Z. (und ihren Umkoppelungen) aus dem Ependym des Z.-K. Die Präparate, die den Abbildungen zugrunde liegen, sind mit Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbt (Abb. 97), neurofibrillenimprägniert (Abb. 98 und 99) bzw. Golgi-imprägniert (Abb. 100 bis 103).

Abb. 97 zeigt links eine intraependymal liegende Keimzelle und im übrigen sezernierende Ependymzellen — auch blasenähnliche Sekretion — bei *Bos taurus*. Vergrößerung 1700 : 1.

Abb. 98 zeigt eine i. N.-Z. mit Birnform bei *Bos taurus*. Vergrößerung 510 : 1.

Abb. 99 zeigt eine bi- und eine multipolare i. N.-Z. von *Bos taurus*. Vergrößerung 510 : 1.

Abb. 100 zeigt eine i. N.-Z., die sich auf einen Ausläufer einer peripher liegenden Nervenzelle bei einem 24 cm langen *Rindsembryo* umkoppelt. Vergrößerung 500 : 1. Dieselbe Abbildung ist in Abb. 94 etwas vergrößert und schematisiert wiedergegeben.

Abb. 101 zeigt links eine Ependymzelle und rechts eine i. N.-Z. bei einem 14 cm langen Embryo von *Bos taurus*. Vergrößerung 750 : 1.

Abb. 102 zeigt eine i. N.-Z. bei einem 23 cm langen Embryo von *Bos taurus*. Vergrößerung 750 : 1.

Abb. 103 ist eine Vergrößerung des Gebiets innerhalb der Linie *l* in Abb. 95. Sie zeigt also eine i. N.-Z., eine subependymale Nervenzelle und deren beider Umkoppelung auf eine peripher vom Z.-K. gelegene Ganglienzelle bei einem 24 cm langen *Rindsembryo*. Vergrößerung 755 : 1.

Tafel XVIII.

- Abb. 104—122 zeigen i. N.-Z. im Ependym des Z.-K. bei etwa 1000facher Vergrößerung. Von diesen Abbildungen sind 110, 111, 112, 114, 117 und 118 nach neurofibrillen-imprägnierten und die übrigen nach toluidinblaufärbten Präparaten gezeichnet.
- Abb. 104, 108 und 109 zeigen i. N.-Z. von *Bison bonasus*.
- Abb. 105, 106, 107, 110 und 111 zeigen i. N.-Z. bei *Capra hircus*.
- Abb. 112 zeigt i. N.-Z. im Ependym ventral im Z.-K. bei *Rangifer tarandus*.
- Abb. 113 und 114 zeigen i. N.-Z. bei *Ovis aries*.
- Abb. 115—118 zeigen i. N.-Z. bei *Sus scrofa domestica*.
- Abb. 119 zeigt eine i. N.-Z. bei *Cynocephalus babuin*.
- Abb. 120 zeigt i. N.-Z. bei *Macacus rhesus*.
- Abb. 121 zeigt eine i. N.-Z. (Neuroblast?) im Ependym des Z.-K. bei einem 35 cm langen menschlichen Embryo.
- Abb. 122 zeigt eine i. N.-Z. bei einem 14 Jahre alten Knaben.

Tafel XIX.

- Abb. 123—128 und 130 sind Zeichnungen und Abb. 129 ist ein Mikrophotogramm.
- Abb. 123 zeigt ein Golgi-Bild einer i. N.-Z. ventrolateral im Ependym der Fossa rhomboidea von *Ammocoetes*. Vergrößerung etwa 300 : 1.
- Abb. 124—126 stellen drei verschiedene Querschnitte der Medulla oblongata caudal vom Cerebellum bei *Squalus acanthias* dar. *S. S.* = somatisch-sensible Region, *V. S.* = visceral-sensible Region, *V. M.* = visceral-motorische Region und *S. M.* = somatisch-motorische Region der Fossa rhomboidea bei *Squalus acanthias*.
- Abb. 127—130 zeigen Nervenfasern und deren Endbildungen im Ependym und im Lumen der Fossa rhomboidea bei *Squalus acanthias*. Es sind genaue Abbildungen von Präparaten, die nach meinen Modifikationen der Bielschowsky-Methode neurofibrillenimprägniert sind. Vergrößerung bei Abb. 127, 128 und 130 ist 1470 : 1 und bei Abb. 129 etwa 600 : 1.

Tafel XX.

- Abb. 131—136 sind Zeichnungen bei 1470facher Vergrößerung von Nervenfasern und ihren Endbildungen im Ependym und im Lumen der Fossa rhomboidea bei *Squalus acanthias*. Die Abbildungen sind nach ähnlich imprägnierten Präparaten gezeichnet wie Abb. 127—130.

Tafel XXI.

- Abb. 137—143 sind Zeichnungen von Nervelementen aus der Fossa rhomboidea (Abb. 137 bis 139), der Insertionsstelle des R.-F. am Tectum opticum bei einem Embryo von *Bos taurus* (Abb. 140) und des Ventriculus terminalis mit Teilen seines Daches bei *Erinaceus* (Abb. 141—143).
- Abb. 137 gibt eine Übersicht von Nervelementen im Ependym in Höhe der Region *V. M.* (Abb. 125 und 126) bei *Squalus acanthias*. Vergrößerung etwa 970 : 1.
- Abb. 138 zeigt bei *Osmerus* vorhandene Bildungen im caudalen Ende der Fossa rhomboidea, die wahrscheinlich nervöser Natur sind. Die Abbildung ist nach einem Golgi-imprägnierten Präparat mit Hilfe von Abbéschem Zeichenapparat, Öl-immersion $\frac{1}{12}$ und Kompensationsokular 4 gezeichnet. Vergrößerung 800 : 1.
- Abb. 139 zeigt bei *Osmerus* vorhandene nervöse Bildungen im Ependym der Fossa rhomboidea. Die eine Bildung ist eine schalenförmige Nervenendigung am Boden einer intraependymalen Krypte, die anderen Bildungen sind drei i. N.-Z., von denen zwei am Boden intraependymaler Recessus enden. Golgi-imprägniertes Präparat. Vergrößerung etwa 800 : 1.
- Abb. 140 zeigt eine Insertionsstelle am Tectum opticum des in Entwicklung begriffenen R.-F. bei einem 21 cm langen Embryo von *Bos taurus*. Das Material ist mit Hämatoxylin und Eosin gefärbt. Die Abbildung ist nach einem Sagittalschnitte gezeichnet. Vergrößerung 540 : 1.

Abb. 141 zeigt einen Teil des Ventriculus terminalis in Sagittalschnitt bei *Erinaceus*. Vergrößerung 110 : 1.

Abb. 142 und 143 sind Vergrößerungen (vom Sagittalschnitt) vom Dach des Ventriculus terminalis (Abb. 141) bei *a* und *b*. Diese Abbildungen zeigen u. a. intraependymal liegende Ganglienzellen, die an die in Spinalganglien erinnern. Hämatoxylin- und eosin gefärbtes Material. Vergrößerung 570 : 1.

Tafel XXII.

Abb. 144—153 sind Mikrophotogramme und zeigen den Z.-K. mit Inhalt bei einem 21 cm langen (Abb. 144 und 145), einem 22 cm langen (Abb. 146 und 147) und bei einem 28 cm langen Embryo (Abb. 148—153) von *Bos taurus*.

Abb. 144 und 145 zeigen Zellen im Lumen des Z.-K., von denen die meisten mit einem Teil ihres Zellkörpers zwischen die Ependymzellen sich erstrecken, während einige andere Zellen desselben Typs frei im Lumen des Z.-K. liegen. Das Material ist mit Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbt. Vergrößerung 375 : 1.

Abb. 146 und 147 zeigen Zellen im Lumen des Z.-K. bei zwei 22 cm langen *Rinderembryonen*. Bei dem einen Embryo (Abb. 146) liegen die Zellen deutlich einzeln in einer Reihe im Zentrum des Z.-K. Bei dem anderen Embryo (Abb. 147) finden sich mehrere Zellreste und Bildungen, die wahrscheinlich Umwandlungen einer ersten Anlage des R.-F. sind. Die noch intakten Zellen sind hier unregelmäßig angeordnet. Das Material ist mit Hämatoxylin und Eosin gefärbt. Vergrößerung 375 : 1.

Abb. 148—151 zeigen Zellreihen und den in Entwicklung begriffenen R.-F. im Zentrum des Z.-K. bei einem 28 cm langen *Rinderembryo*. Das Material ist mit Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbt. Vergrößerung in Abb. 148 und 149 = 375 : 1 und in Abb. 150 und 151 = 250 : 1.

Abb. 152 zeigt das Gebiet zwischen den Strichen der Abb. 150 in 1000facher Vergrößerung.

Abb. 153 zeigt das Gebiet zwischen den Strichen der Abb. 149 bei 1000facher Vergrößerung.

Tafel XXIII.

Abb. 154—161 sind Mikrophotogramme und zeigen den Inhalt des Z.-K. bei einem 28 cm langen (Abb. 154 und 155) und bei einem 21 cm langen (Abb. 156—158) *Rinderembryo*, während die Abb. 159 und 160 dasselbe bei einem erwachsenen *Equus caballus* und Abb. 161 bei erwachsenem *Bos taurus* zeigen.

Abb. 154 und 155 zeigen wie Abb. 148—153 den in Entwicklung begriffenen R.-F. bei einem 28 cm langen *Rinderembryo*. Vergrößerung 375 : 1.

Abb. 156—158 zeigen bei *a* Bildungen, die wahrscheinlich von der Anlage eines R.-F. herrühren, die aus unbekannten Ursachen zerstört ist. Diese Abbildungen stammen vom Z.-K. eines 21 cm langen *Rinderembryos* ab. Vergrößerung 420 : 1.

Abb. 159 zeigt den Z.-K. mit einem doppeltkonturierten R.-F. bei *Equus caballus*. Der Abbildung liegt ein neurofibrillenimprägnierter Längsschnitt des Z.-K. eines erwachsenen *Pferdes* zugrunde. Vergrößerung 390 : 1.

Abb. 160 zeigt dasselbe wie Abb. 159 bei einem 6 Monate alten *Pferde*. Vergrößerung 390 : 1.

Abb. 161 zeigt bei 600facher Vergrößerung einen Teil des Z.-K. eines etwa 16 Jahre alten *Pferdes*. Unten in der Abbildung sieht man den R.-F. quergetroffen und doppeltkonturiert. Das der Abb. 161 zugrundeliegende Präparat ist mit Eisenalaun-Hämatoxylin gefärbt.

Abb. 1.

Abb. 2.

Abb. 3.

Abb. 4.

Abb. 5.

Abb. 6.

Abb. 7.

Abb. 8.

Abb. 9.

Abb. 10.

Abb. 11.

Abb. 12.

Abb. 13.

Abb. 14.

Abb. 15.

Abb. 16.

Abb. 18.

Abb. 17.

Abb. 19.

Abb. 20.

Abb. 25.

Abb. 22.

Abb. 21.

Abb. 26.

Abb. 23.

Abb. 24.

a

b

Abb. 27.

Abb. 28.

Abb. 29.

Abb. 30.

Abb. 31.

Abb. 32.

Abb. 33.

Abb. 34.

Abb. 37.

Abb. 35.

Abb. 36.

Abb. 38.

ventralt.

Abb. 39.

c.k.

Abb. 40.

Abb. 41.

Abb. 42.

Abb. 43.

Abb. 41.

Abb. 44.

Abb. 46.

bb. 45.

Abb. 49.

Abb. 47.

Abb. 48.

Abb. 50.

Abb. 51.

Abb. 54.

Abb. 52.

Abb. 53.

Abb. 55.

Abb. 56.

Abb. 57.

Abb. 58.

Abb. 60.

Abb. 59.

a

b

Abb. 64.

Abb. 66.

Abb. 61.

Abb. 62.

Abb. 69.

Abb. 63.

b

Abb. 65.

Abb. 67.

Abb. 68.

Abb. 70.

Abb. 71.

Abb. 72.

Abb. 73.

Abb. 77.

Abb. 74.

Abb. 75.

Abb. 76.

Abb. 78.

Abb. 79.

Abb. 80.

Abb. 81.

Abb. 82.

Abb. 84.

Abb. 83.

Abb. 85.

Abb. 86.

Abb. 89.

Abb. 87.

Abb. 90.

Abb. 88.

Abb. 91.

Abb. 92.

Abb. 93.

Abb. 94.

Abb. 95.

Abb. 96.

Abb. 97.

Abb. 98.

Abb. 99.

Abb. 100.

Abb. 101.

Abb. 103.

Abb. 102.

Abb. 123.

Abb. 124.

Abb. 125.

Abb. 126.

Abb. 127.

Abb. 128.

Abb. 130.

Abb. 129.

Abb. 131.

Abb. 132.

Abb. 133

Abb. 135.

Abb. 134.

Abb. 136.

Abb. 137.

Abb. 138.

Abb. 140.

Abb. 139.

Abb. 141.

Abb. 142.

Abb. 143.

Abb. 144.

Abb. 145.

Abb. 146.

Abb. 147.

Abb. 148.

Abb. 149.

Abb. 150.

Abb. 151.

Abb. 152.

Abb. 153.

Abb. 154.

Abb. 155.

Abb. 156.

Abb. 161.

Abb. 159.

Abb. 160.

Abb. 157.

Abb. 158.