Über chronische endogene Uveitis.

Von

Prof. Dr. Ernst Fuchs
in Wien.

Mit Taf. X—XI, Fig. 1—36, und 22 Figuren im Text.

I. Einleitung.

Ich hatte schon lange die Absicht, die anatomischen Verhältnisse der endogenen Iritis und zwar speziell der chronischen Form zu bearbeiten, wozu ich seit Jahren Material gesammelt hatte. Dieses ist trotzdem noch spärlich, denn gerade die für die Untersuchung wichtigen leichten Fälle und die Frühstadien der Krankheit geben keine Indikation zur Enucleation und gelangen daher nur zufällig zur anatomischen Untersuchung. Den Anstoss, doch schon jetzt mit den Ergebnissen meiner Untersuchungen hervorzutreten, gab die Aufforderung, auf dem internationalen medizinischen Kongress, der im Sommer 1913 in London stattfinden soll, zu referieren, und zwar „über die Pathogenese der chronischen Uveitis mit Ausschluss der syphilitischen, tuberkulösen und sympathischen Fälle“. An diese Beschränkung wird sich auch die vorliegende Arbeit halten.

Zuerst muss man sich darüber verständigen, was man unter chronischer Uveitis versteht, worunter Iritis, Iridocyclitis und Iridochorioiditis gemeint ist. Ich bezeichne als chronisch nicht jene Fälle, welche häufige Rezidiven machen, von welchen aber jede einzelne akut verläuft, wie das besonders der rheumatischen und gonorrhöischen Iritis zukommt, sondern ich nenne solche Fälle rezidivierende Iritis. Den Ausdruck chronische Iritis gebrauche ich für Fälle, welche ganz oder nahezu ganz ohne äussere Entzündungserscheinungen beginnen und so entweder Jahre hindurch verlaufen oder erst in den späteren Stadien und den schwereren Fällen mit äusseren Entzündungserscheinungen sich verbinden. Der Kranke bemerkt sein Leiden daher gewöhnlich zuerst durch die Sehstörung. Objektiv sind diese Fälle hauptsächlich gekennzeichnet durch Beschläge an der Hornhaut, hin-

tere Synechien, Glaskörpertrübungen und oft auch Veränderungen in der Aderhaut.

Es ist begreiflich, dass krankmachende Ursachen, welche geeignet sind, die Uvea zu ergreifen, bald den, bald jenen Teil derselben befallen, und es kommt deshalb auch häufig vor, dass eine zuerst in der Aderhaut sitzende Entzündung langsam nach vorn bis auf die Iris sich erstreckt und umgekehrt. Deshalb ist der allgemein gehaltene Ausdruck Uveitis ganz am Platze. Wenn man aber den Sitz der Krankheit auch im Namen genauer ausdrücken will und zwar bloss auf Grund klinisch wahrnehmbarer Kennzeichen, so muss man sich nach dem richten, was man eben klinisch wahrzunehmen imstande ist. Bei sichtbaren Veränderungen des Irisgewebes oder bei hinteren Synechien ist man berechtigt, von Iritis zu sprechen, bei ophthalmoskopisch wahrnehmbaren Herden in der Aderhaut von Chorioiditis. Es gibt aber zahlreiche Fälle, wo an der Iris keine Veränderungen zu sehen sind, sondern nur Präcipitate an der Hornhaut und vielleicht noch Glaskörpertrübungen. In diesen gewöhnlich als Iritis serosa bezeichneten Fällen scheint mir doch als klinische Bezeichnung der Name Iritis nicht berechtigt, indem meiner Ansicht nach nicht bloss die Glaskörpertrübungen sondern bei Abwesenheit sichtbarer Veränderungen an der Iris auch die Präcipitate auf den Ciliarkörper zurückzuführen sind.

Weil ich für die bezeichneten Fälle den Ursprung der Präcipitate in den Ciliarkörper verlege und diese Fälle deshalb Cyclitis nenne, ist mir die Behauptung unterschoben worden, dass die Entstehung von Präcipitaten aus der Iris überhaupt nicht existiere. Ich habe aber niemals Ähnliches behauptet oder auch nur geglaubt. In der einzigen Arbeit, in welcher ich diese Frage behandelte, heisst es vielmehr: „In Fällen, wo die Iris sehr stark infiltriert ist, mag sie vielleicht auch daran (d. i. an der Präcipitatabildung) teilnehmen“¹⁾. Ich habe immer nur hervorgehoben, dass in jenen Fällen, wo man klinisch an der Iris gar nichts findet, man auch nicht berechtigt ist, von Iritis zu sprechen und eine vorhandene Exsudation der Iris zuzuschreiben.

Die anatomische Untersuchung bestätigt die klinische Erfahrung, indem sie zeigt, dass tatsächlich die einzelnen Abschnitte der Uvea gesondert erkranken können. Von der Aderhaut einerseits, von Iris und Ciliarkörper andererseits ist dies lange bekannt. Es fragt sich, ob auch die Iris ohne Ciliarkörper und umgekehrt ergriffen sein können. Bei dem innigen Zusammenhang beider ist dies zwar selten, kommt

¹⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. XXX. 3. Abt. S. 146. 1884.

aber vor. Ich habe unter den von mir anatomisch untersuchten Fällen chronischer Uveitis vier, wo bei Entzündung der Iris der Ciliarkörper dauernd frei geblieben war, also Iritis ohne Cyclitis (Fall 5, 6, 7 und teilweise auch Fall 3 der Tabelle auf S. 252). Dabei handelte es sich in diesen Fällen keineswegs um ganz leichte Iritis, denn in einem Falle war es zur *Seclusio pupillae* mit Vortreibung der Iris gekommen. In leichteren und frischeren Fällen von Iritis würde man vielleicht noch häufiger den Ciliarkörper frei von Entzündung finden.

Nicht so genau kann ich die Frage beantworten, ob es anatomisch eine Cyclitis ohne Iritis gibt, wie dies in der klinischen Bezeichnung „chronische Cyclitis“ zum Ausdruck kommt. Ein solcher Fall klinisch reiner Cyclitis war der später zu beschreibende Fall Leitner (S. 236), in welchem bei Gegenwart massenhafter Präcipitate klinisch keine Veränderungen an der Iris nachweisbar waren. Anatomisch zeigte aber die Iris doch eine ganz leichte entzündliche Infiltration, die eben zu gering war, um klinisch wahrnehmbar zu sein. Chronische Fälle von reiner Cyclitis in meinem Sinne sind ferner jene, wo bei Heterochromie der Iris am heller gefärbten Auge Präcipitate bestehen¹⁾. Die anatomische Untersuchung erweist in diesen Fällen an der Iris keine Exsudation, aber eine eigentümliche Atrophie des Gewebes (siehe S. 247), welche wohl als Folge eines chronischen Entzündungsreizes gedeutet werden kann. Die einzigen Fälle, wo ich bei vollkommener Abwesenheit entzündlicher Veränderungen an der Iris kleine Lymphocytenherde am Ciliarkörper fand, betrafen zwei Augen, welche beide, klinisch normal aussehend, zugleich mit einem Orbitaltumor entfernt worden waren. Aber diese Fälle gehören wieder nicht zu jenen, welche wir klinisch als chronische Cyclitis ansprechen. Sie beweisen nur, dass eine Schädlichkeit, welche die inneren Augenhäute offenbar in ziemlich gleichmässiger Weise treffen muss, doch nur gerade einen bestimmten Abschnitt der Uvea schädigen kann.

Wenn ich also auch keinen Fall klinisch diagnostizierter chronischer Cyclitis aufweisen kann, welcher sich auch anatomisch als reine Cyclitis ohne Beteiligung der Iris erwiesen hätte, so glaube ich doch, dass dieses vorkommt, wenigstens insofern, dass nennenswerte entzündliche Veränderungen fehlen, denn die Gegenwart ganz vereinzelter Lymphocyten oder Plasmazellen im Gewebe der Iris kann ja wohl nicht als Entzündung im klinischen Sinne bezeichnet werden.

¹⁾ Fuchs, Über Komplikationen der Heterochromie. Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. XV. S. 191. 1906.

In dem von mir untersuchten Falle Leitner sind die entzündlichen Veränderungen an der Iris so unbedeutend im Vergleich zu denen am Ciliarkörper, dass sie wohl in einem andern Falle chronischer Cyclitis ganz fehlen könnten. Ich möchte daher an der klinischen Bezeichnung chronische Cyclitis für alle jene Fälle festhalten, wo ohne alle wahrnehmbare Veränderung an der Iris Präcipitate bestehen.

Sowie meiner Meinung nach der Ciliarkörper nicht bloss als erster, sondern auch als einziger Teil der Uvea erkranken kann, indem die Entzündung nicht notwendig auf die Iris überzugehen braucht, so halte ich eine Cyclitis ohne Iritis auch für manche jener Fälle für wahrscheinlich, wo die Krankheit als Chorioiditis beginnt und dann ohne sichtbare Veränderungen an der Iris Präcipitate dazu kommen. Ich entsinne mich z. B. eines jungen Mädchens, wo ein frischer Aderhautherd weit vorn auftrat und gleichzeitig damit eine Menge feiner Präcipitate bei blassem Auge und normal aussehender Iris. Ich glaube, dass in solchen Fällen die Entzündung von der Aderhaut auf den flachen Teil des Ciliarkörpers übergegriffen hat. Eine Entzündung der Ciliarfortsätze dagegen dürfte wohl kaum ohne Beteiligung der Iris verlaufen.

Über das Sinnlose des Namens Iritis serosa für die Fälle chronischer Iritis mit Präcipitaten herrscht Übereinstimmung. Will man durchaus die Gegenwart von Beschlägen zum Ausdruck bringen, so möchte eher die Bezeichnung Iritis oder Cyclitis globularis passen, da globulus ein Kügelchen bedeutet. Ich halte aber auch diese Bezeichnung für entbehrlich. Die Präcipitate sind ein zwar häufiges, aber nicht unentbehrliches Kennzeichen chronischer Uveitis. Es kommt oft vor, dass in einem solchen Falle im Laufe der manchmal jahrelangen Krankheit bald Präcipitate zu sehen sind, bald nicht, und doch besteht dieselbe Art von Krankheit dauernd fort. Es verhält sich wie mit dem Hypopyon, das in einem Falle akuter Iritis von Tag zu Tag wechseln kann. Es wäre sicher absurd, die Art der Iritis nach der Gegenwart des Hypopyons zu bezeichnen. Auch die Präcipitate kennzeichnen nicht die Art, sondern nur die Verlaufsweise der Iritis, nämlich die chronische. Bei der akuten Iritis besteht das Exsudat aus polynukleären Leukocyten, welche, wenn sie genügend zahlreich, ein Hypopyon bilden. Bei der chronischen Iritis dagegen sind Lymphocyten im Kammerwasser, welchen allein die Fähigkeit zukommt, sich zu den charakteristischen Kugeln zusammenzuballen. Da die Art der Exsudatzellen wechseln kann, können, wenn auch nur ausnahmsweise, in demselben Falle Hypopyon und Präcipitate

beisammen sein, welche sich zu verschiedenen Zeiten gebildet haben, z. B. in seltenen Fällen sympathischer Ophthalmie. Die Präcipitate beweisen also nur die lymphocytäre Beschaffenheit des Exsudates und damit den chronischen Verlauf der Entzündung, nicht aber deren besondere Ätiologie und Art. Die chronischen Entzündungen sind allerdings insofern einigermaßen einheitlich, als sie zumeist endogene sind, aber ausnahmsweise können sie auch exogen sein, z. B. die sogenannte traumatische seröse Iritis. Diese ist aber nicht bloss ätiologisch von der endogenen Iritis verschieden, sondern liefert auch ein ganz anderes und für sie charakteristisches anatomisches Bild. Und selbst unter den 7 Fällen traumatischer seröser Iritis, die ich bis jetzt untersuchen konnte, waren zwei, welche sich bei der anatomischen Untersuchung als sympathisierende Entzündung erwiesen (es bestand auch tatsächlich sympathische Entzündung des zweiten Auges) und daher von den fünf anderen Fällen verschieden waren. Da also die Fälle von Iritis mit Präcipitaten eine ganz verschiedene Ätiologie und verschiedene klinische Bedeutung haben können, empfiehlt es sich, die Bezeichnung Iritis serosa überhaupt fallen zu lassen und statt dessen zu sagen Iritis, bzw. Cyclitis oder Iridocyclitis chronica, unter Hinzufügung der Ätiologie (tuberculosa usw.) falls diese bekannt ist.

Zur Erforschung der Pathogenese einer Krankheit gibt es drei Wege: die klinische Beobachtung, das Tierexperiment und die anatomische Untersuchung. Die letztgenannte Methode gibt dann sicheren Aufschluss über die Ätiologie, wenn sie den Krankheitserreger in den Geweben nachzuweisen vermag. Wo dies nicht möglich ist, vermag sie doch oft unter der Menge der Befunde einzelne Typen herauszufinden, was berechtigt, für diese mit Wahrscheinlichkeit auch eine besondere Ätiologie anzunehmen. Die folgenden Untersuchungen sollen zeigen, bis zu welchem Grade es möglich ist, unter den Fällen chronischer Iritis einzelne anatomische Typen herauszuschälen.

Bevor ich die von mir untersuchten Fälle im einzelnen bespreche, schicke ich einige allgemeine Bemerkungen über die Art der Exsudation bei der chronischen Iritis voraus.

II. Exsudation bei der chronischen Uveitis.

Die frischen entzündlichen Veränderungen bestehen in zelliger Infiltration der Uvea mit Auswanderung der Zellen in das Kammerwasser und in den vorderen Teil des Glaskörpers. Die älteren Veränderungen sind Wucherung des Gewebes, besonders des ciliaren

Epithels, Verwachsungen der Teile untereinander und organisierte Exsudatmembranen.

Die Zellen, welche bei chronischer Uveitis im Gewebe der Uvea und auch frei im Kammerwasser sich finden, sind der Hauptsache nach Lymphocyten. Man ist von der ursprünglichen Ansicht, dass den Lymphocyten keine aktive Beweglichkeit zukommt, zurückgekommen; man weiss, dass sie ebenso wie die polynukleären Leukocyten aus der Blutbahn in das Gewebe auswandern. Ob es noch eine andere Quelle für die Lymphocyten gibt, nämlich die Adventitialzellen der Blutgefässe, wie Marchand glaubt, ist noch nicht mit voller Sicherheit erwiesen.

Eine Exsudation, welche ausschliesslich aus polynukleären Leukocyten oder aus Lymphocyten bestehen würde, kommt kaum vor. Auch im reinen Eiter findet man gewöhnlich einige einkernige Zellen und in einem lymphocytären Exsudat gelegentlich einige polynukleäre. Die Natur der Hauptmasse der Zellen aber hängt von dem akuten oder chronischen Verlauf der Entzündung ab. Da die akuten Entzündungen gewöhnlich durch Eiterung erregende Bakterien verursacht werden, die chronischen dagegen durch andere Mikroorganismen, als Tuberkelbacillen, Spirochäten usw., oder durch Toxine, wie vermutlich in vielen Fällen chronischer Uveitis, so wird die Zellform des Exsudates in zweiter Linie durch Ätiologie bestimmt. Dies ist aber nur mit Einschränkung der Fall, weil dieselbe Ursache nicht selten bald akute, bald chronische Entzündung zur Folge haben kann.

Dass die zellige Beschaffenheit des Exsudates in erster Linie von der Intensität der Entzündung und nicht von der Art der Noxe abhängt, möge durch folgendes Beispiel erläutert werden. Bei der Endophthalmitis nach perforierender Verletzung, wo die eingedrungenen Bakterien vom Glaskörper aus auf die inneren Augenhäute wirken, produziert die Netzhaut reichlich polynukleäre Leukocyten, während die darunter liegende Aderhaut, weil durch die Netzhaut geschützt und daher weniger ergriffen, häufig nur von Lymphocyten infiltriert ist. Desgleichen findet man, wenn im vorderen Teil des Glaskörpers ein Abscess, aus polynukleären Leukocyten bestehend, sich gebildet hat, im hinteren Teil der Netzhaut, welcher vom Ausgangspunkt der Entzündung entfernter ist, oft fast nur Lymphocyten. Umgekehrt kann bei blosser Toxinwirkung, wenn sie nur stark genug ist, das Exsudat aus polynukleären Leukocyten gebildet werden (siehe die auf S. 279 angeführten Beispiele).

Die zellige Beschaffenheit des Exsudates hängt auch ab von dem

Stadium, in welchem man das Exsudat untersucht. Wenn man in die Peritonealhöhle einer Maus oder eines Meerschweinchens Bouillon oder gewisse Bakterientoxine einspritzt, erhält man innerhalb der ersten Stunden ein fast nur aus Lymphocyten bestehendes Exsudat, dem sich im weiteren Verlauf immer mehr polynukleäre Leukocyten beimengen, so dass diese bald überhand nehmen¹⁾.

Bei der chronischen Uveitis besteht, entsprechend dem chronischen Charakter der Entzündung, das Exsudat fast ausschliesslich aus Lymphocyten. Dies gilt sowohl für die Exsudatzellen im Gewebe der Uvea als auch für die, welche das freie Exsudat in der Kammer bilden. Viele Lymphocyten erfahren später eine Veränderung: ihre Kerne werden grösser, oft länglich, chromatinarm, und auch der Protoplasmaleib der Zellen vergrössert sich. Diese grossen einkernigen Zellen kann man als grosse Lymphocyten bezeichnen, welche innerhalb des Gewebes der Uvea gegenüber den kleinen Lymphocyten verhältnismässig selten sind, während sie im Kammerexsudat die Majorität bilden. Ich bin also der Meinung, dass die grossen Lymphocyten aus den kleinen hervorgegangen sind und nicht, wie manche (Lossen) meinen, aus Endothelien. Ich habe nur in einem einzigen Falle im Kammerexsudat grosse einkernige Zellen gesehen, welche sich als abgestossene Endothelien dadurch verrieten, dass sie noch in grösseren Verbänden beisammen waren; sie sahen aber wesentlich verschieden von den grossen Lymphocyten aus. Auch ist in der Mehrzahl der Fälle, wo die vordere Kammer reichlich grosse Lymphocyten beherbergt, das Endothel der Descemeti normal, von einem Abfallen der Endothelzellen nichts zu sehen. Wenn im Kammerwasser nebst grossen Lymphocyten reichliche polynukleäre Leukocyten vorhanden sind, entwickeln sich die ersteren manchmal zu Phagocyten (Makrophagen nach Metschnikoff), welche die polynukleären Zellen aufnehmen, wovon später noch die Rede sein wird (S. 230).

Im Gewebe der Uvea trifft man bei chronischer Uveitis ausser den Lymphocyten und sehr vereinzelt polynukleären Leukocyten Mastzellen, eosinophile Zellen und Plasmazellen an. Die Frage nach der Herkunft und dem spezifischen Charakter dieser Zellen ist noch nicht endgültig gelöst. Mastzellen sind bei der chronischen Uveitis ein häufiger, eosinophile Zellen ein seltener Befund. Von Plasmazellen sind vereinzelte regelmässig anzutreffen. Ausnahmsweise kann aber die Iris von Plasmazellen und sogar ausschliesslich von solchen ganz dicht durchsetzt sein.

¹⁾ A. Wolff u. A. v. Torday. Berl. klin. Wochenschr. Nr. 49. 1904.

Die akute Iritis (bei eitriger Infektion) ist also durch polynukleäre Leukocyten, die chronische Iritis durch Lymphocyten und Plasmazellen in ihrem Gewebe ausgezeichnet. Dies ist aber niemals in ausschliesslicher Weise der Fall. Bei der eitrigen Iritis findet man immer auch einzelne Lymphocyten und manchmal sogar Plasmazellen, z. B. in dem auf S. 230 erwähnten Falle von Iritis mit Hypopyon infolge eines grossen Diplobacillengeschwürs der Hornhaut. Umgekehrt wird man bei der chronischen Iritis oft vereinzelte polynukleäre Leukocyten antreffen. In den Taf. X, Fig. 1—5 sind Ausschnitte aus der Iris bei den verschiedenen Formen der Iritis wiedergegeben. Fig. 1 ist einem Falle chronischer Iritis mit Präcipitaten entnommen. Nebst kleinen, stark gefärbten Kernen, deren Protoplasma nicht deutlich ist, d. i. Lymphocyten, bemerkt man eine mässige Anzahl von Plasmazellen, deren Kern randständige Granulationen trägt und excentrisch in dem grossen Protoplasma liegt. Fig. 2 entstammt einem Falle von seröser traumatischer Iritis und zeigt die Iris vollgepfropft mit Plasmazellen, so dass sich dieselben stellenweise epithelartig abplatten; zwischen ihnen verschwinden die Stromazellen und die wenigen Lymphocyten fast ganz¹⁾. Den Gegensatz zu diesen chronischen Fällen bildet Fig. 3, die einem Auge entnommen ist, welches 9 Tage vorher eine perforierende Hornhautverletzung erlitten hatte. Es bestand eine akute eitrige Endophthalmitis: Hypopyon, Eiterklumpen in der Pupille, eitriges Exsudat auf dem Ciliarkörper und auf der Netzhaut. Man bemerkt in der Iris mehrkernige und einkernige Zellen. Die ersteren sind polynukleäre Leukocyten; unter den letzteren sind die kleinen runden Kerne ohne Protoplasma Lymphocyten, während die grösseren und oft länglichen Kerne teils grossen Lymphocyten angehören, teils Stromazellen, deren Fortsätze nicht mehr sichtbar sind. Von den Veränderungen bei der chronischen Iritis, welche in Fig. 4 und 5 dargestellt sind, wird später die Rede sein.

Eine Form der Exsudation, die für chronische Uveitis besonders

¹⁾ 1905 gab ich als erster (Sympathisierende Entzündung. v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXI. S. 439) den histologischen Befund dreier Fälle seröser traumatischer Iritis, wozu ich seitdem noch vier weitere Fälle bekam. Ich hatte damals den Plasmazellen keine Beachtung geschenkt und ergänze daher jetzt meine damalige Beschreibung dahin, dass sich diese Zellen in allen 7 Fällen fanden, und zwar manchmal sehr reichlich, so wie es Fig. 2 darstellt. In einem andern Falle bestanden daneben knötchenförmige Anhäufungen von Lymphocyten, während die Plasmazellen keine Knötchen, sondern nur eine diffuse Infiltration bildeten, ein Verhalten, dem ich wiederholt bei Iritis verschiedener Ätiologie begegnete.

charakteristisch ist, wird durch die Präcipitate an der hinteren Hornhautwand gebildet. Dem klinischen Bilde der Hornhautbeschläge entsprechen anatomisch zwei verschiedene Zustände, welche ich als Pseudopräcipitate und echte Präcipitate unterscheide, wenn sie auch klinisch oft nicht auseinander zu halten sein dürften.

1. Die Pseudopräcipitate bestehen darin, dass die hintere Hornhautfläche von einem fortlaufenden Zellenbelag überzogen wird, der ungleichmässig dick ist. Während er im allgemeinen dünn und stellenweise lückenhaft ist, wird er an andern Stellen so dick, dass in die Kammer vorragende Hügel entstehen (Taf. X, Fig. 6). Die den Belag bildenden Zellen liegen anfangs ganz locker beisammen (Taf. X, Fig. 8), später vergrössern sich die Zellen durch Aufquellen und können teilweise

Fig. 1.

miteinander verschmelzen (Taf. X, Fig. 7). Die der Kammer zugewendete Oberfläche der Zellhügel ist nicht glatt, und die Hügel grenzen sich auch nicht scharf gegen den übrigen Belag ab (Fig. 6 u. 8). Manchmal nimmt der Belag samt den Prominzen nur die untere Hälfte der Hornhaut ein. Das Endothel ist unter den Pseudopräcipitaten häufig verändert; einzelne Zellen sind aufgequollen und andere abgefallen (Fig. 7 u. 8), was sich aus dem etwas akuterem Charakter der Entzündung erklärt, bei welcher die Pseudopräcipitate vorkommen.

Eine besondere Art vom Pseudopräcipitaten fand ich in einem Fall von traumatischer seröser Iritis. Nach einer perforierenden Hornhautverletzung war es zu einer Iridocyclitis gekommen, in deren Verlauf grosse, graue, speckig aussehende Präcipitate in den mittleren Teilen der Hornhaut entstanden. Dieselben hatten sich, wie Textfig. 1 zeigt, dadurch gebildet, dass sich grössere Fibringerinnsel an die Hornhaut angelegt hatten. An deren freier Oberfläche hafteten zahlreiche einkernige Leukocyten, so dass die Gerinnsel einen Zellenmantel be-

kamen. Auch innerhalb der Gerinnsel sieht man Kerne, teils in grösseren Abständen stehend, teils in dichten Haufen. Von ersteren ist nicht zu sagen, ob sie Zellen angehören, welche bei der Gerinnung des Fibrins mit eingeschlossen wurden, oder welche später in das Gerinnsel einwanderten. Dagegen ist der letztere Vorgang wohl sicher anzunehmen für die starken Kernanhäufungen, welche sich bis an den äusseren Zellenmantel verfolgen lassen.

Die Pseudopräcipitate finden sich am häufigsten bei leichter traumatischer Iritis. Ich zweifle nicht, dass z. B. die Präcipitate, welche man manchmal nach einer Staroperation bei nur wenig gereiztem Auge sieht, dahin gehören, soweit es sich nicht um Linsenpräcipitate handelt. Anatomisch habe ich ferner die Pseudopräcipitate in den als seröse traumatische Iritis bezeichneten Fällen gefunden, von welchen ich bis jetzt sieben untersuchen konnte. In diesen Fällen überzieht ein gleicher Zellenbelag auch oft die vordere Irisfläche, so dass dann die Kammerwände durchwegs mehr oder weniger von Exsudatzellen belegt sind. Ebenso verhält es sich auch in den Fällen seröser traumatischer Iritis, welche seit meiner Veröffentlichung von andern Autoren beschrieben wurden, wo nach Beschreibung und Abbildung es sich ebenfalls um einen ziemlich kontinuierlichen, stellenweise verdickten Zellenbelag an der Descemetschen Membran handelte¹⁾.

Straub²⁾ behandelt auf Grund experimenteller traumatischer Iridocyclitis auch die Frage der Präcipitate, beschreibt sie und bildet sie gleichfalls als einen kontinuierlichen, stellenweise verdickten Zellenbelag an der Descemeti ab. Die Ursache davon soll Anlockungsstoff für Leukocyten in den hintersten Hornhautschichten sein. Der anfangs kontinuierliche Zellenbelag soll später in getrennte Zellgruppen zerfallen; es verschwinden an den einen Stellen die Zellen wieder von der Descemeti und sammeln sich an andern dagegen an, indem von den stehen gebliebenen Zellen eine chemotaktische Wirkung auf die frei im Kammerwasser befindlichen Leukocyten ausgehen soll. Meines Erachtens ist es nicht nötig, für den kontinuierlichen Zellenbelag eine von der hinteren Hornhautschicht ausgehende Anlockerung anzunehmen, denn es ist in diesen Fällen eben die ganze Wand der Vorderkammer oft von Zellen belegt, so wie sich in einem Gefäss, das eine Flüssigkeit mit suspendierten Teilchen enthält, diese nicht bloss auf den Boden, sondern auch an die Seitenwände des Gefässes

¹⁾ Gilbert. v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXXVII. S. 220. — Rubert. v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXXVIII. S. 275.

²⁾ Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Nr. 3. 1912.

sich anlegen. Dass sich im Auge die Zellen meist mehr an die Hornhaut als an die Iris anschlagen, ist leicht aus der Zentrifugalkraft zu verstehen. Noch weniger erforderlich aber ist es, zu erklären, wie aus diesem kontinuierlichen Belag die einzelnen Präcipitate mit dazwischen klarer Hornhaut sich entwickeln, denn eine solche Entwicklung findet tatsächlich nicht statt. Ich bin überzeugt, dass der von Straub experimentell erzeugte Belag niemals zu wohl umschriebenen Zellkonglomeraten mit dazwischen klarer Hornhaut geworden wäre, welcher Zustand den echten Präcipitaten entspricht. Diese sind nach der Art der Entstehung von den Pseudopräcipitaten grundsätzlich verschieden. Sie kommen auch nur der endogenen Iritis zu, während in den traumatischen Fällen die klinisch sichtbaren Beschläge durch

Fig. 2. Vergr. 10:1.

Pseudopräcipitate gebildet werden. Ausnahmen kommen ja natürlich vor. Klinisch konnte ich einige Male nach perforierender Verletzung typische in Dreiecksform angeordnete echte Präcipitate sehen und in zwei Fällen konnte ich solche auch anatomisch feststellen, nämlich in den weiter unten beschriebenen Fällen von seröser traumatischer Iritis mit sympathischer Erkrankung des zweiten Auges, wo echte Präcipitate neben Pseudopräcipitaten vorhanden waren.

2. Die echten Präcipitate sind wohl abgegrenzte, mehr kompakte Zellkonglomerate. Zuweilen sind sie kugelförmig (Taf. X, Fig. 23), so dass sie der Descemeti nur mit einem kleinen Teil ihres Umfanges anliegen, gewöhnlich aber sind sie hügelartig mit steil abfallenden Rändern (Taf. X, Fig. 9) oder flach, beetartig (Textfig. 2). Ihre Oberfläche ist zwar nicht glatt, indem einzelne Zellen mehr vorspringen als andere, aber sie ist doch nicht so unregelmässig wie bei den Pseudopräcipitaten. Zwischen den einzelnen Präcipitaten ist die Descemeti entweder ganz frei oder nur hier und da mit einzelnen Zellen oder ganz kleinen unregelmässigen Zellaggregaten belegt, aber selbst in letzterem Falle ist das anatomische Bild doch wesentlich von den Pseudopräcipitaten

verschieden. Unter den echten Präcipitaten ist das Endothel normal (Fig. 9, 23), nur unter besonders grossen und alten Präcipitaten wird es lückenhaft.

Der Unterschied zwischen Pseudopräcipitaten und echten Präcipitaten liegt in der Art ihrer Entstehung. Im ersten Falle legen sich die Leukocyten aus dem Kammerwasser einzeln an die Hornhaut an. Im zweiten Falle vereinigen sich die Leukocyten zuerst zu kugligen Ballen, welche frei im Kammerwasser herumschwimmen und dann erst als Ganzes an die Hornhaut sich anlegen. So ist z. B. das in Fig. 23 abgebildete Präcipitat noch nicht zur festen Anlegung an die Hornhaut gekommen. In dieser Art hat man sich dies ja auch früher vorgestellt und deshalb diesen Gebilden den Namen Präcipitate gegeben. Dieser Hergang wird bewiesen durch das Vorkommen ganz runder Zellkugeln, welche man an der Descemeti allerdings nur ausnahmsweise, dagegen häufiger in vollkommener Form auf der Iris findet. Ein späteres Wachstum der Präcipitate ist dadurch nicht ausgeschlossen. Es ist ein solches manchmal schon klinisch wahrzunehmen, und man kann sogar zwei benachbarte Präcipitate sich allmählich so vergrössern sehen, dass sie endlich zusammenfliessen, und eine Biscuitform entsteht. Für späteres Wachsen spricht auch die Tatsache, dass die meisten Präcipitate nicht Kugeln, sondern flache, der Hornhaut aufsitzende Halbkugeln sind. Diese Form ist aus den ursprünglich kleinen, kugelförmigen Beschlägen dadurch entstanden, dass sich neue Zellen einzeln aus dem Kammerwasser an die Oberfläche derselben anlegten, und zwar vor allem in dem toten Winkel, welcher zwischen der Descemeti und dem Abhang der Kugel eingeschlossen ist¹⁾. Da das Anlegen einzelner Zellen infolge der Zentrifugalkraft an die hintere Hornhautfläche geschieht, nicht aber auf die vordere Irisfläche, so findet man auf letzterer viel häufiger die rein kugelförmigen Präcipitate als auf ersterer, wo sie eine Seltenheit sind.

Der Unterschied zwischen echten und Pseudopräcipitaten zeigt sich schön in dem folgenden Befund, welcher dem einen der früher erwähnten Fälle seröser traumatischer Iritis, gefolgt von sympathischer Entzündung des andern Auges, entnommen ist. Der 68jährige Kranke

¹⁾ Die Neigung im Kammerwasser schwebender Zellen, sich gerade an den Rand etwa vorhandener Präcipitate anzulegen, wird sehr deutlich durch Fälle folgender Art demonstriert: Wenn bei Gegenwart von Präcipitaten eine Blutung in die Kammer auftritt, sieht man manchmal später, wenn die Hauptmasse des Blutes sich resorbiert hat, dass jedes Präcipitat von einem feinen roten Ringelchen umgeben ist.

war an beiden Augen wegen Glaukom iridektomiert worden. Das linke Auge war zur Zeit der Operation schon erblindet. Hier ging der Augendruck nach der Operation nicht herab, die Narbe wurde ektatisch, das Auge blieb gereizt, und 7 Wochen nach der Operation brach eine sympathische Entzündung am rechten Auge aus, welches die Iridektomie gut überstanden hatte. Das linke, sympathisierende Auge wies zahlreiche graue, speckige Präcipitate auf, so dass man diesen Fall wohl als seröse traumatische Iritis bezeichnen durfte. Die mikroskopische Untersuchung ergab die Gegenwart zahlreicher echter Präcipitate, welche den mittleren Teil der Hornhaut einnahmen (Textfig. 2). Ausserdem fand sich aber, und zwar im unteren Teil der Hornhaut, auch ein ganz lockerer Zellbelag, welcher stellenweise zu grösseren Häufchen, Pseudopräcipitaten sich erhebt, die also hier neben echten Präcipitaten liegen. Ein gleicher lockerer Belag überzieht auch den unteren Teil der Iris, wo er stellenweise fast so dick wird wie die Iris selbst. Geringere lockere Zellanhäufungen bestehen ferner auf dem Ciliarkörper und im circumlentalen Raum der unteren Seite. All die Zellen nun, welche lose auf der Hornhaut, Iris und Ciliarkörper liegen, sind fast ausschliesslich eosinophile Zellen; nur ganz vereinzelt sind Lymphocyten dazwischen zu sehen. Selbstverständlich bestehen auch die vorhandenen Pseudopräcipitate aus eosinophilen Zellen. Dagegen liegen im Gewebe der Uvea, welche die für sympathisierende Entzündung charakteristischen Veränderungen aufweist, nur äusserst wenige eosinophile Zellen, so dass man Mühe hat, sie überhaupt zu finden. Ebenso entbehren auch die echten Präcipitate dieses Auges dieser Zellen; sie sind wie gewöhnlich aus einer zusammenhängenden Protoplasmamasse mit eingelagerten grossen Kernen und etwas Pigment zusammengesetzt. Einzelne eosinophile Zellen liegen nur an der Oberfläche der Präcipitate, wohin sie sich aus dem Kammerwasser niedergeschlagen hatten und von wo aus sie manchmal in die Randteile der Präcipitate eingedrungen sind (die stark granulierten Zellen in Fig. 9). Dass der Belag eosinophiler Zellen auf den Präcipitaten nicht stärker ist, erklärt sich aus dem Umstand, dass die Hauptmasse dieser Zellen im unteren Teile der Kammer liegt, während die Präcipitate die mittleren Teile der Hornhaut einnehmen.

Es bestand in diesem Falle offenbar erst eine Entzündung, welche wie die sympathisierende, sich vornehmlich im Gewebe der Uvea abspielte und nicht mit der Bildung eosinophiler Zellen verbunden war; aus dieser Zeit stammen auch die echten Präcipitate. Dann kam in

der jüngsten Zeit ein Nachschub von Entzündung, welcher sich durch reichliche Auswanderung von Zellen an die Oberfläche auszeichnete, sowie dadurch, dass diese Zellen fast ausschliesslich eosinophile sind. Diese bilden an der Hornhaut einige Pseudopräcipitate. Wir sehen also echte und Pseudopräcipitate nebeneinander, welche in diesem Falle nicht bloss durch ihre Form, sondern auch durch die Art der sie zusammensetzenden Zellen sich als grundsätzlich verschieden erweisen.

Der vorstehende Fall ist auch dadurch bemerkenswert, dass es sich um eine rein lokale Eosinophilie handelte, denn in dem Blute, welches die Blutgefässe des Auges reichlich erfüllte, konnte ich keine einzige eosinophile Zelle nachweisen. Neben den eosinophilen Zellen waren im Exsudate nur noch Lymphocyten, aber keine polynukleären Leukocyten, was mit der Ansicht übereinstimmt, dass polynukleäre Leukocyten und eosinophile Zellen sich ausschliessen, indem die ersteren durch Reize angezogen werden, welche die letzteren abstossen. Gegen die Annahme, dass die lokale Eosinophilie dadurch entstehe, dass die Lymphocyten Trümmer roter Blutkörperchen aufnehmen, spricht der Umstand, dass in diesem Falle keine Anzeichen eines Blutergusses vorlagen. Endlich ist bemerkenswert, dass der Entzündungsreiz im Laufe der Krankheit offenbar eine Änderung erfahren hatte, da erst der letzte entzündliche Nachschub die eosinophilen Zellen brachte.

Auch in dem zweiten Falle seröser traumatischer Iritis, welcher zu sympathischer Erkrankung des andern Auges Veranlassung gegeben hatte, bestanden echte Präcipitate nebst Pseudopräcipitaten, nur waren hier beide von derselben Zellenart, nämlich gewöhnlichen Lymphocyten, gebildet. Offenbar hatte sich die Hauptmenge der in die Kammer ausgetretenen Zellen an die Hornhaut angelegt, bevor sie sich zusammenballten, so dass im unteren Teil der Hornhaut ein zusammenhängender Zellbelag mit hügelartigen Verdickungen entstanden war. Ein kleinerer Teil der Zellen war aber so lange suspendiert geblieben, dass es zur Konglomerierung kam, und die gebildeten Zellkugeln in den mittleren Teilen der Hornhaut sich anlegten. Hier bildeten sich also, im Gegensatz zum ersten Fall, die echten Präcipitate später als die Pseudopräcipitate.

Ein kontinuierlicher Zellenbelag im unteren Teile der Hornhaut, auf welchen nach oben einzelne Zellhaufen folgen, kommt manchmal vor und kann, nach einem von mir untersuchten Falle zu urteilen, vielleicht auch noch auf folgende Weise entstehen. Es sind zuerst echte Präcipitate da, welche sich durch Anlegung neuer Zellen verbreitern, so dass sie schliesslich zu einem zusammenhängenden Belage verschmelzen, was natürlich im untersten Teile der Hornhaut zuerst eintreten müsste.

Es ist nicht zu leugnen, dass durch ähnliche Fälle der Unterschied zwischen echten und Pseudopräcipitaten sich verwischt, ja wirkliche Übergänge zwischen beiden vorkommen. Die Natur hält sich eben nicht an die scharfen Grenzen, welche wir im Interesse der Forschung ziehen. Dies hindert mich aber doch nicht zu glauben, dass im ganzen ein prinzipieller Unterschied zwischen den beiden Arten von Präcipitaten besteht. Derselbe hat auch klinische Bedeutung, indem die echten Präcipitate vor allem der spontanen chronischen Iritis zukommen, die Pseudopräcipitate aber den mehr akut verlaufenden Fällen, besonders traumatischen Ursprungs.

Echte Präcipitate und Pseudopräcipitate dürften oft auch klinisch zu unterscheiden sein, namentlich bei Betrachtung der Hornhaut mit starker Vergrösserung. Die Pseudopräcipitate sind gewöhnlich klein, nicht sehr regelmässig rund und nicht ganz scharf begrenzt und, weil sie kein Pigment enthalten, weiss oder grau. Die echten Präcipitate sind manchmal auch klein, oft aber sind sie grösser, und sie sind es hauptsächlich, welche zu den sogenannten speckigen Beschlägen heranwachsen; sie sind regelmässig rund, scharf begrenzt, oft etwas gelblich oder bräunlich. Sie können monatelang bestehen, während die Pseudopräcipitate von kürzerer Dauer sind. Da aber doch in vielen Fällen die klinische Unterscheidung zwischen echten und Pseudopräcipitaten schwierig sein dürfte, empfiehlt es sich, diese Unterscheidung vorläufig nur auf pathologisch-anatomischem Gebiete zu machen.

Sowohl die echten als die Pseudopräcipitate sind der Hauptsache nach aus Lymphocyten zusammengesetzt. Es wurde bereits hervorgehoben (S. 206), dass schon die Infiltration in der Iris im wesentlichen aus Lymphocyten besteht, welche aber hier kleiner sind als die im Kammerwasser befindlichen. Letztere scheinen mir aus ersteren zu entstehen und zwar durch Quellung im Kammerwasser. Diese grossen Lymphocyten sind es, welche die Beschläge zusammensetzen. Die Konturen der einzelnen Zellen sind in den Pseudopräcipitaten gewöhnlich noch gut zu unterscheiden (Fig. 7 u. 8). Bei den echten Präcipitaten verhält sich dies nach dem Alter der Präcipitate verschieden. In den jungen Präcipitaten sind die Zellgrenzen noch deutlich, die Kerne sind klein, rund, gut tingiert, granuliert (Fig. 23), in den älteren Präcipitaten dagegen sind die Zellen zusammengefloßen, so dass in einer gemeinschaftlichen Protoplasmamasse Kerne liegen, welche hier grösser, länglich oder nierenförmig, blasser tingiert und wenig oder gar nicht granuliert sind (Fig. 9). Zuweilen stehen die Kerne stellenweise besonders dicht und nehmen eine halbkreisförmige

Anordnung wie in Riesenzellen an. In älteren Präcipitaten sieht man auch einzelne sehr lang gestreckte Kerne.

Viele Präcipitate bestehen bloss aus zusammengebackenen Lymphocyten; andere schliessen vereinzelte polynukleäre Zellen ein, wenn solche im Kammerwasser vorhanden sind. Diese Zellen werden von Lymphocyten nur mitgerissen, denn sie selbst haben nicht die Fähigkeit, zu Klumpen zusammenzubacken. Manchmal schliessen die Präcipitate stellenweise ein sehr feines Netz von Fibrin ein. Vakuolen in der Grundsubstanz der Präcipitate sind nicht selten, doch mögen sie manchmal nur Härtingsprodukt sein. Ein gewöhnlicher Einschluss sind Pigmentkörnchen. Dieselben stimmen ihrem Aussehen nach mit den Pigmentkügelchen der Chromatophoren der Uvea überein, und sie gelten daher als Beweis der Abstammung der Präcipitate aus der Uvea. Wenn nur wenig Pigment vorhanden ist, liegen die feinen Körnchen einzeln im Protoplasma neben dem Kern. Bei grossem Pigmentgehalt verschmelzen die Körnchen zu grossen Kugeln, vielleicht Tropfen, welche den Kern ganz verdecken können (Taf. X, Fig. 15). Solche Präcipitate sehen auch bei der klinischen Betrachtung braun oder schwarz aus. Dass Präcipitate schon bei ihrem Entstehen dunkel pigmentiert sein können, habe ich öfter klinisch beobachten können. Davon ist zu unterscheiden die zunehmende Pigmentierung, welche manche Präcipitate in dem Masse zeigen, als sie älter werden.

Fast alle Autoren stimmen darin überein, dass die Präcipitate durch im Kammerwasser suspendierte Lymphocyten gebildet werden, und dass das Endothel der Descemeti damit nichts zu tun hat, da es ja unter den Präcipitaten zumeist unverändert gefunden wird. Dagegen gehen die Meinungen darüber auseinander, wie die Lymphocyten zu Haufen sich aggregieren. Nach der Ansicht einiger schlagen sich zuerst einzelne Zellen auf die Descemeti nieder, und an diese legen sich später immer neue Zellen an, sei es, dass die Unebenheit, welche durch die bereits angeklebten Zellen gebildet wird, für neue Zellen einen Halt gibt, sei es infolge einer chemotaktischen Wirkung, welche von den bereits anhaftenden Zellen ausgeht (Straub). Die Entstehung der Beschläge durch Haften immer neuer Zellen gilt sicher für die Pseudopräcipitate. Bezüglich der echten Präcipitate dagegen halte ich an der alten Anschauung fest, dass die Zusammenballung der Zellen bereits im Kammerwasser geschieht, und die so gebildeten Klümpchen durch die Zentrifugalkraft an die Hornhaut angeschleudert werden. Für diese Entstehungsweise spricht:

1. die oft ganz runde Form der Präcipitate mit ziemlich glatter Oberfläche¹⁾,

2. dass bei chronischer Uveitis so oft nur ganz wenige Präcipitate in einer sonst vollkommen klaren Hornhaut liegen, dass also zwischen grösseren Zellkugeln die Hornhaut frei von Zellenbelag ist,

3. das schon von Arlt mit Recht betonte Verhalten, dass die Präcipitate mit Vorliebe eine dreieckige Fläche mit der Spitze nach oben einnehmen, innerhalb welcher die kleinsten Präcipitate an der Spitze, die grössten an der Basis liegen. Arlt hat sie mit der Anordnung des Kieselsteins verglichen, wenn man denselben durch ein Drahtnetz wirft, um ihn von grösseren Steinen zu reinigen. Wenn sich die Zellen zuerst einzeln an die Hornhaut legen, wäre es wohl verständlich, dass der Belag im unteren Teil der Hornhaut dicker ist als im oberen, wenn im unteren Teil der Kammer mehr Zellen suspendiert sind, aber es wäre nicht zu begreifen, dass das Ganze in eine obere Spitze ausläuft. In demselben Sinne spricht, dass auch Klümpchen anderer Art, welche nicht aus einzelnen Zellen zusammengesetzt sind, wie die später zu erwähnenden Linsenpräcipitate, zuweilen dieselbe dreieckige Gruppierung einnehmen.

Wenn die Anordnung der Präcipitate ganz regellos ist, mag der Zufall eine Rolle spielen. Wenn dagegen die Präcipitate eine bestimmte, aber von der Dreiecksform abweichende Anordnung zeigen, muss eine besondere Ursache hierfür gesucht werden. Eine regelmässige Anordnung kommt zuweilen in der Form vor, dass eine Gruppe meist sehr feiner Präcipitate ein gewöhnlich vertikal ovales Areal in der Mitte der Hornhaut einnimmt. Grössere, speckige Präcipitate finden

¹⁾ Leber (Ber. über d. 12. Vers. d. ophth. Ges. in Heidelberg. 1879) erklärt die runde Form mancher Beschläge durch die Annahme, dass diese aus einem Gerinnsel bestehen, welches die zelligen Elemente einschliesst, und das sich später zusammenzieht. Die meisten Präcipitate enthalten aber kein Gerinnsel (z. B. das in Fig. 23 abgebildete). Auch die Ansicht von Harms (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. II. S. 29. 1904) scheint mir nicht zutreffend, dass sich zuerst unregelmässige Klumpen auf die Descemeti niederschlagen, aus welchen dann durch weitere Auflagerung von Zellen zuerst runde und dann durch Ausfüllung des toten Winkels halbkuglige Präcipitate entstehen. Ich verstehe nicht, warum die Auflagerung von Zellen die unregelmässigen Klumpen nicht von vornherein zu halbkugligen Gebilden machen sollte. Die Abrundung der anfangs unregelmässigen Zellklumpen zu Kugeln erfolgt meiner Ansicht nach so, dass sie durch längere Zeit in der Kammer hin und her geschleudert werden, bevor sie an der Hornhaut festhaften. Sie werden dadurch gleichsam abgeschliffen, indem einzelne über die Oberfläche hervorragende Zellen wieder losgerissen werden.

sich manchmal besonders entlang dem Rande der Hornhaut. Zuweilen entspricht die Lage der Präcipitate entzündlichen Herden in der Hornhaut. Ich führe als Beispiel eine 41jährige Kranke an, welche, sonst gesund, an beiden Augen an tiefer Skleritis und sklerosierender Keratitis erkrankt war. Auf dem rechten Auge war die Entzündung schon abgelaufen und bestanden keine Präcipitate. Auf dem linken Auge (Textfig. 3) sind die Infiltrate in der Hornhaut randständig und zumeist halbkreisförmig. Die frischen Herde sind in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmässig trübe und sind an ihrer hinteren Fläche mit Präcipitaten besetzt. An den Herden *a* und *b*, welche genau halbkreisförmig sind, liegen die Präcipitate dem Rande entlang, besonders regelmässig im Herde *b*. Der Herd *c* ist von unregelmässiger Form, und auch die Präcipitate sind hier unregelmässig angeordnet. Die älteren Herde *d* und *e* sind weitgehend aufgeheilt, so dass auf den ersten Blick nur ein schmaler, regelmässiger, grauer Halbkreis sichtbar ist; erst bei fokaler Beleuchtung gewahrt man, dass auch innerhalb des Halbkreises die Hornhaut zart getrübt ist. Entsprechend diesen beiden Herden bestehen keine Präcipitate und ebenso wenig in den übrigen

Fig. 3.

Teilen der Hornhaut. — Ich erkläre mir die Fälle von besonderer Anordnung der Präcipitate durch die Annahme, dass an bestimmten Stellen der Hornhaut die hintere Fläche von einem dünnen Gerinnsel aus dem Kammerwasser überzogen ist, wodurch das Haften der im Kammerwasser schwimmenden Zellklumpen begünstigt wird. In dem Falle von sklerosierender Keratitis ist es ja nicht schwer, sich vorzustellen, dass solche Gerinnsel sich gerade dort bilden, wo in der Hornhaut selbst eine Infiltration besteht. Ich erinnere daran, dass man beim Ulcus serpens einen Fibrinbelag an der Descemeti entsprechend dem Sitze des Geschwüres in den vorderen Schichten häufig genug anatomisch nachgewiesen hat.

Bei der Entstehung von Präcipitaten jeder Art ist gewiss dem Kammerwasser eine Rolle zuzuschreiben. Dass dasselbe bei Entzündung eine klebende Wirkung besitzt, erkennt man an dem raschen Entstehen von Verklebungen der Iris mit der Linse, an dem Ankleben von roten Blutkörperchen, Pigmentschollen und Linsenbröckeln an der hinteren Hornhautwand. Durch diese klebende Kraft erklärt sich die Entstehung eines kontinuierlichen Zellüberzuges an der Descemeti

im Falle von Pseudopräcipitaten und das Zusammenkleben der Lymphocyten schon im Kammerwasser im Falle der echten Präcipitate. Allerdings muss noch ein besonderes Verhalten der Lymphocyten selbst angenommen werden, denn bei den polynukleären Leukocyten kommt ein solches Verkleben untereinander nicht vor. Es ist wahrscheinlich, dass die in die Kammer ausgetretenen Lymphocyten durch Adsorption einer im Kammerwasser enthaltenden klebenden Substanz selbst eine klebrige Oberfläche bekommen. Diese hält dann auch andere Zellen als Lymphocyten durch Ankleben fest, z. B. einzelne polynukleäre oder eosinophile Zellen (S. 213); in dem auf S. 231 besprochenen Falle war die Oberfläche der aus Lymphocyten hervorgegangenen Makrophagen dicht mit angeklebten polynukleären Leukocyten besetzt (Taf. X, Fig. 20).

Dass Klebrigkeit der Oberfläche von Blutkörperchen und infolgedessen Zusammenballen derselben durch eine besondere Beschaffenheit der Flüssigkeit, in welcher die Blutzellen suspendiert sind, hervorgebracht werden kann, geht aus den Versuchen von Bordet und Gengou hervor¹⁾. Die Autoren brachten zu defibriniertem Meerschweinchenblut kleine Mengen von inaktiviertem Serum eines gegen Kaninchenblut immunisierten Meerschweinchens und dann normales inaktiviertes Kaninchenblut, worauf die roten Blutkörperchen zu grossen Klumpen zusammenbuden. Ich selbst stellte Versuche an, um speziell das verschiedene Verhalten der Lymphocyten und der polynukleären Leukocyten zu studieren. Zuerst wollte ich durch das Verfahren von A. Wolff und A. v. Torday²⁾ Lymphocyteneiter durch Injektion geeigneter Substanzen in den Peritonealsack von Mäusen und Meerschweinchen gewinnen, doch waren die erhaltenen Mengen zu gering, um damit arbeiten zu können. Ich nahm daher Eiter aus heissen und kalten Abscessen, welcher mir frisch von der chirurgischen Klinik zur Verfügung gestellt worden war. Der Eiter wurde zuerst mikroskopisch auf seine Zusammensetzung aus Lymphocyten und polynukleären Leukocyten untersucht und dann teils in natürlichem Zustande, teils nach Zentrifugierung und Waschung der weissen Blutkörperchen einer längeren Schüttlung unterworfen. Trotz einer Reihe von Versuchen dieser Art, bei welcher mir Herr Dr. K. Lindner behilflich war, kam ich doch zu keinem unzweideutigen Ergebnis, bekam aber doch den Eindruck, dass eine Fortsetzung und Variierung

¹⁾ La coagglutination des globules rouges par les mélanges des anticorps et des antigenes. Zentralbl. f. Bakt. Bd. LVIII. 1. Abt. S. 330. 1911.

²⁾ Loc. cit.

der Versuche zu einem Resultate führen könnte. Vorläufig kann ich also nur auf Grund der histologischen Untersuchung kranker Augen aussagen, dass innerhalb der verschiedenen Hohlräume des Auges die polynukleären Leukocyten nicht zusammenbacken, sondern nur die Lymphocyten. Darin ist die Ursache zu suchen, warum bei akuten exogenen Entzündungen, welche hauptsächlich polynukleäre Leukocyten liefern, keine Präcipitate vorkommen, sondern nur bei den chronischen, gewöhnlich endogenen Entzündungen, bei welchen das Exsudat fast ausschliesslich aus Lymphocyten besteht.

Von der allgemeinen Ansicht, dass die Präcipitate durch Lymphocyten gebildet werden, welche aus der Uvea stammen, weichen nur zwei Autoren ab. Venneman¹⁾ lässt ganz allgemein die Präcipitate aus einer Wucherung des Hornhautendothels hervorgehen, ohne irgend einen Beweis dafür beizubringen. Opin²⁾ stellt die Bildung der Präcipitate aus Lymphocyten nicht in Abrede und behauptet nur für einen von ihm untersuchten Fall ihre Entstehung aus dem Endothel. Herr Dr. Opin hatte die Freundlichkeit, mir Präparate seines Falles zur Ansicht zu übersenden und ich konnte bei der Untersuchung derselben die Überzeugung gewinnen, dass es sich in diesem Falle überhaupt nicht um Wucherung des Hornhautendothels handelt, sondern um Epitheleinwanderung von aussen her und dadurch Epithelauskleidung der Vorderkammer (auch als Vorderkammereyste bezeichnet). Nach dem bis jetzt vorliegenden Material ist es daher noch nicht bewiesen, dass bei der Entstehung der Präcipitate das Endothel eine andere Rolle spielt als höchstens eine passive. Ich bekam allerdings einen Fall zur Untersuchung, welcher zeigt, dass das klinische Bild der Präcipitate, d. h. scharf umschriebene graue Flecken an der hinteren Fläche der Hornhaut, eventuell durch Endothelwucherung vorgetäuscht werden könnte. Dieser Fall steht aber bis jetzt noch einzig da.

Ein 28jähriger Mann hatte sich bei der Arbeit am Auge verletzt; dieses war danach durch einige Zeit entzündet und behielt ein schlechteres Sehvermögen zurück. Ein Jahr später neuerliche Entzündung und völlige Erblindung des Auges. Noch zwei Jahre später kam der Kranke zum ersten Male an die Klinik, weil er seit 7 Tagen eine Sehstörung am andern Auge bemerkte. Das rechte verletzte Auge zeigte eine lange lineare Narbe in der äusseren Hälfte der Hornhaut ohne Iriseinheilung, ferner die Residuen einer Iritis in Form von Atrophie der Iris, vollständiger Anwachsung des Pupillarrandes an die Linse und Membran in der Pupille. Das Auge war weicher und amaurotisch. Von Präcipitaten ist in der sorgfältig geführten Krankengeschichte nichts erwähnt; es heisst darin im Gegenteil ausdrücklich, dass die Hornhaut, abgesehen von der Narbe, durchsichtig ge-

¹⁾ Encyclopédie française d'opht. T. VI. p. 21.

²⁾ Arch. d'opht. 1911. p. 501.

wesen sei. Am linken Auge bestand sympathische Iridocyclitis mit vielen Präcipitaten.

Die horizontal geführten Schnitte durch das rechte Auge ergaben vor allem den typischen Befund der sympathisierenden Entzündung. Die vordere Kammer ist tief und enthält nur geronnenes Kammerwasser, kein Exsudat. Die Kammerbucht ist frei. Eine genaue Besprechung erheischt das Verhalten der Hornhaut. Diese trägt an ihrer hinteren Fläche eine Anzahl flacher Erhebungen, welche durch Ansammlung von Zellen gebildet werden. Die meisten derselben sitzen auf der Höhe der Falten, welche die hintere Hornhautfläche in diesem Falle zeigt, wie die Textfig. 4 zeigt, welche einen horizontal durch die Hornhaut geführten Schnitt wiedergibt. Die Zahl dieser Herde beträgt an manchen Schnitten bis zu acht. Sie nehmen den mittleren

Fig. 4.

Teil der Hornhaut ein in einer Ausdehnung, welche einer etwas weiteren Pupille entspricht. Die grössten unter denselben erreichen einen Durchmesser von fast 1,5 mm. Die Herde bestehen aus Zellen, welche zumeist zu einer gemeinschaftlichen Protoplasmanasse sich vereinigt haben, in welcher die Kerne liegen, die ähnlich wie die Kerne junger Präcipitate klein, rund oder polygonal und dunkel tingiert sind. An den dicksten Stellen liegen die Kerne in 6—8facher Reihe übereinander. An der Oberfläche liegen einzelne lose Zellen. Am Rande des Herdes ist das Endothel verdickt, und sein scharfer hinterer Kontur reicht eine Strecke weit auf den Abhang des Herdes hinauf. Unter dem Herd dagegen ist kein Endothel vorhanden (Taf. X, Fig. 13, 14).

Man kann die Entstehung der Herde vom ersten Beginn an verfolgen. Zwischen den Herden ist das Endothel normal, flach (Taf. X, Fig. 10). Dann wird das Endothel an einer umschriebenen Stelle dicker, indem das Protoplasma an Masse zunimmt und die früher flachen Kerne rund werden. Dann vermehren sich die Kerne, so dass sie bald in unregelmässiger doppelter Reihe liegen (Taf. X, Fig. 11). Hierdurch ist eine flache Anschwellung des Endothels gegeben. Bei weiterer Dickenzunahme erhebt sich die Endothelwucherung knospenartig über die Oberfläche. Anfangs lässt sich der hintere Kontur des Endothels noch auf die Prominenz verfolgen (Taf. X, Fig. 12 a), dann aber durchbricht die Wucherung an der einen oder andern Stelle diesen Kontur und setzt so eine Kontinuitätsstrennung des Endothels, dessen Grenzkontur dann am Abhang der Wucherung endigt (Taf. X, Fig. 13). Der Herd wächst nun sowohl in die Breite als in die Höhe weiter. Dann isolieren sich aus den oberflächlichen Schichten der ursprüng-

lich kompakten Zellmasse einzelne Zellen und werden selbständig. Man sieht sie lose auf der Oberfläche des Herdes liegen (Taf. X, Fig. 13). Es sind nicht etwa Zellen, welche sich aus dem Kammerwasser auf die Wucherung niedergeschlagen haben, denn auf der Oberfläche der Iris werden solche Zellen nicht gefunden; hier liegen nur einige wenige gewöhnliche Lymphocyten ohne erkennbaren Protoplasmaleib. Dagegen sieht man einzelne der Zellen, wie sie auf der Oberfläche der Herde liegen, auch zwischen diesen auf der Descemeti. Es fallen also einzelne dieser Zellen ab und legen sich an andern Stellen wieder an die Hornhaut an, doch ist die Zahl dieser abgefallenen Zellen gering.

Bei den grösseren Herden bemerkt man zwischen der kernhaltigen Masse und der Descemeti und unmittelbar auf letzterer liegend eine von Kernen freie Zone, welche sich immer mehr und mehr verbreitert und von dem zwischen den Kernen befindlichen Protoplasma differenziert, indem sie sich mit Eosin stärker rot färbt (Taf. X, Fig. 13). Noch später treten in der so differenzierten Protoplasmaschicht lange, schmale Kerne auf, welche unmittelbar an der Descemeti liegen und sich weiterhin in eine schmale Bindegewebsschicht verwandeln (Taf. X, Fig. 14). Die bindegewebige Umwandlung betrifft den der Descemeti anliegenden Teil der Protoplasmaschicht, wodurch der Rest dieser Schicht von der Descemeti abgedrängt wird und nun bogenförmig unterhalb der kernhaltigen Hauptmasse der Wucherung verläuft. Zu dieser Bindegewebsbildung an der hinteren Seite der Descemeti tritt später eine solche auch an ihrer vorderen Seite, und zwar zwischen ihr und den hintersten Hornhautlamellen (Taf. X, Fig. 13 u. 14). Bei den grössten Herden liegt etwas Bindegewebe selbst noch weiter vorn zwischen den hintersten Hornhautlamellen. Zwischen den bindegewebigen Lagen an ihrer vorderen und hinteren Seite ist die Descemeti häufig etwas verdünnt, aber niemals ganz unterbrochen oder sonst verändert.

Die Entstehung dieser Herde aus dem Endothel lässt sich also schrittweise verfolgen; anderseits schliesst das Aussehen derselben die Entstehung aus niedergeschlagenen Exsudatzellen nach Art der echten Präcipitate aus. Ich erwähne zum Unterschiede von den echten Präcipitaten noch besonders das Hinaufziehen des Endothels auf den Abhang der Wucherung, das Fehlen des Endothels unter derselben und die Abwesenheit selbst der kleinsten Pigmentkörnchen, welche in den echten Präcipitaten kaum je vermisst werden. In dem vorliegenden Falle waren die Herde klinisch nicht gesehen worden, offenbar weil die durch sie gesetzte Trübung zu zart war. Falls es aber vorkommen sollte, dass solche Herde undurchsichtiger würden, durch Zunahme ihrer Dicke oder vielleicht besonders durch Zunahme ihres Bindegewebes, so müssten sie klinisch als kleine, graue, runde, scharf begrenzte Flecken an der hinteren Hornhautfläche erscheinen. Sie würden dann von echten Präcipitaten wohl nicht zu unterscheiden sein.

Wucherung des Hornhautendothels ist oft beschrieben worden, aber bisher noch kein Fall wie der meinige. Die Wucherung des Endothels in diesem Falle kann nur auf einen leichten, aber lange dauernden Reiz zurückgeführt werden. Von der Hornhaut selbst ging dieser nicht aus, da diese in ihrem Parenchym durchaus normal war; er konnte also nur von der vorderen Kammer kommen. Weil hier kein Exsudat angesammelt war,

musste es das Kammerwasser sein, welches diesen Reiz ausübte. Warum das Endothel daraufhin gerade nur fleckweise wucherte und nicht in seiner ganzen Ausdehnung, ist unklar. Man sieht aber ähnliches oft; ich erinnere nur an die anfangs fleckweise Wucherung des Gefässendothels bei der Arteriosklerose.

Die Präcipitate wurden früher als Descemetitis oder Hydromeningitis bezeichnet. Für meinen Fall passt der Ausdruck Descemetitis nicht, weil die Descemeti nicht verändert war. Dagegen könnte man ihn als Hydromeningitis bezeichnen, wenn man unter Hydromeningitis das Endothel versteht als jene Gewebsschicht, welche das Kammerwasser unmittelbar begrenzt.

Die Rückbildung der Präcipitate konnte ich in meinen Fällen nicht deutlich verfolgen. Harms gibt an, dass die Kerne der Zellen sich immer schlechter färben, und die Zellen endlich zugrunde gehen. Dieser Prozess beginnt an der Basis der Präcipitate, wodurch dieselben pilzförmig werden. Welches nun immer der Vorgang der Resorption sei, so ist sicher, dass in den meisten Fällen die Präcipitate verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen. In meinem Falle Leitner waren die anfangs vorhandenen massenhaften Präcipitate 25 Tage später, als der Kranke starb, zum grössten Teil verschwunden, und auch die mikroskopische Untersuchung zeigte von den verschwundenen Präcipitaten keine erkennbaren Spuren. In manchen Fällen werden die Präcipitate mit der Zeit dunkler, und endlich bleiben für immer dunkelbraune oder schwarze Fleckchen zurück. Dieser klinisch leicht zu verfolgende Vorgang geschieht wahrscheinlich so, dass bei der Resorption der Zellen des Präcipitates die darin enthaltenen Pigmentkörnchen zurückbleiben. Es würde also keine wirkliche Vermehrung des Pigments stattfinden, sondern dasselbe würde nur in der Masse, als die Zellen verschwinden, von diesen weniger und weniger verdeckt werden. Ich habe bisher nicht Gelegenheit gehabt, einen solchen Fall anatomisch zu untersuchen, aber ich vermute, dass man bloss Pigment und allenfalls etwas Detritus auf der Descemeti finden würde, nicht aber ganze Zellen, wie bei einem stark pigmenthaltigen frischen Präcipitate, das in Fig. 15, Taf. X dargestellt ist. Es kommen auch Beschläge vor, welche von Anfang an schwarz sind und durch Anlegung von Zellen des retinalen Irisepithels entstehen (S. 228).

In einzelnen Fällen tritt eine Organisation der Präcipitate zu Bindegewebe ein. Ich glaube, wenigstens in 3 Fällen diesen Vorgang gesehen zu haben. In dem einen Falle handelte es sich um besonders alte Präcipitate im untersten Teile der Kammer, die konfluierend waren und dem nahestanden, was als schwammiges, aus dem Kammerwasser hervorstwachsendes Exsudat bezeichnet wird. Hier waren die

untersten Lagen der Zellhaufen von mehreren Lagen von Fibroblasten durchzogen, welche der hinteren Hornhautfläche parallel lagen und zwischen sich die zum Teil mit Pigment beladenen Zellen des Präcipitates einschlossen (Taf. X, Fig. 16). Von jenen Fibroblasten, welche nahe der hinteren Hornhautfläche lagen, kann man nicht sicher ausschliessen, dass sie nicht vom Endothel abstammen. Einzelne Fibroblasten findet man aber auch in den obersten Schichten der dicken Präcipitate, so weit von der Descemeti und den andern Fibroblasten entfernt, dass eine Ableitung derselben vom Endothel der Descemeti unmöglich scheint, und man nicht umhin kann, anzunehmen, dass sie sich aus den Zellen des Präcipitates selbst entwickelt haben. Zwei andere Fälle ähnlicher Art beschrieb ich seinerzeit¹⁾, und denselben Vorgang konnte Bartels an einem Falle meiner Klinik verfolgen²⁾.

Die Frage über die Herkunft der Leukocyten, welche die Präcipitate bilden, ist noch viel umstritten. Für den ausschliesslichen Ursprung aus der Iris ist Knies³⁾, Rubert⁴⁾ und Baas⁵⁾, welcher letzterer den Ciliarkörper als Quelle der Zellen deshalb ausschliesst, weil in seinem Falle Seclusio pupillae bestand. Für die Herkunft der Zellen aus Iris und Ciliarkörper und zwar auch aus dem der hinteren Kammer angehörigen Teile desselben tritt ein Groenouw⁶⁾ und Harms⁷⁾, der geradezu von Präcipitaten auch auf der Pars plana spricht. Krückmann⁸⁾ äussert sich, aber, wie es scheint, nicht auf Grund anatomischer Präparate, dahin, dass die farblosen Präcipitate von der Iris, die pigmentierten vom Ciliarkörper kommen sollten. Ich selbst habe in einer Arbeit aus dem Jahre 1884⁹⁾ den Ciliarkörper als die Quelle der Präcipitate angegeben, ohne die Iris auszuschliessen (siehe S. 202).

Die Auswanderung der die Präcipitate bildenden Zellen ist theoretisch genommen möglich aus der Iris, aus jenem Teil des Ciliarkörpers, welcher den Winkel der vorderen Kammer begrenzt, und endlich aus der der hinteren Kammer angehörigen Oberfläche des Ciliarkörpers.

¹⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXI. S. 445.

²⁾ Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. XLIII, 2. S. 15.

³⁾ Arch. f. Augenheilk. Bd. IX. S. 1.

⁴⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXXVIII. S. 268.

⁵⁾ Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. IX. S. 30.

⁶⁾ Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1900. S. 186 u. 209.

⁷⁾ Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. II. S. 25. 1904.

⁸⁾ Graefe-Saemisch, Handb. d. ges. Augenheilk. 2. Abt. Bd. V. S. 90.

⁹⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. XXX, 3. S. 146.

Dass aus der Iris Lymphocyten in die vordere Kammer gelangen und dann auch zur Bildung von Präcipitaten Veranlassung geben können, ist zweifellos. Ich muss die in meiner ersten Mitteilung geäußerte Ansicht, dass die Iris nur dann Präcipitate liefere, wenn sie stark infiltriert ist, dahin korrigieren, dass dies keineswegs notwendig ist. In dem Falle leichter chronischer Iritis (Roseneder), den ich später beschreiben werde, waren Präcipitate vorhanden, obwohl weder in der Iris, noch im Ciliarkörper freie Zellen in nennenswerter Zahl vorhanden waren und an der freien Oberfläche dieser Teile so gut wie fehlten. Es ist offenbar in den ganz chronischen Fällen die Infiltration der Uvea mit Zellen und die Auswanderung dieser in das Kammerwasser eine höchst unbedeutende, und es ist nur der langen Dauer des Prozesses zuzuschreiben, dass schliesslich genug Zellen in das Kammerwasser gelangen, um Präcipitate zu bilden.

Dass der Ciliarkörper von jenem Teil aus, welcher die Kammerbucht begrenzt, Zellen in die vordere Kammer absetzen kann, ist zweifellos. Bei schwerer Iritis mit Hypopyon ist das lockere Gewebe dieses Teiles des Ciliarkörpers oft so dicht von Leukocyten durchsetzt, dass eine Abgrenzung gegen das Hypopyon unmöglich erscheint. Desgleichen sieht man bei Blutungen innerhalb des Ciliarkörpers die Blutkörperchen von diesem aus in die vordere Kammer übertreten. Bei Melanosarkom des Ciliarkörpers, welches gegen den Kammerwinkel vordringt, können zu einer Zeit, wo die Geschwulst den Kammerwinkel selbst noch nicht erreicht hat, pigmentierte Zellen in die Kammer gelangen und sich sogar wie Präcipitate an die Descemeti anlegen¹⁾. Es muss daher auch für die chronische Uveitis die Möglichkeit zugegeben werden, dass auf diesem Wege Lymphocyten aus dem Ciliarkörper in die vordere Kammer kommen, was auch — entgegen Baas — durch eine Seclusio pupillae nicht verhindert werden könnte.

Die Lymphocyten, welche die Präcipitate bilden, können also aus der Iris oder aus dem der Kammerbucht angehörigen Teil des Ciliarkörpers stammen. Was von beiden in einem gegebenen Falle zutrifft, wird sich wohl selbst bei anatomischer Untersuchung nicht immer sicher entscheiden lassen; wahrscheinlich dürften meist beide Teile an der Zelllieferung teilnehmen. Die Beteiligung des der hinteren Kammer angehörigen Teiles des Ciliarkörpers lässt sich immer dann ausschliessen, wenn eine Seclusio pupillae besteht. Kommt aber dieser

¹⁾ Fehr. Zentralbl. f. Augenheilk. 1902. S. 129.

Teil des Ciliarkörpers überhaupt für die Bildung von Präcipitaten in Betracht? In meiner ersten Arbeit hatte ich für die Präcipitate, welche von dem hinteren Teile des Ciliarkörpers kommen sollten, einen doppelten Ursprung angenommen, nämlich erstens Klümpchen von Exsudatzellen, welche sich auf der Oberfläche des Ciliarkörpers bilden, und zweitens Zellkonglomerate, welche durch Proliferation des unpigmentierten Epithels des Ciliarkörpers entstehen. Die zweite Annahme hatte ich längst als unrichtig erkannt, aber auch die erste war mir mit zunehmender Erfahrung zweifelhaft geworden. Wenn auch einzelne Zellen aus der hinteren in die vordere Kammer gelangen konnten, so schien es mir doch fraglich, ob auch ganze Zellkonglomerate diesen Weg nehmen könnten. Meine neuesten Untersuchungen lassen mir dies aber doch wahrscheinlich erscheinen. In dem später zu beschreibenden Falle Leitner mit zahlreichen Präcipitaten lagen auf der Oberfläche der Iris nur sehr wenige Zellen, dagegen aber auf der Oberfläche des Ciliarkörpers zahlreiche Zellkonglomerate, welche genau dasselbe Aussehen hatten wie die Präcipitate auf der Hornhaut. Ebenso sagt Groenouw von den Ciliarfortsätzen: „Auf einigen derselben finden sich Auflagerungen von Zellhaufen, welche denen in der vorderen Kammer durchaus gleichen.“ Dieselben Zellhaufen liegen auch in der hinteren Kammer. Der Übertritt derselben in die vordere Kammer ist in dem Falle von Groenouw allerdings unwahrscheinlich, da viele hintere Synechien bestanden. Dass aber bei freier Pupille selbst grössere Bröckel aus der hinteren in die vordere Kammer gelangen können, beweist mir ein Fall von Gliom. Die Netzhaut war im ganzen trichterförmig abgehoben und ziemlich gleichmässig gliomatös entartet, eine grössere Geschwulstmasse hatte sich aber noch nicht gebildet. Sowohl von der äusseren als von der inneren Oberfläche der Netzhaut waren zahlreiche Geschwulstbröckel abgefallen. Die ersteren lagen in grösserer Zahl auf der inneren Fläche der Aderhaut, die letzteren im Glaskörper und in der hinteren Kammer. Einige ziemlich grosse Bröckel lagen aber auch in der vorderen Kammer, teils frei, teils an der hinteren Hornhautfläche. Coats¹⁾ nimmt auch für einen Fall von Melanosarkom des Ciliarkörpers an, dass Geschwulstpartikel vom Ciliarkörper auf dem Wege der hinteren Kammer und Pupille in die vordere Kammer gelangt seien. — Diese Fälle beweisen auch, dass eine Flüssigkeitsströmung vorhanden sein muss, welche eben den Transport nach vorn besorgt.

¹⁾ London Ophthalmic Hospital Reports. Vol. XVIII. p. 299.

Knies meint, dass die Zonula grössere Partikel nicht passieren lasse. Dagegen habe ich schon in meiner ersten Arbeit eingewendet, dass die Exsudate auf der Oberfläche des Ciliarkörpers zum Teil ausserhalb der Zonula liegen, in dem Raum zwischen ihr und der Oberfläche des Ciliarkörpers (Taf. XI, Fig. 25, 26), welcher den hintersten, auf einen kapillaren Spalt verschmälerten Teil der hinteren Kammer bildet (Orbicularraum nach Salzmann). Übrigens ist auch die Zonula selbst für Zellenklümpchen nicht undurchgängig. Fig. 27, Taf. XI zeigt, wie ein ganzer Zellenhaufen zwischen den Zonulafasern an die Glaskörperseite sich durchzwängt; dasselbe könnte wohl auch in umgekehrter Richtung geschehen.

Gleichwie an der Hornhaut werden Beschläge auch auf der Iris und im Bereiche der Pupille auf der Linsenkapsel oder auf einer Pupillarmembran beobachtet. Die Präcipitate auf der Iris werden gewiss seltener gesehen, als sie wirklich vorkommen, denn sie heben sich namentlich bei blauer oder grauer Iris von dieser kaum ab. Sie werden dann wohl nur entdeckt, wenn sie etwas grösser sind, und erscheinen als kleine, perlgraue, durchscheinende Klümpchen, die wie kleinste Knötchen aussehen und von solchen nicht immer mit Sicherheit unterschieden werden können. Sie liegen am häufigsten in kleinen Vertiefungen der Oberfläche, z. B. in den Krypten. Auf der Linsenkapsel kann man die gleichen Gebilde sehen, woraus man schliessen kann, dass es sich nicht um Knötchen handelt.

Anatomisch kommen an der Iris dieselben zwei Arten von Veränderungen vor, wie ich sie an der hinteren Hornhautfläche als Pseudopräcipitate und echte Präcipitate unterscheide. Entsprechend den ersteren findet man nicht selten — z. B. bei seröser traumatischer Iritis — die ganze vordere Fläche der Iris von einem Zellenbelag überzogen, welcher stellenweise zu kleinen Hügeln sich verdickt. Wenn man aber klinisch Präcipitate auf der Iris diagnostizieren kann, handelt es sich um Zellklümpchen auf der Iris analog den echten Präcipitaten der Hornhaut (Taf. X, Fig. 17).

Ich habe in drei Fällen echte Präcipitate auf der Iris gefunden. Dieselben sind im Vergleich zu den Hornhautpräcipitaten noch besser begrenzt, ja an der Oberfläche glatt und sitzen entweder breitbasig auf der Iris, oder sie sind kuglig und berühren die Iris nur mit einer kleinen Fläche oder sind manchmal sogar durch dünne Schicht geronnener Masse von der Irisoberfläche getrennt (Taf. X, Fig. 17). In den Präcipitaten sind die Zellgrenzen bald zu erkennen, bald nicht. Die Kerne sind dieselben wie bei den in der Iris liegenden

Lymphocyten, nur etwas grösser und blässer, wahrscheinlich durch Quellung. In einem Präcipitate hatten sich einige Kerne wie in einer Langhansschen Riesenzelle gruppiert. In einem andern Präcipitat schien sich eine Organisation vorzubereiten, welche vielleicht von der Iris ausging, auf welcher dieses Präcipitat fest anlag. Die Kerne in dem Präcipitat waren zum Teil langgestreckt oder unregelmässig geworden, und von der vorderen Grenzschicht der Iris drangen pigmentierte Zellfortsätze weit in das Präcipitat vor. In allen drei Fällen, wo ich in der Iris Präcipitate fand, bestanden solche auch an der Hornhaut, waren hier jedoch bedeutend kleiner.

Ich halte die alte Vermutung für richtig, dass die Präcipitate auf der Iris und in der Pupille entstehen, wenn der Kranke auf dem Rücken liegt, namentlich während des Schlafes. Dann fehlt wegen mangelnder Bewegung des Auges auch die Zentrifugalkraft, welche sonst die Zellklümpchen an die Hornhaut schleudert. Soweit diese also noch frei in der Kammer schwimmen, können sie sich langsam auf den Boden der Kammer senken, welcher bei Rückenlage von der Iris und Linsenkapsel gebildet wird, und bleiben dort haften.

In gleicher Weise wie Lymphocyten können sich auch andere corpusculäre Elemente auf die Hornhaut niederschlagen wie rote Blutkörperchen, Bruchstücke der Linse, des retinalen Irisepithels oder bösartige Geschwülste. Diese Beschläge legen sich wohl gewöhnlich nach Art der Pseudopräcipitate unmittelbar an die Hornhaut an, ohne sich vorher im Kammerwasser aus kleineren Partikelchen durch Zusammenballung gebildet zu haben.

Blutpräcipitate können manchmal klinisch wahrgenommen werden. Anatomisch habe ich dieselben in einem Falle spontaner Iridocyclitis gefunden, in deren Verlauf eine Blutung in die Vorderkammer aufgetreten war. Nach Resorption des grössten Teiles des Blutes lagen noch auf der hinteren Hornhautfläche einzelne teils halbkuglige, teils runde, teils unregelmässige Konglomerate roter Blutkörperchen.

Beschläge an der Hornhaut, welche durch abgefallenes retinales Irispigment gebildet werden, sehen schwarz aus. Sie entstehen sowohl infolge spontanen Abfallens des Irispigments (im Greisenalter, bei Heterochromia iridis) als nach Kontusionen, nach Operationen (Iridektomie, Kataraktoperationen) und auch bei Iridocyclitis, namentlich bei jener, welche infolge der Nekrose eines Aderhautsarkoms entsteht. In diesem Falle wird nämlich das retinale Epithel in die ein-

zellen Zellen aufgelöst und mobilisiert, so dass es sich reichlich auch in der vorderen Kammer findet. Die an die Hornhaut sich anlegenden retinalen Pigmentzellen kommen also nicht immer bloss vom Pupillarrand der Iris, sondern auch von deren hinterer Fläche, in welchem Falle sie erst durch die Pupille in die vordere Kammer treten müssen.

Ein Fall, den ich anatomisch untersuchen konnte, betraf ein Auge, welches 4 Wochen vorher infolge einer Kontusion eine Linsenluxation und im Anschluss daran eine schwere Drucksteigerung bekommen hatte. An der Hornhaut sah man zahlreiche schwarze Beschläge. Dieselbe zeigte bei der anatomischen Untersuchung einen fleckweisen Belag von nebeneinander liegenden schwarzen Kugeln. An der Iris war gerade nur der Pupillarteil wie sklerosiert und an seiner hinteren Seite hatte sich das retinale Epithel in eine Reihe von schwarzen Kugeln aufgelöst, von welchen sich ein Teil an die Hornhaut angelegt hatte.

Linsenbröckel, welche sich an die Hornhaut anlegen, können ein den echten Präcipitaten sehr ähnliches Bild geben, weshalb ich sie vor 21 Jahren als Linsenpräcipitate beschrieb¹⁾. Ich hatte dieselben bloss auf Grund klinischer Beobachtung als Linsenteilchen erkannt, da ich damals noch kein Präparat von einem solchen Falle besass. Sie finden sich in Fällen, wo die vordere Linsenkapsel eröffnet wurde, und dadurch quellende Linsenmassen in der Kammer blossliegen. Die in solchen Fällen auftretenden Beschläge könnte man leicht für das Zeichen einer schleichenden Iridocyclitis halten, um so mehr, als sie manchmal dieselbe Anordnung besitzen wie die echten Präcipitate. Mit der Lupe gesehen, erscheinen sie bald rund, bald eckig wie kleine Splitter. Einige sind weiss, andere bräunlich in verschiedenen Tönen. Sie verschwinden rascher als die echten Präcipitate, manchmal schon nach einigen Tagen. Ich verfüge jetzt über Präparate von vier Fällen mit Linsenpräcipitaten. Drei Fälle sind weit vorgeschrittene Glaukome, wo nach der Iridektomie die Linsenkapsel im Bereich des Coloboms defekt war, sei es, dass sie bei der Operation verletzt wurde, sei es, dass sie spontan platzte. Der vierte Fall, von dem Fig. 18, Taf. XI entnommen ist, war eine perforierende Verletzung der Hornhaut und kam 5 Wochen später zur Enucleation. An der hinteren Hornhautfläche waren zahlreiche kleine weisse Präcipitate zu sehen und auf dem Boden der Kammer einige Bröckel

¹⁾ Beiträge zur Augenheilk. Heft III. 1891.

quellender Linsenmasse. Die Linsenbröckel, welche in diesen Fällen sowohl an der hinteren Hornhautfläche als auch an der vorderen Irisfläche lagen, sind von zweierlei Beschaffenheit. Die einen sind unregelmässige Schollen von Linsensubstanz, deren Zusammensetzung aus Fasern sehr deutlich ist, weil durch Quellung eine Zerklüftung der Schollen stattgefunden hatte. Die zweite, zahlreichere Art der Bröckel sind grosse Kugeln, den Morgagnischen Kugeln entsprechend (Taf. XI, Fig. 18). An der Oberfläche der Linsenpräcipitate liegen einzelne Lymphocyten. Das Endothel der Hornhaut ist unter den Beschlägen im ganzen normal, nur unter einem besonders grossen Linsenbröckel fehlten einzelne aus der Reihe der Endothelzellen.

Die echten Präcipitate bestehen aus Lymphocyten. Den polynucleären Leukocyten fehlt die Fähigkeit, sich zusammenzuballen, und die einzelnen Exemplare, welche man in den Präcipitaten findet, sind von den Lymphocyten nur mitgerissen und eingeschlossen worden. In eitrigen Exsudaten, d. i. also im Hypopyon, das hauptsächlich aus polynucleären Leukocyten besteht, kommen allerdings auch kugelige Gebilde vor, welche aber eine andere Bedeutung haben. Ich fand dieselben in fünf Fällen. Dreimal handelte es sich um ein Hypopyon bei Hornhautgeschwür, das eine Mal ein Diplobacillengeschwür, das andere Mal von bakteriologisch nicht bestimmter Ätiologie, das dritte Mal ein Geschwür nach Morbillen bei einem Kinde. Der vierte Fall war eine Netzhautabhebung mit nachfolgender Iridocyclitis, welche ausnahmsweise zur Bildung eines eitrigen Exsudates in der vorderen Kammer geführt hatte. Im fünften Fall bestand eine traumatische Endophthalmitis. Die genannten Kugeln erreichen eine Grösse bis zu 0,03 mm (Taf. X, Fig. 19). Sie haben einen einfachen, aber scharfen Kontur und bestehen aus einer homogenen, kaum färbbaren Grundsubstanz, welche verschiedene Gebilde einschliesst. Die einen sind kleine, unregelmässige, mit Hämatoxylin sehr dunkel gefärbte Bröckel, welche leicht als geschrumpfte Zellkerne oder deren Bruchstücke zu erkennen sind. Die andern zahlreicheren sind grössere, durch Eosinhämatoxylin blassrosa gefärbte Kügelchen, die gequollenen und ihres Chromatins verlustig gewordenen Kerne polynucleärer Leukocyten. Ferner finden sich häufig kleine Pigmentkörnchen. In jeder Kugel liegt aber ein, selten zwei Kerne, welche sehr gross, rund oder oval, chromatinarm und mit einem Kernkörperchen versehen sind.

Die Herkunft dieser Kugeln lässt sich leicht feststellen, wenn man die kleinsten derselben untersucht. Dieselben enthalten auch schon einen grossen blassen Kern und daneben einige im Untergang

befindliche kleine Kerne in solcher Gruppierung, dass man sie leicht als die Kerne polynucleärer Leukocyten erkennt. Es handelt sich also um Zellen, die, nach ihrem Kern zu urteilen, aus Lymphocyten hervorgegangen sind, und welche phagocytär geworden sind, indem sie Eiterkörperchen aufnehmen, wobei sie sich immer mehr vergrössern. Es sind die von Metschnikoff zuerst als Makrophagen bezeichneten Zellen. Im Gegensatz zu den Lymphocyten nehmen die polynucleären Leukocyten als Mikrophagen nur Bakterien, aber keine Zellen auf. Im Hypopyon spielen die polynucleären Leukocyten bloss eine passive Rolle, indem sie teilweise von den Makrophagen aufgenommen und zerstört werden¹⁾. Das in denselben auftretende Pigment scheint durch Verdauung der Eiterkörperchen gebildet zu werden. Es ist bemerkenswert, dass in einem der drei Fälle auch rote Blutkörperchen in ziemlicher Zahl zwischen den Exsudatzellen lagen, aber niemals von den Makrophagen aufgenommen wurden.

Die Makrophagen lagen in meinen Fällen teils mitten im eitrigen Exsudat, teils an der hinteren Fläche der Hornhaut, in grösster Zahl aber auf der Iris und der Pupillarmembran. In einem der Fälle war die Iris im unteren Teile der Kammer mit einer zusammenhängenden Lage von Makrophagen bedeckt (Taf. X, Fig. 20). Die der Kammer zustehende freie Oberfläche derselben war dicht besetzt von polynucleären Leukocyten mit noch gut gefärbten Kernen, während der der Iris anliegende Teil der Makrophagen frei von solchen Belägen war. Diese polynucleären Leukocyten waren nicht von den Makrophagen gefressen worden, sondern hatten sich offenbar an die freie Oberfläche der Makrophagen angeklebt und kennzeichneten dadurch die klebrige Beschaffenheit derselben, von welcher schon bei der Aggregation der Lymphocyten zu Präcipitaten die Rede war.

In rein lymphocytären Exsudaten kommen die geschilderten grossen Kugeln nicht vor, da die Makrophagen nur polynucleäre Leukocyten aufnehmen. In solchen Exsudaten findet man nur manchmal kleinere Kugeln, welche bei schwacher Vergrösserung wegen ihrer geringen Tinktion als helle Lücken in der dichten Zellenmasse

¹⁾ Gilbert (v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXXVII. S. 218) glaubt, dass die Aufnahme der polynucleären Leukocyten durch Lymphocyten dahin führen könne, dass ein ursprünglich aus polynucleären Leukocyten bestehendes Exsudat ein solches wird, welches aus Lymphocyten zusammengesetzt ist. Ich halte dies für ganz ausgeschlossen, denn wenn polynucleäre Leukocyten von Lymphocyten gefressen werden, so entsteht daraus nicht ein gewöhnliches lymphocytäres Exsudat, sondern die grossen Makrophagen.

hervortreten. Bei starker Vergrößerung kann man feststellen, dass es sich um einzelne stark kugelige aufgequollene Lymphocyten handelt, welche aber keine Einschlüsse besitzen.

Im Anschluss an die Präcipitate im Bereich der Vorderkammer möchte ich noch solche besprechen, welche im hinteren Augenraum vorkommen. Ich sehe hier von den Zellkonglomeraten auf der Oberfläche des Ciliarkörpers ab, von welchen später die Rede sein wird, und ziehe nur diejenigen in Betracht, welche sich manchmal auf der Netzhaut, im Glaskörper und auf der Aderhaut finden. Es handelt sich dabei ausnahmslos um echte Präcipitate in dem Sinne, dass die Zusammenballung der Zellen in freier Flüssigkeit stattfindet und erst dann die Anlegung der grossen Zellkugeln an die Augenhäute erfolgt.

Präcipitate auf der Netzhaut hatte ich zuerst im Jahre 1909 bekannt gemacht¹⁾. 1912 wurden sie dann von Straub²⁾, dem meine Mitteilung offenbar entgangen war, abermals besprochen, nachdem er schon 1910 durch seinen Schüler O-Siau-Dhai³⁾ eine kurze Mitteilung davon hatte machen lassen. Die Beschreibung und die beigegebene Abbildung entsprechen allerdings nicht echten Präcipitaten, sondern Pseudopräcipitaten; es ist ein kontinuierlicher, nur stellenweise dickerer Zellenbelag, wie ihn Straub in derselben Veröffentlichung auch von der Hornhaut beschreibt und als Präcipitate in Anspruch nimmt.

Die echten Präcipitate der Netzhaut sind gradeso wie an der Hornhaut entweder grössere Zellkugeln, welche nur mit einem kleinen Teil ihrer Oberfläche die Netzhaut berühren (Taf. XI, Fig. 21), ja manchmal sogar durch eine dünne Schicht geronnener Masse von ihr getrennt sein können, oder sie sitzen der Netzhaut als etwas flachere Hügel breitbasig auf. Manchmal liegen auch Präcipitate auf der Oberfläche der Papille. Die Präcipitate werden von Lymphocyten gebildet und zeigen dieselbe feinere Beschaffenheit wie die Präcipitate an der Hornhaut, auf deren Beschreibung hier verwiesen wird. Während die Präcipitate keine oder nur ganz vereinzelte polynucleäre Leucocyten einschliessen, tragen sie manchmal an ihrer Oberfläche einen zusammenhängenden Belag von solchen, so dass schon bei schwacher Vergrößerung an Hämatoxylin-Eosinpräparaten die dunkelblaue Färbung der Randteile des Präcipitates auffällt. Die polynucleären Leucocyten haben sich erst nachträglich an die Oberfläche des Präcipitates

¹⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXX. S. 472.

²⁾ Nederlandsche Tijdschrift voor Geneeskunde. Nr. 13. 1912.

³⁾ Over Glasvochstof, Academisch Proefschrift.

angeklebt, sowie dies von den Makrophagen in der Vorderkammer beschrieben wurde (S. 231).

Die Netzhautpräcipitate enthielten in zwei meiner Fälle Pigment. Dasselbe erwies sich in dem einem Falle als hämatogenes, in dem andern nach der Beschaffenheit der feinen Pigmentkörnchen als vom Ciliarepithel abstammend. In manchen Präcipitaten rücken die Kerne näher zusammen, die Grundsubstanz färbt sich dunkler mit Eosin, und die an der Oberfläche gelegenen Kerne werden länger und ordnen sich zur Oberfläche parallel an, wodurch der Eindruck einer Art Kapsel hervorgebracht wird (Taf. XI, Fig. 21). Diese verdichteten, an der Oberfläche geglätteten Präcipitate sind wahrscheinlich solche, welche durch längere Zeit in dem Raum hinter dem abgehobenen Glaskörper herumgeschleudert wurden, bevor sie an der Netzhaut hafteten. Ich gebe davon eine Abbildung, während ich in bezug auf die gewöhnlichen Netzhautpräcipitate auf die Figuren verweise, welche meiner oben citierten Arbeit beigegeben sind (Taf. XII, Fig. 2 u. 3).

Ich verfüge jetzt zusammen mit dem schon veröffentlichten über 7 Fälle mit Netzhautpräcipitaten. In allen handelte es sich um eine nicht mehr ganz frische Endophthalmitis nach perforierender Verletzung. Während also die Präcipitate in der Vorderkammer in der Regel bei endogener und nur ausnahmsweise bei exogener Entzündung entstehen, ist für die Präcipitate der Netzhaut die exogene Entzündung bisher als die einzige Ursache bekannt. Diese liefert in heftigen Fällen und im Beginn polynucleäre Leukocyten, welchen die Fähigkeit des Zusammenballens abgeht. Wenn dann die Stärke der Entzündung nachlässt, werden Lymphocyten in den Glaskörperraum abgesetzt, welche Präcipitate zu bilden vermögen. In einem der Fälle bestand im vorderen Abschnitt des Glaskörpers ein kleiner Abszess, zusammengesetzt aus polynucleären Leukocyten, und auch die Oberfläche des Ciliarkörpers war von solchen bedeckt, während im hinteren Abschnitt auf der Netzhaut fast nur Lymphocyten lagen, welche die Präcipitate lieferten. Die Zellen, welche diese bilden, können aber ausser von der Netzhaut auch vom Ciliarkörper, wenigstens von dem hinteren Abschnitt desselben stammen, wofür die Gegenwart von Pigmentkörnchen in einzelnen Präcipitaten spricht.

Die Lymphocyten konglomerieren in der Regel nicht im Glaskörper selbst. Ich habe nur einmal, und zwar in einem Falle von sympathisierender Entzündung, grosse, schön begrenzte und abgerundete Zellkugeln im vordersten Teil des Glaskörpers gesehen; einige derselben enthielten sogar Riesenzellen. In diesem Falle hatte die Lympho-

cyteninfiltration im Ciliarkörper die Epithelschicht desselben durchbrochen und ragte in den Glaskörper vor, so dass vielleicht hierdurch die Bildung freier Zellkugeln im Glaskörper ermöglicht worden war. In den 7 Fällen mit Netzhautpräcipitaten dagegen hatte die Bildung derselben in einer hinter dem Glaskörper angesammelten Flüssigkeit stattgefunden. Im Glaskörper selbst lagen die Leukocyten einzeln, und war keine Ballung derselben eingetreten. Der Glaskörper hatte sich aber auf den vorderen Abschnitt des Glaskörperraums zurückgezogen, und der hinter ihm freiwerdende Raum war von einer im Präparate gleichmässig geronnenen Flüssigkeit erfüllt. Wenn auch vielleicht durch die Härtung die Schrumpfung des Glaskörpers noch stärker erschien, so bestand doch gewiss schon im Leben eine hintere Glaskörperabhebung. Der Glaskörper grenzt sich gegen die hinter ihm befindliche Flüssigkeit scharf ab, besonders da seine hintere Fläche meist mit Exsudatzellen belegt ist. Diese hatten sich aus der retrovitrealen Flüssigkeit darauf niedergeschlagen. Andere Zellen hatten sich aber in dieser Flüssigkeit zu Zellkugeln vereinigt, welche in den Schnitten teils noch frei in der Flüssigkeit, teils an der hinteren Fläche des abgehobenen Glaskörpers, teils an der Netzhaut haftend gefunden wurden. An letzterer Stelle sind sie am zahlreichsten, wohl auch infolge der Wirkung der Zentrifugalkraft; infolge der Schwerkraft finden sich die meisten auf der unteren Hälfte der Netzhaut.

Ähnlich den Netzhautpräcipitaten, aber nach der Art der Entstehung davon prinzipiell verschieden ist eine Bildung, welche ich in einem Falle traumatischer seröser Iritis beobachtete. Es bestanden zahlreiche typische Präcipitate im unteren Teile der Netzhaut, welche keinerlei Beziehung zu den Netzhautgefässen hatten; nicht wenige derselben lagen überhaupt noch nicht auf der Netzhaut, sondern etwas entfernt davon im Glaskörperraum. Ausserdem aber sah man an einigen Stellen gleich aussehende halbkugelige Zellhaufen, welche der *Limitans interna retinae* gerade dort aufsassen, wo eine Netzhautvene, umgeben von einem dichten Lymphocytenmantel, innerhalb der Faserschicht lag (Textfig. 5). Es war ferner an einzelnen dieser Gebilde deutlich, dass gerade entsprechend der Mitte ihrer Basis die *Limitans interna* eine Öffnung besass, durch welche die Zellen aus der Umgebung des Gefässes an die Oberfläche traten und sich zu dem Zellhügel ausbreiteten, in welchem infolgedessen die Kerne eine fächerförmige Anordnung zeigten. Dieser Zellhügel hatte sich also nicht frei im Glaskörperraume gebildet, wie die Präcipitate, sondern war unmittelbar vom Blutgefäss geliefert worden, während sonst von den Netzhautgefässen in der Regel nur ein ungleichmässiger Belag von Zellen auf der Innenfläche der Netzhaut entsteht, wie man bei jeder Endophthalmitis sieht. Ich erwähne das seltene Vorkommnis nur, damit nicht vielleicht jemand, der ein solches Bild zu

sehen bekommt, zum Glauben verleitet wird, dass dies die gewöhnliche Entstehungsart der Präcipitate sei.

Den Präcipitaten analoge Zellkugeln können überall entstehen, wo Lymphocyten frei in einer Flüssigkeit schweben und bewegt werden. Ich habe gleiche Zellkugeln auch in grösseren Netzhautcysten, sowie in der subretinalen Flüssigkeit gesehen. Aus letzterer schlagen sie sich auf die innere Oberfläche der Aderhaut und auf die äussere Oberfläche der Netzhaut nieder, vorwiegend aber auf die erstere, wieder infolge der Zentrifugalkraft. Die meisten dieser Zellkonglome-

Fig. 5. Vergr. 70:1. Lymphocytenhaufen an der Oberfläche der Netzhaut entstanden durch Auswanderung aus dem eine Netzhautvene umgebenden Zellenmantel. Links daneben ein kleines echtes Präcipitat.

rate haben regelmässige Kugelform; Taf. XI, Fig. 22 zeigt ein solches Präcipitāt auf der Aderhaut, das Cholesterinkrystalle einschliesst. Ich führe dieses Beispiel hier an, um zu zeigen, dass die Zusammenballung der Lymphocyten im Auge überall dort erfolgen kann, wo sie sich frei in einer Flüssigkeit befinden.

Ich komme nun zur Beschreibung der einzelnen Fälle chronischer Uveitis, welche ich anatomisch untersucht hatte. Dieselben sind:

1. Ein ganz leichter Fall (Leitner), in welchem bloss Präcipitate,

aber keine Synechien vorhanden waren, weshalb ich ihn als Cyclitis bezeichne. Er heilte rasch aus.

2. Fälle bloss mit Präcipitaten, nur ausnahmsweise mit Synechien, daher auch klinisch bloss Cyclitis, und gekennzeichnet durch eine gleichzeitige Verfärbung der Iris ins Hellere (Heterochromia iridis). Diese Fälle sind von sehr langer Dauer, aber bleiben fast immer leicht.

3. Ein leichter Fall (Roseneder), wo nebst Präcipitaten auch einzelne Synechien bestanden, daher chronische Iridocyclitis.

4. Schwerere Fälle, welche teilweise durch Seclusio pupillae und Drucksteigerung zur Erblindung geführt hatten.

Endlich habe ich noch, obwohl nicht zur chronischen Uveitis gehörend, als endogen und weder tuberkulös, noch syphilitisch in Betracht gezogen,

5. die Iridocyclitis, welche infolge von Netzhautabhebung eintritt.

III. Cyclitis mit Präcipitaten.

Ein 24 jähriger Bauer, Leitner, sonst gesund, hatte 3 Wochen vor seinem Eintritt in die Klinik eine Krankheit gehabt, die er als Influenza bezeichnete. Seit dieser Zeit litt er an Kopfschmerzen und Sehstörung. Bei seiner Aufnahme in die Klinik, am 2. X. 1911, klagte der Kranke nur über etwas Lichtscheu. Die allgemeine Untersuchung ergab normale Verhältnisse bis auf ein systolisches Geräusch an der Herzspitze und verkürztes Atmen über der linken Lungenspitze. Für Syphilis war kein Anhaltspunkt vorhanden und die Wassermannsche Probe fiel negativ aus.

Die beiden Augen waren blass und zeigten nur nach längerer Untersuchung eine Spur von Ciliarinjektion. Die Hornhäute waren klar und glänzend, in ihrer oberen Hälfte waren einzelne, in der unteren massenhaft kleine Präcipitate zu sehen. Die Pupillen waren von normaler Weite und Reaktion und erweiterten sich maximal auf Atropin. An der Iris waren keine Veränderungen sichtbar. Die Papillengrenzen waren ein wenig verschwommen, die Netzhautvenen etwas verbreitert und geschlängelt. Sonst war der Augenhintergrund normal.

Das Sehvermögen war rechts $S \frac{6}{6}$, mit $+ 0,5 D$ sph. schlechter. Jäger Nr. 1, Pp 17 cm ($A. = 6 D$); links $S \frac{6}{24}$; keine Besserung durch sphärische oder cylindrische Gläser, Jäger 3 in 14 cm. Ophthalmometrisch $A_s 1,5 D$ nach der Regel. — Rechts bestand also Accommodationsparese, wohl in Zusammenhang mit der Erkrankung des Ciliarkörpers. Links liess sich der Nahepunkt wegen der ungenügenden Sehschärfe nicht genau bestimmen. Da am linken Auge weder eine grössere Refraktionsanomalie, noch eine ophthalmoskopisch wahrnehmbare Veränderung im Augenhintergrunde die schlechte Sehschärfe zu erklären vermochte, wurde diese als angeborene Amblyopie aufgefasst.

Es bestand die Neigung, für viele Fälle chronischer Cyclitis Tu-

berkulose als Ätiologie anzunehmen. Das verkürzte Atmen über der linken Lungenspitze wurde in diesem Sinne gedeutet und mit Rücksicht auf diesen positiven Befund eine diagnostische Tuberkulininjektion unterlassen. Es wurde gleich mit den therapeutischen Injektionen begonnen, und zwar bekam der Kranke am 7. X. als erste Injektion $\frac{1}{500}$ mg der Bacillenemulsion. Die Temperatur stieg nach dieser und den folgenden Injektionen nur bis auf $37,5^{\circ}$. Erst als man zu $\frac{6}{500}$ mg kam, trat Fieber von $38,9^{\circ}$ auf, weshalb die Injektionen ausgesetzt wurden. Noch bevor man dieselben wieder aufgenommen hatte, stieg am 27. X. die Temperatur plötzlich auf 40° an. Der Kranke bekam Seitenstechen, Erbrechen und Durchfall und verschied am Morgen des nächsten Tages. Was die Augen anlangt, so war während der Injektionen keine lokale Reaktion an denselben aufgetreten, und die Präcipitate waren in den letzten Tagen fast verschwunden.

Die Sektion ergab Katarrh des Magens, des Dün- und Dickdarms, ferner ein offenes Foramen ovale in Form eines 20 hellerstückgrossen Defektes des Septums, endlich Status lymphaticus (nach Paltauf). Es bestand ausgeprägte Hyperplasie der Zungen- und Dünndarmfollikel, in geringem Masse auch der Milzfollikel. Die Pubes waren mangelhaft behaart, die Hoden hypoplastisch. Der pathologische Anatom erklärte den Status lymphaticus für die Ursache, warum ein mässiger Magen-Darmkatarrh zum plötzlichen Tode geführt hatte. Bei der Sektion wurde genau nach tuberkulösen Veränderungen gesucht, solche aber weder in den Lungen, noch in den Lymphdrüsen, noch in andern Organen gefunden¹⁾.

Der rechte Bulbus wurde im Zusammenhang mit dem Orbitalinhalt entfernt und in Müller-Formol gehärtet, der linke in Zenkerscher Lösung. Das Chiasma zusammen mit den intrakraniellen Teilen der Sehnerven kam in Müller-Formol. Bei der histologischen Untersuchung zeigten beide Augen fast den gleichen Befund, so dass sie zusammen beschrieben werden, und nur zum Schlusse sollen die kleinen Verschiedenheiten zwischen beiden Augen erwähnt werden.

Die Augen sind von normaler Grösse, die Pupillen für Leichenaugen weit (5 mm). Die Linsen sind klein [äquatorialer Durchmesser 8 mm gegen 9 mm normal, sagittaler 3,5—4 mm gegen 4,8 mm normal²⁾] und daher der circumlentale Raum breit (durchschnittlich 1 mm). Die geringe Grösse der Linsen hat mit dem frischen Krankheitsprozesse natürlich nichts zu tun,

¹⁾ Hayashi (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. I. S. 274. 1911) berichtet von einer alten Frau, welche an einer Iritis mit Präcipitaten litt, wobei manchmal auch Knötchen in der Iris gesehen wurden. Die Kranke wurde mit Tuberkulininjektionen behandelt, wobei bis zu 39° vorkamen. Bei der Sektion der Patientin wurde am Körper nichts auf Tuberkulose Verdächtiges gefunden, und auch der histologische Befund an den Augen ergab keine Anhaltspunkte dafür. Dennoch hält der Verfasser seinen Fall für tuberkulöser Natur. Ich kann dieser Ansicht nicht beipflichten, um so weniger, als ich noch ein paar andere Fälle kenne, wo die Tuberkulininjektion Fieber ausgelöst hatte, und doch bei der Sektion keine Spur von Tuberkulose gefunden wurde.

²⁾ Salzmann, Anatomie und Histologie des menschlichen Augapfels. 1912. S. 175 u. 176.

vielleicht hängt sie zusammen mit den andern bei dem Kranken festgestellten Hypoplasien.

Die Hornhäute zeigen keine Veränderungen. Ihr Endothel ist unverändert bis auf zahlreiche Vakuolen, die aber auch in normalen Augen vorkommen. An der hinteren Hornhautwand liegen nebst einzelnen Zellen nur einige wenige Zellkonglomerate, entsprechend der klinisch festgestellten Tatsache, dass die Präcipitate in den letzten Tagen fast verschwunden waren. Die Zellkonglomerate hatten noch ihre ursprüngliche nicht ganz regelmässige runde Form und lagen der Hornhaut nur ganz lose auf (Taf. X, Fig. 23). Die breitbasig der Hornhaut aufsitzenden halbkugligen Präcipitate, wie sie älteren Fällen eigen sind, fehlten hier. Auch die feinere Struktur der Zellkugeln entspricht Präcipitaten jüngeren Datums. Die Kerne sind kleiner und chromatinreicher als die grossen, blassen, gequollenen Kerne in alten Präcipitaten. Auch färbt sich die Zwischensubstanz noch stärker rot mit Eosin. In ihr liegen Pigmentkörnchen.

Die Iris hat normales Gefüge. In ihrem Gewebe liegen einzelne Lymphocyten und etwas Plasmazellen (ähnlich wie in Fig. 1, welche aber nicht von diesem Fall ist). Die meisten der Zellen sind im Bereich der Lymphspalte (Fortsetzung der Krypten). Ansammlung solcher Zellen in Form kleiner, unscharf umschriebener Knötchen findet sich in jedem der beiden Augen nur an zwei Stellen, und zwar immer am peripheren Rande des Sphinkter. Im ganzen ist die Infiltration der Iris so gering, dass man dieselbe bei schwacher Vergrösserung für normal halten würde, und es ist daher begreiflich, dass dieselbe auch klinisch normal aussah. Anzeichen von hinteren Synechien fehlen. Im Ciliarkörper besteht dieselbe unbedeutende diffuse Infiltration und einige feinste herdförmige Zellanhäufungen. Etwas mehr Zellen, sowohl Lymphocyten als Plasmazellen, liegen an der Oberfläche des Ciliarkörpers, und zwar der Pars plana. Man muss daraus schliessen, dass die Zellen in dem Masse, als sie aus den Blutgefässen in das Stroma des Ciliarkörpers traten, an die Oberfläche auswanderten, so dass sie sich nicht im Gewebe anhäufte. Nur an wenigen Stellen findet man eine einfache Reihe von Lymphocyten zwischen der Glashaut und der pigmentierten Epithellage. Aus dieser Lagerung der Zellen geht hervor, dass das Epithel dem Durchtritt der Zellen ein etwas grösseres Hindernis bietet als die Glashaut, so dass sich die Zellen unter dem Epithel ansammeln. Einzelne Zellen liegen, offenbar im Durchtreten durch das Epithel begriffen, zwischen den unpigmentierten Epithelzellen. Die Pigmentkörnchen, welche sie enthalten, haben sie bei ihrem Durchtritt zwischen den pigmentierten Epithelien mitgenommen. Das Epithel selbst ist kaum verändert. Nur an wenigen Stellen im gefalteten Teil des Ciliarkörpers besteht eine umschriebene Läsion des Epithels, indem es von den andrängenden Zellen abgehoben wird. Bald ist es nur die innere unpigmentierte Lage (Taf. XI, Fig. 24 *b d*), bald auch die äussere pigmentierte (*c*), welche von der Unterlage abgedrängt werden, wobei die Epithelzellen grösstenteils zugrunde gehen; die Lücke wird durch ein Häufchen der an die Oberfläche auswandernden Zellen ausgefüllt. Es entstehen kleine Epitheldefekte, also, wenn man so sagen darf, kleinste oberflächliche Geschwüre (bei *e*).

Die an die Oberfläche des Epithels gelangten Zellen liegen zunächst

nach aussen von der Zonula (Taf. XI, Fig. 25 u. 26). Dann sieht man Zellen zwischen den Zonulafasern. Fig. 27, Taf. XI, welche dies zeigt, ist bei einer Einstellung gezeichnet, welche gerade die Zellen sehen lässt, die sich durch eine Spalte zwischen den Fasern α durchzwängen. Bei einer tieferen Einstellung sieht man an der Stelle der Zellen die Zonulafasern ununterbrochen weiter ziehen. Endlich liegen Zellen auf der Glaskörperseite der Zonula (Taf. XI, Fig. 28). Die meisten Zellen sind zu kleinen halbkugligen oder runden Konglomeraten vereinigt, welche hauptsächlich auf der Oberfläche des flachen Teiles, nur wenig auf dem hinteren Abschnitte des gefalteten Teiles und gar nicht auf der Höhe der Ciliarfirsten liegen. Die Zellhaufen auf dem gefalteten Teil sind zumeist rund (Taf. XI, Fig. 25), die auf dem flachen Teil abgeplattet (Taf. XI, Fig. 26), weil am ersten Orte zwischen der Oberfläche des Epithels und den Zonulafasern mehr Platz ist als am zweiten¹⁾.

Nur ausnahmsweise ist gerade dort, wo ein Zellenhäufchen liegt, auch im Gewebe des Ciliarkörpers eine grössere Zahl von Zellen zu sehen; in der Regel ist entsprechend den Zellhäufchen die Zahl der Exsudatzellen im Stroma des Ciliarkörpers sehr gering und jedenfalls nicht grösser als an den dazwischen liegenden Stellen. Es kann also die Bildung der Zellhäufchen nicht durch eine besonders starke fleckweise Entzündung im Ciliarkörper selbst erklärt werden. Ebenso wenig kann man eine Ballung der Zellen zu Konglomeraten durch Hin- und Herschütteln annehmen, da der freie Raum hierzu fehlt. Man kann nur denken, dass von den Punkten, an welchen sich Zellhäufchen finden, eine stärkere chemotaktische Wirkung ausgeht, welche die überall in geringer Zahl und gleichmässiger Weise an die Oberfläche tretenden Zellen auf diese Punkte hinlenkt.

Die Zellklümpchen können sich offenbar von der Oberfläche des Ciliarkörpers ablösen und durch eine Flüssigkeitsströmung nach vorn getragen werden, denn man findet einige gleich aussehende im Petitschen Raum zwischen den Zonulafasern, nahe dem Äquator der Linse. Wahrscheinlich gelangen sie noch weiter durch die Pupille in die vordere Kammer, denn manche Zellklümpchen an der hinteren Hornhautwand haben dasselbe Aussehen wie die auf der Oberfläche des Ciliarkörpers. Ich fand z. B. eines auf dem Ciliarkörper, das fast genau dem in Fig. 23, Taf. X abgebildeten Hornhautpräcipitate gleicht.

Der Epithelüberzug des Ciliarkörpers ist, abgesehen von den oben erwähnten kleinen Epitheldefekten, im ganzen normal, nur an wenigen umschriebenen Stellen besteht eine Wucherung des Epithels. Sie betrifft in erster Linie die unpigmentierten Zellen der inneren Lage. Hier kann man stellenweise mehrere Zellagen übereinander sehen, so wie ich sie in meiner Arbeit über die Wucherungen des Ciliarepithels in Fig. 17 abgebildet habe²⁾. Es sind durch die Schnitte quer getroffene, der Oberfläche des Ciliarkörpers parallele Zellplatten. Die gewucherten Epithelzellen enthalten feine Pigmentkörnchen, welche aus der pigmentierten äusseren Lage stammen. Die Wu-

¹⁾ Ganz gleiche Zellenhaufen auf der Pars plana zeichnet Knies in Fig. 3 seiner Arbeit.

²⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXIX. S. 534.

cherung dieser beginnt erst später und erreicht nicht denselben Grad. Nur am linken Auge befindet sich unmittelbar vor der Ora serrata eine Stelle, wo eine mächtige Wucherung der pigmentierten Lage die unpigmentierte durchbricht und glaskörperwärts wächst, wobei sie im Verein mit der unpigmentierten Lage einige grosse cystenartige Blasen bildet.

Eine eigentümliche Degeneration, von welcher ich nicht weiss, ob sie mit dem Krankheitsprozess zusammenhängt oder nur einen zufälligen Befund bildet, besteht in einer Aufquellung der Epithelzellen. Dieselbe findet sich hauptsächlich im hinteren Abschnitte der Pars plana. Sie betrifft die unpigmentierten und in etwas geringerem Grade auch die pigmentierten Epithelien, ist aber an letzteren nur an depigmentierten Schnitten zu sehen. Die Zellen sind aufgequollen und von einem homogenen, mit Hämatoxylin-Eosin sich nicht färbenden Inhalt erfüllt. Derselbe sieht wegen seiner lichten Färbung wie eine grosse Vakuole aus und verdrängt den Kern so, dass er als sichelförmiges Gebilde an der Wand der Zelle liegt, so wie in den Becherzellen. Der Kern nimmt immer jenen Pol der Zelle ein, welcher von dem Raum der primären Augenblase abgewendet ist, also an den unpigmentierten Epithelien den inneren, an den pigmentierten den äusseren Pol.

Eine besondere Veränderung besteht in der Gegenwart zahlreicher epithelialer Cysten fast an allen Ciliarfortsätzen (Fig. 6). Die freie Wand der Cysten ist bei jenen pigmentiert, welche im Winkel der hinteren Kammer liegen, weil hier noch beide Epithellagen pigmentiert sind. An den weiter hinten liegenden Cysten ist die freie Wand unpigmentiert.

Die Aderhaut ist bis auf vereinzelte Lymphocyten und Plasmazellen normal. In der Netzhaut findet man solche Zellen nur an einzelnen grösseren Venen, also eine gerade angedeutete Periphlebitis, wie sie in stärkerer Ausbildung die gewöhnliche exogene Endophthalmitis kennzeichnet. In den äusseren Schichten des Glaskörpers, besonders im vorderen Teil desselben liegen etwas mehr Zellen als in normalen Fällen. Am Sehnervenkopf besteht an der nasalen Seite eine wulstartige Vorwölbung der Fasern, welche den Rand der Netzhaut vom Sehnerventamm abdrängt und als kleiner, auf die nasale Seite beschränkter neuritischer Wulst anzusehen ist. Damit steht im Einklang, dass im Leben die Papillengrenzen etwas verschwommen erschienen waren. Sonst lässt sich am anatomischen Präparat weder eine zellige Infiltration, noch eine Schwellung der Papille im ganzen nachweisen.

Was den retrobulbären Teil des Optikus anlangt, so besteht im vorderen gefässhaltigen Teil desselben eine geringe Ansammlung von Lymphocyten in der nächsten Umgebung der Zentralvene, besonders im linken Optikus. Diese Infiltration ist zwar sehr unbedeutend, aber doch sicher schon pathologisch. Dasselbe gilt für die Nervenbündel. In diesen findet man 2—6 Lymphocyten in jedem Querschnitt eines Bündels; Präparate von normalen Sehnerven aber zeigen mir, dass solche entweder gar keine Lymphocyten innerhalb der Bündel enthalten oder, wenn solche da sind, doch weniger als in unserem Falle. In dem gefässlosen Teil des Optikus, in seinem intrakraniellen Abschnitte, sowie im Chiasma fehlen selbst diese leichten Veränderungen.

Unterschiede im Verhalten beider Augen sind: Im rechten Auge ist die cystische Entartung der Ciliarfortsätze und die Aufquellung der Epithe-

lien im flachen Teil erheblich stärker als am linken Auge. Vielleicht weist dies auf eine gemeinschaftliche Ursache der beiden Veränderungen hin. Da man dieselbe sonst bei chronischer Uveitis vermisst, dürften sie auch in diesem Falle nichts mit der Entzündung zu tun haben. Vielleicht hängen sie zusammen mit der Konstitution des Kranken (Status lymphaticus) oder mit der vorausgegangenen, als Influenza bezeichneten akuten Krankheit. Die cystöse Entartung der Ciliarfortsätze scheint während des Lebens keine

Fig. 6 u. 7. Von Fall Leitner:

Fig. 6. Cystöse Degeneration des Ciliarepithels. Vergr. 46:1.

Symptome gemacht zu haben. Einige Cysten sind zusammengefallen und dürften also schon während des Lebens geplatzt sein.

Besondere Beachtung wurde der Vergleichung beider Augen geschenkt mit Rücksicht auf die ungleiche Sehschärfe derselben, welche rechts $\frac{6}{6}$, links $\frac{6}{24}$ betrug, was als angeborene Amblyopie des linken Auges gedeutet wurde. Die Sehnerven beider Augen sind gleich, nur dass am rechten Nerven die Septen erheblich breiter sind als links. Da die Sehnervenfasern beiderseits sich als normal erweisen, so beziehe ich die ungleiche Breite der Septen auf die verschiedene Härtung der Augen, nämlich rechts in Müller-Formol, links in Zenker. Die verschiedene Härtung erschwert auch die Vergleichung der beiden Netzhäute. Im linken, in Zenker gehärteten Auge liegt die Netzhaut faltenlos an, während sie in dem rechten, in Müller-Formol gelegenen Auge abgehoben und gefaltet ist, was besonders die Betrachtung der Fovea centralis beeinträchtigt. Dicke und Aussehen der einzelnen

Schichten der beiden Netzhäute ist gleich. Zählung der Ganglienzellen im Bereich eines bestimmten Areales, temporal und nasal von der Papille und in verschiedenen Abständen von derselben, ferner innerhalb des die Fovea umgebenden Walles ergeben für beide Augen ungefähr dasselbe. Die Fovea ist beiderseits von ungewöhnlich geringem Durchmesser und hat daher einen sehr steilen Clivus (Fig. 7). Im rechten Auge ist die Limitans interna von der stark gefalteten Fovea abgehoben, so dass sie geradlinig über die Vertiefung hinwegzieht; der Zwischenraum zwischen ihr und der Netzhaut wird durch ein feines Gerinnsel ausgefüllt. Am linken Auge liegt die Limitans überall an, und das Gerinnsel erfüllt die Grube der Fovea. Ich halte diese Veränderungen entweder für postmortal oder für in der Agonie entstanden. Es findet sich auch eine gewisse Menge geronnener Flüssigkeit zwischen den Lamellen der Suprachorioidea und auch stellenweise im Tenon'schen Raum, ohne dass eine Entzündung in der Nachbarschaft bestünde, so dass auch dieser Erguss vielleicht als agonal anzusehen ist.

Fig. 7. Fovea centralis des linken Auges. Vergr. 53 : 1.

Auf dem Grunde der Fovea ist noch eine dünne Schicht Henlescher Fasern vorhanden. Die Limitans interna zeigt hier eine leichte Vorwölbung, welche nur zum Teile auf einer Biegung der Netzhaut im ganzen beruht, zum Teil aber sicher auf der grösseren Länge der Schzellen an dieser Stelle¹⁾. Der feinere Bau der Fovea lässt nicht die geringste Störung erkennen: — Der vollkommen normale Befund an Netzhaut und Optikus gibt also keinen Aufschluss über die Ursache der Amblyopie; jedenfalls trifft hier nicht die Erklärung zu, dass eine angeborene Amblyopie manchmal die Folge von Blutaustritten sei, welche intra partum in der Gegend der Fovea stattfinden und das Netzhautgewebe schädigen. Eine solche Veränderung müsste jedenfalls sichtbare Spuren hinterlassen haben.

Der vorliegende Fall unterscheidet sich von den gewöhnlichen Fällen chronischer Cyclitis durch einen rascheren Verlauf. Die zahlreichen Präcipitate waren nach 6 Wochen grösstenteils verschwunden. Es ist nicht möglich, zu sagen, ob bei längerem Leben des Kranken die Augenkrankheit bald vollständig erloschen wäre oder in ganz

¹⁾ Vgl. Greeff, Mikroskopische Anatomie des Sehnerven und der Netzhaut im Handb. d. ges. Augenheilk. von Graefe-Saemisch. I. Teil. Bd. I. S. 177.

schleichender Weise noch länger gedauert hätte. Über Fälle von Cyclitis bloss mit Präcipitaten, aber ohne Beteiligung der Iris liegt bisher nur eine anatomische Untersuchung vor, und zwar von Knies¹⁾, dessen Fall aber viel älter und schwerer war.

Was nun die Ätiologie der Entzündung in meinem Falle betrifft, so ergibt der anatomische Befund am Auge ebenso wie am Körper im allgemeinen keine Anhaltspunkte für Tuberkulose oder Syphilis. Die Veränderungen am Auge entsprechen einem leichten Entzündungsreize, denn es sind keine polynukleären Leukocyten im Gewebe und im Exsudate, sondern nur Lymphocyten und Plasmazellen und selbst diese sind in nur geringer Zahl vorhanden. Ein Reizzustand leichtester Art besteht auch noch in den hintersten Teilen des Auges bis in den vordersten Abschnitt des orbitalen Optikus hinein, eine etwas stärkere Entzündung aber nur im vorderen Teil der Uvea, wo sie im flachen Teil des Ciliarkörpers ihren Höhepunkt erreicht. Hier findet sich bei nur geringer Infiltration des Gewebes selbst hauptsächlich eine Auswanderung von Zellen an die Oberfläche und als sicher spätere Veränderung der Anfang einer Wucherung des Epithels. Diese wesentlich oberflächlichen Veränderungen weisen, wie ich später ausführlicher dartun werde, auf einen leichten, aber länger dauernden Reiz hin, der wahrscheinlich von Toxinen ausgeht, welche mit dem Blute in die Gefässe des Ciliarkörpers und der Iris kommen, von diesen gleichzeitig mit dem Kammerwasser ausgeschieden werden und von hier aus auf die Oberfläche der Iris und des Ciliarkörpers einwirken. Die Augenentzündung entstand nach einer akuten allgemeinen Erkrankung, welche vom Patienten als Influenza bezeichnet worden war. Ich zweifle nicht, dass diese nicht näher bekannte Krankheit tatsächlich durch die Ausscheidung schädlicher Stoffe in das Auge die Cyclitis veranlasst hat.

IV. Cyclitis chronica bei Heterochromia iridis.

Der leichten Cyclitis im vorhergehenden Falle (Leitner) steht nahe die zuerst von mir beschriebene Cyclitis bei Heterochromia iridis, wobei in dem heller gefärbten Auge Präcipitate auftreten, und in späterer Zeit häufig eine Linsentrübung dazu kommt. Der Verlauf ist äusserst langwierig aber gutartig, indem hintere Synechien nur ausnahmsweise, Schwarten niemals gebildet werden. Ich verweise in bezug auf die Einzelheiten auf meine Arbeit im XV. Band des Archivs

¹⁾ Loc. cit.

für Augenheilkunde. Die anatomische Untersuchung konnte bisher nur an ausgeschnittenen Irisstücken vorgenommen werden, an welchen man die auch im folgenden Falle (Roseneder) beobachtete Form der Atrophie findet, die zu einer Art Umbau des Irisgewebes führt (Taf. X, Fig. 4 und 5); Infiltration des Irisgewebes oder Exsudation auf der Oberfläche fehlt. Gerade über den wichtigsten Punkt, das Verhalten des Ciliarkörpers, wissen wir nichts, da bisher noch kein ganzer Bulbus, an welchem eine solche Cyclitis während des Lebens beobachtet worden war, zur anatomischen Untersuchung gekommen ist.

V. Leichte chronische Iridocyclitis.

Einen Schritt weiter in dem Grade der Entzündung bedeutet der folgende Fall, wo neben Präcipitaten auch schon hintere Synechien bestanden.

Die 59jährige Frau Roseneder bemerkte zuerst vor 6 Jahren eine Abnahme des Sehvermögens des rechten Auges, das allmählich erblindete. Das linke Auge wird seit einem Jahre schwächer. Als die Kranke am 9. VIII. 1909 in die Klinik kam, war die Hornhaut des rechten Auges vollständig bedeckt von einem Papillom, das offenbar die Erblindung verursacht hatte. Auf dem linken Auge waren keine fest haftenden Synechien zu sehen, sondern nur hin und wieder kleine Hervorragungen am Pupillarrande und im Kreis angeordnete Pigmentpunkte auf der vorderen Linsenkapsel. Die Iris sah normal aus, die nasale Papillengrenze war etwas verschwommen. Mit $+1,75 D$ sph. $S \frac{6}{6}$. Über das spätere Schicksal der Patientin und im besonderen ihres linken Auges konnte ich nichts erfahren.

Das rechte Auge wurde enucleiert und in horizontale Schnitte zerlegt. Die Hornhaut ist überall von einem bis zu 5 mm dicken Papillom überzogen, das stellenweise Übergang in carcinomatöse Struktur zeigt. Die Neubildung hat die vorderen Hornhautschichten bis ungefähr zur Mitte der Hornhautdicke zerstört. Die hinteren Schichten sind bis auf etwas grösseren Kernreichtum normal.

In den Schnitten durch die obere Bulbushälfte ist die vordere Kammer leer bis auf einzelne Gerinnsel, welche auf der Vorderfläche der Iris liegen. Je weiter man abwärts geht, desto grösser werden die durch Gerinnung des Kammerwassers entstandenen homogenen Massen, welche einige wenige einkernige Leukocyten einschliessen. Im unteren Teil der vorderen Kammer sind ausserdem einzelne rote Blutkörperchen sowohl im Kammerwasser als an der hinteren Hornhautfläche zu sehen.

An der Descemeti liegen ausserdem Zellkugeln (in den Schnitten durch die untere Bulbushälfte 1—2 in jedem Schnitte). Es sind echte Präcipitate, welche auf dem unversehrten Endothel liegen und aus einkernigen Zellen zusammengesetzt sind. Die meisten enthalten viel Pigment; in manchen sind einzelne Zellen geradezu in grosse, braune Kugeln verwandelt (Taf. X, Fig. 15). Einzelne Präcipitate gleicher Beschaffenheit liegen auf der Vorderfläche der Iris und ein ganz kleines auf der vorderen Linsenkapsel gerade

in der Mitte der Pupille. Ein gleicher runder Zellhaufen schwebt frei im Kammerwasser, wo er infolge der Gerinnung desselben ungefähr in der Mitte der Kammer, gleich weit von der Iris und Hornhaut fixiert ist. Man kann nicht sagen, ob diese Zellkugel während des Lebens noch frei in der Kammer schwamm, bevor sie sich an der Hornhaut fixierte, oder ob sie vielleicht doch durch die Manipulationen bei der Enucleation losgelöst worden war.

Nebst den Präcipitaten lagen an der Descemeti noch in geringer Zahl einzelne Lymphocyten, sowie Pigmentzellen, welche von dem retinalen Epithel der Iris stammen.

Was die Erscheinungen frischer Entzündung anlangt, so sind Exsudatzellen an der freien Oberfläche der Iris und des Ciliarkörpers nicht vorhanden. Frische Infiltration in Form kleinster Lymphocytenansammlungen besteht nicht in der Iris, sondern nur im vordersten Teil des Ciliarkörpers und in der Aderhaut. In ersterem liegen sie nahe der Iriswurzel, so dass, wenn aus solchen Herden Auswanderung von Lymphocyten stattfindet, diese in die vordere Kammer kommen müssen. In der Aderhaut sind vereinzelte Leukocyten in gleichmässiger Weise über die ganze Aderhaut verteilt, und daneben stehen noch kleinste umschriebene Zellenherde in der vorderen Hälfte der Aderhaut, von der Ora serrata bis in die Äquatorgegend. Diese Herde sind so klein, dass sie leicht übersehen werden können; über ihnen besteht keine Veränderung im Pigmentepithel oder in der Netzhaut. — Obwohl also die entzündliche Infiltration des Gewebes überall unbedeutend ist, und man keine freien Zellen auf der Oberfläche der Uvea liegen sieht, müssen doch Zellen in geringer Menge in das Kammerwasser übertreten, da man an der Descemeti sowohl einzelne Zellen als Zellkonglomerate findet.

Deutlicher als die Erscheinungen frischer Entzündung sind die älteren Veränderungen. An der Iris besteht eine Atrophie mit einer besonderen Art der Umwandlung des Gewebes, welche oft bei chronischer Iritis vorkommt und daher etwas ausführlicher zu behandeln ist. Ich gab eine kurze Beschreibung dieser Veränderung schon in meiner Arbeit über Heterochromie der Iris. Zum besseren Verständnis derselben ist es nötig, einige Worte über die Chromatophoren und besonders über die Orientierung ihre Fortsätze unter normalen Verhältnissen voranzuschicken.

In der normalen Iris stehen innerhalb der vorderen Grenzschicht die Zellen bald sehr dicht, bald in etwas grösseren Abständen. Im ersten Falle bilden die Zellausläufer einen so dichten Filz, dass derselbe nicht entwirrt werden kann. Im zweiten Falle erkennt man, dass die Zellausläufer nach allen Richtungen hin verlaufen und sich durchkreuzen. In der auf die Grenzschicht folgenden Lage sind die Zellkerne mit ihrer Längsachse und die grösseren Zellausläufer entweder regellos orientiert, oder sie sind der Mehrzahl nach parallel zur Oberfläche der Iris gerichtet und ziehen zumeist in radiärer Richtung.

Die mittleren Schichten der Iris enthalten entsprechend der hier befindlichen Lymphspalte nur wenige Chromatophoren, abgesehen von denen, welche die Blutgefässe umspinnen. Diese schicken die längsten Ausläufer entsprechend der Längsrichtung der Gefässe. In den hinteren Irisschichten kann die Richtung der Zellkerne und ihrer Hauptaussläufer entweder ganz

regellos sein, oder sie sind der Hauptmasse nach ungefähr parallel zur Bruchschen Membran oder in andern Fällen nahezu senkrecht darauf. In manchen Fällen fehlt allerdings jede halbwegs regelmässige Anordnung der Chromatophoren, höchstens dass sie in der Pupillarzzone gerade vor dem Sphinkter eine der Oberfläche ungefähr parallele Richtung einnehmen.

Es liegt nahe, die Orientierung der Zellausläufer mit der Anspannung des Irisgewebes, also mit der Pupillenweite in Zusammenhang zu bringen, so dass bei enger Pupille die Zellen vorwiegend eine der Irisoberfläche parallele Richtung einnehmen würden. Dies ist aber keineswegs der Fall. Ich habe normale Irides bei Pupillenweite von 1,5—6,5 mm Durchmesser untersucht und die Unabhängigkeit der Orientierung der Zellfortsätze von der Pupillenweite feststellen können. Von zwei Fällen mit je 2,5 mm Pupillenweite zeigte der eine in den hinteren Irisschichten die Zellausläufer annähernd senkrecht, der andere annähernd parallel zur Bruchschen Membran gerichtet. In der Iris eines Falles mit 6,5 mm weiten Pupillen sind die Zellen in den vorderen Irisschichten parallel, in den hinteren ungefähr senkrecht auf die Irisoberfläche gerichtet. In derselben Iris wechselt die Orientierung der Zellen oft von Stelle zu Stelle¹⁾.

Die Zwischenräume zwischen den Chromatophoren sind ungefärbt und scheinen leer. In der Gegend der Lymphspalte sind sie auch wirklich leer, d. h. im Leben nur mit Kammerwasser erfüllt. Sonst aber findet man bei starker Vergrösserung und bei starker Abblendung des Gesichtsfeldes eine eben angedeutete, ausserordentlich zarte Streifung als Ausdruck des kollagenen Gewebes zwischen den Zellen.

¹⁾ Die Anordnung der Zellausläufer ist hier nur mit Rücksicht auf den Vergleich mit der parallelen Anordnung derselben in der atrophischen Iris in Betracht gezogen. Es kam mir also hauptsächlich darauf an, wie sich die Zellausläufer zur Irisdicke verhalten; ob sie die Iris mehr oder weniger quer durchsetzen oder sich der Oberfläche parallel halten. Für diese Zwecke sind Radiärschnitte am besten geeignet. Münch (Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. XIII. S. 6) hat die Verlaufsrichtung der Ausläufer der Chromatophoren von einem andern Gesichtspunkte aus untersucht. Er misst denselben muskulären Charakter bei, und es kommt ihm darauf an, zu zeigen, dass sie eine dilatierende Wirkung haben. Zu diesem Zweck ist festzustellen, ob sie in der Iris radiär oder cirkulär verlaufen, und hierzu eignen sich Flachschnitte besser. Ich habe auch solche untersucht und kann von der Iris des Menschen, die ich allein auf diese Verhältnisse hin prüfte, nur sagen, dass sie sehr grosse individuelle Unterschiede darbietet. Es gibt Irides, die eine vorwiegende radiäre Anordnung der Chromatophorenausläufer besitzen, wie dies Münch abbildet; in andern aber ist, hauptsächlich in der peripheren Hälfte der Irisbreite, die Anordnung entweder ganz regellos oder sogar annähernd cirkulär.

Jedenfalls sind in der normalen Iris die Zwischenräume zwischen den Zellen überall hauptsächlich von Kammerwasser erfüllt — Auch in der normalen Iris trifft man häufig vereinzelte kleine und grosse Lymphocyten und selbst Plasmazellen oder Mastzellen an.

Um zu versuchen, wie sich aus dem geschilderten Verhalten der normalen Iris die Atrophie derselben entwickelt, muss man die ersten Stadien der Veränderung kennen. Die Gelegenheit dazu geben Fälle mit kurz dauernder Drucksteigerung, da sich diese Art von Atrophie nicht bloss bei chronischer Iritis, sondern auch bei Drucksteigerung einstellt. Zum Studium eignen sich am besten Fälle von Aderhautsarkom, bei welchen die Drucksteigerung erst vor kurzem eingetreten ist. Da dieser Zeitpunkt mit dem Eintritt der Schmerzhaftigkeit zusammenfällt, lässt er sich leicht feststellen. Ich besitze Fälle, wo die Drucksteigerung erst am Tage vor der Operation eintrat, bis zu solchen von langer Dauer. Die Untersuchung derselben lässt folgende Entwicklung der Atrophie erkennen.

Die Veränderungen betreffen vor allem die Stromazellen, und zwar sowohl deren Kerne, als deren Protoplasma mit seinen Ausläufern. Der Kern wird grösser und chromatinärmer. Während normalerweise die Randteile des Kernes weniger Chromatin enthalten und daher lichter aussehen, häuft sich in der kranken Iris das Chromatin in der Peripherie des Kernes an, und indem diese dadurch dunkler tingiert wird, bekommt der Kern ein bläschenförmiges Aussehen. In manchen Kernen entwickeln sich Vakuolen. Die Kerne sind entweder rund oder länglich. Die letzteren richten sich immer mehr mit ihrer Längsachse parallel zur Irisoberfläche.

Die Zellfortsätze werden mehr gestreckt und ordnen sich ebenfalls parallel zur Irisoberfläche an. Nach und nach werden sie kürzer bis zum gänzlichen Verschwinden. Bei dunkel pigmentierter Iris sieht man nach Auflösung der Fortsätze noch eine Zeitlang ihre frühere Lage durch eine Reihe von Pigmentkörnchen gekennzeichnet. Wenn alle Zellausläufer verschwunden sind, enthält die Iris — nebst einigen klumpigen, gelbe Pigmentkörnchen enthaltenden Zellen und gewöhnlich auch einigen Mastzellen — nur blasse, runde oder längliche Kerne, die letzteren mit ihren langen Achsen parallel zur Irisoberfläche. Zwischen den Kernen besteht eine Streifung, die immer gröber und deutlicher wird und ebenfalls parallel zur Irisoberfläche gerichtet ist (Taf. X, Fig. 4). Die Iris bekommt dadurch ein faseriges Aussehen. Die der Streifung zugrunde liegenden feinsten Fasern hängen mit den Kernen nicht zusammen. Die Zwischenräume zwischen den

Kernen färben sich mit Eosin diffus rot als Ausdruck der Durchtränkung mit eiweisshaltiger Flüssigkeit.

Die Zahl der Kerne in der durch Atrophie stark verschmälerten Iris ist in der Regel erheblich geringer als die Zahl der Stromazellen in der normalen Iris (Taf. X, Fig. 4). Manchmal sind aber sehr viele Kerne da und stehen besonders in den vorderen Schichten der Iris, namentlich vor dem Sphinkter ausserordentlich dicht, so dass unzweifelhaft eine Vermehrung der Kerne stattgefunden hat (Taf. X, Fig. 5). Mitosen habe ich nicht gesehen. Man kann eine so veränderte Iris nicht einfach als atrophisch bezeichnen, was bloss einen Schwund der normalen Bestandteile bedeuten würde. Es hat vielmehr ein förmlicher Umbau des Gewebes stattgefunden, welcher sowohl die zelligen Elemente als auch die Zwischensubstanz betrifft. Diese Veränderung findet sich denn auch durchaus nicht in allen Fällen, wo klinisch eine Atrophie der Iris diagnostiziert wird. Sie ist besonders ausgeprägt bei Heterochromie der Iris, wo gerade klinisch die Iris zwar eine hellere Färbung, aber kaum eine nennenswerte Atrophie des Gewebes erkennen lässt.

Im Falle Roseneder ist die geschilderte Veränderung der Iris erst in ihrem Beginn und überdies nur in einem Teile der Iris vorhanden. Im Irisgewebe liegen einzelne Kerne und grosse Lymphocyten, sowie Plasmazellen, und es bestehen einige hintere Synechien. An andern Stellen sind Pigmentablagerungen auf der Linsenkapsel an der Stelle zerrissener Synechien.

Im Gegensatz zur Iris, wo die Hauptveränderung das Stroma betrifft, weist der Ciliarkörper ein normales Stroma auf, dagegen eine Veränderung seiner Oberfläche, nämlich des Epithelüberzuges. Dieselbe findet sich herdweise in der Pars plana; nur ein einziger Herd liegt im hintersten Teil der gefalteten Portion. Die Herde sind ausgezeichnet durch Wucherung der Epithellage und zwar bald mehr der unpigmentierten, bald mehr der pigmentierten (Fig. 8). In einem gerade vor der Ora serrata liegenden Herde ist die Wucherung des Epithels so, dass Cysten gebildet werden (Fig. 9). Denselben Wucherungen werden wir auch bei den schwereren Formen chronischer Uveitis begegnen.

Da wegen des Papilloms der Hornhaut die Iritis dieses Auges klinisch nicht diagnostiziert worden war, sondern bloss aus den Präparaten sich ergab, fragt es sich, ob dieselbe als spontan oder als die Folge des Papilloms aufzufassen war? Für die erstere Annahme spricht die Gegenwart leichter iritischer Veränderungen auch am

andern Auge, ferner der Befund an dem untersuchten Auge selbst. Die Erkrankung des Ciliarkörpers ist dieselbe, welche wir in klinisch diagnostizierten Fällen chronischer Uveitis antreffen werden. Würde

Fig. 8 u. 9. Wucherung des Epithels der Pars plana vom Fall Roseneder.

Fig. 8. Verdopplung der Epithellage. Vergr. 51:1.

Fig. 9. Cystenbildung im Epithel. Vergr. 55:1.

die Entzündung der Uvea hervorgerufen sein durch reizende Substanzen, welche vom Papillom durch die hinteren Hornhautschichten in die vordere Kammer gelangten, so müsste man vor allem eine Infiltration der hinteren Hornhautschichten, sowie der Iris finden, welche beiden fehlten.

VI. Chronische Uveitis schwereren Grades.

Ich konnte im ganzen 27 Augen mit Uveitis von 23 Patienten untersuchen, bei welchen nach der Krankengeschichte und dem klinischen Befunde keine Verletzung vorlag, die also als endogen angesehen wurde, und bei welchen auch Syphilis und Tuberkulose nicht in Frage kamen¹⁾. Manche dieser Augen waren dauernd von äusseren Entzündungserscheinungen frei geblieben, bei andern traten solche im Verlaufe der Krankheit früher oder später auf, so dass diese Fälle nicht mehr zu den vollkommen chronischen zu rechnen sind. Der

¹⁾ Eine Ausnahme machte Fall 3 der Tabelle, wo der Tod des Kranken an Meningitis tuberculosa erfolgte. Die Augenkrankheit bestand aber schon seit vielen Jahren, und der anatomische Befund ergab keine Anhaltspunkte für Tuberkulose im Auge, so dass ich annahm, dass die Augenkrankheit unabhängig von der vielleicht erst später erworbenen Tuberkulose war.

klinische Verlauf war verschieden. In 3 Fällen (1, 2 und 3 der Tabelle) war die Iridocyclitis so leicht, dass sie das Sehvermögen nicht vernichtet hatte. Dasselbe betrug in Fall 1 noch $\frac{6}{18}$; die Erblindung in Fall 2 und 3 war auch nicht der Iridocyclitis, sondern einer älteren Retinochorioiditis zuzuschreiben. Diese 6 Augen kamen durch den Tod der Patienten in meinen Besitz. — In anderen Fällen dagegen hatte die Iridocyclitis zu Seclusio pupillae geführt und dadurch zur Erblindung und schliesslich zur Enucleation. Gewiss hätte in einem Teil der Fälle das Sehvermögen durch rechtzeitige Iridektomie erhalten werden können, wie dies in dem Falle 4 tatsächlich an dem zweiten Auge geschehen war. — Eine andere Zahl von Fällen verlief noch schwerer, indem das Auge nicht härter, sondern im Gegenteil weicher wurde, so dass Atrophie des Auges eintrat.

Die anatomische Untersuchung ergab in einem Teile der Fälle mit Seclusio pupillae dasselbe, wie in den drei leichten Fällen 1, 2 und 3 und wie es im leichtesten Grade auch in den Fällen Leitner und Roseneder bestand. Ich glaube daher, dass alle diese Fälle zusammengehören und dem entsprechen, was man hauptsächlich als chronische Uveitis bezeichnet. Ich werde daher nur diese Fälle, die 10 an Zahl, in der Tabelle auf S. 252 zusammengefasst sind, im folgenden behandeln.

Von den übrigen Augen, welche teils durch Seclusio pupillae und Drucksteigerung, teils unter dem Bilde der Atrophie erblindet waren, ergeben die meisten Schwarten im Augeninnern, auf dem Ciliarkörper und oft auch auf der Aderhaut gleich denen, welche als Produkt einer Endophthalmitis nach perforierender Verletzung entstanden sind. Diese Fälle sind also von der gewöhnlichen chronischen Uveitis wesentlich verschieden. In drei Fällen endogener Iritis besteht ein Befund wie bei sympathisierender Iridocyclitis und in zwei andern Fällen eine eigentümliche nekrotisierende Entzündung. Auch diese Fälle sind der gewöhnlichen chronischen Uveitis nicht zuzurechnen.

Es würde zu weit führen, die 10 als gewöhnliche chronische Uveitis aufgefassten Fälle einzeln zu beschreiben. Ich werde nur das für alle Fälle Gemeinschaftliche und Charakteristische besprechen und mich sonst mit der tabellarischen Anführung der Fälle begnügen. In der Tabelle ist der anatomische Befund insofern angegeben, als er sich auf die Iridocyclitis selbst bezieht. Sekundäre Veränderungen wie Druckexcavation des Sehnerven, Atrophie der Aderhaut, Ektasie der Sklera sind als blosse Folgeerscheinungen der Iridocyclitis nicht erwähnt. Nebst den zehn Fällen der Tabelle habe ich noch einen

elften, ganz typischen Fall untersucht, der aber nicht in die Tabelle aufgenommen wurde, weil ich keine Krankengeschichte dazu besitze.

Die Veränderungen in meinen Fällen sind entweder frische Infiltration oder Gewebsneubildung. Die erste besteht in einer diffusen Infiltration und manchmal in kleinen Herden, ist aber auf jeden Fall sehr unbedeutend, offenbar weil die Fälle eben chronisch und zumeist auch noch alt waren. Deshalb treten die älteren Gewebsneubildungen in den Vordergrund: an der Iris Anwachsung des Pupillarrandes an die Kapsel, Membranen in der Pupille und oft auch auf der Vorderfläche der Iris; am Ciliarkörper Wucherung des Epithels. In einigen Fällen war auch die Aderhaut in ausgedehnter Weise beteiligt, indem atrophische Herde mit Verwachsung zwischen Netzhaut und Aderhaut bestanden, weshalb diese Veränderungen in der Tabelle als Retinochorioiditis angeführt sind, obwohl die Netzhaut nur sekundär ergriffen ist. Die Veränderungen in der Aderhaut betrafen entweder die ganze Aderhaut oder nur deren vorderen Abschnitt.

Die Veränderungen verteilen sich in folgender Weise auf die einzelnen Abschnitte der Uvea:

Iris allein 1 Fall (7),

Iris und Ciliarkörper 2 Fälle (8 und 10),

Iris und Aderhaut 2 Fälle (5 und 6),

Iris, Ciliarkörper und Aderhaut 5 Fälle (1, 2, 3, 4, 9).

Sehr unbedeutende Veränderungen, z. B. vereinzelte Lymphocyten im Gewebe oder die so häufigen senilen Wucherungen im Epithel des Ciliarkörpers oder die ebenfalls bei Greisen häufigen kleinen chorioiditischen Herde im vordersten Teil der Aderhaut wurden dabei nicht gerechnet.

Nach dieser Zusammenstellung waren in der Hälfte der Fälle alle drei Abschnitte der Uvea ergriffen, so dass dieses als das Gewöhnliche angesehen werden muss. In einem Falle zeigte nur die Iris Veränderungen, welche aber schwer genug waren, um durch Seclusio pupillae Erblindung zu veranlassen. In zwei Fällen hatte sich die Erkrankung auf die vorderen Teile der Uvea, Iris und Ciliarkörper beschränkt. In sieben Fällen war auch die Aderhaut ergriffen, aber in zwei von diesen war der Ciliarkörper von Entzündung frei geblieben, gleichsam übersprungen worden. Hier besteht die sonst unrichtige Bezeichnung Iridochorioiditis zurecht.

In allen Fällen war also die Iris erkrankt und zwar zumeist ziemlich schwer. Daraus lässt sich aber nicht der Schluss ziehen, dass die chronische Uveitis vor allem die Iris befällt, sondern dieses Ver-

Geschlecht	Alter	Anamnese	Klinischer Befund des untersuchten Auges	Anatomischer Befund	Klinischer Befund am andern Auge
I. Leichte Fälle.					
1 m.	43	Seit mehreren Jahren zunehmende Sehstörung mit zeitweiliger Entzündung. Iridektomie, 13 Tage später an Pneumonie gestorben.	Hinteres Synechien, zarte Pupillarmembran. T. n. $S \frac{6}{18}$.	Hinteres Synechien, zarte Pupillarmembran, Wucherung an der Pars plana, frische u. alte Herde im vorderen Teile der Aderhaut.	Derselbe Befund.
2 m.	76	Seit 20 Jahren an Retinochorioiditis erblindet. Gestorben an Arteriosklerose u. Pleuritis.	Hinteres Synechien, Ophthalmoskopisch ausgebreitete alte Retinochorioiditis. T. n.	Infiltration der Iris mit Plasmazellen. Hinteres Synechien. Wucherung an der Pars plana. Retinochorioiditis inveterata.	Derselbe Befund; in den letzten Lebenstagen Ulcus serpens.
3 m.	45	Seit langem schwachsichtig. Gestorben an Meningitis tuberculosa.	Hinteres Synechien. Ophthalmoskopisch ausgebreitete alte Chorioiditis disseminata. T. n.	Hinteres Synechien, Ciliarkörper bis auf geringe frische Infiltration normal, Retinochorioiditis inveterata.	Derselbe Befund.
II. Schwere Fälle.					
4 w.	35	Seit $1\frac{1}{4}$ Jahren Sehstörung; im Beginn der Krankheit Präcipitate.	Napfkucheniris, glaukomatöse Excavation. T. +. Amaurose.	Pupillarmembran, Wucherung an der Pars plana, frische u. alte Herde in der Aderhaut, besonders im vorderen Teile.	Wegen Oclusio pupillae iridektomiert. $S \frac{6}{12}$.
5 m.	60	Seit 4 Monaten Entzündung.	Kammer tief. Pupillarmembran. T. n. Amaurose (eine Zeitlang hatte Drucksteigerung bestanden).	Membran in der Pupille und auf der Iris. Ciliarkörper bis auf Atrophie normal. Retinochorioiditis inveterata.	Normal.
6 m.	65	Seit 4 Monaten erblindet.	Napfkucheniris. Blut in der Vorderkammer. T. +. Amaurose.	Membran in der Pupille und auf der Iris. Am Ciliarkörper bloss Atrophie. Chorioiditis anterior inveterata.	Normal bis auf Cataracta senilis.

7	m.	65	Seit 1 Jahr Sehstörung, seit 1 Monat Schmerzen.	Kammer normal tief, etwas Blut in derselben. Pupille verschlossen. T. +. Amaurose.	Kammer in der Pupille und auf der Iris. Ciliarkörper normal bis auf Atrophie, keine Chorioiditis.	Normal.
8	m.	68	Seit 6 Jahren wiederholte Entzündungen beider Augen.	Iris oben bis zur Hälfte ihrer Breite der Hornhaut anliegend. Pupillarmembran. T. n.	Oben periphere vordere Synchie. Membran in der Pupille und in der hinteren Kammer. Wucherungen in d. Pars plana. Keine Chorioiditis.	Ciliarinjektion, hintere Synechien, Glaskörpertrübungen.
9	m.	60	Seit 26 Jahren wiederholte Entzündungen, seit 22 Jahren erblindet. Vor 10 Jahren wegen Schmerzen Iridektomie.	Kammer tief, Pupille verschlossen, nach oben Colobom. Ekstase der Sklera. T. +.	Membran in der Pupille u. auf der Iris. Wucherung an der Pars plana, Retinochorioiditis inveterata.	Einzelne Präcipitate, keine Synechien. S $\frac{9}{6}$.
10	m.	59	Seit dem 10. Lebensjahr erblindet, seit 3 Wochen Entzündung.	Gürtelförm. Hornhauttrübung, tiefe Kammer, atrophische schlotternde Iris. Einzelne hintere Synechien, geschrumpfte Katarakt.	Präcipitate, hintere Synechien, Wucherung in der ganzen Ausdehnung des Ciliarkörpers, keine Chorioiditis.	Derselbe Befund.

halten erklärt sich aus der Art des Materials. Dieses bestand zum grössten Teile aus Augen, welche wegen der Folgezustände der Iritis, nämlich Seclusio pupillae, zur Enucleation kamen, während Augen, in welchen vorwiegend Ciliarkörper und Chorioidea erkrankt sind, gewöhnlich nicht enucleiert zu werden brauchen und daher unter den untersuchten Fällen nur durch die ersten drei vertreten sind.

Ich gehe nun daran, die einzelnen Abschnitte der Uvea im besonderen zu besprechen.

a) Iris.

An der Iris bestehen Zeichen frischer entzündlicher Infiltration und die Produkte älterer Entzündung, nämlich Verwachsungen und Membranen. Die frische Infiltration ist gering und beschränkt sich auf die Gegenwart einzelner freier Zellen im Gewebe. Neben gewöhnlichen Lymphocyten gibt es noch solche mit grösserem Protoplasma, sogenannte grosse Lymphocyten, die nach meiner Ansicht aus den kleinen hervorgehen. Nur ausnahmsweise sind einzelne polynucleäre Leukocyten zu sehen; es entspricht ja auch die Gegenwart solcher nicht dem

chronischen Charakter der Entzündung. Ausserdem trifft man Plasmazellen, manchmal auch Mastzellen und eosinophile Zellen. Die Mastzellen kommen nur vereinzelt vor, nur in einem Falle waren sie zahlreich. Die Plasmazellen sind häufiger. In einem Falle (2) waren sie ausserordentlich zahlreich, so dass die fixen Zellen der Iris und die Lymphocyten daneben ganz verschwanden. Das Bild ist so, wie es Taf. X, Fig. 2 darstellt, welches aber nicht diesem Falle entnommen ist, sondern einem solchen von traumatischer seröser Iritis. Die Plasmazellen liegen in dichten Reihen längs der Gefässe und besonders reichlich an der Vorderseite des Sphinkter; sie sind durch Aneinanderliegen epithelartig abgeplattet. Das Gefüge der Iris ist sonst kaum verändert und die Exsudation an die Oberfläche ist sehr unbedeutend, so dass man annehmen muss, dass die Plasmazellen in der Iris wenig Neigung besitzen, an die Oberfläche und in das Kammerwasser auszuwandern, sondern dass sie mehr dauernde Bewohner des Irigewebes sind. Die besondere Art der Infiltration der Iris in diesem Falle lässt daran denken, dass hier vielleicht eine besondere Ätiologie vorliege. Die Krankengeschichte lieferte allerdings keine Anhaltspunkte dafür. Der 76jährige Patient war seit 20 Jahren erblindet. Der klinische Befund ergab chronische Iridochorioiditis, nämlich einzelne hintere Synechien und ausgedehnte chorioiditische Flecken nebst Atrophie des Sehnerven. Am linken Auge war in den letzten Lebenstagen ein Ulcus serpens aufgetreten, doch war im Verhalten der Iris beider Augen kein nennenswerter Unterschied, so dass die Plasmazellen mit dem Ulcus sicher nichts zu tun hatten. Die Sektion ergab Arteriosclerose, Myodegeneratio cordis und Erweichungsherde im Gehirn, wozu zuletzt noch Pleuritis gekommen war. — Ein Fall von dichter Infiltration der Iris ausschliesslich mit Plasmazellen wird von Verhoeff beschrieben¹⁾. Es handelte sich um einen Fall von Keratitis punctata, und da ich durch die Güte des Autors Präparate von diesem Falle bekam, vermag ich die Identität des anatomischen Bildes der Iris mit meinem Falle festzustellen. Die Ätiologie in dem Falle Verhoeffs, der einen 75jährigen Mann betraf, ist nicht bekannt.

In zwei Fällen besteht nebst der diffusen Infiltration noch eine knötchenförmige Ansammlung von Lymphocyten an einzelnen Stellen. Die Knötchen sind übrigens spärlich und klein. Sie liegen in verschiedenen Teilen der Iris und bestehen nur aus einer nicht scharf

¹⁾ Arch. f. Augenheilk. Bd. LXX. S. 290.

abgegrenzten Ansammlung von Lymphocyten; epitheliale Zellen kommen darin nicht vor. Auswanderung von Zellen an die Oberfläche von den Knötchen aus findet jedenfalls nicht in nennenswertem Masse statt.

Präcipitate im Bereiche der Vorderkammer waren klinisch in den meisten Fällen zur Zeit der Enucleation nicht nachweisbar gewesen, was ja bei älteren Fällen das Gewöhnliche ist. Auch in den Präparaten zeigten nur ein paar Fälle einige Präcipitate, darunter auch ein Fall, wo *Seclusio pupillae* mit buckelförmiger Vortreibung der Iris bestanden hatte.

Die Atrophie der Iris mit dem eigentümlichen Umbau ihres Gewebes, der bei Fall Roseneder beschrieben wurde (S. 247), findet sich entweder in seinen Anfängen oder ausgeprägt in der Hälfte der Fälle. Dies sind nicht gerade die Fälle von besonders langer Dauer, sondern die, wo Drucksteigerung bestanden hatte. Dass Drucksteigerung auch allein, ohne Iritis, imstande ist, die in Rede stehende Veränderung des Irisgewebes zu bewirken, ergibt sich aus dem Befunde bei echtem Glaukom und bei Aderhautsarkom mit Drucksteigerung. Auf der andern Seite können offenbar auch andere Ursachen als Drucksteigerung diese Veränderung veranlassen, denn sie findet sich besonders gut ausgeprägt in den Fällen von Heterochromie der Iris, von welchen auch die Figuren 4 und 5, Taf. X herrühren.

Der Umbau des Irisgewebes ist jedenfalls mit bedeutender Atrophie der Iris im ganzen verbunden, denn in den fünf Fällen, wo derselbe bestand, betrug die Dicke der Iris nur $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{2}$ der Dicke in den übrigen Fällen. Auch bei Heterochromie ist die Iris verdünnt, wenn auch nicht so stark, wie bei der chronischen Iritis. Allerdings ist die Messung der Irisdicke an ausgeschnittenen Stücken, die mir von den Heterochromiefällen allein zur Verfügung standen, nicht so verlässlich, als wenn die Iris in situ ist.

Die älteren Entzündungsprodukte bestehen in Anwachsungen des Pupillarrandes an die Linsenkapsel, in Pupillarmembranen und in Membranen auf der vorderen Irisfläche. In zwei Fällen waren bloss hintere Synechien vorhanden, in drei Fällen auch noch eine Pupillarmembran, und in den übrigen Fällen überzog auch noch als Fortsetzung der Pupillarmembran ein feines Häutchen die vordere Irisfläche, manchmal bis zur Kammerbucht. Die Membran war in den leichten Fällen dünn, glasartig oder gar nur wie ein vom Stroma sich scharf abhebendes, gleichsam selbständig gewordenes Endothelhäutchen. In den schwereren Fällen dagegen überzog eine dichte

Membran, meist mit neugebildeten Gefässen versehen, die Iris. Zur Bildung einer Membran auf der Iris ist übrigens keineswegs eine klinisch intensiv verlaufende Entzündung nötig. Ich fand solche Häutchen in Fällen von Iritis (die nicht in der Tabelle enthalten sind), welche fast ohne äussere Entzündungserscheinungen, ja selbst ohne Bildung hinterer Synechien oder einer Pupillarmembran verlaufen waren.

Membranen an der hinteren Seite der Iris, die in ein paar Fällen vorkamen, gehören nicht zu dieser, sondern sind Auflagerungen auf die Linsenkapsel und sind nur am Pupillarrand mit dem retinalen Epithel der Iris verwachsen. Auch wo bloss eine Pupillarmembran vorhanden ist, erstreckt sich diese häufig ein kurzes Stück weit über den Pupillarrand hinaus auf die Linsenkapsel.

Die Exsudation ist also immer am Pupillarrand am stärksten. Schon klinisch fällt ja bei der Hyperämie der Iris vor allem der grosse Blutreichtum der pupillaren Zone im Vergleich zum ciliaren Teil der Iris auf.

Dass eine Membran auf der vorderen Irisfläche häufig, in der hinteren Kammer aber gerade nur in der Nähe des Pupillarrandes gefunden wird, erklärt sich aus der besonderen Art der chronischen Uveitis. Bei der exogenen Iridocyclitis (Endophthalmitis) ist häufig die ganze hintere Kammer von Exsudat erfüllt, welches später die Iris in ihrer ganzen Ausdehnung an die Linsenkapsel befestigt. Dieses Exsudat stammt von den Ciliarfirsten. Die Iris selbst braucht nicht einmal sehr entzündet zu sein, wie man an Fällen sieht, wo die Schädlichkeit im hinteren Augenabschnitt angreift, wie manche exogene und wie die metastatische Entzündung. Dann kann die hintere Kammer ganz von einer Schwarte erfüllt sein, ohne dass an der vorderen Irisfläche nennenswerte Veränderungen bestünden. Bei der chronischen Uveitis dagegen fehlt das Exsudat in der hinteren Kammer, obwohl die Iris selbst ziemlich entzündet ist, weil eben die Ciliarfortsätze frei von der Entzündung bleiben. Das Exsudat reicht daher in der hinteren Kammer nur so weit, als es vom Pupillarrand aus sich in dieselbe verschiebt (in Fig. 10 am linksseitigen Pupillarrand).

In den Fällen mit Drucksteigerung besteht die gewöhnliche periphere Anlegung der Iris an die Hornhaut infolge der buckelförmigen Vortreibung der Iris. In zwei Fällen waren aber Veränderungen in der Kammerbücht vorhanden, welche auf eine Entzündung bezogen werden müssen, die mit der Exsudation am Pupillarrand nicht in Verbindung steht. In dem einen Fall war hierdurch eine

homogene Membran gebildet worden, welche die Kammerbucht auskleidete, sich aber nicht über diese hinaus erstreckte (Fig. 11). Eine derartige Veränderung vermag Drucksteigerung bei tiefer Kammer hervorzurufen, was bei chronischer Uveitis manchmal vorkommt. Im zweiten Falle hatte die Entzündung adhäsiven Charakter, wodurch die Iriswurzel mehr und mehr an die Hornhaut herangezogen worden war (Fig. 10). Diese Veränderung besteht aber nur

Fig. 10—15. Von Fällen chronischer Iritis.

Fig. 10. Vergr. 16:1. Die Iris ist an der oberen Seite fast bis zur Hälfte ihre Breite an die Hornhaut angewachsen, während an den andern Seiten die Kammerbucht frei ist. Die Pupille ist durch eine Membran verschlossen, welche am unteren Pupillarrande dünn ist, am oberen Pupillarrande aber so dick, dass sie auf die vordere Irisfläche übergreift und an der Oberfläche der Linse sich eine Strecke weit in die hintere Kammer vorschiebt.

an der oberen Seite, wo die Iris bis zur Mitte ihrer Breite an die Hornhaut angewachsen ist. Mit Rücksicht auf diesen Befund war vor der Enucleation die Diagnose irrtümlich auf eine die Iris vordrängende Geschwulst des Ciliarkörpers gestellt worden. In diesem Falle hatte keine Drucksteigerung bestanden. Eine gleich weit gegen die Mitte reichende Anwachsung der Iris an die Hornhaut zeigt das linke Auge des Groenouwischen Falles (loc. cit. Fig. 2 auf S. 193). Auch in diesem Falle fehlte Drucksteigerung.

b) Ciliarkörper.

Auch am Ciliarkörper besteht frische entzündliche Infiltration neben den Produkten älterer Entzündung.

Die Infiltration trägt am Ciliarkörper denselben Charakter wie in der Iris und weist dieselben Zellformen auf. Sie ist aber stets sehr gering, viel geringer als in der Iris, und manchmal fehlt sie überhaupt. Dementsprechend sind auch die kleinen Lymphocytenherde, welche in der Iris nicht so selten sind, am Ciliarkörper nur

Fig. 11. Vergr. 104:1. Die Kammerbucht ist von einer homogenen Membran ausgekleidet, deren innere Oberfläche einen Endothelüberzug trägt. In der Iriswurzel besteht eine umschriebene Infiltration mit Lymphocyten.

in zwei Fällen angetroffen worden. Auswanderung von Zellen an die Oberfläche des Ciliarkörpers existiert überhaupt kaum, selbst nicht über den kleinen knötchenförmigen Herden. Allerdings sind die diesen Betrachtungen zugrunde liegenden 10 Fälle alle älter, und es ist möglich, dass im Beginn der Krankheit mehr Zellen zur Auswanderung kamen, so wie in dem frischen Falle Leitner. Dies würde gerade hinreichend sein, um die Zellen für die Präcipitate zu liefern, nicht aber grössere Exsudate zu setzen. Es fehlen daher grössere plastische Exsudate an der Oberfläche des Ciliarkörpers, speziell der Ciliarfortsätze. Dieses ist zwar ein negatives, aber doch charakte-

ristisches Zeichen, welches die spontane Uveitis von der exogenen unterscheidet. Ich habe daher auch die Fälle, wo nach der Krankengeschichte die Iritis spontan aufgetreten war, die anatomische Untersuchung aber entzündliche Schwarten an der Oberfläche der Ciliarfortsätze zeigte, von der gegenwärtigen Betrachtung ausgeschlossen, da dieselben jedenfalls nicht mehr zur gewöhnlichen chronischen Iritis gehören und einzelne von ihnen möglicherweise einer andern Ätiologie angehören, d. h. vielleicht zum Teil doch exogen sind.

Fig. 12. Vergr. 45:1. Wucherung des ciliaren Epithels im flachen Teil des Ciliarkörpers, welcher dadurch seine scharfe Begrenzung verloren hat. Im Stroma des Ciliarkörpers mässige Infiltration mit Lymphocyten.

Die älteren Veränderungen bestehen in einer Wucherung des ciliaren Epithels, welcher besondere Wichtigkeit zukommt, weil sie für gewisse Fälle der chronischen Uveitis ein charakteristisches Merkmal ist. Die Wucherung findet sich bald im ganzen Umkreis, bald nur herdweise auf einzelne Flecken beschränkt. Zumeist nimmt sie die Pars plana bis zur Ora serrata ein (Fig. 12). In einem Falle waren es sogar nur die unmittelbar vor der Ora serrata liegenden Teile, welche die typische Veränderung zeigten. Manchmal greift die Wucherung aber auch auf den hintersten Abschnitt der Pars plicata über. In einem Falle war das Verhalten von dem Gewöhnlichen da-

durch abweichend, dass die Wucherung in ausgedehnter Weise die Ciliarfortsätze betraf, ja dieselben grösstenteils zerstört hatte, während gerade der flache Teil des Ciliarkörpers kaum verändert war (Fig. 13, 14). In einem Falle fand ich eine analoge Veränderung des Pigmentepithels der Netzhaut ein wenig hinter der Ora serrata (Taf. XI, Fig. 32), in einem andern Falle bestand die Wucherung an der hinteren Fläche der Iris, ausgehend von der vorderen der beiden Epithellagen (Fig. 15, Taf. X, Fig. 33, 34). Allen Fällen gemeinsam ist, dass sich die Epithelwucherung ohne erhebliche entzündliche Erscheinungen

Fig. 13. Verg. 50 : 1. Der hintere Teil eines Ciliarfortsatzes ist durch die in das Stroma eindringende Epithelwucherung ersetzt. An der Basis des Ciliarfortsatzes ein kleiner Lymphocytenherd.

entwickelt, im Gegensatz zu jener, wo das Epithel in cyclitische Schwarten hineinwächst.

Die feineren Vorgänge bei der Wucherung sind, weil nicht ganz gleich, für die äussere und innere Lage des Epithels getrennt zu besprechen.

Die äussere pigmentierte Lage des ciliaren Epithels wuchert sowohl nach innen als nach aussen. Die Wucherung nach innen, das ist glaskörperwärts, kann so geschehen, dass die einfache Zellenlage mehrschichtig wird und die unpigmentierte Lage immer mehr abdrängt, wobei die Grenze zwischen beiden immer deutlich bleibt

(Taf. XI, Fig. 29). Es kann aber die pigmentierte Lage auch nach innen wachsen, indem sie die unpigmentierte durchbricht und sich dann an deren inneren Oberfläche ausbreitet. Der durch die innere Lage vorwachsende Zellzapfen legt sich infolge des Widerstandes, den er an den Zonulafasern findet, auf der Oberfläche der unpigmentierten Lage nieder und überlagert diese (Fig. 13 in meiner Arbeit über die Wucherung des ciliaren Epithels). Wenn dann später auch aus der unpigmentierten Lage Zellen hervowachsen und sich auf die gewucherten pigmentierten legen, kann auf eine Strecke weit eine völlige Verdoppelung beider Epithellagen entstehen (Fig. 14 derselben Arbeit).

Fig. 14. Vergr. 30:1. Wucherung des Ciliarepithels in der ganzen Ausdehnung des Ciliarkörpers, während der Ciliarfortsatz selbst verschwunden ist.

Häufiger ist es, dass bei Zunahme der Wucherung die Abkömmlinge beider Epithellagen so durcheinander wachsen, dass sie nicht mehr auseinander zu halten sind.

Die Zellen der pigmentierten Lage können auch nach aussen wuchern (Taf. XI, Fig. 29a, Fig. 16 der oben citierten Arbeit). In einem Falle war dies besonders stark und ging mit dem Schwund des ursprünglichen Stromas Hand in Hand. Züge pigmentierter Epithelzellen dringen nach Schwund der Glashaut in das Stroma des Ciliarkörpers ein. In Taf. XI, Fig. 30 kann man die Schläuche pigmentierter Zellen zwischen den Venen des Ciliarfortsatzes in die Tiefe wachsen und bis an die Oberfläche des Ciliarmuskels vordringen sehen; innerhalb dieses letzteren habe ich aber niemals Epithelschläuche gesehen. Der gleichzeitige Schwund des Grundgewebes

kann so weit gehen, dass die Ciliarfortsätze ganz abgeflacht werden; in der Tat war im ganzen Auge kein unversehrter Ciliarfortsatz mehr zu sehen. Fig. 13 zeigt, wie von einem Ciliarfortsatz die hintere Hälfte bereits verschwunden ist. In Fig. 14 ist der Fortsatz ganz weg, und das gewucherte Epithel liegt fast unmittelbar auf dem Ciliarmuskel. Dieser Vorgang ist gewiss nicht so aufzufassen, als ob die Stränge pigmentierter Epithelzellen sich aggressiv gegen das Bindegewebe des Ciliarkörpers verhalten würden in der Weise wie Krebschläuche; die hochgradige Atrophie der Ciliarfortsätze ist wohl Folge der Drucksteigerung und mag das Einwachsen der Epithelstränge erleichtert haben, aber man hat doch oft den Eindruck, als ob das Bindegewebe unter dem Druck des vorwachsenden Epithels noch mehr geschwunden wäre.

Die wuchernden Epithelzellen verlieren ihre regelmässige cylindrische Form. Sie ziehen sich — Protoplasma und Kerne — in die Länge und werden zu Spindelzellen, welche sich wie die Zellen eines Spindelzellensarkoms aneinanderlegen. Zugleich verlieren sie immer mehr ihr Pigment, so dass die Kerne sichtbar werden (Taf. XI, Fig. 31). Es kommt aber auch vor, dass die Zellen, ebenfalls unter zunehmendem Pigmentverlust, zu einer gemeinschaftlichen Masse, einem Syncytium verschmelzen, wo in einer zusammenhängenden Protoplasamasse die Kerne liegen, welche in diesen Fällen annähernd rund sind.

Auch die Form der Wucherung im ganzen ist verschieden. Die Zellen können ausgedehnte Platten bilden, welche übereinander geschichtet liegen und auf dem Querschnitt wie lange Zellbänder aussehen (Taf. XI, Fig. 29 und 31), oder sie ordnen sich zu Schläuchen an, welche auf dem Querschnitt rund sind (Taf. XI, Fig. 30). Die Zellplatten sind gewöhnlich die innen auf dem ursprünglichen Epithel liegenden Wucherungen, die Zellschläuche, die nach aussen in das Stroma des Ciliarkörpers eindringenden; doch können Zellschläuche auch an der inneren Oberfläche des Epithels emporwachsen. Die Zellplatten bestehen häufiger aus Spindelzellen, die schlauchartigen Wucherungen gewöhnlich aus Syncytien.

Die innere unpigmentierte Lage wächst stets nur nach einer Seite, nämlich nach innen. Man konstatiert auch hier die beiden Formen der aneinanderliegenden spindelförmigen Zellen und der Syncytien. Während aber das pigmentierte Epithel häufiger zu Spindelzellen auswächst, bildet das unpigmentierte häufiger Syncytien. Auch hier kommen die beiden Formen der Zellschläuche und der Zellplatten

vor (Taf. XI, Fig. 30 und 31). Die letzteren liegen nicht bloss unmittelbar auf der ursprünglichen Epithellage, sondern oft auch noch parallel zu dieser, in einer gewissen Entfernung von ihr, indem sie in Lage und Richtung offenbar durch die Zonulafasern bestimmt werden (Taf. XI, Fig. 31, Textfig. 12). Die unpigmentierten Zellen nehmen bei ihrer Vermehrung gewöhnlich etwas Pigment auf, bald nur einige Körnchen, bald so viel, dass sie sich nicht mehr von den pigmentierten Zellen, welche ihr Pigment teilweise verloren haben, unterscheiden lassen (Taf. XI, Fig. 31).

Es gibt Fälle, wo auch bei starker Wucherung die Produkte der beiden Epithellagen leicht auseinander zu halten sind. Aussen sind einige Lagen stärker pigmentierter spindelförmiger Zellen als Abkömmlinge

Fig. 15. Vergr. 53 : 1. Wucherung des retinalen Blattes der Iris.

des pigmentierten Epithels und darauf folgen nach innen mehrere Lagen weniger pigmentierter, syncytialartiger Platten als Produkt der unpigmentierten Lage (Taf. XI, Fig. 29, Textfig. 16). Wenn es sich um schlauchförmige Excrescenzen handelt, so schlagen die pigmentierten und die unpigmentierten entgegengesetzte Richtungen ein (Taf. XI, Fig. 30). In andern Fällen aber wachsen die Produkte beider Epithellagen so durcheinander und nähern sich in Form und Pigmentgehalt so sehr, dass eine Zurückführung der einzelnen Zellen auf die pigmentierte oder unpigmentierte Lage unmöglich geworden ist (Taf. XI, Fig. 31). Dasselbe gilt für einzelne Stellen, wo das Ciliarepithel in der Weise verändert ist, dass es nicht als gewuchert, sondern als atrophisch bezeichnet werden muss. Es besteht aus einer zwei- bis dreifachen Lage unregelmässig nebeneinander liegender, gleich stark pigmentierter Spindelzellen, welche so niedrig sind, dass die Dicke

des Epithelüberzuges erheblich unter der normalen zurückbleibt. In meinen Fällen war eine solche Atrophie nur selten anzutreffen und bestand nur fleckenweise und in geringer Ausdehnung. Vielleicht aber tritt in manchen Fällen oder in späteren Stadien diese Atrophie als hauptsächliche Veränderung an die Stelle der Wucherung. Wenigstens sagt Groenouw¹⁾ von seinem Fall: „Das Pigmentepithel zeigt in dem

Fig. 16. Umschriebene chronische Cyclitis nach Einheilung eines Kupfersplitters. Vergr. 108:1. Wucherung des Epithels der Pars plana, besonders der unpigmentierten Lage.

infiltrierten Teil der Pars plana des Ciliarkörpers sehr erhebliche Veränderungen. Es ist grösstenteils atrophiert und mit ihm die darüberliegende Epithelschicht. Um eine einfache Alterserscheinung handelt

¹⁾ Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 1900. S. 191.

es sich dabei sicher nicht.“ Da über das Epithel der Ciliarfortsätze nichts gesagt ist, dürfte es ungefähr normal gewesen sein.

Die durch die Wucherung nach der Glaskörperseite hin entstandene Zellenlage lässt Zwischenräume zwischen sich, welche von einer Masse erfüllt sind, die sich mit Eosin stark rot färbt. Sie ist bald homogen, bald feinstreifig und enthält einzelne freie Zellen (Taf. XI, Fig. 31, Textfig. 16). Diese Substanz ist als Bindegewebe anzusehen und führt nicht selten auch einzelne feine Gefässe. Diese aus abwechselnden Lagen von Bindegewebe und Epithelzellenplatten bestehende Auflagerung unterscheidet sich von den Schwarten nach Endophthalmitis schon durch ihre geringe Mächtigkeit, indem sie sich auf einen dünnen Überzug der Pars plana beschränkt und nicht auf die Ciliarfortsätze reicht. Ein prinzipieller Unterschied liegt vielleicht in der Entstehungsweise. Die endophthalmitischen Schwarten entwickeln sich aus mächtigen, dem Ciliarkörper aufgelagerten Exsudaten, welche erst nachträglich vom Stroma des Ciliarkörpers aus organisiert und vaskularisiert werden; ganz zuletzt erst wächst dann das Ciliarepithel in das junge Bindegewebe hinein. Bei der chronischen Iritis fehlt die starke Exsudation, indem nur einzelne Zellen und Zellhäufchen die Oberfläche des Ciliarkörpers bedecken. Die Auflagerung beginnt mit der Wucherung des Epithels, an welche sich später ein Auswachsen des Bindegewebes des Ciliarkörpers anschliesst, und dann geht die Proliferation beider Gewebe weiter Hand in Hand, so dass abwechselnde Lagen von Epithel und Bindegewebe sich bilden.

Das Bindegewebe zwischen den Epithelzellenlagen ist bei der chronischen Iritis manchmal ausserordentlich spärlich (Fig. 14), manchmal etwas reichlicher (Fig. 12), so dass es scheinen könnte, als ob schliesslich nur graduelle Unterschiede zwischen diesen Fällen und denjenigen mit cyclitischen Schwarten bestünden. Dies ist auch insofern richtig, als ein schwacher Reiz die chronische Epithelwucherung setzt, ein starker die Oberflächenexsudation mit nachheriger Epithelein sprossung. Man kann darum zuweilen nach Endophthalmitis beide Arten von Veränderungen an verschiedenen Stellen desselben Auges antreffen. Aber im ganzen sieht die Wucherung bei chronischer Iritis doch ganz anders aus als die in Schwarten, wie sie z. B. die Textfiguren 20 und 21 zeigen. Ich werde im folgenden die Epithelwucherung, wie sie für chronische Iritis charakteristisch ist, als freie Epithelwucherung bezeichnen zum Unterschied von der Epithelwucherung in Schwarten.

An der äusseren Seite der Wucherung, zwischen ihr und der

Glashaut, liegt häufig eine neugebildete Schicht, welche homogen oder feinstreifig ist und sich auch mit Eosin stark rot färbt. Die Glashaut selbst kann verdickt sein oder umgekehrt stellenweise fehlen. In einem Falle konnte ich sehen, dass die Auflösung der verdickten Glashaut unter Aufsplitterung derselben in einzelne Lamellen vor sich ging. Das Stroma des Ciliarkörpers zeigt nur in den frischen Fällen eine leichte entzündliche Infiltration. In den älteren Fällen ist die Infiltration verschwunden, und häufig ist der Ciliarkörper infolge der bestehenden Drucksteigerung atrophisch geworden.

Die in einem Falle konstatierte Epithelwucherung im vorderen Teil der Aderhaut bestand darin, dass herdweise das Pigmentepithel eine 3—4fache Lage bildete, ohne dass an solchen Stellen die Aderhaut oder Netzhaut verändert war (Taf. XI, Fig. 32).

Eine der Wucherung des Ciliarepithels analoge Wucherung fand sich in einem Falle am retinalen Epithel der Iris, wovon Fig. 15 ein Übersichtsbild gibt. Die spindelförmigen Zellen, welche die vordere retinale Epithellage bilden und zum Dilatator pupillae gehören, vermehren sich, anfangs noch unter Zunahme ihres Pigmentgehaltes, so dass mehrere Lagen spindelförmiger, dunkel pigmentierter Zellen entstehen (Taf. XI, Fig. 33). Bei weiterer Vermehrung der Zellen rücken die einzelnen Lagen derselben auseinander; die Zellen werden schmaler, pigmentärmer und lassen sich schliesslich nicht mehr deutlich abgrenzen von einem Gewebe, welches sich indessen zwischen den Epithelzellenlagen entwickelt hat. Dieses Gewebe, ursprünglich nur eine feinstreifige Substanz, nimmt später deutlichen Bindegewebscharakter an (Taf. XI, Fig. 34). In derselben Figur sieht man ausserdem noch unmittelbar vor der hinteren Epithellage den Querschnitt *a* eines durch Auswachsen der hinteren Epithellage entstandenen Zellschlauches. Durch die Proliferation der vorderen Epithellage wird die hintere abgehoben. Sie ist zumeist unverändert, doch an einigen Stellen ist auch sie zu einer mehrfachen Zellenlage herangewachsen.

Die Wucherung des ciliaren Epithels kommt nicht nur bei der chronischen Uveitis, sondern auch bei andern Erkrankungen des Auges vor und wurde seinerzeit von mir ausführlich beschrieben. In dieser Arbeit war auf die Ätiologie nur insofern Rücksicht genommen worden, dass ich die einfach senilen Veränderungen von den eigentlichen pathologischen trennte. Die ersteren bestehen nur in kleinen, meist knospenartigen Auswüchsen des unpigmentierten Epithels. Sie kommen daher, wenn es sich um eine Differentialdiagnose mit der chronischen

Uveitis handelt, nicht weiter in Betracht. Ausgedehnte Wucherungen wie bei dieser kommen vor teils frei an der Oberfläche des Ciliarkörpers, teils eingebettet in entzündliche Schwarten, welche auf dem Ciliarkörper liegen. Die freie Epithelwucherung wie bei chronischer Uveitis findet man am häufigsten in ektatischen Augen mit Drucksteigerung (alte Hornhautstaphylome usw.). Zugleich mit der Wucherung des Epithels im flachen Teil des Ciliarkörpers besteht hier auch häufig eine obsolete Retinochorioiditis, welche ja auch in manchen Fällen chronischer Uveitis vorkommt. Meiner Ansicht nach entsteht die Wucherung des Ciliarepithels in ektatischen Augen ebenso wie bei der chronischen Uveitis, nämlich durch einen schwachen aber lange dauernden Entzündungsreiz, welcher vom Kammerwasser oder vom Glaskörper aus auf die innere Oberfläche des Ciliarkörpers wirkt. Zur Illustration des Gesagten sei mir gestattet, von zwei ziemlich gleichen Fällen von Zündhütchenverletzung wenigstens den einen genauer anzuführen.

Fig. 17.

Einem 8 jährigen Jungen war bei der Explosion eines Zündhütchens ein Stück davon ins Auge gedrungen, welches sich aber nach 14 tägiger Entzündung beruhigte. Erst 8 Jahre später wurde es plötzlich wieder entzündet. Als der Junge deshalb in die Klinik kam, konstatierte man einen Bluterguss, der die vordere Kammer so erfüllte, dass von den tieferen Teilen nichts zu sehen war. Die anatomische Untersuchung des enucleierten Auges wies den Fremdkörper, einen kleinen Kupfersplitter, im unteren inneren Winkel der vorderen Kammer nach, wo er auf der Iris lag, eingehüllt in eine dicke Hülle (Textfigur 17). Dieselbe besteht der Hauptsache nach aus Leukocyten, einkernigen und mehrkernigen durcheinander, zwischen welchen man feine Bindegewebszüge erkennt. Diese gehören offenbar einer bindegewebigen Kapsel an, welche sich um den Fremdkörper gebildet hatte und jetzt, beim Wiederaufflackern der Entzündung, dicht von frisch ausgewanderten Leukocyten durchsetzt worden war. In der Iris besteht eine mässige Infiltration mit Lymphocyten und namentlich mit vielen Plasmazellen und eine herdförmige Infiltration im Ciliarkörper besteht fast ausschliesslich aus letzteren. Die Firsten der Ciliarfortsätze sind bis auf eine kleine Stelle ziemlich normal und erst im hintersten Abschnitt des gefalteten

Teiles beginnt die Epithelwucherung, welche sich bis zur Ora serrata erstreckt. Dieselbe betrifft sowohl die unpigmentierte als die pigmentierte Lage, welche beide auch im gewucherten Zustande leicht auseinander zu halten sind (Fig. 16). Sie beschränkt sich auf den Quadranten, in welchem der Fremdkörper sitzt, so dass im übrigen Umkreis des Bulbus der Ciliarkörper ungefähr normal ist.

Zur Erklärung der gefundenen Veränderungen muss man annehmen, dass der Kupfersplitter zunächst nur eine geringe Reaktion auslöste, welche gerade hinreichte, die Bildung einer dünnen bindegewebigen Kapsel zu veranlassen. Wie nun von reizlos eingeheilten Eisensplintern doch andauernd Eisensalze in das Auge übergehen, so muss es sich hier bezüglich der Kupfersalze verhalten haben, welche ja leichter wasserlöslich sind als die Eisensalze. Dieselben übten Jahre hindurch einen Reiz auf den Ciliarkörper aus, welcher nicht zu einer heftigen Entzündung desselben führte, sondern nur zur Wucherung seines Epithelüberzuges. Der Weg, den die Kupfersalze nahmen, ging nicht durch die Pupille, sondern quer durch die Iriswurzel, wie ich auf Grund folgender Erwägungen annehme. Es ist nur jener Teil des Ciliarkörpers verändert, welcher dem Meridian des Fremdkörpers entspricht. Dort müssen also die Kupfersalze in der stärksten Konzentration eingewirkt haben. Wenn die Kupfersalze durch die Pupille nach rückwärts gegangen wären, müssten sie den Ciliarkörper ringsum ziemlich gleichmässig affiziert haben. Der nächste Weg vom Fremdkörper zu dem erkrankten Teil des Ciliarkörpers geht durch die Iriswurzel, welchen Weg daher die Kupfersalze genommen haben müssen. Darauf weist auch die dichte Infiltration hin, welche entsprechend dem Sitz des Fremdkörpers in der unmittelbar darunter liegenden Iris besteht; dieselbe reicht bis an das retinale Epithel, ohne dieses jedoch an irgendeiner Stelle zu durchbrechen. Die durch die Iris dringenden Kupfersalze gelangen zuerst an die Ciliarfibrillen und dann erst an den flachen Teil des Ciliarkörpers. Wenn nun erstere kaum, letzterer intensiv verändert ist, so muss man noch eine besondere Disposition der Pars plana annehmen, durch Wucherung ihres Epithels auf chronisch einwirkende Reize zu reagieren.

Wucherung des Ciliarepithels wird aber auch dort gefunden, wo entzündliche Schwarten auf dem Ciliarkörper liegen, wie dies nach abgelaufener plastischer Iridocyclitis (Endophthalmitis) der Fall ist. Hier wächst vor allem das pigmentierte Epithel in die Schwarten hinein (das unpigmentierte ist häufig zugrunde gegangen). Diese Art von Wucherung unterscheidet sich also durch die Gegenwart der entzündlichen Schwarten von der freien Wucherung bei der chronischen Uveitis. Man kann allerdings einzelne Fälle älterer Endophthalmitis finden, wo an manchen Stellen freie Wucherung des ciliaren Epithels, an anderen aber Wucherung in eine Schwarte hinein zu sehen ist. Es handelt sich dann in bezug auf die Stellen mit freier Wucherung ohne Schwarten wohl um solche Stellen, welche nur der Fernwirkung der Noxe ausgesetzt waren, weil sie dem Ausgangs-

punkt der Entzündung ferner lagen als jene Stellen, welche von Schwarten bedeckt gefunden werden.

Freie Wucherung des Epithels gleichzeitig mit Wucherung in eine Schwarte hinein kennzeichnet viele Fälle von Iridocyclitis nach Netzhautablösung, welche später noch genauer besprochen werden sollen. In solchen Fällen besteht eine Schwarte („Ringschwiele“), welche entsprechend der Ora serrata ringsum auf der Uvea ruht, in welche das pigmentierte Epithel in langen Zügen hineinwächst (Textfigur 20 u. 21). Ausserdem findet man aber öfter vor dieser Ringschwiele die typische freie Wucherung beider Epithellagen. Dieselbe hat mit der Wucherung bei der chronischen Uveitis und in ektatischen Augen gemeinsam, dass die Ciliarfirsten intakt sind. Es ist ferner, im Gegensatz zu den Fällen mit Schwarten, die unpigmentierte Lage, welche den Hauptteil der Wucherung bestreitet.

Aus den obigen Darlegungen geht hervor, dass die Grenze zwischen den einzelnen Formen der Wucherung nicht scharf ist, und es wäre verfehlt, aus der Art der Wucherung an einer umschriebenen Stelle des Auges auf die Natur des Krankheitsprozesses im ganzen zu schliessen, wohl aber ist dies möglich, wenn man die Gesamtheit der anatomischen Veränderungen in Rechnung zieht.

Die Aderhaut zeigt öfter in ihrem vordersten Teil kleine frische Lymphocytenherde oder Herde obsoletter Chorioiditis. In fünf Fällen bestanden die Folgen einer über die ganze Aderhaut ausgebreiteten alten Chorioiditis mit fleckweiser Verwachsung der Netzhaut mit der Aderhaut, weshalb diese Fälle in der Tabelle als Retinochorioiditis angeführt sind. Nach der Anamnese begann in diesen Fällen die Sehstörung vor langer Zeit, so dass die Krankheit wahrscheinlich mit der Chorioiditis angefangen hatte und erst später die geringeren Veränderungen im vorderen Abschnitt der Uvea hinzutraten. In drei Fällen erwies sich bei der anatomischen Untersuchung der Ciliarkörper normal, war also beim Übergang der Entzündung von der Aderhaut auf die Iris übersprungen worden. Dies liess sich klinisch natürlich nicht diagnostizieren.

Die Netzhaut hatte in den vorliegenden Fällen nur sekundär gelitten, entweder infolge der Chorioiditis oder infolge der Drucksteigerung. Ebenso ist auch die Atrophie oder die Excavation des Sehnerven, welche in mehreren Fällen besteht, nur sekundärer Natur. Netzhautablösung war in keinem Falle vorhanden. Allerdings waren die meisten Fälle entweder mit Chorioiditis oder mit Drucksteigerung verbunden, welche beide einer Netzhautablösung entgegenwirken. Es

könnte wohl sein, dass manchmal die Wucherung des ciliaren Epithels an der Ora serrata sich mit der Netzhaut selbst in Verbindung setzt und einen Zug an ihr ausübt, welcher Netzhautablösung hervorrufen könnte. In meinen Fällen war von einem solchen Zuge nichts zu sehen.

Der Glaskörper enthält entsprechend der Gegend des Ciliarkörpers in seinen oberflächlichen Schichten etwas mehr Zellen als normal. In zwei Fällen bestand deutliche hintere Glaskörperabhebung, wobei die hintere Fläche des Glaskörpers sich zu einer Art Grenzmembran verdichtet hatte, auf welcher einzelne Zellen lagen.

Zusammenfassung.

Die untersuchten zehn Fälle gehören nicht zu den ganz leichten Fällen chronischer Cyclitis, sondern zu den etwas schwereren, welche chronisch und unscheinbar beginnen, dem Kranken oft erst durch die Sehstörung zum Bewusstsein kommen, später aber durch ihre Folgen, vor allem durch Drucksteigerung, zur Erblindung führen können. Wenn man wie hier, tuberkulöse und syphilitische Fälle ausschliesst, kommt diese Erkrankung hauptsächlich bei Frauen vor. Meine zehn Fälle betrafen vorwiegend Männer, und es ist daher nicht sicher, ob sie ätiologisch mit den gewöhnlich bei Frauen angetroffenen identisch sind. Ausserlich, bei bloss klinischer Beobachtung, sind freilich alle diese Fälle ähnlich, indem die Veränderungen der chronischen Iritis und ihre Folgen das Krankheitsbild beherrschen. Die anatomische Untersuchung zeigte, dass gewöhnlich die ganze Uvea beteiligt ist, ausnahmsweise aber doch bloss die Iris oder bloss Iris und Ciliarkörper oder bloss Iris und Aderhaut. Klinisch hat sich dies aber nicht auseinanderhalten lassen.

Die Fälle Leitner, Roseneder und die zehn schweren Fälle bilden, was die klinischen Symptome anlangt, eine zusammenhängende Reihe. Im Falle Leitner ist die Krankheit am frischesten und leichtesten, indem bloss Präcipitate und keine Veränderungen an der Iris bestehen. Von hier führt der Fall Roseneder, wo zu den Präcipitaten hintere Synechien kommen, hinüber zu den schwereren Fällen, wo die Präcipitate schon grösstenteils vermisst werden, dagegen stärkere Veränderungen an der Iris vorliegen. Die anatomischen Veränderungen bilden in gleicher Weise eine ansteigende Reihe. Im Falle Leitner kennzeichnet sich der Prozess durch geringe Oberflächenexsudation, wodurch die Präcipitate gebildet werden, während am ciliaren Epithel nur der Beginn der Epithelwucherung vorhanden ist. Im Falle Rose-

neder tritt die Zellauswanderung an die Oberfläche schon mehr zurück, und die Anwachsungen der Iris, sowie die Epithelwucherungen am Ciliarkörper werden deutlicher, um in den Fällen der dritten Reihe in den Vordergrund zu rücken. Man darf daraus vielleicht schliessen, dass wenigstens in vielen Fällen die Krankheit mit einer leichten entzündlichen Infiltration beginnt, durch welche die Präcipitate gesetzt werden, und dass in den späteren Stadien an die Stelle der Infiltration und Zellauswanderung die Anwachsungen der Iris, die Membranbildung und die Wucherung des Ciliarepithels tritt. Damit würde übereinstimmen, dass man während des so langen Verlaufes der chronischen Uveitis Verschlimmerungen häufig durch einen Nachschub von Präcipitaten eingeleitet findet.

Sämtliche Fälle zeigen Veränderungen an der Iris, welche nichts Charakteristisches bieten, da sie bei Entzündungen der Iris aus andern Ursachen in gleicher Weise vorkommen. Eine Iritis z. B. infolge eines Hornhautgeschwüres wird im frischen Zustande zwar ein wesentlich anderes anatomisches Bild geben wie bei der chronischen Uveitis, aber wenn sie abgelaufen ist, bleiben dieselben hinteren Synechien, dieselben Pupillarmembranen zurück, wie sie sich bei der chronischen Uveitis langsam bilden.

In einer Anzahl von Fällen wurde auch der Ciliarkörper erkrankt gefunden, und zwar zum Unterschied von der Iris in einer ganz typischen Art. Der Ciliarkörper zeigt Veränderungen, welche in ganz gleicher Weise bei keiner andern Krankheit vorkommen. Sie sind als negatives Kennzeichen Abwesenheit plastischer Exsudation und als positives Wucherung des Ciliarepithels, ohne dass eine dem Grade der Veränderung entsprechende entzündliche Infiltration des Gewebes bestünde. Ich habe auf dieses Merkmal chronischer endogener Uveitis schon früher einmal hingewiesen¹⁾. Da es nicht in allen Fällen dieser

¹⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXVIII. S. 541. 1908. Ich finde wohl einzelne Fälle in der Literatur verzeichnet, wo eine Wucherung des ciliaren Epithels bloss im flachen Teil des Ciliarkörpers erwähnt wird, so von Brailey (Transactions of the Ophth. Society of the United Kingdom. 1882. p. 61) und Weeks (A Treatise on diseases of the eye. 1910. p. 351). Beide erwähnen nichts über das klinische Verhalten ihrer Fälle, von welchen sie ein Präparat abbilden, aber aus der Abbildung ist ersichtlich, dass die Wucherung des Epithels in eine dicke Schwarte hinein erfolgt. Riddleys Beschreibung (Ophthalmic Hospital Reports. Vol. XIV. p. 255. 1895) ist zu kurz und ungenau, um über die Art der Wucherung, von der er spricht, ein Urteil zu gewinnen. Einfache Wucherung des Epithels ohne Schwarten, wie sie meinen Fällen chronischer Uveitis eigen ist, habe ich nirgends beschrieben gefunden.

Krankheit vorhanden ist (es fehlte in vier meiner Fälle), so darf man es nicht als allgemeines Kennzeichen derselben hinstellen, sondern nur als gemeinschaftliches Merkmal einer bestimmten Gruppe.

Was nun die Natur der Entzündung anlangt, so zeigten die anatomischen Untersuchungen keine für Tuberkulose oder Syphilis charakteristischen Veränderungen. Es besteht bloss eine leichte, meist nur diffuse Infiltration, gebildet durch Lymphocyten und Plasmazellen, während polynucleäre Lymphocyten fehlen. Diese Zellen wandern aus dem Gewebe an die Oberfläche, u. zw. teilweise — am Ciliarkörper — in ungleichmässiger Weise, indem die Exsudatzellen stellenweise zu Häufchen sich ansammeln. Auch die späteren Veränderungen, die Proliferation des Epithels, ist häufig fleckweise. Aus diesen Tatsachen kann man Schlüsse auf den Ort und die Art des Reizes ziehen. In bezug auf den ersten Punkt wissen wir, dass die Exsudatzellen dem Orte des Reizes zustreben, welche gesetzmässige Erscheinung als Chemotaxis bezeichnet wird. Greift der Reiz im Gewebe selbst an, wie dies z. B. bei Tuberkulose und Syphilis der Fall ist, wo die Erkrankung von den Blutgefässen ausgeht, so besteht Infiltration im Gewebe selbst. Wirkt der Reiz auf die Oberfläche, so ruft er Auswanderung der Zellen an die Oberfläche hervor, bei Schleimhäuten als vermehrte und veränderte Sekretion, bei serösen Häuten als Exsudatbelag und Erguss in die Höhlen. Von diesem Gesichtspunkte aus beurteilt, muss bei der chronischen Uveitis der Reiz auf die Oberfläche der Uvea einwirken. Dies kann nur vom Kammerwasser aus geschehen, soweit es sich um den vorderen Abschnitt der Uvea handelt. In das Kammerwasser können, da eine Perforation nicht in Frage kommt, die schädlichen Substanzen nur auf dem Blutwege gelangt sein. Sie werden aus den Gefässen des Ciliarkörpers, vielleicht auch der Iris, zugleich mit dem Kammerwasser ausgeschieden. Es muss dann noch die Annahme gemacht werden, dass die reizende Substanz nicht schon von den Blutgefässen aus das Gewebe der Iris und des Ciliarkörpers angreift, sondern erst nach Ausscheidung in das Kammerwasser von der Oberfläche aus. Entweder ist diese für die reizende Substanz besonders empfindlich, oder die Substanz selbst erfährt bei ihrer Ausscheidung in das Kammerwasser eine chemische Veränderung. Als Beispiel für einen solchen Vorgang führe ich die Reizung der Nasenschleimhaut bei innerer Darreichung von Jodkalium an, indem aus diesem bei der Ausscheidung an die Oberfläche Jod in Freiheit gesetzt wird.

Was die Art des Reizes anlangt, so kommen Mikroorganismen

und Toxine in Betracht. Für die Gegenwart von ersteren liegt kein Anhaltspunkt vor. Es gelingt nicht, sie im Auge nachzuweisen, und auch die Art der Entzündung spricht gegen Parasiten. Wenn solche, wie so häufig bei Verletzungen, in die Kammer oder den Glaskörperraum eindringen und von hier aus auf die Oberfläche der Uvea wirken, erregen sie schwere plastische oder sogar eitrige Entzündung. Man kommt also auf dem Wege der Ausschliessung zu der Annahme der Wirkung eines chemischen Entzündungsreizes, eines Toxines, das ja allerdings von Mikroorganismen abgeleitet sein kann.

Die Wirkung der Toxine auf die Oberfläche der Uvea ist ungleichmässig in doppeltem Sinne. Die einzelnen Teile der Uvea, Iris, gefalteter und flacher Teil des Ciliarkörpers sind in verschieden starkem Grade und in verschiedener Form ergriffen, und in den einzelnen Abschnitten selbst bestehen Herde besonders intensiver Entzündung, nämlich Häufchen von Zellen auf dem Ciliarkörper in frischen Fällen und fleckweise Wucherung des Epithels in alten Fällen. Für die herdförmige Anordnung der Entzündungsprodukte lässt sich wohl nur eine verschieden starke Einwirkung des Reizes auf verschiedene Punkte der Oberfläche annehmen. Die verschiedene Beteiligung der einzelnen Abschnitte der Uvea aber lässt sich vielleicht ableiten aus der verschiedenen Reaktionsfähigkeit derselben auf den Entzündungsreiz, welche wieder in der anatomischen Verschiedenheit ihre Begründung hat.

Was zunächst die Iris anlangt, so ist dieselbe in allen Fällen entweder leicht infiltriert oder atrophisch, und immer, mit Ausnahme des Falles Leitner, bestehen hintere Synechien oder eine Membran in der Pupille. Die Iris ist also häufiger ergriffen als der Ciliarkörper, welcher in vier Fällen nicht verändert war. Die Erkrankung der Iris betrifft in erster Linie den Pupillarrand, in zweiter die vordere Fläche, welche manchmal von einer Membran überzogen ist, während die hintere Fläche der Iris frei von Entzündungsprodukten ist. Die stärkere Beteiligung der Iris im Vergleich zum Ciliarkörper lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass letzterer von einer doppelten Epithelschicht bedeckt ist, welche sein Gewebe bis zu einem gewissen Grade schützt; dasselbe gilt auch für die hintere Irisfläche. Die vordere Irisfläche ist dagegen nur von einem dünnen Endothel bekleidet, das sich überdies im Falle einer Entzündung leicht abstösst. Dadurch wird die frühe Erkrankung gerade der vorderen Irisfläche verständlich. Dass es gerade der Pupillarrand ist, welcher am stärksten reagiert, verlangt auch nicht die Annahme einer spezifischen Empfindlichkeit gegen das Toxin,

sondern steht im Einklang mit der Tatsache, dass dieser Teil der Iris, wahrscheinlich wegen seiner Gefässe und Zirkulationsverhältnisse, bei Entzündungen gewöhnlich am stärksten ergriffen ist.

Die Veränderungen am Ciliarkörper bestehen im Beginne in einer leichten Infiltration und in einer stellenweise stärkeren Auswanderung von Zellen an die Oberfläche, späterhin in einer Proliferation des Epithels. Auch diese Veränderungen entsprechen einem wenig intensiv, aber lange wirkenden Reiz, der seinen Angriffspunkt an der Oberfläche hat. Das Verhalten des Ciliarkörpers gleicht dem der Schleimhäute, welche auf einen auf ihre Oberfläche lange wirkenden Reiz zuerst mit einer Infiltration und Exsudation, später mit einer Verdickung ihres Epithels antworten. Allerdings ist das Ciliarepithel nicht dem Oberflächenepithel der Haut und der Schleimhaut gleichzusetzen, sondern hat sein Analogon im Ependym der Gehirnhöhlen, welches gleichfalls aus epithelähnlich geformten Zellen des Zentralnervensystems besteht. Gabriel Delamare und Pierre Marie¹⁾ beschreiben unter den verschiedenen Formen von Ependymitis auch eine, bei welcher das Epithel wuchert, so dass es manchmal bis auf die achtfache Reihe von Zellen anwächst. Auf solche Weise entstehen reine epitheliale Erhebungen und ebensolche Einsenkungen. Diese Form von Ependymitis ist eine ganz chronische.

Wenn vom Ciliarkörper wieder nur der flache Teil erkrankt, so darf man daraus schliessen, dass dessen Epithelüberzug von dem der Ciliarfirsten und der hinteren Irisfläche insofern verschieden ist, als er entweder leichter für das Toxin durchgängig ist, so dass das darunterliegende Stroma angegriffen wird und sekundär zur Wucherung seines Epithelüberzuges Veranlassung gibt, oder dass hier das Epithel selbst leichter durch das Toxin unmittelbar zur Proliferation angeregt wird. Der Unterschied in dem Verhalten des Epithels ist ja nur ein gradueller, indem ausnahmsweise auch das Epithel der Ciliarfirsten, ja selbst das der hinteren Irisfläche in Wucherung gerät. Es ist durchaus nicht ungereimt, eine Verschiedenheit im Verhalten des Epithels der einzelnen Abschnitte des Ciliarkörpers anzunehmen, da es sich ja auch durch seine anatomische Beschaffenheit unterscheidet. Als Beweis für sein verschiedenes Verhalten gegen Toxine führe ich die diabetische Veränderung des Irisepithels an. Beim Diabetes besteht eine hydropische Aufquellung, welche sich streng auf das retinale Epithel der Iris beschränkt und an der Grenze des Ciliarkörpers

¹⁾ Archives de médecine expérimentale et d'anatomie pathologique. Juli 1909.

ganz scharf aufhört. Dies beweist eine Verschiedenheit im chemischen Verhalten zwischen dem Epithel der Iris und dem des Ciliarkörpers. Man darf daher wohl auch gegenüber dem angenommenen Toxin der chronischen Uveitis eine von hinten nach vorn abnehmende chemische Affinität des Epithels zum Toxin annehmen.

Wenn wir nun die Ergebnisse klinischer Beobachtung mit denen der anatomischen Forschung vergleichen, ergibt sich folgendes:

Vom klinischen Standpunkte aus kann man bei der endogenen, weder syphilitischen, noch tuberkulösen chronischen Uveitis drei Gruppen unterscheiden:

1. Ganz leichte Fälle, bloss mit Präcipitaten, ohne hintere Synechien, von mir als chronische Cyclitis bezeichnet. Dieser Zustand kann jahrelang bestehen (in einem von mir behandelten Falle durch 17 Jahre), ohne dass etwas anderes zu sehen wäre, als dass die Präcipitate wechseln, indem die einen verschwinden, und dafür andere kommen, ja zu manchen Zeiten gar keine Präcipitate zu sehen sind. Die einzige ernste Komplikation dieser Fälle ist neben Glaskörpertrübungen die Drucksteigerung, welche leicht für echtes Glaukom gehalten wird, wenn man die in diesen Fällen gewöhnlich feinen Präcipitate übersieht. In diese Gruppe der andauernd leicht bleibenden Cyclitis gehören auch die Fälle bei Heterochromie der Iris.

2. Mittelschwere Fälle, wo zu den Präcipitaten Synechien hinzutreten, also Iridocyclitis. Diese Fälle können ganz schleichend bloss mit Präcipitaten beginnen und eine Zeitlang ganz leicht verlaufen, oder die Iris beteiligt sich vom Anfang an der Erkrankung. Wenn die Synechien zahlreich werden, kann durch *Seclusio pupillae* Erblindung eintreten. Rechtzeitige Iridektomie vermag oft Stillstand der Krankheit herbeizuführen.

3. Ganz schwere Fälle, welche in Atrophie des Auges ausgehen. Für diese Fälle gilt das von Gruppe 2 Gesagte, dass sie manchmal im Beginne ganz leicht erscheinen, während andere von vornherein einen schweren Charakter zeigen.

Ein andauernd chronischer Verlauf, d. h. ohne äussere Entzündungserscheinungen, kommt gewöhnlich nur den Fällen der ersten Gruppe zu, in den anderen Fällen treten diese früher oder später auf. Eine scharfe Grenze zwischen diesen Gruppen besteht nicht. Es gibt unzählige Zwischenstufen, und ein leichter Fall kann allmählich in einen schweren übergehen. Der Kliniker, welcher sich einem frischen leichten

Fälle gegenüber sieht, vermag nicht mit Sicherheit den weiteren Verlauf vorauszusagen.

Mit Rücksicht auf diese Übergänge muss man sich fragen, ob die drei Gruppen nur verschiedene Grade desselben Leidens darstellen, oder ob sich dieselben wenigstens teilweise ihrem Wesen nach voneinander unterscheiden? Die Antwort ist, dass beides zugegeben werden muss.

Dass ein leichter Fall von einem schweren sicher nur dem Grade nach verschieden sein kann, beweisen jene Fälle, wo die Krankheit an dem einen Auge leicht, an dem andern schwer verläuft. Beispiel: Eine 46 jährige Frau bekam vor acht Jahren eine chronische Uveitis mit Präcipitaten an beiden Augen. An dem einen kam die Krankheit nach Iridectomy dauernd zum Stillstande mit $S \frac{6}{12}$; das andere Auge wurde trotz Behandlung blind und atrophisch. Die Präparate zeigten mächtige Schwarten im Augenninneren wie nach einer septischen Endophthalmitis.

Auf der andern Seite haben wir die Fälle von Cyclitis bei Heterochromie der Iris, welche nur ganz ausnahmsweise einen schweren Verlauf nehmen, so dass man wohl annehmen muss, dass es in ihrem Wesen liegt, niemals stärkere Exsudation zu veranlassen.

Man hat also wahrscheinlich zu unterscheiden:

1. Fälle, welche grundsätzlich leicht verlaufen. 2. Fälle, welche grundsätzlich schwer verlaufen. Ich meine dies z. B. in Analogie der sympathischen Entzündung, in deren Wesen es liegt, einen schweren Verlauf zu nehmen, wenn auch ausnahmsweise leichtere Fälle vorkommen. 3. Fälle, welche nach Umständen leicht oder schwer verlaufen, je nach der Individualität der Kranken und anderen Faktoren.

Der Kliniker vermag, wenn wir von den Heterochromiefällen absehen, diese drei Kategorien nicht auseinander zu halten; er unterscheidet nur leichte und schwere Fälle chronischer Uveitis. Wir wollen sehen, ob die anatomischen Befunde uns eine Zerlegung der Krankheit in wesensverschiedene Gruppen erlauben. Die Befunde lassen uns folgende Typen erkennen:

1. Fälle mit Veränderungen an der Iris (oft auch an der Aderhaut), aber ohne Beteiligung des Ciliarkörpers. An der Iris findet man leichte Infiltration, später Atrophie des Gewebes, Fixierung des Pupillarrandes an die Kapsel und eine Membran bloss in der Pupille oder auch an der vorderen Fläche der Iris.

Diese Fälle sind klinisch teilweise ganz leicht verlaufen (Fall 3), teilweise mittelschwer mit Seclusio pupillae (Fall 5, 6, 7).

2. Fälle mit Veränderungen an der Iris und auch am Ciliarkörper. Die ersteren sind dieselben wie bei der ersten Gruppe. Die Veränderungen am Ciliarkörper sind typische. Als negatives Kennzeichen ist wichtig die Abwesenheit von Schwarten, als positives die Wucherung des Epithels.

Der klinische Verlauf dieser Fälle ist bald ganz leicht (Fall 1 und 2), bald schwerer mit *Seclusio pupillae* (Fall 4, 8, 9). Dass im klinischen Verlauf die beiden Gruppen übereinstimmen, kommt daher, dass hierfür nicht das Verhalten des Ciliarkörpers, sondern das der Iris massgebend ist; die Iris ist aber in den Fällen beider Gruppen in gleicher Weise ergriffen. Das Verhalten des Ciliarkörpers scheint den Verlauf der Krankheit nicht wesentlich zu beeinflussen.

Ob Gruppe 1 und 2 mit Rücksicht auf das verschiedene Verhalten des Ciliarkörpers grundsätzlich zu trennen sind, wird erst auf Grund eines grösseren Materiales entschieden werden können. Leider gibt es gerade in bezug auf die klinisch so wohl charakterisierten Fälle von *Cyclitis* bei *Heterochromie* noch keine anatomischen Befunde über das Verhalten des Ciliarkörpers.

3. Fälle mit Schwarten im Augeninneren, auf dem Ciliarkörper und häufig auch auf der Aderhaut. Manchmal besteht Verknöcherung in den Schwarten. Dieselbe verursachen totale Netzhautablösung und Atrophie des Auges. Diesen Fällen kommt wahrscheinlich in den früheren Stadien die besonders starke Infiltration der Iris zu, welche von den Autoren (Knies, Harms, Baas, Hayashi) beschrieben wurde, wodurch die Iris auf das Doppelte verdickt und manchmal an ihrer vorderen oder hinteren Fläche in eine Art Granulationsgewebe verwandelt war. Ich selbst habe eine solche starke Infiltration der Iris nicht gefunden, wahrscheinlich weil ich meine schweren Fälle in einem zu späten Stadium zur Untersuchung bekam.

Der klinische Verlauf solcher Fälle kann im Beginn derselbe sein, wie bei den ersten beiden Gruppen (siehe das auf S. 276 zitierte Beispiel), oder er kann vom Anfang an schwer sein. Nach dem anatomischen Befund aber sind diese Fälle jedenfalls von denen der beiden ersten Gruppen grundsätzlich verschieden, auch wenn sie ihnen zuerst klinisch ähnlich sein mögen.

4. Fälle mit Veränderungen, welche denen bei sympathischer Ophthalmie gleichen. Von solchen sind bisher zwei von Dr. Botteri aus meiner Klinik veröffentlicht worden¹⁾. Der eine Fall war einseitig,

¹⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXIX. S. 172.

der andere doppelseitig. Seitdem ist noch ein dritter, einseitiger Fall derselben Art an meiner Klinik zur Enucleation und anatomischen Untersuchung gekommen. Klinisch war der Verlauf der einer an Schwere allmählich zunehmenden chronischen Uveitis.

5. Fälle mit besonders mächtiger Infiltration der Uvea, aber auch der Netzhaut mit ausgedehnter Nekrose dieser Membranen. Der Höhepunkt der Krankheit liegt im hinteren Abschnitt der Uvea, der vordere ist weniger ergriffen. Der erste Fall dieser Art wurde von mir veröffentlicht¹⁾, der zweite aus meiner Klinik von Dr. E. V. L. Brown²⁾. Der klinische Verlauf war vom Anfang an schwer.

Die Fälle der Gruppe 4 und 5 gehören der proliferierenden Form der Entzündung an, welche durch Infiltration im Gewebe selbst gekennzeichnet ist. Sie unterscheiden sich dadurch dem Wesen nach von den drei ersten Gruppen. Sie sind aber untereinander nicht bloss dem Grade, sondern auch der Art nach verschieden. In Gruppe 4 beschränkt sich die primäre Erkrankung auf die Uvea, und die Netzhaut ist nur sekundär in Mitleidenschaft gezogen; auch kommt es nicht zur Nekrose. In Gruppe 5 ist dagegen die Netzhaut ebenso wie die Uvea primär befallen, und die Entzündung hat einen ausgesprochen nekrotisierenden Charakter.

Die Aufstellung obiger 5 Gruppen ist nur eine provisorische, soweit eben das bisher vorliegende Material gestattet. Gruppe 1 und 2 gehören vielleicht zusammen, und von 2 mögen Übergänge zu 3 vorkommen. Gruppe 4 und 5 stehen jede für sich da. Weitere Forschungen werden vielleicht noch andere Typen aufstellen lassen.

Ein anatomisch verschiedenes Verhalten gestattet wohl auch Schlüsse auf eine verschiedene Ätiologie u. zw. umso eher, je grösser die Verschiedenheit im Befunde ist. So vermag die anatomische Untersuchung die Klinik, wo diese im Stiche läßt, zu ergänzen. Ich erinnere an die sympathische Ophthalmie. Einem an traumatischer Iridocyclitis zugrunde gegangenen Auge kann man nicht ansehen, ob es den Krankheitskeim für das andere Auge birgt oder nicht. Die anatomische Untersuchung vermag dies durch den Nachweis der typischen Veränderungen. — Welche Schlüsse auf die Ätiologie lassen sich nun aus den anatomischen Befunden bei der chronischen Uveitis ziehen?

Bezüglich der Gruppen 1 und 2 wurde schon auf S. 272 dar-
getan, dass die anatomischen Veränderungen auf einen leichten, aber

¹⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXI. S. 437.

²⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXXXII. S. 300.

andauernden, auf die Oberfläche einwirkenden Reiz hinweisen, welcher wahrscheinlich auf der Gegenwart reizender Stoffe im Kammerwasser beruht.

In Gruppe 3 bestehen Schwarten, welche wir als Folge massenhafter, später organisierter Oberflächenexsudation kennen. Diese entsteht am häufigsten exogen, nach Perforation. Es mag daher sein, dass einzelne der anscheinend spontan entstandenen Fälle doch auf eine perforierende Verletzung zurückzuführen sind, wenn auch weder die Anamnese, noch der klinische Befund, noch die anatomische Untersuchung sichere Anhaltspunkte dafür ergeben. Natürlich kommt diese Möglichkeit nur für einseitige Fälle in Betracht.

Eine schwere Infektion kann auch auf endogenem Wege durch Metastase geschehen. Metastasen mit den eiterungserregenden Bakterien verursachen zwar gewöhnlich eine Panophthalmitis, doch können ausnahmsweise auch weniger schwere, ja selbst ganz leichte Entzündungen dadurch erzeugt werden (Axenfeld)¹⁾. Gewissen Metastasen kommt grundsätzlich ein guter Charakter zu, z. B. denen bei Febris recurrens. Manche Fälle von spontaner Uveitis mit Schwartenbildung, sowohl einseitig als doppelseitig, mögen also auf klinisch unerkannte Metastasen zurückzuführen sein.

Es ist aber nicht auszuschliessen, dass auch Toxine allein schwere Entzündung hervorzurufen vermögen. Axenfeld²⁾ erklärt eine eitrige Entzündung durch blosse Toxinwirkung für unmöglich. Dies ist insofern richtig, als dadurch gewiss niemals eine Panophthalmitis entstehen wird. Lokalisierte eitrige Exsudate kommen aber sicher infolge blosser Toxinwirkung vor. Ich werde später über einen Fall von Iridocyclitis infolge von Netzhautablösung berichten, wo die Pupille von einem Eiterklumpen, ganz aus polynucleären Leukocyten bestehend, erfüllt war. Bei der schweren Iridocyclitis, welche durch Nekrose eines Aderhautsarkoms hervorgerufen wird, sieht man nicht selten ausschliesslich aus polynucleären Leukocyten zusammengesetzte Exsudate. Auch die Folgen schwerer Entzündung, die Schwarten, sind bei der sicher nichtbakteriellen Iridocyclitis nach Netzhautablösung nicht selten und ebenso bei intraoculärem Cysticercus. Es ist also möglich, dass auch eine spontan entstandene Uveitis mit Schwartenbildung ätiologisch mit den durch Toxine entstandenen Fällen der beiden ersten Gruppen identisch ist, was uns den Übergang der leichten in die schweren Fälle verstehen lässt.

¹⁾ Bakteriologie des Auges. I. Aufl. S. 326.

²⁾ Loc. cit. S. 325.

Bei Gruppe 4 und 5 scheint die starke Infiltration des Gewebes selbst, welche die Entzündung als eine proliferierende charakterisiert, für den Angriffspunkt der Schädlichkeit, u. zw. vielleicht einer parasitären im Gewebe selbst von den Blutgefässen aus zu sprechen.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, dass die Fälle chronischer Uveitis bei bloss klinischer Betrachtung fließende Übergänge zeigen und nur eine Differenzierung dem Grade nach zulassen, während die anatomische Untersuchung gestattet, eine Anzahl von Typen aufzustellen, welche wenigstens teilweise einer verschiedenen Ätiologie entsprechen dürften. Welche diese ist, lässt sich heute noch nicht sagen. Man kann nur vermutungsweise aussprechen, dass es sich in gewissen Gruppen um Toxinwirkung, in anderen um eine parasitäre Schädlichkeit handelt.

VII. Iridocyclitis nach Netzhautablösung.

Ich habe die Iridocyclitis nach Netzhautablösung auch in den Kreis dieser Untersuchungen gezogen, weil sie in mancher Beziehung der chronischen Uveitis nahesteht. Sie ist gleich dieser endogen. Was wir von der chronischen Uveitis nur vermuten, steht für die Iridocyclitis nach Netzhautablösung fest, nämlich dass sie nichts mit Mikroorganismen zu tun hat. Dieselbe wird vielmehr mit Recht der reizenden Wirkung der subretinalen Flüssigkeit zugeschrieben. Dies wird erst neuerdings wieder durch die therapeutischen Versuche Birch-Hirschfelds bewiesen. Derselbe sog in Fällen von Netzhautablösung die subretinale Flüssigkeit mit einer Spritze an und injizierte sie dann, ohne die Spritze inzwischen herauszuziehen, in den Glaskörper. Hierauf folgte in mehreren Fällen heftige Reaktion in Form einer Iritis, einmal sogar mit Hypopyon¹⁾.

Das mir zu Gebote stehende Material waren 15 Bulbi. Einer dieser Fälle war ganz frisch, die andern älter. In einigen Fällen ergab die Krankengeschichte mit Sicherheit, dass das Leiden mit einer Netzhautablösung angefangen hatte. In andern Fällen war die Anamnese in dieser Beziehung lückenhaft. Man wusste nur, dass es sich um spontan erblindete Augen handelte, welche sich später entzündeten und wegen Schmerzhaftigkeit oder wegen Verdacht auf intraoculären Tumor enucleiert wurden. Wenn dann die anatomische Untersuchung nebst den Produkten der Iridocyclitis eine seröse Netzhautabhebung ergab, war zu entscheiden, was als das Primäre anzusehen

¹⁾ v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXXXII. S. 259.

sei. Für die Netzhautablösung als Ausgangspunkt spricht ein stark kurzsichtiger Bau des Auges und die Abwesenheit von Schwarten, welche die Netzhaut an sich ziehen.

Der frische Fall betraf einen 65jährigen Mann, welcher seit seiner Jugend an beiden Augen stark kurzsichtig war und vor drei Monaten eine Netzhautablösung bekommen hatte. Die klinische Untersuchung zeigte eine sehr tiefe vordere Kammer infolge des Zurücksinkens der Linse. Die Lage der Iris war die für solche Fälle charakteristische: Sie zog von ihrem Ansatz zuerst nach hinten, um dann, winklig abgebogen, wieder nach vorn zur vorderen Linsenfläche zu gehen. Die Iris war verfärbt, die Pupille eng mit vielen Synechien,

Fig. 18.

die Spannung vermindert. Durchschnitte durch das Auge zeigen (Textfig. 18), dass der Pupillarrand an die Kapsel angewachsen ist. Die Iris liegt der Vorderfläche der Linse innig an und entsprechend dem circumlentalen Raum senkt sie sich zwischen Linsenrand und Ciliarfirsten nach hinten, wobei sie mit letzteren in Berührung kommt. In der Iris und im Ciliarkörper besteht nur eine sehr unbedeutende Infiltration mit einzelnen Lymphocyten; die Oberfläche dieser Teile ist normal. Die Netzhaut ist vollständig durch seröse Flüssigkeit abgehoben.

In diesem Frühstadium fehlt also die Oberflächenexsudation ganz, und es besteht nur eine Verklebung des Pupillarrandes mit der Kapsel, welche offenbar zu den frühesten Veränderungen gehört. Dadurch wird verständlich, warum in den späteren Stadien so häufig *Seclusio pupillae* mit buckelförmiger Vortreibung der Iris gefunden wird, ohne dass entzündliche Schwarten bestünden.

Von den übrigen 14 Fällen zeigte die Hälfte *Seclusio pupillae* mit Vortreibung der Iris. Dies ist also ein häufiger Befund bei der Iridocyclitis nach Netzhautablösung. In den 7 Fällen, wo die Vortreibung der Iris fehlte, war als Ursache dafür zu finden 1. noch

nicht vollständige Ausbildung einer ringförmigen Verwachsung des Pupillarrandes 2. im Gegenteil eine so starke Entzündung, dass eine Flächenverlötung der Iris mit der Kapsel entstanden war. Eine solche totale hintere Synechie kam nur in einem Falle vor, ist also verhältnismässig selten. 3. Subluxation oder Luxation der Linse in zwei Fällen. 4. Frühzeitig eintretende Drucksteigerung, welche zu starker Verschmälerung der Iris geführt hatte, auch in zwei Fällen.

Wenn die Netzhautabhebung nicht das Primäre ist, sondern sekundär als die Folge einer Endophthalmitis eintritt, so besteht nebst den charakteristischen Schwarten am Ciliarkörper in der Regel auch Flächenverlötung der Iris mit der Linse und daher keine Vortreibung der Iris.

Dass die Iridocyclitis nach Netzhautablösung so häufig bloss ringförmige Synechien setzt, hat seine Ursache darin, dass die Entzündung sich hauptsächlich auf den Pupillarrand beschränkt, während an der hinteren Fläche der Iris und auf den Ciliarfortsätzen kein Exsudat liegt. Infolge der Entzündung des Pupillarrandes bestehen hintere Synechien und zumeist auch eine Membran in der Pupille. Letztere setzt sich häufig auf die vordere Irisfläche fort und ebenso in kurzer Ausdehnung auch hinter die Iris auf die Linsenkapsel, so dass sie ein hemdknopfförmiges Gebilde darstellt, welches mit seinem vorderen und hinteren Rande den Pupillarrand umgreift. Das Häutchen an der vorderen Fläche der Iris führt manchmal neugebildete Gefässe. Es kann sich bis an den Ciliarrand der Iris erstrecken und dann zur Verödung der Kammerbucht beitragen. Auch in Fällen, wo der Pupillarrand nicht angewachsen ist, kann ein solches Häutchen an der vorderen Irisfläche vorkommen. Es stülpt dann durch seine Zusammenziehung den Pupillarrand nach vorn um, so dass ein Ectropium des Pigmentblattes und des Sphinkters entsteht. Diese Formveränderung ist entgegengesetzt derjenigen, welche die buckelförmige Vortreibung der Iris begleitet, bei welcher der Pupillarrand nach hinten umgebogen ist.

Das Stroma der Iris ist oft ganz frei von Infiltration und zeigt nur Atrophie verschiedenen Grades. In anderen Fällen besteht eine mässige diffuse Infiltration mit denselben Zellarten, welche man bei der chronischen Uveitis findet. Zuweilen kommen knötchenförmige Lymphocytenanhäufungen vor. In einem Falle traumatischer Iritis mit gleich starken äusseren Entzündungserscheinungen würde die Infiltration der Iris viel stärker sein.

Veränderungen des Ciliarkörpers finden sich in $\frac{2}{3}$ der Fälle. Im

übrigen Drittel fehlten dieselben; da aber solche Veränderungen oft nur fleckenweise vorkommen, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie in dem einen oder andern Falle, wo nicht alle Serien untersucht worden waren, doch in geringer Ausdehnung vorhanden waren. Dennoch kann man behaupten, dass bei einer Iritis, welche bis zur *Seclusio pupillae* geht, doch manchmal die Beteiligung des Ciliarkörpers minimal sein oder ganz fehlen kann. Eine solche Iritis steht also pathologisch-

Fig. 19 u. 22. Von Fällen myopischer Netzhautabhebung.

Fig. 19. Vergr. 33:1. Gegend der Ora serrata mit Ringschwiele. In derselben Verknöcherung, unter ihr dichte Infiltration der Aderhaut, die in der Photographie wie eine schwarze Masse aussieht. Von der Oberfläche der Ringschwiele geht die abgehobene Netzhaut ab.

anatomisch fest, während man klinisch die Diagnose einer Iritis allein, ohne gleichzeitige Cyclitis, kaum stellen kann.

Der Ciliarkörper zeigt oft in seiner ganzen Ausdehnung eine sehr leichte diffuse Infiltration, namentlich in den frischeren Fällen. Stärkere Veränderungen beschränken sich aber auf die Pars plana, nicht selten sogar auf deren hintersten Teil. Die Fortsätze habe ich bis auf drei Fälle immer von Veränderungen frei gefunden, ähnlich wie bei der chronischen Uveitis und im Gegensatze zur Endophthalmitis.

Die entzündlichen Veränderungen im flachen Teil des Ciliarkörpers sind:

1. Eine frische Infiltration, gewöhnlich in Form eines aus Lymphocyten bestehenden Knötchens in der Uvea, entsprechend der Ora serrata, so dass der Knoten mit seinem vorderen Teil dem Ciliarkörper,

Fig. 20.

mit seinem hinteren dem vordersten Teil der Aderhaut angehört (Fig. 19 u. 21 *B*). Ich habe diesen frischen entzündlichen Knoten nur in etwa der Hälfte der Fälle gefunden; da er aber wahrscheinlich ver-

Fig. 21.

gänglicher Natur ist, mag er vielleicht in einigen Augen früher vorhanden gewesen und wieder verschwunden sein, bevor sie zur Enucleation kamen.

Über dem Knoten ist die Glashaut unverändert, doch sind oft einige Lymphocyten durch sie gedrungen und liegen auf ihrer inneren

Oberfläche. Starke Oberflächenexsudation besteht niemals. Der Knoten nimmt jene Stelle ein, wo die Uvea durch den Zug der Netzhaut ein wenig emporgezogen ist, so dass er die Folge dieses Zuges sein muss. Er ist also einem rein mechanischen Reize zuzuschreiben.

2. Eine oft dicke Schwiele, welche auf der inneren Oberfläche der Uvea liegt und sich ebenfalls von der Ora serrata nach hinten und vorn erstreckt. Sie ist von sehr verschiedener Dicke und Ausdehnung. In einem Falle hatte sie mehr als die Dicke der Sklera und erstreckte sich bis knapp an die Firsten der Ciliarfortsätze

Fig. 22. Vergr. 90:1. Auf Ciliarkörper und Aderhaut liegt eine pigmentierte Schicht, die ausgedehnte, aber noch dünne Ringschwiele *a b*. Am vorderen Rande derselben geht die abgehobene Pars ciliaris retinae *c* ab.

(Textfig. 20 u. 21, welche die nasale und die temporale Seite von demselben Auge darstellen). Sie besteht aus einem Gewebe, das sich mit Eosin und Fuchsin rot färbt, Blutgefässe führt und manchmal verknöchert (Fig. 19), so dass es unzweifelhaft als Bindegewebe angesprochen werden muss. Dasselbe ist manchmal fibrillär, andere Male aber ziemlich homogen. Die Schwiele enthält gewöhnlich lange pigmentierte und kernführende Züge, die Durchschnitte des flächenhaft oder strangartig in die Schwiele hineinwachsenden pigmentierten Epithels. Oft kommt auch hämatogenes Pigment in dieser Schwiele vor.

Die Lage der Schwiele ist manchmal ganz im subretinalen Raum, wenn nämlich die Pars ciliaris retinae auch abgelöst ist (*A* in Textfig. 20 und 22). Solche Fälle beweisen, dass die Schwiele sich erst nach Ablösung der Netzhaut gebildet hatte, sonst wäre diese mit ihr verwachsen¹⁾. In andern Fällen geht die Netzhaut (*A* in

¹⁾ Vgl. Bergmeister, v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXXI. S. 554.

Textfig. 21) von der Höhe der Schwiele ab, so dass deren hintere Hälfte nackt im subretinalen Raume liegt, die vordere Hälfte von der Pars ciliaris überzogen ist. Diese wird durch die wachsende Schwiele vom Ciliarkörper abgedrängt. In dem einen wie in dem andern Falle besteht also eine Ablösung der Pars ciliaris, sei es durch subretinale Flüssigkeit, sei es durch festes Gewebe. Nur in vier Fällen fehlte die Abhebung der Pars ciliaris, indem die Netzhaut gerade nur bis zur Ora serrata abgelöst war; in zwei von diesen Fällen bestand überhaupt keine Schwiele, in den beiden andern lag sie vor der Ora serrata, aber nicht unter der Pars ciliaris, sondern auf ihr, im Glaskörperraume. Die Schwiele erfährt später eine Schrumpfung, wie die Falten beweisen, zu welchen die Oberfläche des Ciliarkörpers durch den Zug der Schwiele emporgezogen wird (Textfig. 20 und 21).

Die Schwiele kann die ganze Ora serrata entlang ringsum gehen, oder sie ist nur in einem Teile des Bulbusumfanges da. Ich will sie aber trotzdem der Einfachheit halber als Ringschwiele bezeichnen¹⁾.

Von der Ringschwiele verschieden ist eine viel kleinere Gewebsneubildung, welche sich manchmal in dem Winkel findet, welcher die vordere Fläche der abgehobenen Netzhaut mit der inneren Fläche des Ciliarkörpers bildet. Es handelt sich gewöhnlich um ein zartes, manchmal homogen aussehendes Gewebe, meist mit Gefässen, ausnahmsweise auch mit Verknöcherung. Einsprossungen von pigmentiertem Epithel fehlen hier begreiflicherweise.

Die Entstehung der Ringschwiele lässt sich an Fällen studieren, wo dieselbe noch sehr klein ist (Fig. 22). Vor allem ist es klar, dass sie nichts mit der unter 1. beschriebenen Knötchen-

¹⁾ Mit der Ringschwiele ist nicht zu verwechseln eine zellige Auflagerung, welche sich nach Ablösung der Pars ciliaris manchmal auf dem Ciliarkörper findet und eine Regeneration der Pars ciliaris darstellt. Es ist ein zelliger Belag, der nur lose auf der Innenfläche des Ciliarkörpers sitzt und oft viel dicker als die normale Pars ciliaris wird. In einer zusammenhängenden Protoplasma-masse liegen mehrere Lagen von Kernen übereinander, wovon die untersten häufig länglich und senkrecht auf der Oberfläche stehen, sowie die Kerne der normalen Pars ciliaris (Taf. XI, Fig. 35). Die Regeneration der Pars ciliaris schießt auch insofern über das Ziel hinaus, als sie sich manchmal noch auf den vordersten Teil der Aderhaut erstreckt. Mir scheint der Wiederersatz der Pars ciliaris von einzelnen Zellen dieser Schicht auszugehen, welche bei der Ablösung derselben zufällig auf dem Ciliarkörper haften bleiben. In Fällen, wo die Pars ciliaris vom Ciliarkörper abgerissen ist, kann die Regeneration derselben auch vom Rissrande ausgehen (Bergmeister, loc. cit. S. 558).

förmigen Infiltration zu tun hat. Sie kann vorhanden sein, wo dieser entzündliche Knoten fehlt; ist er da, so fällt sie häufig in bezug auf Lage nicht mit ihm zusammen, indem sie weiter vorn liegt (Fig. 19). Im frühesten Stadium der Ringschwiele sieht man eine Wucherung des pigmentierten Epithels, so dass bald mehrere übereinanderliegende Pigmentlagen entstehen, zwischen welchen man einzelne Bindegewebskerne oder selbst kapillare Blutgefäße sieht (Taf. XI, Fig. 36). Dieses Stadium zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit der Wucherung des ciliaren Epithels bei der chronischen Uveitis, nur dass im ersten Falle natürlich nur die pigmentierten Epithelien sich an der Wucherung beteiligen. Nur wenn von den unpigmentierten Zellen der Pars ciliaris einige auf der Oberfläche des Ciliarkörpers zurückgeblieben sind, können auch diese an der Wucherung Anteil nehmen. Im weiteren Verlaufe nimmt das Bindegewebe immer zu, sowohl unter dem Epithel, zwischen diesem und der Glashaut, besonders aber auch über dem Epithel, auf dessen innerer Oberfläche sich eine immer dickere Schicht jungen Bindegewebes bildet, das gegen den subretinalen Raum eine glatte Oberfläche hat, ja hier selbst eine Art Glashaut bildet. Die Bindegewebsbildung scheint mir mit einem Auswachsen der Gefäße der Uvea in der Gegend der Ora serrata zu beginnen, denn man findet schon frühzeitig feine Gefäße unter und zwischen den wuchernden Epithelien. Die Stellen, wo die hervorwachsenden Gefäße die Glashaut durchbrechen, sind schwer zu sehen.

Die Ringschwiele kann nicht wie der entzündliche Knoten an der Ora serrata aus einer Zugwirkung der Netzhaut erklärt werden, denn die Ringschwiele liegt ja häufig ohne Zusammenhang mit der Netzhaut im subretinalen Raum (Textfigur 20 und 22). Auch dort, wo der vordere Teil der Schwiele noch von der Pars ciliaris bedeckt ist, scheint es, als ob dieser Teil nur ein unter die Pars ciliaris vorgeschobener Anteil der Wucherung im freien subretinalen Raume wäre. Die Ringschwiele muss also auf eine Reizwirkung zurückgeführt werden, welche die subretinale Flüssigkeit auf die blossliegende Uvea ausübt. Da die gleichen Veränderungen gelegentlich auch bei sekundärer Netzhautablösung nach Endophthalmitis vorkommen, muss man auch hier der subretinalen Flüssigkeit toxische Eigenschaften zuschreiben. Diese kommen der subretinalen Flüssigkeit zu ohne Rücksicht auf die Art der Entstehung der Netzhautablösung.

Die schädliche Wirkung der subretinalen Flüssigkeit äussert sich auch im hinteren Teil der Uvea. Die Aderhaut zeigt häufig dieselben schwieligen Auflagerungen mit Wucherung des Pigmentepithels, wie

sie auf dem Ciliarkörper bestehen, und zwar nehmen dieselben gewöhnlich den hinteren Teil der Aderhaut, hauptsächlich im Umkreis der Papille ein. In diesen Schwielen kann auch Verknöcherung stattfinden, sowie auch in der Aderhaut selbst, auch wieder besonders im Umkreise der Papille. Eine weitere Veränderung sind die Drusen der Glashaut, welche zu einer Grösse heranwachsen, die unter andern Umständen nicht beobachtet wird. Alle diese Veränderungen gleichen denen am Ciliarkörper insofern, als es sich um chronische Gewebsproliferation als Folge eines langsam wirkenden Reizes handelt. Wenn man dieselben Veränderungen im hinteren Teil der Uvea auch bei Netzhautablösung infolge von Endophthalmitis findet, könnte man diese Veränderung der Aderhaut eben dieser Endophthalmitis und nicht der toxischen Wirkung der subretinalen Flüssigkeit zuschreiben. In Wirklichkeit ist aber während der frischen Endophthalmitis die Aderhaut gegen die vom Glaskörper aus wirkenden Entzündungserreger durch die Netzhaut geschützt, und zwar umso mehr, je frühzeitiger dieselbe abgehoben wird. In den frischen Fällen sieht man daher die in Rede stehenden Veränderungen nicht, sondern nur in älteren. Die seit lange atrophischen Augen sind es, welche die ausgedehntesten Verknöcherungen, die riesigsten Drusen der Glashaut aufweisen. Würden diese Veränderungen während des akuten Stadiums der Endophthalmitis entstanden sein, so würden sie die Netzhaut mit der Aderhaut verbunden und die Abhebung der Netzhaut verhindert haben.

Aus dem subretinalen Raum können die Toxine, welche wir in der subretinalen Flüssigkeit annehmen, auf dem Wege der Diosmose durch die Netzhaut in das Kammerwasser gelangen. Häufig findet sich aber bei Netzhautablösung ein Riss in der Netzhaut oder in der abgehobenen Pars ciliaris, oder es besteht eine Abreissung der Netzhaut an der Ora serrata. In diesen Fällen ist natürlich ein direkter Übergang der subretinalen Flüssigkeit in den Kammerraum möglich.

Vom Kammerwasser aus können die Toxine auf den Ciliarkörper und auf die Iris wirken. Trotzdem findet man den gefalteten Teil des Ciliarkörpers meist von Entzündungsprodukten frei. Dies kann nicht darauf zurückgeführt werden, dass die Toxine im Kammerwasser schon in zu grosser Verdünnung enthalten sind, denn die Iris ist ja stark ergriffen. Sie beteiligt sich, wie der in einem frühen Stadium untersuchte Fall beweist, als erste an der Entzündung, und in einem Drittel der Fälle war überhaupt nur die Iris affiziert. Man ist also auch hier zu derselben Annahme genötigt wie bei der chronischen

Uveitis, dass nämlich der Ciliarkörper infolge seiner Epithelbedeckung besser gegen die Toxine geschützt ist, als die bloss vom Endothel überzogene Iris. Die starke Beteiligung der Pars plana in Form des Ringwulstes kann vielleicht so erklärt werden, dass hier durch Abhebung der Pars ciliaris eben die eine Hälfte des schützenden Epithelüberzuges fehlt. Vielleicht kommt dazu noch eine grössere Empfindlichkeit der Pars plana, wie sie für die chronische Uveitis angenommen wurde.

Da ich die Fälle von Iridocyclitis nach Netzhautablösung nur wegen gewisser Analogien mit der chronischen Uveitis in die Untersuchung einbezog, sind diese Analogien hier noch kurz zu erörtern.

Ätiologisch handelt es sich in beiden Fällen um eine endogene Entzündung, bei welcher Mikroorganismen keine Rolle spielen dürften, sondern Toxinwirkung wahrscheinlich ist.

Klinisch besteht bei beiden Krankheiten eine vorwiegende Beteiligung der Iris und zwar besonders des pupillaren Teiles, so dass die häufigste Folge Seclusio pupillae mit Vortreibung der Iris ist, aber nicht totale hintere Synechie.

Anatomisch ist beiden gemeinschaftlich die Abwesenheit einer stärkeren Infiltration des Stroma der Uvea, ferner — im Gegensatz zur Endophthalmitis — das Freibleiben der Ciliarfortsätze, sowie die starke Beteiligung des flachen Teiles des Ciliarkörpers. Diese besteht bei der chronischen Uveitis in einer Epithelwucherung, bei der Iridocyclitis nach Netzhautablösung in einer Bindegewebsneubildung.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. X—XI, Fig. 1—36.

Fig. 1. Iris bei chronischer Iritis. Vergr. 295 : 1. Die Iris enthält nebst Lymphocyten einzelne Plasmazellen.

Fig. 2. Iris bei seröser traumatischer Iritis. Vergr. 295 : 1. In der Iris liegen nebst Lymphocyten sehr zahlreiche Plasmazellen, welche sich auch nebst einzelnen polynukleären Leukocyten auf der Oberfläche der Iris finden.

Fig. 3. Iris bei Endophthalmitis septica. Vergr. 295 : 1. Neben grossen und kleinen Lymphocyten liegen zahlreiche polynukleäre Leukocyten; dieselben Zellen bedecken auch die freie Oberfläche der Iris, deren Dicke infolge der Infiltration zugenommen hat.

Fig. 4. Iris bei Heterochromie. Vergr. 295 : 1. In der streifigen Grundsubstanz fehlen die Chromatophoren, und an ihrer Stelle sind nebst einzelnen grossen Lymphocyten hauptsächlich längliche Kerne zu sehen.

Fig. 5. Iris bei Heterochromie. Vergr. 295 : 1. So wie Fig. 4, nur dass die Zahl der Kerne erheblich vermehrt ist.

Fig. 6. Pseudopräcipitate. Von einem Fall traumatischer seröser Iritis. Vergr. 90 : 1. Auf der Descemetischen Membran liegt ein kontinuierlicher Zellen-

belag, welcher sich an zwei Stellen zu kleinen Hügeln verdickt. Der eine der Hügel schliesst eine Morgagnische Kugel ein. Am Rande des Hügels sind die Zellen einzeln zu erkennen, in der Mitte liegen die Kerne in einer gemeinsamen Protoplasmamasse.

Fig. 7. Pseudopräcipitat. Ein kleiner Zellhaufen von demselben Fall. Vergr. 400:1. Die einkernigen Zellen mit grossem, gequollenem Protoplasmaleib liegen lose aufeinander; dazwischen zwei polynukleäre Leukocyten. Das Endothel ist lückenhaft.

Fig. 8. Pseudopräcipitat von einem Falle syphilitischer Iritis. Vergr. 295:1. Der Zellenbelag ist ganz frisch, weshalb die Zellen locker beisammen liegen, einzelne polynukleäre Leukocyten einschliessend. Das Endothel ist an mehreren Stellen defekt.

Fig. 9. Echtes Präcipitat mit eosinophilen Zellen. Von einem Falle sympathisierender Entzündung. Vergr. 400:1. Das Protoplasma der einkernigen Zellen ist grösstenteils zu einer gemeinsamen Grundsubstanz verschmolzen. An der Oberfläche des Präcipitates liegen einige eosinophile Zellen, deren rote Granula in der Zeichnung durch schwarze Punktierung wiedergegeben sind.

Fig. 10—14. Umschriebene Endothelwucherung an der Membrana Descemeti (Hydromeningitis) von einem Falle sympathisierender Entzündung. Fig. 10 bis 13 Vergr. 400:1. Fig. 14 Vergr. 295:1.

Fig. 10. Normales Endothel dieses Auges.

Fig. 11. Beginn der Endothelwucherung.

Fig. 12. Die Wucherung erhebt sich zu einer Knospe, gebildet durch Kerne in einer gemeinsamen Grundsubstanz und von einem feinen scharfen Kontur begrenzt.

Fig. 13. Rand eines grösseren Herdes. Der Grenzkontur des Endothels lässt sich eine Strecke weit auf den Abhang des Hügels verfolgen. Auf der Oberfläche des Hügels liegen lose Zellen derselben Art wie die, welche den Hügel selbst zusammensetzen. Unmittelbar an die Descemeti angrenzend ist die Grundsubstanz kernärmer und stärker tingiert. Die an die Descemeti angrenzende hinterste Hornhautlamelle ist aufgefaserter und kernreicher.

Fig. 14. Ein ganzer durch Endothelwucherung entstandener Hügel. An seiner Basis, auf der hinteren Fläche der Descemeti, liegt eine dünne Schicht Bindegewebe; ebenso hat sich an der vorderen Fläche der Descemeti eine Bindegewebslage gebildet, welche die hintersten Hornhautlamellen bogenförmig nach vorn ausbaucht.

Fig. 15. Pigmentiertes Präcipitat vom Fall Roseneder. Vergr. 660:1. Die Zellkugel, dem unversehrten Endothel aufliegend, enthält einzelne sehr stark pigmentierte Zellen nebst feinen Pigmentkörnchen zwischen den Zellen.

Fig. 16. Fibroblasten im Präcipitat. Von einem Fall seröser traumatischer Iritis. Vergr. 635:1. Die Fibroblasten finden sich angeordnet in parallelen Lagen zwischen den Zellen des Präcipitates, von welchen einige zu grossen, feinkörniges Pigment enthaltenden Protoplasmamassen mit kaum sichtbarem Kern herangewachsen sind.

Fig. 17. Präcipitat auf der Iris. Vergr. 250:1. *aa* oberflächlichste Lagen der Iris. In der protoplasmatischen Grundsubstanz des Präcipitates finden sich zahlreiche Vakuolen und bei *b* eine riesenzellenähnliche Anhäufung von Kernen.

Fig. 18. Linsenpräcipitat. Vergr. 210:1. Nebst ein paar einkernigen Leukocyten liegen grosse Morgagnische Kugeln auf dem unversehrten Endothel.

Fig. 19. Makrophage aus dem Hypopyon bei Diplobacillengeschwür der Hornhaut. Vergr. 688:1. Nebst dem eigenen grossen Kern des Makrophagen enthält das Protoplasma schattenhafte blasser und einzelne dunkle geschrumpfte, von einem hellen Hof umgebene Kerne, sowie kleine Pigmentbröckel.

Fig. 20. Makrophagen auf der Iris. Von demselben Falle. Vergr. 295:1. *aa* Oberfläche der Iris. In den drei Makrophagen erkennt man deren eigenen grossen blassen Kern nebst den Schatten der Kerne der gefressenen polynukleären

Leukocyten; gut erhaltene Zellen letzterer Art kleben an der freien Oberfläche der Makrophagen.

Fig. 21. Präcipitat auf der Netzhaut. Von einem Fall von Endophthalmitis nach perforierender Hornhautverletzung. Vergr. 250:1. *aa* Faserschicht der Netzhaut mit Lücken (Ödem). Das bereits ältere Präcipitat hat eine ziemlich glatte Oberfläche; die derselben zunächst liegenden Kerne sind länglich und der Oberfläche parallel angeordnet; in der Mitte stehen die Kerne weniger dicht und sind rundlich. In der gemeinschaftlichen Grundsubstanz liegen Pigmentkörnchen; an der Oberfläche des Präcipitates kleben einige Lymphocyten.

Fig. 22. Präcipitat auf der Aderhaut. Vergr. 295:1. Von einem Fall von Endophthalmitis nach perforierendem Hornhautgeschwür. Die Grundsubstanz zwischen den Kernen enthält Pigmentkörnchen und Cholesterinkrystalle; an der Oberfläche des Präcipitates kleben einzelne freie Zellen.

Fig. 23—28. Cyclitis mit Präcipitaten, Fall Leitner.

Fig. 23. Frisches Präcipitat. Vergr. 385:1. Das Präcipitat hat sich noch nicht fest an die Hornhaut angelegt. Es besteht aus lose zusammen liegenden, einkernigen Zellen, deren Protoplasmaleib grösser ist als der der gewöhnlichen Lymphocyten und einzelne Pigmentkörnchen enthält.

Fig. 24. Epitheliales Geschwür am Ciliarkörper. Vergr. 295:1. Die Zeichnung stellt die Bucht zwischen zwei Erhebungen eines Ciliarfortsatzes dar, in welcher Lymphocyten liegen. *a* die vordere Seite der Bucht mit unversehrtem doppelten Epithelüberzug. An der hinteren Seite der Bucht ist das unpigmentierte Epithel *b* stark verändert und bei *d* abgehoben, während die pigmentierte Lage *c* bei *e* durch Lymphocyten zu einer Blase emporgehoben ist.

Fig. 25. Zellhaufen auf dem gefalteten Teil des Ciliarkörpers, ausserhalb der Zonula. Vergr. 280:1. Das Epithel des Ciliarfortsatzes ist kaum verändert. Die Zellen im Inneren des Haufens sind zu einer gemeinschaftlichen, etwas Pigment enthaltenden Masse verschmolzen.

Fig. 26. Zellhaufen auf dem flachen Teil des Ciliarkörpers, ausserhalb der Zonula. Vergr. 350:1. Das Epithel ist unverändert, ohne Zwischenlagerung von Lymphocyten zwischen die Epithelzellen. *aa* abgehobene Limitans interna ciliaris. Der Zellhaufen ist von derselben Beschaffenheit wie in Fig. 25, nur abgeplattet durch die Zonulafasern *bb*, innerhalb welcher noch vereinzelte Lymphocyten liegen.

Fig. 27. Zellhaufen auf dem flachen Teil des Ciliarkörpers zwischen den Zonulafasern. Vergr. 295:1. Auf dem unveränderten Epithel liegen zunächst einzelne Lymphocyten und darauf eine Zellkugel. Die Zonulafasern *a*, welche an der Kugel aufzuhören scheinen, sind bei Wechsel der Einstellung über und unter ihr zu verfolgen, so dass die Kugel also zwischen den auseinander gedrängten Fasern liegt, mit ihrer Kuppe sie überragend, so dass sie die Oberfläche des Glaskörpers *b* etwas eindrückt.

Fig. 28. Zellhaufen auf dem flachen Teil des Ciliarkörpers, zum grössten Teil auf der inneren Seite der Zonula. Vergr. 295:1. Innerhalb der unpigmentierten Epithellage sind die Kerne zweier Lymphocyten sichtbar. Die Zellkugel liegt zum kleineren Teile ausserhalb der Zonulafasern *a* und zwischen denselben, zum grösseren Teile innerhalb der Zonula, zwischen dieser und dem Glaskörper *b*.

Fig. 29. Wucherung des Epithels des flachen Teiles des Ciliarkörpers bei chronischer Iritis. Vergr. 295:1. *a* Stroma des Ciliarkörpers, *p* gewucherte pigmentierte Lage. Die Wucherung dieser erfolgt nur zum kleinsten Teil nach aussen, wie der in das Stroma eindringende pigmentierte Fortsatz *b* zeigt, zum grössten Teile aber nach innen. Je weiter man nach innen geht, desto weniger pigmentiert und desto mehr spindlig, fast faserig, werden die Zellen. Die Wucherung der unpigmentierten Lage ist gering und bildet eine kernhaltige, protoplasmatische Platte (Syncytium).

Fig. 30. Wucherung des Epithels des Ciliarfortsatzes bei chronischer Iritis. Vergr. 120:1. Bei *a* an der Vorderseite des Fortsatzes sind noch beide Epithel-

lagen pigmentiert und nicht gewuchert. Die Wucherung betrifft den Gipfel und den hinteren Abhang des Fortsatzes. Die innere unpigmentierte Epithellage wächst teilweise in Form von Zotten in die hintere Kammer. Die einzelnen isolierten Zellenballen sind nichts anderes als durch den Schnitt abgekappte Auswüchse. Die äussere Epithellage ist auf der Höhe des Fortsatzes auch unpigmentiert und hebt sich bei der schwachen Vergrösserung nicht deutlich von der inneren Lage ab. Die äussere Lage ist aber in Form stark pigmentierter Zellschläuche tief in das Stroma des Fortsatzes vorgedrungen. Der Querschnitt eines solchen Schlauches liegt unmittelbar an einer Vene *b—c* Ciliarmuskelfasern.

Fig. 31. Wucherung des Epithels des flachen Teiles des Ciliarkörpers bei chronischer Iritis. Vergr. 295:1. *a* von Lymphocyten durchsetztes Stroma. Die Lamina elastica ist an dieser Stelle zerstört; es folgen auf das Stroma unmittelbar mehrere Lagen gewucherten Epithels. Dieselben bestehen aus dünnen Zellplatten mit Pigmentkörnchen, so dass sich hier nicht mehr erkennen lässt, was von der pigmentierten und was von der unpigmentierten Lage abstammt. Die Verfolgung der Zellplatten nach vorn und hinten zeigt aber, dass die meisten derselben vom unpigmentierten Epithel abstammen. Zwischen den Zellplatten liegt eine feinstreifige Substanz *b* mit einzelnen Lymphocyten.

Fig. 32. Wucherung des Pigmentepithels der Netzhaut bei chronischer Iritis. Vergr. 250:1. *a* grosse, längsgetroffene Vene der Aderhaut. Auf der hier nicht erkennbaren Glashaut liegt das gewucherte Pigmentepithel in vierfacher Lage; zwischen den Lagen sind einzelne Bindegewebskerne sichtbar.

Fig. 33 u. 34. Wucherung des retinalen Epithels der Iris bei chronischer Iritis. Vergr. 400:1.

Fig. 33. Rand der gewucherten Stelle, wo nur die vordere Epithelschicht zu mehreren Lagen von Spindelnzellen unter Abnahme des Pigmentgehaltes ausgewachsen ist; zwischen diesen Lagen sieht man einzelne Bindegewebsfasern.

Fig. 34. Mitte der gewucherten Stelle. Die hintere Epithelschicht ist in mässigem Grade gewuchert, indem die quergetroffenen Zellschläuche bei *a* von ihr abstammen. Die vordere Epithelschicht ist zu einer mächtigen Gewebsmasse *b* herangewachsen, in welcher sich die Lagen der zu Spindelnzellen ausgewachsenen Epithelien von dem dazwischen liegenden Bindegewebe nicht mehr scharf sondern lassen.

Fig. 35. Regeneration der Pars ciliaris retinae auf der Oberfläche des Ciliarkörpers nach Abhebung derselben. Vergr. 260:1. Die regenerierte Lage besteht aus einer gleichmässig dicken Protoplasmamasse mit eingelagerten länglichen, zur Oberfläche senkrechten Kernen. Diese Masse ist von der unebenen Oberfläche der pigmentierten Epithellage durch eine Reihe heller Lücken getrennt, in welcher einzelne Kerne liegen.

Fig. 36. Entstehung der Ringschwiele bei Netzhautablösung. Vergr. 290:1. Auf der Glashaut *a* liegen zuerst noch wenig veränderte Pigmentepithelzellen *a*, welche ein Blutgefäss *b* einschliessen; weiter nach innen werden die Abkömmlinge der pigmentierten Epithelien immer flacher, und zwischen ihnen treten Bindegewebsfasern auf, welche endlich den innersten Teil der Auflagerung ganz allein bilden.