sind, die Temperatur um einige Decigrade gesteigert, der Harn zeigt ein spezifisches Gewicht von 1028 mit einem Ueberschuss an Harnsäure. Die vier letzten Finger der linken Hand und der linke Handrücken zeigen beträchtliche ödematöse Schwellung, ebenso die linken Augenlider, und an letztgenannter Stelle erreicht die seröse Durchtränkung solche Grade, dass das Oeffnen des Auges absolut unmöglich ist. Die Haut über den befallenen Stellen zeigt ausgesprochene livide Verfärbung. Die Zunge ist rein, und gastro-intestinale Störungen sind nicht vorhanden.

Die Diagnose ergab sich von selbst, und es handelte sich nur darum, zu entscheiden, welches Ingestum an der Wurzel des Uebels lag. Die besondere Häufigkeit und Hartnäckigkeit der Eruption im Sommer wies natürlich auf die Getränkfrage hin. Auf Befragen gab der Patient auch an, dass er bis zu seinem 19. Jahre „aus Furcht vor der Gicht in seiner Familie“ weder Bier noch Wein noch andere Alkoholica berührt und solche auch später nur in sehr beschränkten Quantitäten zu sich genommen habe. Die zeitliche Coincidenz des ersten Alkoholgenusses mit dem ersten Ausbruch der Affection bestätigte meine Vermuthung, und ich gab derselben dem Patienten gegenüber als solcher Ausdruck mit dem Rath, sich aller Spirituosen zu enthalten. Ich bekam ihn dann erst Anfang Juni wieder zu Gesicht mit einem Rückfall und dem Geständniss, dass er sich bisher aller geistigen Getränke enthalten und keinen Anfall gehabt, aber am vorhergehenden Tage nach einer angestrengten Ruderpartie zur Kühlung einige Glas „Whisky und Sodawasser“ zu sich genommen. Im weiteren Verlauf haben dann die Eigenversuche des Patienten ergeben, dass gewässerter Rothwein das einzige alkoholische Getränk ist, das Patient ungestraft bewältigen kann. Mit diesem „deprimirenden“ Getränk hat er sich denn auch seit Anfang August begnügt und seitdem keinen weiteren Anfall gehabt.

Ein Fall von acutem, umschriebenem Hautödem auf alkoholischer Grundlage.

Von Dr. Heinrich Oppenheimer,

Member of the Royal College of Physicians, London.

Im Folgenden erlaube ich mir, über einen, namentlich in ätiologischer Richtung beachtenswerthen Fall jener eigenthümlichen, zuerst von Quincke beschriebenen Angioneurose zu berichten.

Es handelt sich um einen robusten, 23jährigen jungen Mann, dessen Vater im Alter von einigen Fünfzig an progressiver Paralyse gestorben, dessen eine Schwester als Kind an Chorea gelitten; ausser Gicht, an der fast sämtliche Verwandte des Patienten in vorgeschrittenem Alter erkranken, bietet die Familiengeschichte sonst nichts Interessantes. Patient stellte sich mir zum ersten mal am 9. März laufenden Jahres vor, und folgendes war die Anamnese:

Seit ungefähr drei Jahren wird Patient von Zeit zu Zeit, in ganz unregelmässigen Intervallen, häufiger im Sommer als im Winter, von eigenthümlichen Schwellungen befallen, die mit schwachem Jucken und Brennen einhergehen, aber weder schmerzhaft sind noch das Allgemeinbefinden alteriren. Sie treten mit Vorliebe an Augen und Händen auf, verschwinden zumeist binnen 24—48 Stunden von selbst, ohne irgend welche Spuren zu hinterlassen. Hier und da erreichen sie jedoch bedeutendere Ausbreitung, überschreiten dann die gewöhnlichen Grenzen und sind dann wohl auch persistenter.

Während der heissen Sommermonate 1894 trat die Affection mit solcher Heftigkeit auf, dass das ganze Gesicht, beide Arme und Hände in unförmige Massen verwandelt waren, mit solcher Hartnäckigkeit, dass Patient einzig und allein durch die Entstellung seines Aeusseren für mehrere Wochen ans Haus gefesselt war, obwohl auch damals das Allgemeinbefinden nicht im geringsten litt. Patient hat bereits eine grössere Zahl Aerzte consultirt, aber ohne jeden Erfolg.

Bei der Untersuchung ergibt sich, dass sämtliche Organe gesund