Localités Nouvelles De Mousses Des Environs De Paris;

M. Édouard Jeanpert

To cite this article: M. Édouard Jeanpert (1891) Localités Nouvelles De Mousses Des Environs De Paris,, Bulletin de la Société Botanique de France, 38:4, 162-162, DOI: [10.1080/00378941.1891.10828550](https://doi.org/10.1080/00378941.1891.10828550)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1891.10828550>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 4

View related articles [↗](#)

Paléontologie française, terrain jurassique, livr. 45 et 46. Type proangiospermiques et Supplément final.

Annales du Bureau central météorologique de France, année 1889 tomes II et III.

M. Jeanpert communique à la Société la Note suivante :

LOCALITÉS NOUVELLES DE MOUSSES DES ENVIRONS DE PARIS;
par **M. Édouard JEANPERT.**

Gymnostomum tenue Schimper. — Meudon.

Dicranella cerviculata Schimper. — Meudon.

Fissidens exilis Hedw. — Meudon, Marly.

— *pusillus* Wils. — Marly, Jeufosse.

— *crassipes* Wils. — Fontainebleau.

Barbula membranifolia Hook. — Corbeil.

Grimmia orbicularis B. E. — Crosnes, Bas-Meudon.

Buxbaumia aphylla Hall. — Montmorency. (Cette Mousse a été récoltée compagnie de notre zélé confrère M. l'abbé L. Chevallier.)

Leskea polyantha Hedw. — Ceps de Vigne à Étiolles, près Corbeil.

M. Van Tieghem fait à la Société la communication suivante

STRUCTURE ET AFFINITÉS DES *STACHYCARPUS*, GENRE NOUVEAU
DE LA FAMILLE DES CONIFÈRES; par **M. Ph. VAN TIEGHE**

Endlicher a, comme on sait, réparti les espèces du genre *Podocarpus* en quatre sections : *Nageia*, *Eupodocarpus*, *Dacrycarpus* et *chycarpus*. Dans les trois premières, le fruit est solitaire sur un pédic charnu; elles ne diffèrent entre elles que par la forme des feuilles. la quatrième, les fruits sont groupés en épi lâche sur un péd ligneux (1). Cette division du genre en quatre sections a été admise par tous les auteurs qui ont suivi.

La section *Stachycarpus* comptait, pour Endlicher, cinq espèces. *P. andina*, *spicata*, *taxifolia*, *ferruginea* et *falcata*. Parlatore exclu le *P. falcata*, dont le pédicelle est charnu, et par conséquent introduit les *P. nivalis* et *alpina*, ce qui élevait à six le nombre d'espèces (2). Bentham et Hooker ont reporté les *P. taxifolia*,

(1) Endlicher, *Synopsis Coniferarum*, p. 205, 1847, et *Genera plantarum*, si pars II, p. 9, 1847.

(2) Parlatore, *Prodromus*, XVI, 2, p. 507, 1868.