Weyer	5 ^h 32 ^m 39 ^s .6	
Krueger	43.6	Bei sehr unbequemer Körperstellung eher zu spät als zu früh aufgefasst.
Lamp	40.6	Der Mond griff 1 ^s später merklich über.
Kreutz	41.6	
Kroeger	41.1	

Die Herren Weyer, Lamp, Kreutz und Kroeger haben eine Anzahl von Bedeckungen von Sonnenflecken beobachtet, die aber wegen der schlechten Begrenzung zu unsicher notirt sind, als dass ihre Mittheilung von Interesse wäre.

Kiel 1891 Juli 11.

A. Krueger.

Beobachtungen des Mercurdurchgangs 1891 Mai 9.

In Honolulu (Sandwich-Inseln) von Dr. *A. Marcuse.*

Kurz nach meiner Ankunft in Honolulu, woselbst ich im Auftrage des Centralbureaus der Internationalen Erdmessung die mit Berlin correspondirenden Breitenbeobachtungen ausführen werde, bot sich Gelegenheit, den Vorübergang des Mercur vor der Sonnenscheibe am 9. Mai in seinem ganzen Verlaufe zu beobachten. Der Ort Waikiki, an dem die Beobachtungen angestellt sind, liegt etwa 8 Kilometer südöstlich von Honolulu auf derselben Insel Oahu unter 21° 16' 20" nördlicher Breite und 11^h 25^m 0^s westlicher Länge von Berlin. Das benutzte Fernrohr ist ein 2 1/2 zöll. Cometensucher von Merz mit 65 facher Vergrößerung. Das-

selbe war mir auf meine Bitte von Herrn Professor Davidson (U. S. Coast Survey in San Francisco) gütigst zur Verfügung gestellt worden. Zur Abblendung des hier sehr intensiven Sonnenlichtes wurden ziemlich dunkle rothe Gläser gewählt. Das zur Beobachtung benutzte Chronometer Knoblich Nr. 2301 wurde vor und nach dem Mercurdurchgang mit der in Honolulu befindlichen Quecksilberpendeluhr des Herrn Prof. Alexander verglichen, deren Correction wiederum durch Sternbeobachtungen ermittelt wurde. Die im Folgenden mitgetheilten Zahlen sind in M. Z. Honolulu ausgedrückt.

	Beobachtet	Berechnet	B — R
Eintritt: Erster Contact	—	—	—
Mercur vom Sonnenrande bisecirt	1 ^h 24 ^m 5 ^s	—	—
Zweiter Contact	1 26 55	1 ^h 27 ^m 21 ^s	—26 ^s
Austritt: Dritter Contact	6 11 14	6 12 11	—57
Mercur vom Sonnenrande bisecirt	6 13 40	—	—
Vierter Contact	6 15 48	6 17 5	—77

Der erste Contact ging durch eine Wolke verloren. Die Beobachtung der Bisection und des zweiten Contacts ist sicher. Berührung von Mercur und Sonne scharf ohne Trübung. Bei der Beobachtung des dritten Contacts waren die Sonnenränder stark wallend, da Sonne nur 6° über dem Horizonte; Berührung scharf. Die zweite Bisectionsbeobachtung entspricht völlig der ersten. Es scheint, als ob die Mercurscheibe auch ausserhalb der Sonnenscheibe sichtbar ist. Vierter Contact sehr unsicher, da Sonnenränder völlig gezackt sind (Höhe der Sonne über dem Horizonte nur 4°). Die auf die Sonne projecirte Mercurscheibe war

tiefschwarz ohne Färbung oder sonstige auffallende Erscheinung.

Gleichzeitig mit mir beobachtete der Assistent der amerikanischen Coast & Geodetic Survey Mr. Preston sowie der Assistent der hawaiischen Government Survey Mr. Lyons, ersterer ebenfalls in Waikiki mit einem dreizölligen Plössl'schen Fernrohr und der letztere in der Stadt Honolulu mit einem kleineren Theodoliten. Mr. Preston erhielt für den zweiten und dritten Contact die Zeiten 1^h 26^m 45^s und 6^h 10^m 42^s, während Mr. Lyons nur den zweiten Contact um 1^h 26^m 33^s beobachtete.

Honolulu, Observatorium des Centralbureaus der Intern. Erdmessung, 1891 Juni 1.

A. Marcuse.

At the Private Observatory Windsor N. S. Wales.

The atmosphere was calm throughout the transit, and during the early stages of the phenomenon the sky was cloudless. The ingress could not, however, be satisfactorily observed, as at the critical moment the vibrations of the limbs of the sun and planet were very great. The local mean time of the first external contact was noted as 9^d 21^h 58^m 15^s.5, but the observation was rather late as the indentation was well marked. At 22^h 2^m 35^s.8 or just at the time when I expected geometrical internal contact to take place the planet became somewhat pear-shaped, its

limb being connected with that of the sun by a triangular black ligament, whose base was on the planet and its apex on the solar limb. The ligament suddenly broke at the same time, and for fully 14 seconds the vibrations were so great that the triangular ligament was repeatedly seen separated both from the disc of the planet and the limb of the sun. It finally vanished at 22^h 2^m 49^s.8 and the thread of light was seen distinct and undisturbed. During the rest of the transit till the time of egress approached I occasionally showed the planet to several members of my family

and to some friends. One lady, on looking into the eyepiece, instantly remarked that the planet was surrounded by a ring of whitish light, but neither myself nor any other of the observers noticed this peculiarity. I looked carefully for this phenomenon during the transits of 1878 and 1881, but was equally unsuccessful. Towards the close of the transit I noticed a small white spot apparently dancing about on the planet's disc. The disc did not appear to me at any time to be perfectly black, but of a brownish-black colour not of uniform depth. There were scattered clouds during the afternoon but I fortunately succeeded in obtaining a tolerably good observation of the egress. The steadiness and definition had wonderfully improved, and the black ligament was not seen. The thread of light broke

Private Observatory, Windsor N. S. Wales, 1891 June 1.

at $10^{\text{d}} 2^{\text{h}} 48^{\text{m}} 58^{\text{s}}.3$, but vibrations of light followed immediately between the limbs and continued till $2^{\text{h}} 49^{\text{m}} 5^{\text{s}}.3$, when the break was completely established. The last external contact was well observed, being first noted at $2^{\text{h}} 53^{\text{m}} 52^{\text{s}}.5$ but the indentation was repeatedly seen for a space of two seconds after that time. The sun's limb then recovered its accurate circular form. Nothing like a satellite could be seen during the transit. All the observations were made with the full aperture of the $4\frac{1}{2}$ inch equatorial. A diagonal prism was employed and a negative eyepiece of 120 diameters; the lens next to the prism was smoked and a dark glass was fitted over the eye-lens. The combination was the same as that employed by me in the observation of the transit of Venus in 1874 and that of Mercury in 1881.

John Tebbutt.

A l'Observatoire de Moscou.

Pour observer les contacts à l'aide de notre réfracteur j'avais deux oculaires dont l'un était l'hélioscope de Merz. Préablement j'ai comparé plus d'une fois les deux oculaires en examinant la surface du soleil, ses taches et le petit disque de Mercure; il était tout à fait évident que l'hélioscope donnait des images moins bonnes et j'ai résolu de ne pas m'en servir. L'autre oculaire, qui est de ma construction, consiste d'une seule lentille biconcave; par conséquent le réfracteur devient une lunette de Galilée. Cette lentille se trouve dans un disque de cuivre rouge assez solide, réuni à la lunette par trois lames et non par un tube, comme les oculaires ordinaires. Un petit trou est percé dans le disque, devant le centre de la lentille; le champ de vision est donc fort restreint. La lentille est fumée du côté de l'objectif.

Comme le rapport de l'ouverture à la distance focale est presque le même dans toutes les lunettes petites et grandes, le degré de concentration de la chaleur solaire au foyer est aussi le même, donc on pourrait avec un oculaire comme le nôtre observer le soleil à l'aide de très grandes lunettes; mais dans ce cas-là le disque de cuivre doit être plus massif, argenté du côté du soleil et noirci de l'autre.

M. Pokrowski notait le chronomètre, aussi je pouvais, sans détourner les yeux, donner toute mon attention au phénomène.

Voici les moments observés, en temps moyen de Moscou.

1891 Mai 9.

Ouverture de la lunette 272^{mm} , grossissement 193.

La distance du bord du soleil à Mercure égale au diamètre de Mercure (estimé à l'oeil)	19 ^h 8 ^m 39 ^s
Contact intérieur	12 21
Contact intérieur passé depuis un temps très appréciable	12 47
Mercure à moitié sur le soleil (estimé à l'oeil)	15 18
Moment très rapproché du contact extérieur	17 11
Contact extérieur	17 21

Le contact intérieur a été très bien observé. Mercure se trouvait juste au milieu du champ de vision, il n'y avait aucune goutte noire et le contact s'est fait avec une simplicité géométrique.

M. Sternberg, astronome observateur, a fait, au photo-héliographe de Dallmeyer, 26 photographies, dont 7 sont très bonnes, 6 bonnes et 9 médiocres.

Quelques élèves de l'Université observaient aussi le phénomène.

Observatoire de Moscou, le 11/23 juin 1891.

Prof. W. Ceraski.*)

*) Professor Ceraski ist nach Uebersiedelung von Herrn Bredichin nach Pulkowa zu dessen Nachfolger an der Moskauer Sternwarte ernannt worden. Kr.

Elemente und Ephemeride des Planeten (258) Tyche.

Die von mir aus den beiden ersten Erscheinungen von (258) Tyche unter Berücksichtigung der Störungen durch Jupiter abgeleiteten Elemente (Berliner Jahrbuch 1890 bis 1893) waren, wie die Beobachtungen der dritten und vierten Opposition gezeigt haben, noch sehr unsicher. Ausgehend von diesen Elementen erlangte Herr Prof. Dr. R. Luther durch Anschluss der Rectascensionen der vierten Erscheinung ein System, welches, da die Störungen der

letzten Jahre nicht in Betracht gezogen waren, besonders in den beiden mittleren Erscheinungen ebenfalls noch sehr bedeutende Abweichungen übrig liess. Da indessen diese Elemente relativ besser den Lauf des Planeten darstellten, so wiederholte ich mit denselben die Berechnung der Störungen durch Jupiter seit der Zeit der Entdeckung und benutzte bei der weiteren Bahnbestimmung die folgenden 4 Normalörter: