ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o. 568.

Beobachtungen des 2^{ten} Brorsen'schen Cometen in Senftenberg,
von Herrn Baron v. Senftenberg gemacht.

1) 1846. Mai 20.

Senftenb. Sternzt.	☾ — a. AR	Decl.	
15 ^h 36' 38 ^u 8	+3' 33 ^u 42	+14' 53 ^u 2	Beiläufiger Ort des Vergleichssterne a AR = 6 ^h 41'6" D = 50°13'?
15 43 32,1	39,02	30,3	
15 50 34,8	37,72	41,7	
15 ^h 43' 35 ^u 2	+3' 36 ^u 72	+14' 41 ^u 7	

2) 1846. Mai 20.

Senftenb. Sternzt.	☾ — b. AR	Decl.	☾ — c. AR	Decl.	
16 ^h 12' 0 ^u 3	+4' 43 ^u 91	—6' 21 ^u 2	—3' 33 ^u 01	+11' 25 ^u 6	b { AR = 6 ^h 34'3 D = 50°36' c { AR = 6 ^h 42'6 D = 50°18'2 b — c =
23 29,5	45,93	8 2,7	30,58	9 55,3	
35 39,7	48,87	8 12,3	26,98	9 52,4	
47 35,3	52,31	8 56,7	25,37	9 7,0	
58 47,9	54,54	10 32,2	22,84	7 36,1	
16 ^h 35' 30 ^u 5	+4' 49 ^u 11	—8' 25 ^u 0	—3' 27 ^u 76	+ 9' 35 ^u 3	AR —8'16^u87 Decl. +18'0^u3

Anmerk. Der Stern b ist wohl ein Stern aus Argelanders 76 Zone, dessen mittlere Position für 1846
6^h34'22^u12   +50°31'54^u3

S.

3) 1846. Mai 21.

Senftenb. Sternzt.	☾ — a. AR	Decl.	☾ — b. AR	Decl.	☾ — c. AR	Decl.
13 ^h 33' 27 ^u 4	+7' 14 ^u 94	+16' 14 ^u 8	+4' 0 ^u 12	—0' 48 ^u 7	+0' 11 ^u 60	—
13 53 18,6	18,74	15 36,2	4,13	1 34,7		—
14 4 33,2	19,53	14 40,6	4,41	2 22,2		—
14 15 28,0	21,96	13 49,4	7,63	3 11,4	14,60	—
14 26 35,6	23,18	13 7,7	8,03	3 47,1	16,62	—
14 37 53,2	26,19	12 25,9	10,94	4 26,4	19,03	—
14 48 57,6	29,10	11 59,4	13,64	5 3,8	20,84	—
14 59 51,0	30,59	11 48,4	14,86	5 10,4	23,24	—
15 4 10,6					26,10	—
15 7 42,2					26,90	—
15 21 47,2					27,90	—
15 25 45,0					28,20	—
15 29 40,4					29,60	—
	+7' 23 ^u 03	+13' 42 ^u 8	+4' 7 ^u 97	—3' 18 ^u 1	+0' 22 ^u 24	14 ^h 51' 55 ^u 4

Zeit der Beob. 14^h20' 0^u6

a { AR = 6^h36'25
D = +48°52'?

b { AR = 6^h39'5
D = +49°10'

c { AR = 6^h43'4
D = +49°1'

a — b =

c — a =

a (6,7) Größe

b = (8,9)

c = (7,8)

AR	Decl.	AR
—3'15 ^u 04	—17'0 ^u 9	+7'7 ^u 47

Anmerkung. Herr Rümker hat am 21^{sten} Mai die scheinbaren Positionen von b und c am Reps. Mer.-Kreise bestimmt.

$$\begin{array}{ll} \text{b)} & 6^{\text{h}}39'10''06 \quad +49''13'59''6 \\ \text{c)} & 6 \ 43 \ 2,45 \quad 49 \ 5 \ 12,8 \end{array}$$

Aus b und c folgt die scheinbare Position von a

$$\begin{array}{c} \text{AR} \\ \hline 6^{\text{h}}35'55''02 \text{ aus b} \\ 54,98 \text{ aus c} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{Decl.} \\ \hline 48^{\circ}56'58''7 \text{ aus b} \end{array}$$

S.

4) 1846. Mai 23.

Sternzeit.	AR	Decl.	AR	Decl.
14 ^h 36' 53''4	+4' 43''18	-6' 49''6		
14 49 17,2	43,09	7 47,7	+5' 2''06	+2' 50''3
14 58 6,4	43,89	8 7,1	3,54	2 24,0
15 6 58,4	46,71	8 32,5	5,53	1 59,8
15 15 56,0	46,44	8 38,8	6,11	1 42,1
15 30 18,4	49,75	9 0,8		
15 39 2,4	48,98	9 11,7		
15 47 17,2	49,99	8 59,7		
15 55 26,6	51,07	9 39,8		
16 3 31,8	52,37	9 43,3		
16 11 52,6	52,99			
16 20 17,8	55,81			

$$\begin{array}{l} \text{a} \{ \text{AR} = 6^{\text{h}}45'7'' = (7) \\ \text{D} = +46^{\circ}55' \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{c} \{ \text{AR} = 6^{\text{h}}45'3'' = (8) \\ \text{D} = +46^{\circ}45' \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{a} - \text{c} \\ \hline \text{AR} \quad \text{Decl.} \\ \hline +0'19''59 \quad +10'30''6 \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} & +4'48''69 & -8'39''1 & +5'4''31 \quad +2'14''1 \\ \text{Zeit der Beob.} & 15^{\text{h}}31'14''9 & 15^{\text{h}}22'16''8 & 15^{\text{h}}2'34''5 \end{array}$$

Die Beobachtungen 2) 3) und 4) wurden von mir gemacht.

Anmerk. Herr Rümker hat a und c am Meridiankreise bestimmt. Es sind scheinbare Positionen für Mai 23.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & 6^{\text{h}}45'31''65 \quad +46^{\circ}53'50''5 \\ \text{c)} & 6 \ 45 \ 11,78 \quad 46 \ 43 \ 35,4 \end{array}$$

S.

Zusammenstellung der Sternbedeckungen, beobachtet auf der Freiherr v. Senftenberg'schen Sternwarte.

Nr.	1	1844	Octbr. 22	9 α^2 Piscium	Eintritt	8 ^h 37' 33''12	mittl. Senftenb. Zt.
2			Nov. 30	76 α Cancri	Austritt	10 47 0,2	
3			Dec. 3	Anonyma (8 Gr.)	Austritt	18 19 43,8	} Astron. Nachrichten Nr. 512.
4				(9 Gr.)		18 26 55,9	
5		1845	Mai 19	(317) Virginis	Eintritt	8 28 8,5	
6			Juni 16	10 σ Librae	Eintritt	18 25 3,3	Sternzeit.
7			Aug. 26	64 χ^4 Orionis	Austritt	13 49 13,54	mittl. Zeit
8			Sept. 22	57 χ^2 Orionis	Eintritt	17 41 41,7	
9			Octbr. 6	(76) Scorpü	Austritt	6 14 30,9	auf 1'' genau?
10		1846	Febr. 18	8 β Scorpü	Eintritt	18 47 36,2	auf 1'' genau
11			März 3	(215) Tauri	Eintritt	8 29 48,8	
12			März 4	Anonyma (7,8)	Eintritt	8 32 16,3	Decl +18°8
							Q = 115°
13			Mai 4	14 C Sextant	Eintritt	13 53 15,4	Sternzeit.
14			— 4	Anonyma (8)	Eintritt	13 51 38,2	D = +6°2
							Q = 125°
15			— 11	8 β Scorpü	Eintritt	13 53 26,5	mittl. Zeit. Beobachter Pleiner
						17 11 8,5	Sternzeit — Hackel.

P. Hackel.

Herr Hackel hat alle bisher in Senftenberg beobachtete Sternbedeckungen hier zusammengestellt, um Astronomen, die correspondirende Beobachtungen haben, zu veranlassen sie entweder direct dem Herrn Baron v. Senftenberg, oder dem Herausgeber dieser Blätter mitzutheilen.

S.