$$\delta\psi = -((\omega_1) - \mu) \left(\frac{\rho(\omega_1)(\theta)^3 t^2}{8 + 4\rho(\omega_1)(\theta)t} + \frac{168\rho(\omega_1)(\theta)^5 t^2 + 112\rho^2(\omega_1)^2(\theta)^6 t^3 + 21\rho^3(\omega_1)^3(\theta)^7 t^4}{36(4 + 2\rho(\omega_1)(\theta)t)^3} + \dots \right)$$

erhellt. Differenziert man aber hier die Grösse

$$\frac{168\rho(\omega_1)(\theta)^5 t^2 + 112\rho^2(\omega_1)^2(\theta)^6 t^3 + 21\rho^3(\omega_1)^3(\theta)^7 t^4}{36(4 + 2\rho(\omega_1)(\theta)t)^3}, \quad (114)$$

welche =

$$\frac{7(\theta)^4 t}{288} \cdot \frac{6 \cdot \frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t + 8(\frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t)^2 + 3(\frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t)^3}{(1 + \frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t)^3} \quad (115)$$

$$= \frac{7(\theta)^3}{144\rho(\omega_1)} \cdot \frac{6(\frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t)^2 + 8(\frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t)^3 + 3(\frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t)^4}{(1 + \frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t)^3} \quad (116)$$

$$= \frac{7}{18\rho^4(\omega_1)t^3} \cdot \frac{6(\frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t)^5 + 8(\frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t)^6 + 3(\frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t)^7}{(1 + \frac{1}{2}\rho(\omega_1)(\theta)t)^3} \quad (117)$$

ist, in der Gestalt (115) nach (ω_1) , in der Gestalt (116) nach t , und in der Gestalt (117) nach (θ) , so sieht man, dass die Grösse (114) desto grösser ist, je kürzer das Pendel, je grösser die anfängliche Elongation, und je länger die Pendel-Bewegung fortgesetzt ist; für

$$(\omega_1) = 10\pi, \quad (\theta) = 1^\circ 8' 26'', 2, \quad t = 2^h, 243$$

ist die Grösse (114), sogar um ihren 4325^{ten} Theil vermehrt, nicht $> \frac{1}{1024}$ Zeit-Secunde und daher völlig unmerklich. Wir können also kürzer

$$-\delta\psi = \frac{((\omega_1) - \mu)\rho(\omega_1)(\theta)^3 t^2}{8 + 4\rho(\omega_1)(\theta)t}$$

schreiben. Hieraus folgt:

$$\frac{(\omega_1) - \mu}{-\delta\psi} = \frac{8}{\rho(\omega_1)(\theta)^3 t^2} + \frac{4}{(\theta)^2 t};$$

folglich ist der Zeitraum $\frac{-\delta\psi}{(\omega_1) - \mu}$ desto grösser, je kürzer das Pendel, je grösser die anfängliche Elongation, und je länger die Pendel-Bewegung fortgesetzt ist; für

$$(\omega_1) = 10\pi, \quad (\theta) = 1^\circ 8' 26'', 2, \quad t = 2^h, 243$$

ist $\frac{-\delta\psi}{(\omega_1) - \mu} = 0,7834$ Zeit-Secunden.

$$t \frac{\psi' - \alpha}{\psi - \alpha} - t' = \frac{(\theta)^2 t'}{4 + 2\rho(\omega_1)(\theta)t} - \frac{(\theta)^3 t}{4 + 2\rho(\omega_1)(\theta)t} \cdot \frac{\psi' - \alpha}{\psi - \alpha},$$

also (da jedes der beiden Glieder dieser Formel $< 0,39007$ Zeit-Secunden ist) $< 0'', 39007$.

Dieser Zeitraum ist merklich, sogar bei dem 20 Meter langen Pendel, wo er (wenn $(\theta) = 1^\circ 8' 26'', 2$ und $t = 2^h, 243$ gesetzt wird) $0'', 4099$ beträgt; versteht man aber unter der Störung den Überschuss der wirklichen Azimuthal-Bewegung über diejenige, welche das Pendel annehmen würde, wenn es sich von Anfang an mit der Azimuthal-Geschwindigkeit $(\omega_1) - \mu$ bewegte, so lässt sich leicht die Unmerklichkeit darthun. Denn alsdann ist

$$\delta\psi = \psi - \alpha - ((\omega_1) - \mu)t,$$

also sehr nahe

$$\frac{\delta\psi}{(\omega_1) - \mu} = \frac{(\theta)^2 t}{4 + 2\rho(\omega_1)(\theta)t},$$

desto grösser, je länger das Pendel, je grösser die anfängliche Elongation, und je länger die Pendel-Bewegung fortgesetzt ist, und, wenn man

$$(\omega_1) = 0,7003, \quad (\theta) = 1^\circ 8' 26'', 2, \quad t = 2^h, 243$$

setzt, $= 0,39007$ Zeit-Secunden.

Noch unmerklicher ist die Störung der Gleichförmigkeit der Azimuthal-Bewegung überhaupt; diese findet sich nämlich, wenn man die zu Ende des § 30 gebrauchte Bedeutung von t' und ψ' beibehält,

§ 57.

Wir hoffen in den bisherigen Abhandlungen über die Pendel-Bewegung auf einige interessante Punkte aufmerksam gemacht zu haben, welche durch die Beobachtung geprüft und entschieden werden können.

Potsdam, den 12. October 1854.

W. Lehmann.

Schreiben des Herrn Professors *A. Secchi*, Directors der Sternwarte des Coll. Rom., an den Herausgeber.

Permettez moi de vous adresser quelques observations de la comète du 3, 4. Juin 1855. Le mauvais temps et la Lune

et après la Lune les brouillards du côté de la comète ont empêché de l'observer après — . Je vous envoie encore

quelques mesures d'étoiles doubles, prises pour la plus grande partie dans ce dernier temps, car la saison a été pour le passé très défavorable à ce genre d'observations. Je déclare de les présenter plutôt comme un essai d'étude fait pour reconnaître la limite de mes erreurs personnelles dans ce genre de recherches, que comme des mesures sans exceptions. La force de l'instrument paraît assez de la qualité des objets mesurés et de l'accord des résultats partiels, qui seront publiés dans les mémoires de l'observatoire. J'ai suivi minutieusement les prescriptions de Mr. *Struve*: les grossissements ont été toujours les plus forts possibles, c'est à dire 760 et 1000 fois, et si l'on ne pouvait pas les employer, on ne mesurait pas, ou du moins on ne faisait l'observation que pour exercice, ne la comprenant pas dans le rôle des régulières. J'ai reconnu ainsi que les mesures prises avec des images diffuses sont presque toujours considérablement en excès. J'ai apporté un soin spécial à l'étude des différences qui se manifestent d'un jour à l'autre, et pour cela chaque mesure a été prise au moins 3 fois chaque jour, et en trois jours différents. C'est vraiment étonnant de voir, comme les mesures prises le même soir présentent un accord surprenant, de sorte, qu'il était rare que pour un même soir les valeurs des doubles distances presentassent des différences plus grandes de $\frac{1}{100}$ de revolution de la vis, (c'est à dire, de $0'',154$), au contraire d'un soir à l'autre les divergences étaient plus sensibles et quelquefois même trois fois plus fortes. Sans doutes ces différences diminueront avec l'exercice et la pratique de l'instrument, mais il pourrait bien arriver que la constance du résultat devint un effet d'habitude de jugement, et non pas une preuve de la vérité absolue de la mesure: or ce qui peut arriver à un observateur peut bien arriver aux autres et par cela on pourrait expliquer les différences sensibles qui se trouvent entre les mesures des observateurs célèbres, sans rejeter tout sur les instruments. Il paraît donc très intéressant pour la science d'avoir les mesures des mêmes objets obtenues par différents observateurs avec des instruments semblables et très parfaits. Comme notre équatorial est de l'ordre des plus puissants qui existent et égal à celui avec lequel on a fait les travaux les plus remarquables de cette espèce, je dévouerai bien volontier tout mon temps à ce genre de travail. J'ai déjà dit que les observations ont été faites au moins en trois jours différents, et j'ai reconnu qu'en les multipliant davantage on gagne bien peu, et il vaut mieux de laisser passer un intervalle de temps un peu long entre une série d'observations et l'autre pour éviter un agrément illusoire, auquel on arrive bientôt en prenant les mesures en des jours successifs.

Par rapport aux objets en particulier je dirai seulement que γ couronne se voit assez allongée et quoique les deux disques

ne soient pas séparés, mais paraissent se toucher, cependant en quelques moments on les croirait divisés par un trait très delié. Celle-ci et celle de ζ Cancri auront de l'importance après les résultats obtenus par Mr. *Wimecke*, sur les orbites de ces étoiles. Je donne seulement deux observations d'Antares car je l'ai trouvé double dernièrement, quoique cherché inutilement plusieurs fois, de sorte que je doute de la variabilité de cette étoile. Elle a été vue double dans le 1849 en Amérique avec la lunette de Cauchois par le P. *Rosa*, mais après nous l'avons cherchée envain ici à Rome avec la même lunette, et deux fois encore l'hyver passé avec la lunette de Merz, toujours sans succès: actuellement on la voit très bien et de sorte qu'il est impossible de se tromper et de ne pas la reconnaître au premier coup d'oeil: le compagnon est de 7^{ième} à 8^{ième} grandeur et d'une couleur bleuâtre, peut-être par effet de contraste. Elle ressemble beaucoup à ζ Hercules. La nébuleuse 51 Messier célèbre par les découvertes de Lord *Rosse*, a pu être mesurée très facilement aux fils clairs en champ obscur: les différentes mesures s'accordent au $\frac{1}{3}$ de seconde.

Je ne veux pas fermer cette lettre sans vous dire quelque chose de la voie lactée comme on la voit sous ce beau ciel, avec ce magnifique instrument, même dans les parties basses du Sagittaire. La superbe description qu'en a faite Sir *J. Herschel* dans ses observations du Cap en est une expression si fidèle, qu'il serait bien difficile d'en faire une autre plus belle et plus exacte. Une espèce de triple couche d'étoiles paraît se développer devant l'observateur: la première d'étoiles et clusters assez grossiers; la deuxième d'étoiles plus petites et inférieures certainement à la 12^{ième} grandeur; la troisième enfin un fond tout à fait nébuleux. Que ce fond n'est pas un effet d'illusion ni le produit de la clarté des autres étoiles, est évident de ce que dans le milieu de ces places blanchâtres on voit plusieurs espaces absolument noirs comme des ouvertures par les quelles on pénètre dans la profondeur des cieux: je crois aussi que les grandes masses nébuleuses qu'on trouve dans ces régions sont dues à une condensation plus forte de cette matière nébuleuse. Ce qui est remarqué par Sir *J. Herschel* de la limite tranchée de la voie lactée en quelques places se trouve très vrai, et surprenant. Mais un fait qui a choqué non seulement moi mais encore quelque autre savant à qui je l'ai montré, est la disposition singulière des étoiles de grandeurs plus considérables, qui forment quelquefois des figures si géométriques qu'il est impossible de les croire accidentelles. La plus grande partie sont comme des arcs de spirale, on peut compter jusque à 10 ou 12 étoiles de 9^{ième} à la 10^{ième} grandeur (car elles supportent très bien l'illumination) se suivant sur une même courbe comme les grains de chapelet:

quelquefois elles forment des rayons qui semblent diverger d'un centre commun, et ce qui est bien singulier on voit d'ordinaire, que, soit au centre des rayons, soit au commencement de la branche de courbe on trouve une étoile plus grande et rouge. Il est impossible de croire que telle distribution soit accidentelle: elle rappelle une loi d'agglomération qui pour être dévoilée n'a besoin que des mesures exactes. Je signalerai aux astronomes ce que s'observe surtout à $17^h 57^m$ d'AR. et $18^o 50'$ de Decl. aust. comme une place qui contient une foule de ces particularités; même dans le Cygne il y a plusieurs exemples. Pour étudier avec avantage la constitution de la voie lactée, j'ai trouvé très convenable l'application au grand équatorial de l'oculaire le plus faible de son chercheur: le grossissement qu'on obtient ainsi, est de 120 avec un champ de $24'$; mais la lumière est presque double de celle que donnent les oculaires propres de l'équatorial, même les plus faibles, quoique les images des étoiles, surtout au bord du champ, ne soient pas si

exactes. J'ai conclu de là que malgré la petite élévation des régions du Sagittaire sur notre horizon j'ai pu voir jusqu'ici ce qui a vu Sir *J. Herschel* au Cap avec l'avantage d'une position plus favorable. Jupiter paraissant à une heure convenable sur l'horizon il est naturel de lui donner aussi un coup-d'oeil: en l'observant, j'ai été surpris de voir l'aspect des bandes assez différent de l'ordinaire: pour vous faire comprendre cette singularité je dirai que l'hémisphère inférieur apparent (le Nord vrai) est tout à fait sombre pendant que le supérieur est tout clair: ou en autres mots la calotte inférieure est tout à fait de la teinte sombre des bandes obscures avec lesquelles elle fait continuation: après vient une bande claire, puis une obscure, après une autre claire, après une autre obscure et enfin la calotte de l'hémisphère supérieur toute claire. Il est déjà trois soirées qu'il présente ce phénomène, que je vous ai indiqué; car je n'ai vu Jupiter jamais dessiné de cette manière, quoique cela ne soit pas surprenant vue la variabilité des bandes.

Observations de la comète du 3. Juin, découverte à Florence par Mr. *Donati*. Corrigées de refr.

	T. m. Rome.	$\Delta \alpha$.	$\Delta \delta$.	α .	δ .	comparaisons
1855 Juin 12	$9^h 42^m 17^s.2$	(a) $-2^m 26^s.78$	(a) $-0' 55'' 95$	$8^h 9^m 55^s.78$	$+34^o 22' 48'' 4$	3
14	9 5 20,9	(c) $+0 1,91$	(c) $-11 17,50$	8 18 59,63	$+33 49 18,6$	4 } par position
16	9 26 10,7	(d) $-0 3,91$	(d) $+0 9,20$	8 26 34,64	$+33 17 28,6$	4 } et distance.

Étoiles de comparaison: (a) = 16301 Lal. H. C., (c) = 16548 Lal. H. C., (d) = 16809 Lal. H. C. La dernière fois on a encore comparé l'étoile (d) avec l'autre (d') = 2896 B. A. C. et on a trouvé $\alpha(d) = d' - 2^m 46^s 27$, $\delta(d) = d' - 1' 5'' 56$, (2 compar.)

Étoiles doubles observées à l'Equatorial de Merz du Coll. Romain.

Objet.	Epoque d'observ.	angle de posit.	Distance.	No. des jours.	Objet.	Epoque d'observ.	Angle de posit.	Distance.	No. des jours.
Castor	1855, 193	$244^o 50$	$5'' 357$	3	49 Serpentis	1855, 463	$321^o 99$	$3'' 488$	3
ζ Cancri AB.	190	312,44	1,067	3	ζ Herculis	 501	69,37	1,592	2
ζ Cancri AC.	190	140,96	4,931	3	α Herculis	 442	118,70	4,695	3
γ Virginis	 406	172,63	3,372	6	70 Ophiuchi	 451	111,58	6,256	3
ζ Bootis	 432	306,50	0,978	3	δ Serpentis	 464	195,48	2,976	3
ϵ Bootis	 370	323,88	2,613	4	α Scorpii	 507	270,38	3,181	2
ξ Bootis	 419	310,51	5,999	3	Neb. 51 M.	 448	15,54	$4' 22'' 75$	3
44 Bootis	 365	238,84	4,539	3					
η Coronae	 396	325,62	$0,32 \pm^*)$	2					

*) distance estimée.

A. Secchi.

I n h a l t.

(Zu Nr. 975.) Ueber die anomalistische und azimuthale Bewegung des Pendels etc. (Schluss der bisherigen Abhandlungen desselben Verfassers über die Pendel-Bewegung.) 225. —
Schreiben des Herrn Professor *A. Secchi* an den Herausgeber 235. —

Altona 1855. August 1.